

DE HISTORIA STIRPIVM

COMMENTARIJ INSIGNES,

maximis impensis & vigilijs elaborati, Leone

Bartholomæo medico clarissimo, authore:

Scholijs in singula propè capita longè

utilissimis à viro quodam medicis

ne doctissimo adiectis, & Plā-

tarum voces gallicas passim

expressimentibus.

Accessit iis succincta admodum vocū difficultium & obscurarum passim in hoc opere occurrentium explicatio.

Vnà cum triplici Indice, quorū primus quidam Stirpiū nomenclaturas Græcas, alter Latīnas, tertius officinis Seplasiariorum & herbariis vsitatas, continet.

PARISIIS,

Apud Viuantium Gaultherot, sub insigni
D. Martini, via ad D. Iacobum.

1547

63

Joan. Fran. Narati Hieromonachy
= 1735 =

ILLVSTRIS- SIMO ET CHRI- STIANISSIMO PRINCIPI AC

Domino, Domino Ioachimo, Sacri Romani imperij
electori, Marchioni Brandenburgensi, Stetinae,
Pomerania, Cassuborum, Sclauorumq; Duci,
Burggraui Norimbergensi, necnon Rugiae
Principi, Domino suo longè clementissi-
mo, ~~Incubitus Fuchsius~~ medicus

S. P. D.

Herbariã
medicinã
multũ ad-
miratio-
nis & lau-
dis sem-
per obti-
nisse.
Stirpium
origo diui-
na.



Vanquã vniuersa medicina nul-
lis non seculis gloriosa & diuina
sit habita, Illustrissime ac gene-
rosissime Princeps, tamen in hoc
eius sumo splendore seper plus lau-
dis, admirationis ac ponderis, ea
illius pars quæ naturas stirpiũ vestigat rimaturq;
obtinuit: idq; partim quòd vetustate, cuius maxi-
ma semper apud omnes autoritas et veneratio fuit,
esset antiquissima: partim etiam quòd iucunda, v-
tilis & necessaria eius esset cognitio. Nam cum re-
liquæ propemodum omnes artes, simulatque à Deo
opt. max. creatus est homo, inuenta sint, ac subinde
multorum industria aucta, sola herba post condi-
ta statim elementa, nulloq; adhuc existente homi-
ne,

ne, vnâ cum diuinis suis viribus, ita iubente Deo, è
terrâ latebris eruperunt. Vt hoc nomine nullius rei
aut artis inuentio verius quàm medicina & stir-
piû, Deo assignetur. Cuius rei Moses in sua genesi te Moses scri-
psit omnium qui aliquid scripserunt vetustissimus, & ptor om-
non minus profanis quàm nostris admirabilis atq; ve nium anti-
neradus. Testes itē sūt poeta græcorū antiquissimi, quissimus.
Orpheus, Musæus in Polij laudib. Hesiodus in iisdē,
& malua & Asphodeli virib. Homerus in Nepen-
the, Loto, Moly herba Mercurio inuenta: Latini au-
tē Ouidius, dum medicina inuentionē Apollini tri-
buit. Vergilius, dū passim dictāni & aliarū herba-
rum naturā miscet. Plātas autē atque adeò plan-
tarū ipsarum vires omnes, tum à primis qualitati-
bus profectas, tum quas tota ipsarum substantia oc-
cultas tegit, methodo experiētiaq; pernouisse, quā-
sit non incundum modo, sed etiam vtile ac etiā ne-
cessarium, ad sanitatem (qua nihil homini prius et
optatius esse possit) vel præsentem tutandam, vel
absentem reuocandam, abūdē prodit veterum etiā
regum in eam rem studium nobile ac strenuum, quo
horum quisque tum de posteris bene mereri tū no-
men suum apud eos immortale reddere conatus est,
suo nomine plantis à se inuentis, imperdito. Hinc
Gentiana, Lysimachia, Mithridatia herba, scordiū
etiam dicta, à potentissimis regibus. Illyriorum Gē-
tio, Macedonum Lysimacho, Ponti & Bithiniæ Mi-
thridate adpellata sunt, vt à Tencro Tencrium, ab

Achille Achilleia, à Chirone Centauro Cētaurium,
ab Artemisia Carie regina, & alie ab aliis plurima
& inuenta & dicta fuerunt. Quin & Mithridates
idem, Attalus Pergami, Salomon Iudeorum,
Euax Arabum, Iuba Mauritanie rex, plantarum
noscendarum non studiosi modò fuerunt, sed horum
plerique de his accuratè quædam scripserunt, alij
composita ex his non pauca medicamenta miscue-
runt, magno mortalium commodo. Adde quòd Ro-
mani Reges pariter ac Imperatores in multis re-
gionibus herbarios magno sumptu alebant, vt sim-
plicium medicamentorum, sed optimorum notitia &
sibi esset vsui, & ad posteros vsque permaneret.
Idem quoque studium Philosophos tenuisse, his col-
ligas licet, quòd Pythagoras bulbos, Chrysippus
Brassicam, Zeno Capparim, Aristoteles rem herba-
riam volumine iusto celebravit. Quàm vellem hu-
ius ætatis Reges ac Principes alios in idem studium
incumbere, vel saltem viros bonos rei plantariæ stu-
diosos sumptu iusto iuare. Quàm vellem quoque
huius tempestatis medicos hanc medicinæ partem
diligentius tractare, neque totam Pharmacopolis
& rusticis mulierculis permittere. Iam enim &
morbis ratione certa mederi scirèt: iam medicamē-
ta methodo componere, iam compositorum vires ex-
pendere, iam compositis rectè vti profectò possent.
Quem verò lapidem non mouerunt Theophrastus,
Dioscorides, Galenus, vt plantarum non modò hi-
storiam,

storiā, sed vniuersam quoque naturā nobis ex-
primerent? Quo Deus bono studio Hermolaus Bar-
barus & Ioannes Ruellius Plinij exemplo ex va-
riis veterum libris rem plantariā restituere cona-
ti sunt? Vt eo nomine vterque hac etate doctissi-
mus de posteris præclarè sit meritus, vt etiam me
non pudeat apertè fateri, Ruellij cōmentarios mul-
tum mihi profuisse, vt idem de Hermolai, & Mara-
celli, & Othonis Brunfelsii, Ewricij Cordi, Hierony-
mi Tragi scriptis pollicear. Quorum longè doctissi-
morum virorum studium imitatus, hos de historia
sirpium commentarios maximis cū vigiliis tum
sumptibus confeci. Primū vniuersam cuiusque sir-
pis historiam breuiter & ordine optimo complexus.
Deinde singularum imagines viuis proximās, quā
ceteri omnes artificiosius expressi, vt etiam vulgas
res quasdam non prætermittendas censuerim, ne o-
lim à posteris ignorentur, quomodo plurimæ Diosco-
ridis sæculo notiores, quā vt eas putarit describē-
das, hodie etiam doctissimis & diligentissimis igno-
rentur. Addidimus quoque vulnerarias præsertim
plurimis chirurgis vsu quotidiano cognitissimas,
quas ineptis nominibus exprimere quā tacere
maluimus. dū quod nomen apud Græcos aut Latī-
nos germanum sunt sortita, si tamen sunt sortita,
ignoretur. Appinximus & arbores aliquot, ob id
quod ad earum folia sæpius Dioscorides herbarum
quoque folia comparat. Quas porro plantarum vi-

res ex Diosc. Galeno. Aetio, Paulo, Simeone, Plinio
recensemus, si vno ore ab omnib. confirmatur, susci-
piendæ: Si in his dissentitur, Ga. tibi præter cæteros
imitandus, vt qui methodo inuentas plantarum fa-
cultates experientia longa comprobavit. In his au-
tem describendis, Galenum, Aetium, Paulum sequen-
tus, literarum Græcarum ordinem tenui, non cum
Dioscoride congeneres passim herbas cõnexui, quòd
hæ in idem tempus non incidant perfectæ, quales
nobis ad viuas representare in animo fuit, ob id um-
bris pictorũ libidini consuetis abstinere voluimus,
ne veram plantæ formam obscurarent. Quum ve-
rò vsitato more patronum aliquem iis nostris com-
mẽtariis quærerem nobilitate & virtutum splendo-
re excellentem, nemo omnium cui iustius quàm tibi
Illustrissimè Princeps Ioachime, clarissimo heroi,
hos dedicandos esse putarẽ occurrebat. Nã si generis
tui vetustatem atque nobilitatem specto, nemo te
hodie Principum aut melior, aut præstantior, vt po-
te cuius maiores à Guelfis, qua vix vlla in Germa-
nia vetustior est nobilitas, ortos esse constat. Quod
si eorundem virtutes expendo, nullã prorsus virtus
tẽ magnis & bonis Principibus dignã illis defuisse
video. Proinde cum in spẽ certissimam adducere-
mur, nostras has vigilias non vulgarem gratiã ex
amplissimi nominis tui inscriptione apud candidos
& equos inuituras, foreq; vt cã ob causam maledi-
corũ cõniciatorũ petulantia perfringeretur, te qui-
dem

dem in tanto ornatissimorum Principū numero mihi delegi, cui potissimum has ipsas consecrare. Quare cum eas suscipies illustris. **PRINCEPS** commendari tibi defensionē & conseruationem huius partis medicinae quae stirpium naturas inquirat, statues. Quam ut cupidē & libet in te recipias, multa, scio, mouebunt: potissimū vero hoc ipsum, quod vix ex vlla alia re magis diuina praesentia & benignitas eluceat, quam ex tam varia stirpium tū forma, tum natura, dum scilicet omnes illas ad vsum hominis conditas à Deo ipso perpendimus. Si quid igitur aliud, herbarum certē diligens contemplatio exuscitat, imò confirmat in animis nostris opinionem hanc, quod homines Deo cura sint, qui tā anxie laborauit in iis iuuandis ac tuendis, dum tot elegantissimis atque praestantissimis stirpibus quibus illi tā varios morbos propulsare possunt, terrā exornauit. Nō parū etiam ad eam suscipiendam curā te praclarissimorum tū Regū tum Principū exempla, quae supra recitauimus, hortabūtur. Sed omnium maximē immensa commoditas quae ex istius partis medicinae conseruatione ad vniuersos perueniet. Ad herbariae denique medicinae tum amorem tum defensionem mira quoque incūditas, quae in contemplandis tot herbarū generibus animum subibit tuū, inuitabit. Quid enim incūdius, quid delectabilius quam intueri stirpes, quas Deus opt. max. tot tamq; variis pinxit coloribus, tot elegantissimis redimiuit
aa iij floribus,

Diuina
praesentia
& beni-
gnitas ex
stirpibus
ipsis elu-
cet.

floribus, quorum colorem nulus vnquam pictor sa-
 tis exprimere potuit: tot denique seminibus & fru-
 ctibus quorū & in culina & in medicina vsus est
 maximus, ornauit? Verū nō est cur te pluribus in
 admirationem huius partis medicina pertrahere co-
 ner, vtpote qui antea studio & amore eius sic teneas-
 ris, vt vix sit aliud quod te magis delectet. Num-
 quam enim in extruēdis hortis tot arboribus atque
 herbis consitis, tantum operæ & impensarum pone-
 res, si non illuc te rei incunditas ac singularis amor
 pertraheret. Reliquum nunc est illustris. P R I N-
 C E P S, vt pro tua excellenti humanitate, quæ ves-
 stræ familiæ cognata est, munus hoc nostrum tan-
 quam specimen & testem mei erga C. T. amoris &
 obseruantiae, exporrecta lætaq; fronte accipias, at-
 que me tuo fauore complectaris, & autoritate ab
 inuidorum calumniis defendas. Bona autem spes est
 hunc hortum quem donamus C. T. fore longè gra-
 tissimum, non tantum quòd in eo omnis ferè generis
 herbas elegantissimè pictas reperire queas, verū
 etiam quòd inde ad quæuis morborum genera reme-
 dia decerpere tibi liceat. Deus opt. max. te tuamq;
 ditionem incolumem seruet, vt Reipub. Chri-
 stianæ atque literis diuissime prodesse
 possis. Tubingæ, Calendis Mar-
 tiis, Anno à nato Christo

M. D. XLII.

G R A E

GRAECARVM NOMENCLA-
tionum Index Alphabeticus.

Α Ερότονον. 5	ἀναγαλλίς ἄνδρος. 389
Ἀγριοκάρδαμον. 176	ἀνδρόσαιμον. 44. 6
ἄγρωσις. 80	448
ἄδιαντον. 48	ἄνδραχνη. 66
ἄδιον. 106	ἄνθον. 18 ἄνθεμις. 16
ἄειζωον. 19	ἄνθρωπόμορφος. 288
ἄειζωον ἄγριον. 432	ἄνισον. 35 ἄνωγίς. 33
ἄγρόκερως. 430	ἄσπαρίνη. 28
ἄις. 75 ἄκαλύφην. 63	ἄτωιος. 78
ἄκανθες, ἢ ἄκανθα. 29	ἄρίσαρον. 39
ἄκανθα λδυκή. 30	ἄριστολοχίς. 54
ἄκοντον. 52	ἄρκεον. 42
ἄκορον. 8	ἄρκευθος ἢ ἄρκευθίς. 45
ἄκτῆ. 36 ἄλθαία. 11	ἄρνόπλωστον. 22
ἄλισμα. 24 ἄλκία. 47	ἄρόν. 39
ἄλκιβιάδιον. 148	ἄρτεμισία. 25
ἄλοῦ. 82 ἄλσιν. 14	ἄσαρον. 7
ἄμαρσπον. 314. et 360	ἄσκηπιας. 77
ἄμαρσποντος. 60	ἄσκηρον ἢ ἄσκηροειδής. 44
ἄμμι. 38	ἄσπαραγος. 32
ἄμπελος λδυκή. 57	ἄσπερ ἄπικός. 79
ἄμπελος μέλαινα. 59	ἄσπιον. 244
ἄμπελος εἰνοφόρος καὶ ἡμῶρος. 50	ἄσφάδελος. 68
ἀναγαλλίς. 13	ἄστακτυλίσ. 73
	ἄτράφαξις. 71
	ἄφάκω

ἀφάκη.	66	γδράνιον.	115
ἀψίνθιον.	1	γῆς σέφανος.	472
Β Αλλωτή.	92	γιγγίδιον.	119
Βάρυθρον.	88	γληχον.	110
Βασιλικόν.	298	γλυκὺ ῥίζα.	106
Βάτος.	90	γλυκυσίδη.	113
Βατράχιον.	93	γναφάλιον.	121
Βήχιον.	34	γογγύλη, ἢ γογγυλὶς.	
Βίκιον.	99	117	
Βλήχον.	110	Δ αμμασώνιον.	24
Βλίττον.	99	Δαῦκος.	127
Βολβὸς ἄγριος.	97	δάφνη ἀλεξάνδρεια, ἢ	
Βοτάνιον ἔρμε.	259	δαία.	130
Βότρυς.	101	δαφνοειδές.	124
Βυβώνιον.	79	διὸς βάλανος.	205
Βυβλωστον.	85	δίψακος.	122
Βυκδρως.	430	δρακοντία μεγάλη, ἢ	
Βυνιάς.	100	δρακόντιον μέγα.	128
Βυφθαλμον.	86.	δρῦς.	125
Βρύθους.	88	δύσοσμον.	417
Βρύον.	95	Ε βενόριχον.	48
Βρυονία.	57	Εβίσκιος.	11
Βρώμος.	103	ἐλατήριον.	378
Γ Αλεόβδολον.	108	ἐλελίσφακον.	136
Γαλήνοφις.	ibid.	ἐλένιον.	133
Γάλλιον, ἢ γαλλέριον, ἢ		ἐλεοσέλινον.	149
γαλάτιον.	109	ἐλίχρυστον.	60
γυντιανή.	111	ἐλλέβορος λευκός.	149
		ἐλξί-	

ἐλξίνη κατὰ μπελος. 142

ἐλξίνη. 152

ἐλυμος. 140

ἐμπεζομ. 391

ἐπιφυλλόκαρπον. 130

ἐπὶ ἀφυλλον. 143

ἐρέδινθος. 146

ἐρείκη. 141

ἐρτυλλον. 138

ἐρυθρόδανον. 154

ἐρύσιμον. 141

ἐυζωμον. 144

ἐν πᾶσι τῶριον, ἢ ἡ πᾶσι τῶ-

ριον. 134

ἐν φροσύνῃ. 135

ἐφήμορον. 131. & 193.

ἐχιομ. 148

Ζεῖα. 155

ζιζάνιον. 75

Ηλύοσμος. 157

ἡμιονίτις. 160

ἡ πᾶσι τῶριον. 134

ἡ γίγνων. 156

ἡ γύγιον. 161

Θρμός ἡ μόρος. 167

θηλυπέρης. 322

θλάσσι, ἢ θλασσίδιον.

165 θρίδαξ. 162

θύαρος. 75

θύμβρα. 164

θύμος. 445

Ιβόρις. 176

ἰβίσκος. 11

ἰεραβοτάνη. 319

ἰερίμιον. 173

ἰξός. 178

ἰομ πορφυρεῶν. 169

ἰω ποσέλιον. 177

ἰω πύρις. 174

ἰρίς. 171

ἰρίς ἀγρία. 131

ἰσάτις. 179. ἰσχας. 78

ἰτία. 180

ἰχθυόθηρον. 246

Καλαμίνθη. 237

καλλιρίχον. 48

καίναβις. 215

καίπνος. 182

καρδίαμον. 196

καρδίαμαντική. 176

κάρος. 217

κάρυα ποντική. 217

κάριον βασιλικόν. 207

καρύθα. 188

κάσανα. 205

κέγχρος. 223

κα-

πενταύριον μικρόν. 211
 περ αἴτις. 430
 περ σος. 232
 πέτρον. 190
 πέτρη, ἢ κρότων. 183
 περκαῖα. 288
 πέριον. 184
 πεσός. 229
 κληματαὶς σαφνοειδής. 199
 κνίδη. 63
 κνίκος. 223
 κνίκος ἀγρία. 73
 κοκκιμηλία. 219
 κολοκύνθα ἰδωλίμος. 200
 κολοκυθίς. 202
 κολετία. 243
 κολχικόν, ἢ ἐφήμερον. 193
 κομή. 443
 κόριον, ἢ κορίαννον. 185
 κορωνόπης. 244
 κρέμνη ἢ ἡμδρος. 225
 κριθή. 239
 κρίνον. 198
 κρόκος. 241
 κρόμμυον. 234
 κρότων. 183
 κύαμος. 213
 κύανος. 233
 κυδωνία μηλία. 203

κυκλάμιος. 246
 κυνία. 242
 κυνόγλωσσον. 222
 κυνοκρέμνη. 242
 κυνὸς ὄρχις. 303
 κύπδος ἢ κύπφρος. 248
 κώνειον. 221
 Λαγώπης. 267
 Λαθυρίς. 249
 λάπαθον. 252
 λάριξ. 268
 λειμώνιον. 255
 λείριον. 198
 λειχήν. 358
 λίκυθος. 339
 λιπίδιον. 263
 λιπτοκάρυα. 217
 λούκανθον. 305
 λουκότιον Διοσκορίδου. 250
 λουκότιον Θεοφράστου. 264
 λιθανωτίς. 260
 λιθόσπυρον. 265
 λιμνήσιον ἢ λιμναῖον. 211
 λινόζωσις. 259
 λινόζωσις ἀγρία ἄρρη. 242

λίνον

λίνομ. 257
λόπιμον. 205
λυσιμάχιον. 266

ΜΑλάχη. 274
μανδραγόρα.

288 μάραθρον. 271
μέλαν πράσιον. 92

μελάνθιον. 272

μελίλωτος. 286

μελιωτόφυλλον, ἢ μελί-
φυλλον. 269

μήκωρ ἡμόρος. 280

μήκωρ κροαίτις. 282

μήκωρ ροιάς. 279

μίλαξ. 385. & 386

μίνθη. 157

μορέα. 283

μυρίκη. 276

μύρρις, ἢ μύρρα. 285

Νάτυ. 293

νάρδος ἀγρία.

461 νήριον. 295

νυμφαία. 291

Ξάνθιον. 313

Θή.

Οή. 311

οἰνάνθη. 305

οἰκμον. 298

ὀμφαλόκαρπος. 28

ὀξυάκανθα. 286

ὀξύς. 306

ὀρεόσελινον. 310

ὀρίγανος. 301

ὄρμινον. 308

ὄροδος. 309

ὄσυρις. 297

ὄρχις. 303

ὄρχις σεράπιας. 304

ὀφιογλωσσον. 312

Παιονία. 113

παρθέλιον. 314

πεντάφυλλον. 337

πέπλος. 327

πόρδίκιον. 154

πόρικλύμνον. 348

πόρις ὀρέων. 319

πόρσικὴ μηλία. 326

πέτσισίτις. 347

πετροσέλιον. 353

πεξοσέλιον ἀγρίον. 210

πδνκίδανος. 324

πήγανον κητωτόν. 332

πίσον. 339

πόα. 259

πολυγόνατον. 316

πολύγονον ἀρρεν. 331

πολυ-

πολύριχον. 48
 ποταμογείτων. 351
 πράσιον. 318
 πράσιον μέλαν. 92
 πράσον. 342

πρωσώτιον, ἢ πρωσώπης
 42 πιαρμική. 345

πῆρις, ἢ πῆριον. 322
 πύξος. 346

πύρεθρον. 345
 πυρός. 349

Ράφανος, ἢ ῥαφανίς
 356

ῥοδῶν ῥίζα. 359
 ῥοδὸδ' ἀφνή. 295

ῥοδὸδ' ἐνδρον. *ibid.*
 ῥόδον. 354

Σάμφυχον. 360
 σαρδιαίνα βάλα-

νος. 205
 σαρξίφραγον, ἢ σαρξί-

φαγον. 391
 σατύριον τρίφυλλον. 382

σατύριον βασιλικόν. 383
 σέλινου κητωαῖον. 397

σέρις. 164
 σέσιλι κρητικόν. 437

σέσιλι ῥ' μαοσαλιωτι-

κόν. 424
 σδύτλον. 434

σιδ' ηῖτις. 414
 σίκυς, ἢ σίκυος ἢ μόρος.

374
 σίκυς ἄγριος. 378

σίλφιον. 409
 σίνητι. 293

σίνητι ἄγριον. 165
 σίον. 389

σίσαρον. 401
 σισύμβριον. 387

σκήλλα. 420
 σκόλυμος. 426

σκόρδιον. 417
 σκόροδον. 394

σμίλαξ λεῖα. 386
 σμίλαξ τραχεῖα. 385

σμίλαξ κητωαῖα. 381
 σμύρνιον. 407

σογχίτης. 173
 σόγχος. 362

συναναχία. 360
 σπάρτον, ἢ σπαρτίον.

406 σπυλῶιον. 160
 σαυρότυπος. 228

σάφρις ἄγρια. 422
 σαφυλῖνος. 366

σά-

σαχυσ.	412
σαχυίτης.	351
σιχάς.	418
σερατιώτης ὀχιλιόφυλ-	
λος.	390
σεσθιον.	419
σερύχνος.	368
συκαμινέα.	283
συκή ἡ μόρος.	402
σύμφυτον,	372
σχοινόστροφος.	215
Τ ελέφιον.	432
Τ δύκειον.	447
τίλις.	430
τιθυμάλος.	438
τόρδυλον, ἢ τορδύλιον.	
437 τραγόπαγον.	440
τρίορχις.	304
τρίφυλλον.	440
τρίφυλλον ἐν χορζο-	
πείοις ἡμνώμενον.	442
τριχόμανις.	429
τρύχνος.	368
τύφη.	444
Υ άκινθος.	451
Υ δροπέπορι.	455
υδροσέλινον.	149
υποκύαμος.	449

ὑπόρικόν.	448
ὑσώπος.	454
Φ ακός, ἢ φακή.	462
Φ άσγανον.	313
φίλυξ.	465
φιλάνθρωπος.	28
φλόμος.	456
φοῦ.	461
Χ αμαιάκτη.	37
Χ αμαιδάλανος.	
78 χαμαίδρυς.	447
χαμαικίστος.	472
χαμαικυνωάριος.	
471	
χαμαιλέων λευκός	475
χαμαιλέων μέλας.	477
χαμαίμηλον. 16. &	314
χαμαιπίτυς.	448 et 478
χελιδόνιον μέγα.	467
χελιδόνιον μικρόν.	468
χρυσάνθεμον.	474
χρυσολάχανον.	71
Υ δρόναρδος.	481
Υ ψίλωρον.	57
ψύλλιον.	480
ψυχόστροφον.	190
Ω κμοειδής.	482
Ω ώνωνις.	33

LATINARVM APPELLATIO- NUM INDEX.

Auellana

1218

A

A Brotonum. 5

A Absinthium. 1

Acāthus sine Acantha. 29

Aconitū. 52. Acorum. 8

Adiantum. 48

Changy Alnga sine Abiga. 478

Red. ref. Aizoon. 19. Alcea. 47.

Ecl. on Alcibiaciū. 148

Paragonia Alisma. 24

Allium. 394. Aloen. 82

Althæa. II. Amaraciū. 314

Amaracus. 360

Amarantus. 60.

Indet. ref. Ambubeia. 364

Ammi. 38

Anagallis. 13

Anagallis aquatica. 389

Androsomon. 44

Anethū. 18. Angelica. 74

Anguria. 375

Anisum. 35

Anonis. 33. Anthemis. 16

Aparine. 28. Aphaca. 364

Aphace. 66

Changy 134.

Apiastrum. 269

Apium agreste. 92

Apium hortense. 397

Apium montanum. 310

Apium palustre. 149

Apium saxatile. 353

Apios. 78

Apollinaris. 449

Aristolochia. 54

Armoracia. 356

Arnoglossum. 22

Artemisia. 25

Arum seu Aris. 39

Asarum. 7. Asclepias. 77

Ascyrum. 44

Asparagus. 32

Asphodelus. 68

Aster atticus. 79

Atractylis. 73

Atriplex. 71

Avena. 103

Auricula muris. 14

B

B Allote. 92

B Balsamine. 105

Barba Batos. 90.

Bryonia

58-Castanea 205.

Barba caprina.	101
Batrachii. 93. Beta.	434
Beta sylvestris.	255
Bellis siue bellius.	87
Betonica. 190. &.	191
Blattaria.	102
Blitum siue blitus.	99
Botrys. 101. Bonis ligna.	85
Brassica satina.	225
Bubula lingua.	85
Buglossum.	ibid.
Buglossum magnum.	184
Bulbus sylvestris. 97. et 193	
Buphthalmum.	86
Buccus.	346

C

Alamintha.	237
Callitrichum.	48
Caltha vel calthula.	209
Campanula.	236
Canina brassica.	242
Canina malus.	288
Cannabis. 215. Capillaris.	
429 Capsella.	165
Carduus.	426
Carduus veneris.	122
Carduus suarius.	475
Carduus niger.	477
Colubea	248
Cucumer Asini	378
Cinara	426

Cardiaca.	216
Caron, vel careum.	217
Caryophyllata.	210
Cassutha.	188
Casta herba. Ponia	113
Castanea.	205
Centummorbia.	219
Cētūculum aut cētuncula	
ris herba.	121
Cepa. 234. Cerasus.	232
Chamacyparissus.	471
Chamedaphne.	195
Chamaleon albus.	475
Chamamelon.	16
Chelidonium maius.	467
Chelidonium minus.	468
Chrysanthemum.	474
Ciccr.	146
Cicerbita.	362
Cicuta. 221. Cinara.	426
Cincinnalis. Diarda	48
Citrage.	269
Clematis Daphnoides.	195
Enicus & Cneus.	223
Cnicus sylvester.	73
Colubrina.	128
Columbaris sen columbina.	
319 Colutea.	243
Chamdrus	
Cinara	

Colus rustica.	73
Coma.	443
Consolida media.	215
Consolida minor.	87
Convolvulus.	142
<i>Coriander</i> Corion seu Coriannon.	185
Corona regia.	286
Corona veneris.	387
Cotonea malus.	203
Crambe.	225
Crista gallinacea.	320
Crocus.	241
Cruciata.	228
Cucumis, seu cucumer	374
Cucumis anguinus.	378
Cucurbita.	200
Cucurbita sylvestris	202
Cumila.	164
Cyanus.	233
Cydonia.	203
Cynia.	242
Cynosorchis.	303
Cyperus & Cipirus.	248

D

D Amassonium.	24
Daphnoides.	124
Daucus	127
Dolichi.	281

Digitalis

Dracunculus maior.	128
Dulcis radix.	106

E

E Biscus. <i>Althæa</i>	11
Ebulus.	37
Echii.	148.
Elenii.	133
Elleborus albus.	149
Elleborus niger adulteri-	
nus.	151
Ephemerum.	131
Equinalis herba.	174
Equisetum ibidem	
Erica.	141.
Eruca.	144
Erium.	319
Eryngium.	161
Eupatorium.	134
Eupatorium adulterinum.	
	145

F

F Aba.	213
Farrago.	413
Farsaria.	84
Febrifuga.	211
Fel terra.	i bidem
Ficus sativa.	402
Fil: cula.	320
Filix.	322
Flos frumentorum.	234

Floris 457.

Fania

Foeniculum.	271	Hieracium.	173
Foenumgracum.	430	Hierobotane. <i>Verben.</i>	320
Fontalis.	351	Hirci barba.	443
Fragaria.	458	Hirudinaria.	219
Fumaria.	182	Hordeum.	239
Fusus agrestis.	73	Hordeum distichū. <i>ibid.</i>	
		Hordeum polystichum	

G

G Aleopsis.	108	Ibidem.	
Gallion.	109	Hyacinthus.	451
Geminalis.	308	Hydropiper.	455
Genista.	120	Hyoeyamus.	449
Genistella.	121	Hypericum.	448
Gentiana.	III	Hyssopus.	454

Geranium.	115		
Gingidium.	119.	I Biga. <i>Tua Ardet.</i>	478
Gith.	272	Ibiscus.	II
Gossipium.	314	Illecebra.	432
Gramen.	80	Inguinalis. <i>Aster</i>	79

H

H Alicacabum.	368	Intubus.	364
Hedera.	229	Inula.	133
Hedera terrestris.	472	Iouis glans.	205
Hedypnois.	364	Irion.	141
Helxine.	152	Iris.	171
Helxine Cissampelos.	142	Iris sylvestris.	131
Hemionitis.	160	Isatis.	179
Hepatorium.	134	Iuglans.	207
Hiberis.	176	Iuniperus.	45
		Iunonis rosa.	198

Silvestris 194.

211

Linnæus

L	
Labrum veneris.	122
Lactaria herba.	438
Lactuca.	162
Lactuca caprina, aut mas- rina.	438
Lactuca syluatica.	173
Lamium.	256
Lanaria herba.	419
Larix seu Larex.	268
Lascer, seu Laserpitiū.	409
Lathyrus.	249
Lauzer.	389
Laurus alexandrina, aut Idæa.	130
Lens siue lenticula.	462
Lepidon.	176. 263
Leporinus pes.	267
Leucoion Dioscoridis.	150
Leucoio Theophrasti.	264
Lolium.	275
Lichen.	258
Lignustrum.	261
Lilium.	198
Limonium.	255
Lingua canina.	222
Lingua serpentina	312
Linum.	257

Lithospermum.	265
Lunaria minor.	262
Lupinus sativus.	167
Lupus salictarius vel repti- tius. <i>Lupulus</i> -	95
Lychnitis.	457
Lycostomum.	52
Lysimachia.	266

M

Aiorana.	360
Mala insana.	290
Malua.	274
Malus Cotonea.	203
Marrubium.	318
Melilotus.	286
Melones.	375
Menta.	157
Menthastrum.	157
Mercurialis.	259
Mercurialis syluestris mas- 242	
Milium.	223
Millefolium.	314
Mors vermium. <i>Algin</i>	4
Morus.	283
Myrice.	276
Myrrhis.	288
melonge Na	290

Lauricola - 124

Napus
meckow, bapner sak. 28

N

N apus.	100
Napus bunias sativus & sylvestris.	ibidem
Nardus sylvestris.	461.
Nasturtium agreste.	176
Nasturtium sativum.	196
Nepeta.	237. Nerton. 295
Nigella.	272
Nummularia.	219
Nux auellana.	217
Nux regia & persica.	207
Nux castanea.	205
Nux pontica.	218
Nymphæa.	291

O

O Cimum.	298
Ocimastrum.	482
Oenanthe.	305
Oliv. atrum.	177
Ononis.	33
Ophioglossum.	312
Ophris. 307. Orchis.	303
origanū. 301. Orminū.	208
Oshris. 297. Oxalis.	253
Oxyacantha.	286
Oxylapathum.	253
Oxys.	306

P

P AEonia.	113
Panicum.	140
Papaver corniculatū.	282
Papaver nigrum.	272
Papaver rhœas.	279
Papaver sativum.	280
Parthenium.	314
Pastinaca.	366
Pedicularis herba.	422
Peplos.	327
Pepones.	374
Petasites.	347
Petroselinum.	353
Petroselinum sylvestre.	310
Perfoliata.	341
Persicaria.	ibidem
Persica malus.	326
Personatia.	42
Pes anserinus.	352
Pes cornicis.	244
Peucedanus.	324
Phu.	461
Pinastellus.	324
Piperitis.	392
Pistolochia.	54
Pisum.	339
Pituitaria.	422

bb iij

Plantas

Peucedanum 324

Plantago.	22
Polygonatum.	316
Polytrichon.	340
Polytrichum.	48
Porrum.	342
Portulaca.	66
Potamogeton.	351
Pranestina nux.	217
Proserpinaca.	331
Prunus.	219
Pseudonardus.	481
Psilothrum.	57
Pulegium.	110
Pulicaris herba.	480
Pulmonaria.	344
Pyrethrum sylvestre.	345

Q Quercus. 125

Quinquefolium. 337

R

R Adicula. 356. et 419

Radix. 356

Ranunculus. 93

Raphanus. 356

Raphanus sylvestris. 78

Rapum. 117. & 246

Rhodia radix. 359

Rhododendron. 295

Ricinus. 183

Rosa. 354

Rosmarinus. 260

Rubia. 154

Rubus. 90

Rumex. 252

Ruta hortensis. 332

S

S Abina siue samina. 88

Sagminalis herba.

319.

Saliuarius. 345

Salix. 180

Salix equinalis. 174

Salvia. 136

Salvia sylvestris. 308

Sambucus. 36

Sanguinalis. 244. & 331.

Sanguinaria. 244

Sanicula. 361

Sardiana glans. 295

Satyrion regium. 383

Satyrion trifolium. 382

Saxifraga. 391

Scandulaceum. 165

Scilla. 420

Scorpium. 52

Scythica radix. 106

Seca

Handwritten signature and number 356

Secale. 413.	Sedum. 19	Solis oculus.	314
Semen.	155	Sonchus.	362
Semen lumbricorum.	4	Sorbus 311. Spartū	406
Seminalis.	331	Spina alba.	29
Senetio. 156. Sentes. 90		Spinacca vel spinaceum o-	
Septifolium.	143	lus.	360
Seriola.	364	Spina mollis.	184
Seris.	364	Stachys.	412
Serpentaria.	219	Sternutamentaria.	345
Serpentaria maior.	128	Stichas.	418
Serpyllum.	138	Stratiotes millefolia.	390
Sertula campana.	286	Strobilus.	426
Seseli Creticum.	437	Succisa.	384
Seseli Massiliense.	424	Supercilium terra.	48
Sideritis prima.	414	Sylva mater.	348
Siliquastrum.	392	Symphytum.	372
Sinapi.	293	T	
Sion.	389	T Amarix.	276
Sifer.	401	T Telephium.	432
Sisymbrium.	387	Terminalis.	215
Sisymbrium Cardamine.		Terra capillus.	48
388.		Terra corona.	472
Smilax aspera.	385	Terrestris malus.	288
Smilax hortensis.	381	Testiculus serapias sine ora	
Smilax lauis	386	chis.	304
Smyrnium.	407	Teucrium.	447
Solanum.	368	Teucrion Plinij.	160
Solidago.	372	Thlaspi.	166.
		bb iij	Thyma

Tormentilla 174.

Thymbra.	184
Thymus.	445
Thryallis.	457
Tilia.	465
Tintinabulum terra.	255
Tithymalorum genera plu ra.	438
Tordylō sine Tordyliō.	437
Trichomanes.	429
Trifolium odoratum.	440
Trifolium pratense.	442
Triticum.	349
Trissago.	469
Trixago palustris.	417
Tuber terra.	246
Tussilago.	84
Typha.	444

Trinitas. Abs. V

V Eratrum albū.	149
Verbasum.	456

Verbascula.	457
Verbenaca.	319

Cham. Leon - Vernilagium. — 477

Vesicaria.	368
Vetonica.	190

Vicia.	99
--------	----

Victoriola.	130
-------------	-----

Viola.	250
--------	-----

Viola alba.	250. & 264
-------------	------------

Viola matronalis.	170
-------------------	-----

Viola muraria vel purpus	
--------------------------	--

rea.	169
------	-----

Viscum.	178
---------	-----

Vitis alba.	57
-------------	----

Vitis nigra.	59
--------------	----

Vitis vinifera.	50
-----------------	----

Vmbilicus terra.	246
------------------	-----

Volucrum maius.	348
-----------------	-----

Vrceolaris.	152
-------------	-----

Vrtica.	63
---------	----

Vrtica labeo.	108
---------------	-----

Vua crispa.	104
-------------	-----

--	--

--	--

X Anthium.	313
-------------------	-----

X Xylon.	314
-----------------	-----

--	--

Z ca.	155
--------------	-----

--	--

I N D E X N O

menclationū quibus of-

ficinæ Seplasiariorū, &

Herbarii nostri tempo-

ris vtuntur.

A	
----------	--

A brotonum.	5
--------------------	---

A Absinthium.	1
----------------------	---

--	--

--	--

--	--

--	--

Acorum.	3	Asarum.	7
Acus pastoris.	115	Aspergula.	28
Acetosa.	253	Asprella.	174
Acutella.	33	Atriplex. 71. Avena. 103	
Affodillus.	68	B	
Agrimonia. 134. &.	336	B Alfarmita.	387
Alchimilla.	330	B Baptifecula.	233
Alliaris & alliaria.	63	S. Barbara herba.	399
Alleluia.	306	Bardana.	42
Allium.	394	Basilicon.	299
Alkakengi.	368	Bedegarum, siue Bedeguar.	
Aloc.	82	29 Belzuinum.	410
Altercum.	449	Benedicta herba.	210
Ameos.	38	Berberis.	286
Amoris poma.	291	Betonica.	190
Anethum.	18	Bipennula.	329
Apium hortense.	397	Bistorta. 143 &.	416
Apium Agreste.	93	Bismalua.	11
Aquilegia.	62	Bombasum.	314
Archangelica.	156	Bombax.	ibidem
Arcocus.	426	Bonifacia.	110
Aristológia.	54	Bonus Henrichus.	253
Armoracia.	356	Borrage.	85
Artemisia.	25	Branca vrsina.	29
Arthanita.	246	Bruscandula.	95
Arthetica herba.	457	Bryonia.	57
Articocalus.	426	Bacheiden.	383
Asa fetida.	410	Buglossa.	184

Buglossum

Buglossum sylvestre. 148

Bursa pastoris. 166. et 330

C

C Alamentum. 237

Calendula. 209

Camomilla. 16

Campana. 133

Camponella. 386

Canapus. 215

Candela regis, quæ & cā-

delaria. 456

Capill⁹ veneris. 48. et 391

Caprifolium. 348

Caputi caules. 225

Cardo fullonum, seu Car-

duus fullonius. 112

Cardopatium. 475

Carduus Benedictus. 73

Carota. 366

Cartamum. 223

Cartamus sylvestris. 73

Cartafilago. 391

Carui. 217

Castrangula. 108

Cataputia maior. 183

Cataputia minor. 249

Cauda equina. 176

Caulis. 225. Cauta. 315.

Cepa. 234

Cepa sylvestris. 97

Centauria minor. 211

Centumnodia. 331

Centumcapita. *Eryng* 161

Chamaedrys. 469

Charesfolium. 119

Cheiri. 250

Chelidonia. 467

Cheruilla. 401

Cicer. 146

Cichorea. 364

Cicuta. 221

Cicutaria. 285

Citonia. 203

Citruli vel Citreoli. 375

Coloquintida. 202

Colubrina. 416

Condifi. 419

Consolida maior. 372

Consolida minor. 87

Coriandrum. 185

Cornu cernuum. 245

Corrigiola. 331

Cotula foetida. 315

Cotula non foetida. 86

Cotum. 314

Crassula maior. 432

Cresc.

Cressio hortensis. 196

Crocus. 241

Crocus hortensis. 223

Cuculus. 368

Cucumer, seu cucumis.

374

Cucumer asininus. 378

Cucurbita. 200

Cuscuta. 188

Cyclamen. 246

Cypripus. 248

Cypressus. 471

D

Dens leonis. 364

Diapensia. 361

Digitalis. 482

Digitus citrini. 383

E

Elleborus albus. 149

Endivia vera. 364

Enula. 133

Enula campana. ibidem

Equina mentha. 157

Eruca. 144

Esula. 438

Esula rotunda. 327

Eufscum. II

Eupatorium adulterinum. 145

Euphrasis. 135

F

Faba. 213

Fabacraffa. 432

Faseoli. 381

Ficaria. 108

Ficus sativa. 402

Filipendula. 305

Filix. 322

Flammula. 93

Flos amoris. 61

Flos february. 264

Flos omnium mensiu. 209

Foeniculum. 271

Foeniculus portinus. 324

Fehungracum. 430

Fortis, seu sortis herba. 391

Fuga demonum. 448

Fumus terre. 182

Funis arborum. 386

G

Gallitrichum. 308

Genista, siue

Genestra. 120

Gentiana. III

Glastu. 179

Gratia Dei. 115

Guadum. 179

H

Hedera terrestris. 472

Hepatica. 258

Her

Herba diui Ioannis. 448

Herba fortis. 391

Herba fullonum. 419

Herba paralyfis. 457

Herba Roberti. 115

Herba stella. 244

Hermodactylus. 193

Hirundinaria. 77

Spina Hispanach. 361

Hispanicum olus. ibidem

Hordeum. 239

Lupinus Humulus. 95

Hipericum. 448

Hyssopus. 454

I

Iacobi flos. 597

Iarum. 39

Indicum. 179

Iringus. 161

Iris. 171

Iua muschata. 478

Iuniperus. 45

Iusquiamus. 449

K

Keirim. 250 Kerua 383

L

Lactuca. 162

Lactucella. 362

Lupinus 420.

Linaria. 419

Lapadium acutum. 259

Lapparia inuersa. 313

Lappa maior. 42

Lappa minor. 313

Larga. 268

Lauroola. 124

Lens. 462

Leuisticum. 407

Lilium album. 198

Lilium conuallium. 131

Lilium inter spinas. 348

Linaria. 297

Lingua bouis. 184

Lingua ceruina. 160

Linum. 257

Liquiritia. 106

Luparia. 52 Lupinus. 167

Lupulus. 95

M

Maiorana. 360

Malua. 274

Maluaniscum. 11

Mandragora. 288

Marrubium nigrum. 92

Marrubiastrum. ibidem

Mater sylua. 348

Matricaria. 25

Melanthium Melans 270

Mercurialis 259.

Melanxana.	290
Melilotum.	286
Melissa.	269
Mentha.	157
Mentha aquatica.	387
Mentha Romana.	157
Mentha Saracenica.	ibide
Mercurialis.	259
Milium.	223
Milium solis.	265
Millefolium.	390
Millemorbia.	108
Mora Vaticana.	90
Morella. <i>Solanum</i>	368
Morsus diaboli.	384
Morsus gallinae.	14
Morus celsi.	283
Muralis.	152
Muscata.	115

N

Nasturtium	186
Nasturtium aquaticum.	387
Nasturtium tectorum.	166
Nenuphar.	291
Nigella.	272
Nil.	179
Nilech.	ibidem

Nux. 207

O

Ocularia.	135
Oculus bonis aut vacca	86
Oleander.	295
Ophthalmica.	135
Orobis.	309
Origanum.	302
Os mundi.	66
Osatis.	179
Osteritium.	409

Ophvix 307. P

PAEonia.	113
Pagana lingua.	130
Palma Christi.	183. et 383
Pampinula.	329
Panis cuculi.	305
Panis porcinus.	79. et 246
Panis terre.	ibidem
Papaver.	280
Papaver cornut.	282
Papaver rubrum.	279
Parietaria.	152
Pastinaca.	401
Pastoria bursa.	330
Pentadactylon.	183
Pera pastoris.	330

Perfo-

Perforata.	448	Prunula.	210
Perfica.	326	Prunus.	219
Peruinca.	195	Pseudomelanthion.	75
Pes anserinus.	352	Psyllium.	480
Pes asininus.	63	Pulegium.	110
Pes columbinus.	115	Pulegium sylvestre.	237
Pes corui.	93	Pyrethrum.	345
Pes leonis.	330	Pyrethrum sylvestre	ibid.
Pes vituli.	39	Pyrola.	255
Petroselinum.	310		
Phaseoli.	381	Quercus.	125
Pilosella.	328	Quinquefolium.	337
Pimpinella.	329	Quercula minor.	469
Piper Hispani, seu India-			
num. Capricum	392		
Piperitis.	263		
Plantago.	22		
Podagra lini.	188		
Polypodium.	315		
Polytrichon.	429		
Porrum.	342		
Portulaca.	66		
Potentilla.	336		
Prasium.	318		
Prasium foetidum.	92		
Primula veris.	88		
Prunella.	337		
Pruneola, sive			

Prunula.	210
Prunus.	219
Pseudomelanthion.	75
Psyllium.	480
Pulegium.	110
Pulegium sylvestre.	237
Pyrethrum.	345
Pyrethrum sylvestre	ibid.
Pyrola.	255

Quercus.	125
Quinquefolium.	337
Quercula minor.	469

R	
Aphanus minor	356
maior.	356

Rapistrum.	141
Rapum.	117
Rapunculus.	ibidem

Remora aratri.	33
Resta bonis.	ibide.
Rhabarbarum monacho-	
rum.	252

Ribe.	358
Roberti herba	358
tiana.	

Rosa.	354
Rose canina.	ibid.
Rosma.	

Rubus go.
Rapa 217-

Rugosa

130.

Rosmarinus aculeatus.	121	Semperuium.	19
Rostum ciconia.	115	Semperuium marinū.	82
Rostum porcium.	364	Sena.	243
Rubea tinctorum.	154	Serrata, siue Serratula.	
Ruta.	332		469.

S

Sacerdotis virile.	39	Serpentaria minor.	39
Salicaria.	266	Serpentaria officinarum	
			415.

Salvia.	136	Serpyllum.	138
---------	-----	------------	-----

Salvia vita.	391	Serpyllum Romanū.	445
--------------	-----	-------------------	-----

Sanamunda.	210	Seruilla. <i>Sisaru</i>	401
------------	-----	-------------------------	-----

Sancti spiritus radix.	75	Serullum.	ibidem
------------------------	----	-----------	--------

Sandaracha urabum.	46	Sigillum Salomonis.	316
--------------------	----	---------------------	-----

Sanguisorba.	425	Siler montanum.	424
--------------	-----	-----------------	-----

Sanicula.	361	Simeonis herba. <i>Alga</i>	47
-----------	-----	-----------------------------	----

Saponaria.	419	Sinapi.	293
------------	-----	---------	-----

Sardiana glandes.	205	Sinapi rusticum.	166
-------------------	-----	------------------	-----

Saturcia.	164	Sinapi sylvestre. <i>S</i>	141
-----------	-----	----------------------------	-----

Sauina vel Sabina.	88	Sitamum. <i>Tritic</i>	349
--------------------	----	------------------------	-----

Saxifraga lutca.	400	Solatrum.	368
------------------	-----	-----------	-----

Saxifraga maior.	ibid.	Solidago Saracenicā.	391
------------------	-------	----------------------	-----

Saxifraga rubea.	305	Sorba. <i>III.</i> Sorgi.	415.
------------------	-----	---------------------------	------

Scabiosa.	385	Sparagus.	32
-----------	-----	-----------	----

Scariola. <i>In tubif</i>	364	Spelta.	155
---------------------------	-----	---------	-----

Scelerata. <i>A. R. R. R.</i>	93	Sphatula fatida.	428
-------------------------------	----	------------------	-----

Scolopendria. <i>Chif</i>	160	Squilla.	420
---------------------------	-----	----------	-----

Scrophularia.	468	Staphisagria.	422
---------------	-----	---------------	-----

Scrophularia maior.	108	Stella herba.	244
---------------------	-----	---------------	-----

Sabina 88-

Smilax 386-

Saponaria 420-

Stichas

Stichas arabica. 418
 Stichas citrinum. 60
 Stramonia. 369
 Succus cyrenaicus. 410

Tamnus. 59. T

T Amariscus. 279
 Tanacetū. 26. & 27

Telephi Tanacetum sylvestre. 336
um 443. Tapsus barbatus. 456

Taraxacon. 362

Testiculus canis. 303

Testiculus vulpis, aut sa-
 cerdotis. 382

Tilia. 465

Tinctorius flos. 436

Tormentilla. 143

Trifolium. 440. & 442

Trifolium acetosum. 306

Trifolium humile. 267

Trinitas ibidem

Trinitatis herba. 434

Triticum. 349

Tunica. *Betonica* 191

Turcicum frumentū. 444

V

V Aleriana. 461

Verbena. 349

Vernix. *Juniperus.* 46

Veronica. 96

Vincaperuinca. 195

Vincetoxicum. 77

Viola. 169

Virga pastoris. 122

Viscum. 178

Vitcalis. *Convolvulus.* 143

Vicia sylvestris. 66

Viticella. *Bryonia* 57

Vngula caballina. 84

Volubilis maior. *Smil.* 386

Volubilis media. 143

Vrinalis herba. *Sin.* 297

Vrtica. 63

Vrtica iners, mortua, vel

alba. 256

Vua lupina. *Solanid* 368

Vua versa seu vulpina.

52. *Aconitum* -

Vua vulpis 368

Vuularia. 130

Z

Zinziber caninum. 392

Finis Indicis.

445

IN PLANTARVM HISTORIAM

à Leonhartho Fuchsio picturis elegantibus expressam adnotationes.

Absinthium officinis Romanum idem cum pontico rectè sentis, à vulgari autem id esse diversissimum ex Galeni Methodo abunde probatur.

Santonicum à Santonia regione prope Burdegalam albius Romano est, folio non multo latiore. Vtrunque enim & Seriphium est tenuifoliū, cum vulgare sit latifolium. Aloine nobis dictum ab insigni Aloes amaritudine.

DE ABSINTHIO.

CAPVT I.

NOMINA.



Ἀψίνθιον Gracè, Absinthium Latine appellatur. In officinis suam appellationem retinuit Gallicè de Laloine, quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensā suā amaritudinem, nominatur. Nomen hoc Graci ab Ἀψιδου, id est, cōtrectādo,

PLANTARVM HISTORIAE.

Absinthii tractando, per ὀντίφρονος deflexerūt, quod nulum unde lum animal, ob eximiam amaritudinem, hanc herbam attingat. Veteres Græci Comici ἀπίνθιον quoque conformi etymo, quasi impotabilem dixerunt, quod hæc nemo, propter insignem amarorem, bibere possit.

GENERA.

Absinthii genera sunt tria. Galeno & Dioscoride testibus. Vnum quod Romanum, vulgare seu commune vocant, & est id quod passim in Germania nascitur. Huius generis est quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominatur, estque ceteris multò præstantius. Alterum genus est Seriphium, quod Seriphium nominant. Tertium Santonicum, à Santonibus Gallie populis, apud quos plurimum gignitur, dictum est. Hinc nonnulli eius semen corrupta voce Sanctum, quoniam Santonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi imposuerint. Hodie semen lumbricorum nuncupant, Gallicè Mort de vers.

FORMA.

Absinthium vulgare, herba est caule ramoso, foliis incanis, multipliciter sectis, aureo flore, semine Vulgare rotundo, racenatim coherente. Seriphium verò Seriphium. herba est prætenues ramos cirrósve habens, minori similis Abrotano, exiguis referta seminibus, subamarum, & graui odore. Siquidem herba est tenuibus cirris,

cirris, Abrotano femine similis, semine in siliquis paruo, grauiter odorata, & subamara. Santonicum Santoni simile est Absinthio, sed non adeò copioso semine cum. scatens, & subamarum.

LOCVS.

Nascitur, Oribasio & Apuleio autoribus, locis cultis, montosis & saxosis: plurimum autem præstantissimūque in Ponto, Cappadocia, & Tauri monte. Seriphium passim circa itinera, macterias vinearum, & sepes prouenit: ut verum sit quod à Plinio dictum est, plerāsque herbas pedibus cōculamus, quarum si nobis virtus perspecta esset, eas in celum laudibus ferremus. Santonicum in Galia, ut diximus, copiose gignitur.

TEMPVS.

Colligendum in fine Iulij mensis, ac in vmbra exiccandum, quo etiam tempore steribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Ponticum minus calefacit, quod astrictioris multæ sit particeps. Minus etiam ceteris generibus extenuat, non minus tamen resiccat. Galeo no itaque autore calidum in primo gradu, & siccum in tertio statuitur. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est. Vulgare quidem astrictoriam, amarā & acrem qualitatem obtinet hand secus atque Ponticum. In hoc tamen ab eo differre videtur, quod in illo maior sit ama-

PLANTARVM HISTORIAE

virtudo quàm adstrictio. Quamvis neque Ponticum modicè amarum sit; quod Ovidius satis iis innuit versibus:

Turpia deformes gignunt Absinthia campi,

Terræque de fructu, quàm sit amara docet.

Loquitur autem de Ponto: Seriphium ipsum Abrotano minus est calidum, verùm Absinthio, calidius. Santonicum in extenuando, & calefaciendo desiccandove, Seriphio paulò imbecillius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Absinthium calfacit, adstringit, bilémque stomacho & ventri inharētem expurgat. Urinas cit. Crapulam praesumptum arcet. Inflationibus, ventrisque & stomachi doloribus, cum Sceli & Nardo Gallico potum prodest. Fastidia discutit. Morbo regio correptos, dilutum aut decoctum eius per singulos dies cyathis tribus haustū sanat. Menses cum melle sumptum aut appositum euocat. Strangulationibus fungorum ex aceto potum subuenit. Ixiæ, cicuta, muris aranei morsibus, & draconi marino cum vino aduersatur. Anginis cum melle & nitro inungitur. Contra epinyctidas ex aqua, sugillata verò & oculorum caligines cū melle, similiter auribus ex quibus manat sanies illinitur. Decocti eius vapor suffitusve, dentium auriūque dolores lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis oblinatur. Præcordiis, iecinori, & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato Cyprino tritum illinitur.

illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea, aqua inter cutem, lienosisq; subuenit, Preterea vestiarius arcisq; inditum Absinthium, vestes ab erodentium iniuriis seruat. Culices cum oleo perunctum à corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hac omnia facere, attamen in potionibus improbatur, stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Seriphium verò perse, vel cum oryza decoctum, & cū melle sumptum, ascaridas & rotundos lumbricos necat, aluam simul leuiter subducens. Eadem potest præstare cum edulio aut lenticula decoctum. Santonicum eadem quæ Seriphium potest.

EX GALENO.

Absinthium adstrictoriam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergens, roborans & desiccans. Proinde biliosos vètris humores per egestionem infernam propellit, ac per vrinam euacuat. Magis verò quod in venis est biliosum per vrinas expurgat. Ideo cōtentam in ventre pituitam, sumptum nihil iuuat. Sic neque si in thorace aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quàm amara valentior est.

EX PLINIO.

Stomachū corroborat, & ob hoc sapor eius in vīna transfertur. Bibitur decoctum in aqua, & postea

PLANTARVM HISTORIAE

ea nocte & die refrigeratum sub dio : decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in caelestis aquae sextariis tribus. Oportet & salem addi. Tritum, vt aiunt, raro in vsu est, sicut & succus expressus. Bibitur & madefacti dilutum. Exprimitur autem cū primū semen turgescit, madefactū aqua triduo recēs, aut siccū septem diebus, deinde coctū in aereo vase ad tertias, decem heminis, in aquae sextariis quadraginta quinque, iterumq; percolatū, herba eiecta, lentē coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore Cētaurio queritur succus. Sed hic Absinthii succus inutilis stomacho capitq; est, cūm (vt tradunt) sit illud decoctū saluberrimum: nā stomachum adstringit, bilemq; detrahit, vrinam cit, aluum emollit, & in dolore sanat, vētris animalia pellit. Malaciam stomachi & inflationes cū exiguo Sili & Nardo Gallico, addito aceto, discitit. Fastidia abstergit, cōcoctiōes adiuvat. Cruditates detrahit cū ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis gratia dabāt cū marinæ aquae veteris sextario, seminis sex drachmis, cū tribus salis, & mellis cyatho. Efficacius purgat duplicato sale. Quidē in polenta dedere. supradictum pondus addito Pulegio. Alij cōtrā paralysem. Alij pueris folia in fisco, sic vt amaritudinem fullerēt. Facile thoracem purgat cū Iride sumptū. In regio morbo crudū bibitur cū Apio, aut Adiātō. Aduersus inflationes calidū paulatim sorbetur ex aqua. Iecinoris causā cum Gallico Nardo,

do, licnis cum aceto, aut pulte, aut fico sumitur. Ad-
uersatur fungis ex aceto. Item visco, cicuta ex vi-
no, & muris aranci morsibus, draconi marino, scor-
pionibus. Oculorum claritati multum confert. Epi-
phoris cū passo imponitur, sugillatis cū melle. Au-
res eius decoctum vaporis suffitu sanat: aut si ma-
nat sanies, cum melle tritum. Vrinā ac menses ciūt
tres quatuorve ramuli, cum Gallici nardi radice
vna, cyathis aquae 6. menses priuatim cum melle
sumptum, & in vellere appositum. Anginis subue-
nit cū melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat:
vulnera recentia, priusquam aqua tangantur im-
positum: praeterea que capitis vlcera. Peculiariter
ilibus imponitur, cum cypria cera, aut cum fico. Sa-
nat & pruritus. Non est dādum in feбри. Nauseas
maris arcet in nauigationibus potū: inguinum tue-
morē in vētrali habitū. Somnos allicit olfactū, aut
in scio sub capite positum. Vestibus insertum tineas
arcet. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo
si vratur. Atramentum librarium ex diluto eius
temperatum, literas à musculis tuetur. Capillum
denigrat absinthij cinis, vnguento rosaccoque per-
mixtus. Marinum, quod quidam scriphium vocāt,
stomacho inimicū. Aluum mollit, pellitq; animalia
inter ancorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in fari-
na trimestris sorbitione dilutū. Coquitur quantum
manus capiat, in aqua sextario ad dimidias.

VINI ABSINTHITIS VIRES.

a iij

EX

PLANTARVM HISTORIAE

EX DIOSCORIDE.

Absinthites vinum stomacho accommodatum est, urinam cit. Tarde concoquentibus utile: iccinorosis itidem, nephriticis, & regio correptis morbo. Cibi non appetentibus, & stomacho male affectis, & longis precordiorum distensionibus ac inflationibus, rotundis lumbricis, & suppressis mensibus auxiliatur. Contra ixiæ venena hausta, copiosius potum, & vomitionibus redditum prodest.

CONFECTIO.

Variae vini Absinthitis sunt confectiones, ut ex Dioscoride constare potest. Optimum tamen fit, si tusæ Pontici absinthij drachmæ octo, linteo raro ligatae, in amphoram vini coniciuntur. Mustum deinde mittitur, relicto vno vasis spiraculo ne effervesceat foras exiliat.

APPENDIX.

Semen lū Santonici, quod ut commemoratum est, hodie semen lumbricorum vocant, præcipuus hoc tempore ad lumbricos ex corpore pellendos & enecandos usus est. Et si genuinum est, magna efficacia cum melle assumitur tam à pueris, quàm adultis. Seriphium quoque aduersus lumbricos à multis commẽdatur, eoque nomine Mors vermiū appellatur. Sunt etiam qui lumbricorum semen nomenclant.

DE ABROTONO.

CAP. II.

Pro femina abrotono absinthium Romanum

minum videris pictura exprimere, quamquam id vulgo syluestrem cypressum à similitudine & odore foliorum eiusdem appellari scribis. Quam postea ex Plinio chamæ cypressum pingis, quibusdam videtur abrotonum fœmina.

NOMINA.

Aβρότονον Græcis, Abrotonum Latinis nominatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Gallis Auronne appellatur. Hoc autem nomen Abrotonū sibi usurpauit, ut Nicandri testatur interpres, διὸ unde διὰ τοῦ πρὸς ὀλίγῳ, ἀβρόν καὶ ἀπαλὸν φαίνεται. Etum. ἀλλοστε καὶ διὰ τὸ δύσπικτον εἶναι. hoc est, quod conspectu tenerū, molle & delicatū appareat, aut quod grauē, acréμνε & difficilē halitū prospiret.

GENERA.

Abrotonum duorum est generum, veterum & recentiorum omnium sententia, mas & fœmina. Plinius lib. 21. cap. 7. mas quidem campestre vocat Abrotonum, fœminam verò montanum. Vulgus, syluestrem cypressum, à similitudine & odore foliorum eiusdem, nomenclatura herba fruticisve vocat. Gallicè Cypres.

FORMA.

Abrotonum, quod mas appellamus, sarmento Abrotonū sum, minutis foliis, minus album quàm fœmina, mas. tenui semine ac numeroso uti Absinthium. Semen autem non quouis tempore producit, sed ad Septembris

PLANTARVM HISTORIAE

*Abrotonū
fœmina.* ptembris duntaxat mensis initia, quo si diligenter
obseruabis tempore, semine prœgnans esse compe-
ries. Rectè igitur $\lambda\epsilon\pi\theta\upsilon\alpha\sigma\pi\pi\omicron\nu$ in Dioscoride le-
gitur, huic lectioni non solum veterum codicum sic
de, verumetiam sensu suffragante. Fœmina frutex
est, arboris speciem habens, candicantibus foliis,
Scriphij modo minutim circū ramulos incisiss, flori-
bus refertus in summo auri fulgore comātes corym-
bos obtinens, odoratus etiam cū gravitate quadam.

LOCVS.

Mas passim apud Germanos in hortis, & in cam-
pestribus nascitur: fœmina verò in collibus & mon-
tibus sua sponte provenit.

TEMPVS.

Floret vtrunque Augusto. Colligitur autem in
autumno, potissimum Septembri mense: hoc enim
tempore semen, vt diximus, profert.

TEMPERAMENTVM.

Abrotonum calidum & siccum, inq; tertio ordi-
ne seu recessu post media situm est, id quod amari-
tudo eius, quam gustu prae se fert, facile monstrat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vtriusque Abrotoni semen feruesactum, & cru-
dum tritum, cum aqua potum, non nisi recta cer-
uice spirantibus, ruptis, conuulsis, ischiadicis, vri-
nae difficultatibus, & suppressis mensibus auxi-
liatur. Potum in vino exitialium venenorum an-
tidotum est. Cum oleo rigentibus illinitur. Serpē-

tes lecto instratum & suffitum fugat. Cum vino
 potum aduersus eorundem morsus, peculiariter au-
 tem scorpionum & phalagiorū, prodest. Oculorum
 inflammationibus cū cotonco cocto, aut pane illitum
 subuenit. Tritum cū farina hordeacea decoctum, q̃
 tubercula discutit. Admiscetur irino vnguento.

EX GALENO.

Non instrenuè excalfacit & desiccāt. Nam siue
 comam cum floribus (reliqua enim eius palea in-
 utilis est) contusam vlceri puro illinas, mordax &
 irritans videbitur, siue eo in oleo macerato, caput
 aut ventrem perfundere voles, admodum calefa-
 cere reperies. Quin & si qui per circuitum rigori-
 bus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc vo-
 les conficcare, minus utique rigore concutientur,
 imò & sensus confestim vbi admotū fuerit ipsum
 calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat
 par est, nimirum quum sit amarum. Protinus vero
 quod & digerendi & incidendi vim habeat, scies.
 Preterea abrotonum vstum calidum & siccum fa-
 cultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta,
 & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis si-
 mul & citra phlegmonem callo induratis profunt,
 ac proinde maxime vlceribus iis quæ in pudendorū
 præputiis sunt competere videntur: at cinis Abro-
 toni vlceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum
 oleo tenuium partium, Cicino scilicet, aut Raphan-
 o, aut Sycionio veteri, potissimum Sabinos, ad
 alopecias

PLANTARVM HISTORIAE

alopecias confert. Barbam etiam segnius tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis, lentiscino maceratum. Rarefaciendi enim vim, eo quod tenuium est partium, obtinet, & mordax est, & calidum. Abrotonum vero inimicum stomacho existit.

EX PLINIO.

Vsus est & foliis, sed maior semine, ad calefaciendum, ideo nervis utile, tussi, orthopnoicis, urinae, torminibus, convulsis, ruptis, lumbis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tusum in aqua drachmae pondere. Prodest & vulvae. Concoquit panos cum farina hordeacea, & oculorum inflammationibus illinitur cotoneo malo concocto. Serpentes fugat. Contraictus eorum bibitur in vino, illiniturque. Efficacissimum contra ea quorum veneno tremores & frigus accidunt, ut scorpionum & phalangiorum, & contra alia venena. Prodest quoquomodo argentibus, & ad extrahenda ea quae inhaerent corporibus. Pellit interaneorum mala. Ramo eius, si subiiciatur pulvino, venerem stimulari tradunt: efficacissimamque herbam esse contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeatur.

DE ASARO. CAP. III.

Asarum seu baccar nobis per metathesin Cabaret.

NOMINA.

Aσάρων Græcè, Asarum Latine dicitur. Officinis hodie nomen retinet. Gallicè du Cabaret. Asaron autem dictū est, quòd in ornatum Asarō cur non veniat, vel vt Plinius lib. 21. cap. 6. inquit, dictum. quoniam in coronas atque ferta non addatur: vel quod manualibus scopis, quæ odoris gratia gestantur, minimè solitum sit inseri.

FORMA.

Folia hederae similia habet, longè tamen molliora, rotundioraque. Flores inter folia ad radicem purpureos odoratos, Hyoscyami cytino similes, in quo semen acino nō dissimile. Radices multas, geniculatas, tenues, obliquas, graminiper similes, longè tamen graciliores, odoratas, calefacientes, & linguam admodum erodentes. Caterùm hic admonendum esse lectore duximus omnia Dioscoridis exēplaria hoc in loco deprauata esse, perperamq; habere vel τῷ κυνότερ & vel μίαν ὄτρυν, cum potius emendatius scribendū sit μαλακώτ & α, id quod partim Plinij testimonio, partim etiam indice sensu ipso cōprobari potest. Plinius siquidē lib. 12. cap. 13. Asaram sic depingit: Est hederae foliis rotundioribus tantum, mollioribusq;. Si quis verò ea de re ad indicem sensum referat, Asarumq; cum hedera conferat, Asari certè folia neque dēstora, neque minora hederae foliis esse comperiet, quum Asari folia maiora multò sint quàm hederae. Proinde cum folia hederae illo-

Dioscoridis locus emendatus

rum

PLANTARVM HISTORIAE

rum cōparatione multò minora sint, euidentissimum est pro $\mu\alpha\lambda\alpha\gamma\tau\omicron\rho\alpha$. legendum esse $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\omicron\rho\alpha$, huic nimirū lectioni adstipulantibus Plinio & sensus iudicio, ut dictū est: ad tactū enim huius folia lōgè sunt hedera molliora. Accedit quòd ab vna diēctione in aliā facilis sit trāsitus. His itaq; rationibus motus, Asari folia $\mu\alpha\lambda\alpha\kappa\omega\tau\omicron\rho\alpha$, hoc est, molliora hedera foliis esse dixi, ut reuera etiam sunt.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis locis, montibus potissimum & syluis: aspera enim macrāve & sicca loca amat.

TEMPVS.

Bis anno, vere nimirum & autūno floret. Colligendum in fine Augusti, à die videlicet decimoquin- to eius mensis, vsque ad octauum Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Asarum in calefaciendo & exiecando ordinis tertij existit, radices potissimum eius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radices Asari calefaciunt & vrinā mouēt. Hiadropicis & ischiadicis diuturnis profunt. Ducunt mēses pōdere drachmarū sex, cū pulso pota. Purgāt Ellebori albi modo. Ruptis præterea, conuulsis, tussis veteri, difficultati spirandi, & vrinæ conferunt. Cum vino pota ferarum morsibus salutare. Folia adstringunt. Illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, agilopis incipientibus, manimis à partu tumentibus, ignibusq; sacris profunt. Coma somnium

CAPVT III.

*somnum etiam conciliat. Sic Grateias herbarius
de Asaro proditum reliquit.*

EX GALENO.

*Asari radices vtilis sunt, facultate similes radi-
cibus Acori, intensiores tamen. Itaque ex iis, quæ
de illis prodita sunt, hic facienda coniectura.*

EX PLINIO.

*Nardi vim habet Asarum, quod & ipsum ali-
qui sylvestre Nardum appellant.*

EX MARCO AEMYLIO.

*Est Asarum Græcè Vulgago dicta Latine.
Hæc calida & sicca virtutis dicitur esse.
Tertius est illi gradus, vt dicunt, in vtroque.
Prouocat vrinam, potatâque menstrua purgat.
Hocque modo iccoris medicatur sumpta dolori,
Hydropicôsque iuuat, schiasim fugat hausta sic.
Et vulua morbis decoctio subuenit eus. (quæter,
Dicitur ictericum potata repellere morbum.
Elleboriq; modo vomitu præcordia purgat.
Sed non est huius purgatio tam violenta,
Nec metuenda quidem, si fiat taliter illa:
De foliis eius trigintarecentia tollens,
Adde meri tantum quo possint cuncta recondi.
Tota nocte mero facias macerentur in illo,
Mane terens, vino quo sunt macerata resolu.
Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti
Porcina, prius ægroto da sufficienter.
Et sumat vini vult quantum fortis & albi,*

Sic

PLANTARVM HISTORIAE

Sic Asari succum colatum trade bibendum.
Fortibus & magnis est hic numerus foliorum
Sufficiens, reliquis, vt diximus, est minuendus
Iuxta quod vires, etas, & cetera poscunt.

APPENDIX.

Lixiuum in quo Asarum decoctum est, si co-
caput lauetur, cerebrum roborat, & memoriam.
Succus etiam eius cum Pompholyge, caligantibus
oculis confert.

DE ACORO. CAP. IIII.

Acorus officinarum, gladiolus aquæ vul-
gò dicitur, flore luteo non vtendus, sed
indicus vulgò galanga maior quæ verus
esse Dioscoridi Acorus videtur.

NOMINA.

AKopov Gracè, Acorū Latinè appellatur. Of-
ficinis nomen retinet. Gallicè flame bastar-
de ou glaieul de Riuiere ou de Mares vocan-
tur. Acorò aphrodisiam quasi veneream Greci etiā
vocant. Apuleius, quicumque ille fuerit, in commē-
tariolo quod de aliquot herbis scriptum à se reli-
quit, Piper apium dictam fuisse hanc herbam tes-
tatur, quòd ea in alueariis suspensa, nunquam dis-
fugiant apes.

FORMA.

Folia iridis habet, angustiora tamen. Radices nō
dissimiles, implicatas, neque in rectum enatas, sed
obliquas, & in superficie existentes, geniculis seu
internodiis

internodiis distinctas, subalbas, gustu acres, odore non ingratas. Præstat densum, candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colchide & Galatia. Ex qua sanè Dioscoridis descriptione satis liquet, Acorum nostrum, quo hodie officina Acorum na vtuntur, etsi non verum sit, tamen aliquam saltem officinarium Acori speciem esse: Iridis enim folia obtinet, angustum non est vestigia tamen. Radices quoque similes, implicatas rum aco- & inuicem adnatas, non in rectum, sed in obliquum rum. tendentes: non in profundo delitescentes, sed in superficie existentes, & modico cespite tectas: denique geniculis seu internodiis interceptas. Neque etiam in colore ab eo quod Dioscorides pingit, variare videtur: nostrum enim Acorum non raro ὑπολδύνης, hoc est, subalbas seu candicantes radices habere conspicitur. Accidit autem ut & rubentes intus habeat radices, quæ tamen cum candicantes passim intercurrentes venas obtineant, rectè subalba dici possunt, quod nimirum neque vere rubescant, neque candidum etiam prorsus colorem referant, sed eum potius qui ex rubro & candido mixtus sit. Ceterum radices Acori quæ intus candicant, foris ut plurimum subrubent. Hinc est quod Serapion in Acori descriptione Dioscoridis verbareferens, ὑπολδύνης definitionem ita vertere voluit: Et color radicum exterior tendit ad rubedinem. Proinde qui hac sola ratione, quod Acori radix intus interdum rubescat, mouentur, ut diuersum nostrum prorsus à Dioscoridis

dis credant, ū non vtuntur argumento quod tantū
momenti sit, vt quod conantur, persuadere aliis possint.
Cū enim Dioscorides Acori radices ὑπολδύ-
κας, hoc est, albicantes faciat, noster certē nunquā
non tales habere deprehenditur: vel enim vere cā-
dicantes sunt, vel subrubentes, quas etiā ὑπολδύ-
κας rectē dici posse iam ostēdimus. Porro quauis
odorata non sint eius radices, tamen nihil ob stare
posset odor, quo minus nostrum verum esse putare-
mus Acorū, quum abunde cōstet illum, haud aliter
quā colorem, secundū diuersas regiones in eadem
saepē herba mutari: si non esset aliud, quod vt di-
uersum certo crederemus nos vgeret, hoc nempe,
quod nostri Acori radices gustu acres nō sint, quod
tamen omnes veteres vno ore de Acoro affirmant,
sed potius adstringentes. Quapropter etsi tota ferē
descriptio illi respondere videatur, tamen quia acris
nō est, vires eas quas vero Acoro tribuunt veteres,
habere nō potest: vt hoc nomine vehemēter errent
qui a solis descriptionibus tantū pendunt. Nec mi-
nus hallucinantur officinae quae ad vrinas mouen-
das, aut menses euocandos, lienēsvē minuendos eo
vtuntur. Perperā etiā Diacori cōpositionem ex eo-
dem cōficiunt. Curent itaque vt verum Acorū ha-
beāt, quod iā in multis Galliae officinis pro stare pu-
to. Nam radix illa quae à nonnullis seplasiariis nūc
sub nomine maioris Galāgae veditur, si cetera etiā
respondeant, haud dubie radix veri Acori est. Et
debent

debent seplasiarū ea vti, quoties in cōpositionibus
medicamentorum Acori sit mētio, præcipuè autem
in Diacori cōpositione apparanda, quòd hæc ca-
lesfaciendo. concoctionem stomachi supra modū iu-
uet. Et hoc eò confidentius faciendum esse hortor,
quòd Galāgam maiorem veri Acori radicem esse
existimē: geniculis enim scatet, foris subrubra, intus
subalba, gustu acris, odore nō ingrata, vthoc noīe il-
la tutò & sine errore officina pro Acoro vti queāt.

LOCVS.

Apuleius locū cultis, pratis ac hortis nasci, ra-
rāque inuentu herbam hanc tradit. Nostriū Aco-
rum iuxta amnes, & passim in aquosis & palu-
sibus locis prouenit.

TEMPVS.

Legitur radix Acori æstatis initio, & siccatur
in vmbra digitalibus frustis.

TEMPERAMENTVM.

In calefaciendo & desiccando tertij est ordinis.
Nesirum quidem desiccat, at citra calefactionem.

VIREs. - EX DIOSCORIDE.

Acori radix calefaciendi vim habet. Decectum
eius potum, vrinam cit. Prodest lateris, thoracis &
iecoris doloribus: torminibus, ruptis, conuulsis. Lica-
nes minuit. Vrina stillicidio, & venenatorū morsu-
bus subuenit. In seffu, quēadmodum Iris, ad mulie-
bria utilis est. Succus radicis caligines oculorū dis-
cutit. Antidotis præterea radix vtiliter miscetur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Acori vtimur radice qua gustu acris est, & modicè amara, odoréque non iniucunda. Hinc manifestum est hanc facultate calidam, & consistentia tenuium partium esse. Huic consentaneum est, vt urinam moueat, & lienes induratos inuet, tñ cornea membrana crassitiem detergeat simul atque extenuet. Ad hoc autem melior est ipsius succus. Omnino verò siccificum esse clarum est.

EX PLINIO.

Vis ei est ad calefaciendum extenuandúmque efficax, contra suffusiones & caligines oculorū succo eiusdem poto, contráque serpentes. Pectoris doloribus subuenit, & ides antidotis miscetur. Iecinori medetur, thoraci quoque & praecordiis. Urinā citius eius decoctum, & omnia vesicae vitia sanat. Testiū tumores radix decocta in vino, tritáque & illita miè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat decocto huius herbae fountibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radice prodest. Acoron quoque vtile est interioribus fœminarum morbis.

ACORI OFFICINAR. VIRES.

Acori a² Gustus abundè monstrat eius radicem immen-
dulterini sam adstringendi facultatē obtinere. Hinc est quòd
faculta= diuersam planè à veri Acori radice vim sortita sit.
tei. Nam vt hæc tenuium est partium & facultate ca-
lida, atque adeò detergit, extenuat, atque discutit:

ita

ita illa consistentia crassarum partium, ac facultate frigida constringit, densat, cogit & contrahit. Quare urinā non cit, vt verum Acorum, nec menses euocat, sed potius supprimit. Sanguinem etiā vndeunque manātem cohibet. Proinde rectē Pādes Etarū author scribit, cum qui secū Acori radicem gestet, à nullo sanguinis profluvio corripī. Et ex recentioribus aliqui hanc facultatē Acori nostri obseruarunt, atque hinc adeo tradunt eius succū igne expressum, menses nimium promanātes constringere posse, id quod certē de Acoro affirmare vanissimū erit. Ex iis itaque intelligentiā seplasiarū, quis vsus nostri etiam in medicina sit Acori: nec cōmittent, vt fanatici cuiusdam, qui nuper Morophrasti impudentis hominis pestilentissimas nugas & ineptias tegere, atque adeo epistola aliqua operi illius temerē prae fixa commendare, ac prae illo monstro reliquos omnes medicos, si diis placet, contemnere ausus est, consilio obsecuti, hoc prorsus abiciant, cum illius immensa sit adstringendi, quod demonstrauimus, facultas.

DE ALTHAEA. CAP. V.

Althæa, vulgo Bismalua dicitur.

NOMINA.

Aλθαία, ἢ ἑβίσκος, ἢ ἰβίσκος Græcè: Althæa, Ebiscus, Ibiscus Latine dicitur. Officiū Bismaluanæ, quæ vt plurimum barbaris vocibus gaudent, Maluanis Bismaluā, Maluaniscum, & simpliciter Euisce noscuntur.

PLANTARVM HISTORIAE

minat. Maluauisci autem vox corrupta est, ex mal-
ua nimirum & euisco composita, quasi dicat ali-
quis Malua ebiscus, hoc nomine illam ab aliis mal-
uis, quæ sanè multæ sunt, segregās. Gallicè Guim-
maues. **Althæa** mauues. **Althæa** verò à multiplici remediorum
vnde di- potestate & usu, vel vt Plinius ait, ab excellentia
eta. effectus nominata est. Siquidem ἀλθαία Græcis
idem valet, ac si à medendo medicam simpliciter
dicas. Nam ἀλθαίειν illis mederi significat, ἀλ-
θὸς verò remedium & medicinam.

FORMA.

Syluestris Maluæ genus est, cui folia vt Cyclami-
no rotunda, lanuginosa, flos rosaceus, caulis cubito-
rum binam, radix lenta viscosaq; intus candida.

LOCVS.

Locis humentibus, pinguibusque gaudet.

TEMPVS.

Radices, vt reliquarum ferè herbarum omnium
inter autumnii initia, hoc est, in fine Augusti, & Se-
ptembris mensis principio, legenda. Folia verò &
semen in æstate. Floret Iulio & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia & flores calidi & sicci primo excessu seu
ordine. Radices verò in principio secundi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix in aqua mulsæ aut vino cocta, aut per se
pota, ad vulnera, parotidas, strumas, abscessus, mæ-
marum inflammationes, sedis contusiones, inflatio-
nes,

nes, nervorum distentiones, efficax est. Siquidē discutit & maturat, aut rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta quo dictum est modo, & cum adipe anserino aut suillo, vel terebinthina subacta ad uteri inflammationes & præclusiones vtiliter admo-
uetur. Decoctū eius idē præstat, secundasq; à partu relictas educit. Decoctū radicis cū vino potū, vrinæ difficultati, calculosorū cruditati, dysentericis, ischiadicis, tremulis, & ruptis succurrit. Dentium mitigat dolorem cum aceto decocta, colluto inde ore. Semen autem viride siccūque tritum, cum aceto in stole perunctum alphas extergit. Cum aceto & oleo inunctū, à venenatorum moribus præseruat. Valet ad dysenteriam, sanguinis reiectionē, & alui fluores. Seminis decoctum in posca aut vino contra omnes apum & minutarum ferarū ictus bibitur. Folia cum exiguo oleo, moribus & am-
bustis illinuntur. Addensat aquam sub diuo radix trita & admixta.

EX GALENO.

Digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi coctū difficilia tubercula. Porro radix eius & semen cætera quidem pari herbe viridi modo agunt. verum tenuiorum partium, magisque exiccatoriam, adhæc magis extersoriam quam illa facultatem ostendunt, vt & alphas detergant, & semen renum calculos confringat. Radicis autem decoctum dysenteria, alui profluvio,

PLANTARVM HISTORIAE

& sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum astringentem quandam facultatem possideat.

EX PLINIO.

Althaea contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, praecipue scorpionum, vesparum, similiūque, & muris aranei. Quin & trita cum oleo, hac peruncti ante vel habentes eā, non feruntur. Eius radix praecipue conuulsis ruptisque efficax est. Cocta in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas, & mammarum inflammationes, & panos in vino folia decocta & illita tollunt. Eadem arida in lacte decocta, quamlibet perniciosae tussi citissime medentur. Hippocrates vulneratis, sitientibusque defectu sanguinis, radice decocta succum bibendum dedit. Et eam vulneribus cum melle & resina, item conuulsis, luxatis, tumentibus, & mensculis, nervis, articulis imposuit. Et asthmaticis ac dysentericis in vino bibendam dedit. Mirum, aquam radice ea addita addēsari sub dio, atque elatēscere. Efficacior autem quod recentior.

EX THEOPHRASTO.

Vsus eius ad rupta, & tusses ē vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliās si carnibus cōcoquas, in idem aggregare ac veluti conglutinare posse affirmant.

DE ANAGALLIDE. CAP. VI.

Anagallis vtrique in horis frequēs, parvula, arbori tamen habitu, caule quadrato. Mouron petit & quarre nobis dicitur.

NOMINA.

Aναγαλλίς Gracè, Anagallis Latinè, officina-
nis inusitata, Germanicè Gauchheyl, oder Gaucha
Coimarkraut. (Gallicè Mouron) Hoc nominis heyl Gero
fortè à Germanis inditum est, quod Anagallis in li-
mine vestibuli suspensa maleficiorum introitū pel-
lere credita sit. Errāt qui Morsum gallina seu Pas-
serinam vulgò dictam herbam, Anagallida putāt, nō ē Mora
haud secus atque ij, qui Auriculā muris pro Ana-
gallide depictam ostendunt herbarij.

GENERA.

Duo duntaxat Anagallidis esse genera, veterum
omniū testimonio constat, marem scilicet & fœmi-
nam, quæ sanè nullo nisi florum discrimine distant.
Mas enim puniceo, fœmina verò cœruleo flore con-
spicitur. Proinde hallucinari iuniores ac barbaros
medicos euidentissimum est, qui plura duobus Ana-
gallidis genera constituunt.

FORMA.

Frutices sunt Anagallides parui, in terra iacen-
tes, folia in quadrangulis caulibus pusilla habētes,
& modicè rotūda ad Helxines similitudinem. Se-
men gerunt rotundum. Non quicquam sanè certius
hac scriptorum pictura respondet: cū duplex sit
in flore color, puniceus nimirum & cœruleus, qua-
dranguli caules per terram sparsi, folia nō toto am-
bitu rotunda, & semen coriandro non dissimile cir-
cinatum. Non est tamen quod sic humi prostratos
hos

PLANTARVM HISTORIAE

hos frutices intelligas, vt prorsus non suppullulent. Nam in altum etiam surgunt, non tamen altius, quàm ipsa tibi examussum pictura monstrat.

LOCVS.

Pedibus in aruis vineisq; vbiq; calcatur, neque quicquam nunc Anagallide despectius est, cum tamè in antiqua medicina multus eius fuerit vsus. Licet autem vbiq; ferè proueniat, in vliginosos tamen latior.

TEMPVS.

Per æstatem vtriusq; prouentus maximus est, potissimum autem mense Augusto. Florent autem à Maio mense vsq; in autumnum.

TEMPERAMENTVM.

Anagallidis vterque sexus calidam & siccam facultatem obtinet, quòd scilicet extergere possint.

**Error quæ
runda de
tegitur.** Mulieres nanque quæ asperiorè & decolorem à natura cutè acceperunt, ad leuorem nitoremq; vultus harũ succo vtuntur, vt hac ratione errare necesse sit, qui Anagallidas frigidæ & humidæ esse statuunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraque mitigandi facultatem habent, inflammationes arcent, surculos extrahunt, vlcera serpentina compefcunt. Succus earum gargariissatus pituitam capitis purgat. Per nares infusus dolorem dentium lenit, si in contrariam narcm iniciatur. Argema cum Attico melle emendat, & oculorum caligines inuat. Contra viperarum morsus, renum & iecinoris vitia, ex vino potus prodest. Tradunt nō

null;

nulli eam quo cœruleū florem habet, prociduam se-
dem reprimere: quæ verò puniceum, illitu euocare.

EX GALENO.

Anagallis vtraque, tam ea quæ florem parit cœ-
ruleum, quam ea quæ puniceum, admodum exten-
gendi facultatem obtinent. Quendam etiam calor-
em attractorium possident, ita vt impactos cor-
pori refigant aculeos. Succus earū ex naribus pur-
gat eadē de causa. Et vt summam dicatur, exic-
catoriā citra mordicationem facultatem habent,
quāobrem vulnera glutināt, & putrida adiuvant.

EX PLINIO.

Vtriusque succus oculorum caliginem discutit
cum melle, & ex ictu cruorem, & argema rubens,
magis cum Attico melle inūctus. Pupillas dilatat,
& ideo hoc inunguntur antè, quibus paracentesis
fit, iumentorum quoque oculis medentur. Succus ea
put purgat per nares infusus, ita vt deinde vino
colluatur. Bibitur & contra angues succi drachma
in vino. Mirum, quod fœminam pecora vitant. At
si decepta similitudine (flore enim tantum distāt)
degustauere, statim eam que Asyla vocatur, in rea-
medio querunt. Ea à nostris ferus oculus nuncupa-
tur. Precipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum, Supersti-
tiusquam quicquid aliud loquantur, ter salutare tiosum.
eam, tunc sublatam exprimere, ita præcipuas esse
vires. Vrinā cient Anagallides. Iccinori mirè pro-
sunt. cohibent quas nomas vocant. Vtiles & recē-
tibus

PLANTARVM HISTORIAE

tibus plagis, præcipuè senum corpori. Ad recentia quoque vulnera tanta traditur vis, ut sanicm ossibus extrahant. Anagallis cœrulea procidentia sedis retro agit, è diuerso rubens proritat.

DE ALSINE. CAP. VII.

Alsine omnis Mouron nobis dicitur, à baccarum similitudine cum solano.

NOMINA.

Morsus
gallinae.

AΛΙΥΝ Græcè, Auricula muris Latinè, Morsus gallinae vulgò appellatur. Paučina Itali-
cè, quod pauçeris, id est, iunioribus anseribus grati-
pabulū sumministret. Auiculas canis in clusa, cū
fastidiunt escam, aucupes hac herba recreare solēt.

Gallicè Mouron, aliis Morgeline vocatur.

Alsine cur Alsine autem dicta est, quòd lucos, quæ Græci ἄλ-
dicta. ΘΗ nominant, nemorosaq; , & vmbrosa loca amet.

Auricula Auricula verò muris, quòd muscutorum auribus
muris. folia similia habeat.

GENERA.

Quamuis Dioscorides & alij vnā tantum Al-
sine faciunt, nos tamen tria eiusdem genera, licet
plura adhuc inueniantur, damus. Primum genus
Alsine maiorem vocauimus, quod scilicet vera
sit Alsine, & aliis maior, Gallicè Mouron nomi-
natur. Alterius generis plantam Alsinen mediam
appellauimus, Gallicè Moyen mouron. Hac
quod ad flores attinet, qui cœrulei sunt, à descrip-
tione variat: eiusdem tamen cum priore facultas
tis,

sis. Tertū generis herbam. *Alsinen* minorem vocauimus. Hæc, quidem, vt prima, pulchrè descriptioni respondet. Gallicè *Petit mouron* nuncupatur.

FORMA.

Cauliculis serpit rotundis, è quorū gemiculis exiles ramuli proflinunt, foliis *Helxines* minoribus, minusque hirsutis, flore exiguo, candido, foris herbasceo. Hæc cum teritur cucumis odorem refert. Non autem illam *Peponis* maturi incunditatem, sed herbaceum cucumeris odorem subolet. Porro cum *Dioscorides* *Helxine* similem esse *Alsinen* tradit, non de ea *Helxine* quæ vulgò *Parietaria*, sed ea potius quæ alio nomine *Cissampelos* dicitur, intelligas oportet: hæc enim folia *Hederæ* haud dissimilia obtinet. Adeò vt liquidò iam constet, *Alsinen* esse eam herbam quam passim hodie *Morsum gallinæ* appellant. Huc accedit quòd facultates, vt ex sequentibus patebit, quas vulgus *Morsui gallinæ* tribuit, ab *Alsines* viribus nihil variant.

Helxine
duplex.

LOCVS.

Nascitur in lucis, hortis, & maximè in parietibus, maceriis, opacisque locis.

TEMPVS.

Incipit à media hyeme. Arescit autè æstate media. Cum prorepat, musculorū aures imitatur foliis.

TEMPERAMENTVM.

Refrigeratē & humectatē haud secus quàm *Helxine* obtinet facultatē: est enim aqueæ essentia frigidaq;

PLANTARVM HISTORIAE

frigidaeq; quare & citra adstrictionem refrigerat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Al sine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorū inflammationibus cum polēta illita conuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In vniuersum eadem quæ helxine potest.

EX GALENO.

Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

EX PLINIO.

Vsus eius ad collectiones inflammationesque. Quin emendat omnia quæ Helxine, sed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item veredis & ceribúsque cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.

APPENDIX.

Easdem facultates, herbis quas morsus gallinae vulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuūt, quòd scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, vt dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est quod minorem aliqui Germanorum Fieberkraut vocent, quia scilicet febribus accommoda, & utilis sit.

DE ANTHEMIDE.

CAPVT VIII.

Chamæmelum leucanthemū nomen nobis retinet.

Chrysanthemū quod pingis: mihi quod sciam non est visum.

Eranthe-

Eráthemum quia vere floret in calcaris effigiem, in ambitu purpureum, cornueta nobis dicta pingitur, quæ tamen floret melsibus.

NOMINA.

Aνθεμῖς, ἢ χαμαίμηλον Græcè, Anthemis, Chamamelon Latine, officinis corrupto nomine Camomilla dicitur, Germanicè Camillen. (Gallicè de la Camomille.) Chamamelon quoniam odorem habeat mâli, appellant, id quod de primo genere potissimum intelligendum venit. Chamamelon cur dictum.

GENERA.

Tria eius genera, floribus tâtum distantia, inueniuntur. Hi enim & si intus aurei sint, tamen foris per ambitum illis adiacet folia aut candida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem cædida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκαῖθμον, & vulgò hodie Camomilla vocatur. Leucæthemon. Quæ verò lateis per ambitum foliis cõstat, ea haud dubiè est, quæ priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθεμον nominat, Germani autem pulchrè ad Græcā appellationem alludentes, Goldtblumen, Gelcamillen, Streichblumen, appellant. Chrysanthemon. Tertia species chamameli, quæ nimirum purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie vulgus medicorum Consolidâ regale, Germani autè à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbe, & à colore lepto regioq; qui affestari nunquam

PLANTARVM HISTORIAE

nunquam satis potest, R itterisporn vocant. Dioscorides peculiariter ῥῥανθεμον, eo quò vere flo-
Consolida reat, dici tradit. Tria itaque in vniuersum *Anthe-*
regalis est midis seu *Chamæmeli* genera sunt, quorū sanè pri-
tertia cha mum *Chamæmelon* leucanthemon, alterum *Cha-*
mæmeli memelon chrysanthemō, tertiu *Chamæmelon* crā-
species. themon Dioscoridi nominatur. De duobus primis

generibus neminem dubitare, quin vera & legitima sint, arbitramur, quòd nihil in iis sit, quod Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, nō respōdeat. Tertiu fortè nōnullis qui morosius omnia obseruāt, minimè genuinū *Chamæmeli* genus esse videbitur, ideoq; quibus simus argumentis & coniecturis impulsī, vt tertiu *Anthemidis* esse genus credamus, necesse erit ostēdere. Potissimum autem quod nos in hanc sententiā pertraxit, est, quòd singula in Dioscoridis descriptione illi congruant, ramis scilicet palmum non excedentes, fruticosi, multas alas habentes, parui & exigui, capitula rotunda, aurea, foris purpureis foliis, magnitudine in nullo alio genere *Ruta* foliis magis similibus circumdata. Deinde sententiam hanc nostram confirmauit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissimè Regalem dictā cōsolidam refert, quam iis sanè verbis describit: herba est quam quidam Monachellam, siue Capuciariam vocant (à cucullo haud dubiè monachorum, quem flores illius herbae referunt, nomen imponentes) Dioscorides

Eranthemno

Eranthemon appellat, & est vna species *Anthemidis*, quæ folia instar *Camomillæ* habet, nigriora tamen florē autē *viola* similem. Hæc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostrā de hac herba sententiā mirificè corroborans, quòd vulgus hodie medicorum *Consolidam regalem* calculosis, & oculis prodesse tradat, adeò vt illius etiā cōspectum multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atque hinc fit vt studiosi passim eam herbā in suis museis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere volentes. Has autem omnes facultates, vt ex sequētibus patebit, *Eranthemo* suo *Dioscorides* etiā adscribit. Quamobrem nihil certius est, quàm *Consolidā regalem* tertium esse *Anthemidis* genus, id quod argumenta nostra iam adducta palàm enuncunt.

FORMA.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tenues & multi, capitulis rotundis. Flores intus aurcos continent, foris verò per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum *Rutæ* magnitudine.

LOCVS.

Nascuntur in aspero, sicco, macroque solo, & iuxta semitas atque itinera.

TEMPVS.

Colliguntur vere in calidis potissimū regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

PLANTARVM HISTORIAE

nunquam satis potest, Rittersporn vocant. Dioscorides peculiariter ῥιττερσπορν, eo quò vere flo-
Consolida reat, dicit tradit. Tria itaque in vniversum *Anthe-*
regalis est midis seu *Chamameli* genera sunt, quorù sanè pri-
tertia cha mum *Chamamelon leucanthemon*, alterum *Cha-*
mameli mamelon *chrysanthemò*, tertiu *Chamamelon crā-*
species. themon *Dioscoridi* nominatur. De duobus primis
 generibus neminem dubitare, quin vera & legitima
 sint, arbitramur, quòd nihil in iis sit, quod
Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, nò
 respòdeat. Tertiu fortè nònullis qui morosius omnia
 obseruāt, minimè genuinu *Chamameli* genus esse
 videbitur, ideoq; quibus simus argumentis & con-
 iecturis impulsì, vt tertiu *Anthemidis* esse genus
 credamus, necesse erit ostèdere. Potissimum autem
 quod nos in hanc sententiā pertraxit, est, quòd sin-
 gula in *Dioscoridis* descriptione illi congruant, ra-
 mi scilicet palmum non excedentes, fruticosi, mul-
 tas alas habentes, parui & exigui, capitula rotùn-
 da, aurea, foris purpureis foliis, magnitudine in nul-
 lo alio genere *Rutæ* foliis magis similibus circums-
 data. Deinde sententiam hanc nostram confirma-
 uit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictu-
 ra exquisitissimè *Regalem* dictā còsolidam refert,
 quam iis sanè verbis describit: herba est quam qui-
 ce dam *Monachellam*, siue *Capucariam* vocant (à cu-
 ce cullo haud dubiè monachorum, quem flores illius
 ce herba referunt, nomen imponentes) *Dioscorides*
Eranthemno

Eranthemum appellat, & est vna species *Anthemidis*, quæ folia instar *Camomille* habet, nigriora tamen: florē autē *viola* similem. Hæc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostrā de hac herba sententiā mirificè corroborans, quòd vulgus hodie medicorum *Consolidam regalem calculosis*, & oculis prodesse tradat, adeò vt illius etiā cōspectum multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atque hinc fit vt studiosi passim eam herbā in suis museis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere volentes. Has autem omnes facultates, vt ex sequētibus patebit, *Eranthemum* suo *Dioscorides* etiā adscribit. Quamobrem nihil certius est, quàm *Consolidā regalem* tertium esse *Anthemidis* genus, id quod argumenta nostra iam adducta palam enuncunt.

FORMA.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tenues & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris verò per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum *Rutæ* magnitudine.

LOCVS.

Nascuntur in aspero, sicco, macroque solo, & iuxta semitas atque itinera.

TEMPVS.

Colliguntur vere in calidis potissimū regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

c

Calefa

PLANTARVM HISTORIAE

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habent radices, flores, & herba calfaciendi, extenuandiq; Potu & in seissione menses, fectus, calculos, & vrinam pellunt. Aduersus inflationes, & tenuis intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & iecinorosis medentur. Decocto earum vesicae vitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, ceterisque maius existit, idq; proprie Eranthemon vocatur. Quod verò Leucanthemon & Chrysanthemon congnominant, vehementius vrinam ciunt. Aegilopiis illitæ medetur. Commanducata oris vlcera sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus. Folia & flores reponi debent, & separatim confusa in pastillos conformari. Radix quoque siccatur, & usu poscete interim partes duas herbae, floris aut radiceis modò vnâ: interim contra floris duas, & herbae vnâ, alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in vino diluto mulso.

EX GALENO.

Tenuium est partium, quamobrem digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Est itaque Chamemelon tenuitate Rose persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & tēperatas. Quapropter lassitudinibus vt si quid aliud, cōfert, doloresq; mitigat. Præterea
tensa

tensa remittit & laxat, quæq; mediocriter dura sunt, emollit, quæq; constipata condensatæve sunt, rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris alicuius inflammationem infestant, dissoluit, præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate consistunt. Quæ de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecrata est, februmq; omnium remedium putatur. Verum hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt. Iuuat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium Chamamelum vel streptuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, vt si quid aliud, gratum existit.

EX PLINIO.

Medici vere folia tusa in pastillos digerunt, item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachma vnius pondere contra serpentum ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & urinam calculosque: inflationes, iccinorum vitia, bilem suffusam, egilopia. Commanducata vlcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus iis generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius & foliorum, & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc propriè quidem Eranthemum vocant.

PLANTARVM HISTORIAE
DE ANETHO. CAP. IX.
NOMINA.

Aνηθον Græcè, Anethum Latine appellatur. Nomen in officinis genuinum retinet, Germanicè Dyllē, & Hochkraut (Gallicè Anet) nominatur.

FORMA.

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule, ramosum, exilitate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & quasi foliato, radice lignosa, neq; adeò prolixa, umbella fœniculi, cui cognatum quasi genus, propter similitudinem videri potest.

LOCVS.

In hortis seritur: interdum & sponte, fœniculi modo, provenit.

TEMPVS.

Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Anethum adeò calefacit, vt habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantium verò ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum autem tertij tum calfacientium, tum desiccantium ordinis sit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Anethi aridi comæ seminisq; decoctum potū lac euocat. Tormina & inflationes sedat. Aluum leuēque vomitiones sistit. Vrinam cit. Singultus lenit. Oculos hebetat, & genituram assidue potum extinguit. Decoctū eius mulieribus praefocatione vuluæ laboranti-

laborantibus ad insidendum vtile. Semen eiusdem
vstum & illitum condylomata tollit.

EX GALENO.

Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos & incoctos humores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & maturantibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tū calidius, tum tenuiorum partium est, atque adeò digerendi facultate preditum. Vstum vlceribus admodum humidis illitum prodest, potissimū iis quæ in pudendo consistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, iis probè cicatricem inducit. Cæterum viride humidius est, & minus calidum, itaque magis concoquit sicco, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo concinnatis in symposiis vti esse.

EX PLINIO.

Anethum ructus mouet, & tormina sedat. Aluum sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis eius vna in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

EX SIMEONE SETHI.

Ad crassorum humorū inflationes prodest. Quisdam sanè ipsum stomacho bonū esse, alij verò minime, dixerūt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatem quæ humiditatem concoquit, & flatus

PLANTARVM HISTORIAE

qui sunt in ventriculo discutit, respexerunt: ū verò ad substantiam eius, quæ crassarum est partiū, cōcoctū difficilis, & nauseosa. Oleo incoctū discutit, & somnū conciliat. Inunctū tumores crudos cōcoquit. Inflationes quoque quæ in ventriculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum, curat. Renes verò, vt quidam aiunt, ledit.

DE AIZOO. CAP. X.

Sedum maius nobis Iouis barba, minus mas. Triquemadame, hortēse est acetariis expetitur: alia duo syluestria quorum posterius vermicularis nobis dicitur calida multum herba, non autem teneo aliud.

NOMINA.

εἰς ὧν Græcè: Aizoon, Sedum, Sēperuium

Iouis barba. A Latine nominatur. Postremum nomen officinae obtinuerunt. Vulgo Iouis barba, Gallicè de la Ioubarbe dicitur, quòd scilicet nonnullis locis plebis animos iam pridem inuasit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis vireat Sedum. Porro Aizoon & Semperuium appellant, quod perpetuò, tam æstate quàm hyeme virescat, nec ullis frigorebus, aut cæli iniuria quantumvis frigida emoriatur.

GENERA.

Dioscoridē sequētes tria eius genera statuimus.

Aizoon maius. Primum Aizoon seu Sedum maius, quòd folia latiora habeat. Alterum Sedum minus, quod Græcis etiam

etiam τριθαλὴς, quia ter floreat in anno, vocatur.

Vulgò Vermicularis, à similitudine foliorum, quæ Vermiculæ rotunda sunt, & figuræ ovalis, vt vermiculos putes, laris.

& Crassula minor nominatur. Huius iterum duo Crassula sunt genera: alterum enim mas est, quod nimirum minor floribus luteis spectatur, & Gallis Triquemada. Aixoon me appellatur. Alterum fœmina, quod pallidis seu minus candidis conspicitur floribus. Tertium genus est Tertium quod Aixoon sylvestre, ab aliis Portulaca sylvestris genus aut Illecebra minus rectè & improprie dicitur. Aixoi.

Nam portulaca sylvestris diuersa ab hoc tertio Sed genere herba est, vt suo dicemus loco. Illecebræ autem nomen aliæ debetur herba, quæ Telephion vocatur, vt in eiusdem historia docebimus. Nomina verò hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorū qui Portulacam sylvestrem cum tertio Aixoo apud Dioscoridem confuderunt, atque ad eò quæ debentur Portulacæ & Telephio nomina, Aixoo temere assignarunt. Vt enim viribus diuersa est Portulaca sylvestris ab hoc genere tertio Aixoi, ita etiam nomine & forma. Quare meritò reprehendendi sunt qui duo hæc capita sic sibi temere miscuerūt. Vulgares herbarij Vermicularem minorem vocant. Galli Pain d'Oyseau.

FORMA.

Semperuiuum maius caules profert cubitales, in- Maius. terdum etiā maiores, pollicis crassitudine, pingues, egregiè virentes, incisuras Characiæ Tithymalli

PLANTARVM HISTORIAE

Minus.

χλωρῆ.

instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine lingua similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aixoon caules ab vna radice exeuntes multos habet, tenues, foliis plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis. Emittere autem è medio caulem palmi altitudine, umbellam & flores pallidos luteosve sustinet. τε: χλωρῆ enim hoc loco, vt aliàs saepe, pro ὡχρῶ accipitur, id quod ex Serapione etiam abundè constare potest, qui hūc Dioscoridis locū ita reddidit: Et habet virgam in medio longam, circa longitudinem palmi super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Eam autem Semperuini minoris speciem quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinae gratia, marem appellauimus. Alteram verò quæ candidos obtinet flores, feminam. Tertium Semperuini genus sylvestre dictum, foliola habet pinguiora, ad Portulacæ figuram accedentia, & hirsuta, breuiori quæ cacumine. His verbis exquisitè admodum Dioscorides & Plinius tertium Aixoi genus, quod vermicularè minorem hodie appellant, delinearunt. Habet enim pingua admodū foliola, ad Portulacæ sylvestris formā nonnihil accedentia, hirsuta, & breuiori quàm in Aixoi minori cacumine. Reliqua quæ sequuntur in quibusdam Dioscoridis exemplaribus, manifestè adulterina sunt. Neque iis plura habet Aldinum exemplar,

& alia quæ paulò sunt castigatiora.

LOCVS.

Maius nascitur in montanis & testis. Nonnulli autem in tectis domorum conferunt. Minus Aixoon in muris & petris, maceris vinearum, parietibusque prouenit. Tertium in petrosis locis, sepulchris vmbrosis, oppidorumque fossis.

TEMPVS.

Florèt Maio & Iunio mēsis maius & minus. Tertium autem genus in Maio tantum floribus ornatur luteis.

TEMPERAMENTVM.

Aixoon vtrunque, tam maius quam minus, desiccāt modicè, vehemēter autem refrigerāt: sunt enim ex tertio ordine & recessu refrigerantiū. Tertium genus calidum esse, Dioscoridis & omnium veterū testimonio constat. Gustus etiam minimè reclamationat: si enim gustaueris, linguam vehementer vrit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Maius vim obtinet refrigerandi & adstringēdi. Conferunt ad erysipelata, herpetas, nomas, oculorū inflammationes, ambusta, podagras, folia per se, & cum polenta illita. Succus verò cum polenta & rosaceo, capiti in doloribus infunditur. Datur à phalangio morsus in potu diarrhœa laborantibus, dysentericiq; . Teretes lumbricos cum vino potus excutit. Subditus in pessa, muliebres fluxiones sistit. Succus etiā lippicentibus à sanguine vtiliter inungitur.



PLANTARVM HISTORIAE

gitur. Minoris folia antedicto eandem facultatem habent. Tertium genus calfaciendi vim habet, acrè, & exulceratè. Cū axungia illitū, strumas discutit.

EX GALENO.

Semperuium vtrūque tam maius quàm minus desiccet quidè modicè, quādoquidem & mediocriter adstringat, omnis alterius vehemētis qualitatis expers: quare in eo aquea essentia abundat. Refrigerat non mediocriter, ideòque ad erysipelata, herpes, & à fluxione natas phlegmonas prodest.

EX PLINIO.

Vtriusque vis eadè, perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita, vel succus inunctus. Purgant enim vlcera oculorū, explentq; & ad cicatricem perducūt. Palpebras deglutināt. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito verò maius Aixoum precipuè. A scorpiionibus quoque feriri id habentem negant. Medentur & aurium dolori.

APPENDIX.

Errat non parum hodie magna medicorum pars, qui Sedi genus tertiū refrigerare, asserere haud ventur. Et mirum sanè cur ab eo errore illos Dioscorides non reuocet, qui disertè ait, hoc ipsum calefaciendi, & exulcerandi facultatem habere. Sed fortè non magnopere laborant, quid de hac planta Dioscorides tradat: debuisset tamen erroris huius admon.

admonuisse eos saltem germanica eius plantæ nomenclatura. Neque enim alia ratione Maurpfeffer nostris Germanis dicta est, nisi quod in muris proveniat, gustûque acris admodum sit.

DE ARNOGLOSSO. CAP. XI.

Plantago hæc triplex omnibus nota, & quæ speciatim præter has Arnoglossum dicitur, rotundioribus foliis, lanuginosis, sessilibus, vsu frequentissimo officinarum celebris.

NOMINA.

AΡΥΘΛΩΣΟΝ Græcis: Arnoglossum, Plantago Latinis nominatur. Nomen latinum Plantaginis officinæ retinuerunt. Gallicè du Plantain, Germanicè Schaffzungē quod nomen Græco pulchrè respondet, dicitur. Arnoglossum, quod eius folia agnina lingua similima sint, appellarūt Græci. sum unde Latini autē Plantaginem, ducto à planta vocabulo dictum. lo, nuncuparūt. Sunt tamen qui à multitudine nervi Plantago. norū, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, Polyneuron vocant.

Polyneuron.

GENERA.

Duo Plantaginis sunt genera, veterum omnium sententia, maior & minor. Maior, quā peculiariter à septenis quæ in foliis apparēt, costis, Græcè ἑπτάκωλον, id est, Septinerviā vocant. Minor, quod eius folia fibris quinque tanquam nervis distincta sunt, πέντεκωλον, id est, Quinquenerviā dicitur.

Herba & flores in aestatis initio, Maio & Iunio
mensibus, semen verò Augusto carpitur mense.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est temperatura Plantago, habet enim
quiddam aqueum frigidum: habet verò & austero
rum quiddā, id quod terreum est, siccum, frigidum.
Itaque refrigerat simul & desiccatur, & in utroque
secundi recessus à mediis est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vim habent folia exiccatoriam & adstringen-
tem, ideo ad omnia vlcerā maligna, elephantica,
quæ humore scatēt, & sordida, conferunt. Eruptio-
nes sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas, epiny-
ctidasq; cohibent. Vlcerā vetera & inequalia ci-
catrice obducunt. Medentur & iis quæ Chironia
nuncupātur. Sinus glutināt. Morsibus canis, ambu-
stis, inflammationibus, parotydi, panis, prosunt. Stru-
mis & agilopis cum sale illita conferunt. Oulus co-
ctum cū aceto & sale dysentericis & cœliacis sum-
ptum subuenit. Datur & in locum Beta cum len-
ticula coctū. In leucophlegmatia post aridas epu-
las in medio herba decocta datur. Comitibus &
asthmaticis data proficit. Foliorum succus oris vl-
cerā continua collutione purgat. Cum creta cimo-
lia & cerusa ignibus sacris medetur. Fistulas in-
fusus sanat. Aurium doloribus & lippitudinibus
succus instillatus, & collyriis additus prodest. Gine-
ginis sanguinolentis, & sanguinem reiiciētibus po-

PLANTARVM HISTORIAE

tus cōfert. Dysentericis subter per aluum iniicitur. Bibitur cōtratabē. Aduersus vteri strangulationes in lana apponitur: item vuluæ fluxiones. Semē cum vino potum alui fluxiones, & sanguinis excretionēs sistit. Radix decocta collutione. & cōmanducata, dentiū dolores sedat. Eadē cū foliis in passo ad vesicæ renumq; vlcera præbetur. Ferūt tres radices cū tribus vini cyathis, & pari aquæ potas, tertijs auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice è collo suspensa ad strumas discutendas vtātur.

EX GALENO.

Quaecunque medicamenta cum hoc quod refrigerant vnā etiā adstringūt, ea & ad vlcera maligna omnia, & ad fluxiones, & putredines prosunt atque adeo etiā ad dysenterias: nā & sanguinis exruptiones sistunt, & si quid aduratur refrigerant. Sinus quoq; glutināt, & alia vlcera recētia simul & vetera. In omnibus ferē id genus medicamentis primis tenet, aut certē nulli secūdum est Arnoglossum, idq; tēperaturæ symmetria. Nā siccitatem obtinet morsus expertē, & frigiditatem quæ nōdum obstupefaciat. Semen eius & radix similis sunt facultatis, attamen siccioris, & minus frigida. Semē etiam subtiliū est partiū, radices autem crassiorū. Et huius herba folia exiccata, subtilioris & minus frigida facultatis sunt, nēpe diffлото ex eo ac digesto excremento aqueo. Hic ratione radicibus vtuntur ad dentium dolores, tum manducātes, tum collutionis

collutionibus incoquentes. Præterea ad iecinoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoq; & multò magis semen: hæc enim quãdam abstergendi in se facultatem habent, quam & in herba viridi inesse satis coniici potest, verum ab humiditatis copia vinci.

EX PLINIO.

Vis mira in siccando densandoq; corpore, cauterij vicem obtinens. Nulla res aquè sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocat. Stomachũ corroborat. Plátago per se sumpta in cibo cum Lête alicuic sorbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta dysentericis datur. Lichenis fædo mala medetur trita. Vitia sedis & attritus celerrimè sanat. Ex aqua mulsa duabus horis ante accessionem pota duabus drachmis, tertianas leniores facit, vel succus radicis madefactæ vel tussæ, vel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidã ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Iidem in quartanis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo cum prius panem siccũ comederint sine potu. Folia podagras refrigerat, & in primo impetu podagræ rubentis, hoc est, calidæ, conueniunt. Oris vlcera succus emendat, & folia radicesque cõmaduata, vel si rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis sanguinis idem medetur. Phthisim sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cũ sale & oleo à somno

matutino

PLANTARVM HISTORIAE

matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tusa, addito sale modico. Fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluvium sistit semen, si ore reiciatur, siue aluo fluat, siue fecinarum utero. Succus vomentibus sanguinem datur. Contusis, eversis omnib. modis ipsa sumitur. Medetur omnium generum ulceribus, peculiariter fecinarum, senum, & infantium, igne mollita, melior & cum cerato.

DE ALISMATE. CAP. XII.

NOMINA.

Aλίσμα, ἢ δάμασκόβιον Græcè: Alisma, Damasonium Latine nominatur. Sunt qui eam herbam esse putent, quam herbarum & vulgus nominant Barbam Sylvanā, & Plantaginem aquaticam: **Plantago aquatica.** nonnulli verò eam, quam multi pastorem fistulam vocant. Prior Germanis Vuasser Vuegreich, & Froschloffel (Gallicè Plantain aquatique) quòd scilicet in palustribus nascatur, ubi frequētes sunt ranae. Altera verò iisdem Hirtenpfeiff nominatur. Plantaginem autem aquaticam, ob natales & similitudinem quæ illi cum vera Plātagine est, dixerūt: quemadmodum fistulam pastorem, quòd singulari scapo rudis fistula & lōgitudinem & cōfigiē quādam videatur imitari. Quæ verò nostra de iis sit sententia, paulò post indicabimus.

FORMA.

Alisma folia Plātagini similia habet, angustiora tamen & in terrā reflexa, demissaq;. Caulis illi est

est tenuis, simplex, altitudine cubitum excedente, thyrso similis, capitula habes. Flores tenues, candidos & aliquatenus pallidos obtinet. Radices vt Elebori nigri tenues, odoratas, acres, modicęque pingues. Ex qua quidem delineatione satis constat, neutrā herbarū quarum picturas damus, esse Alisma. Nā herba quā hodie Plātaginē aquaticā vocant, nō per omnia historiae respōdet. Vt enim alia prae terea, radix eius neq; odorata, neq; acris est. Alterius autē, quā pastoralē fistulā nominauimus, etsi radix odorata sit, minimē tamen acris existit. Quicquid tamen sit, hac potius quā altera pro Alismate vtē dum esse censeo. Eius effigiem suo loco dabimus.

LOCVS.

Aquosa amat loca, in quibus passim nascitur.

TEMPVS.

In aestate colligi potest, tū enim floribus abundat.

TEMPERAMENTVM

Calidam esse hanc herbam satis monstrant radices, quas acres esse constat. Absterforiam etiam quandam in se facultatem obtinent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix vnius aut alterius drachma pondere cū vino pota, his qui leporem marinum deuorauerunt, prodest, & quos rubet arana momorderit, quique opium hausērūt. Torminibus & dysenteriae per se, aut cum Dauco pari pondere pota confert. Cōuulsis itidem & vteri strāgulationibus. Herba sistis

PLANTARVM HISTORIAE

aluum, menses ducit, & oedemata illita lenit.

EX GALENO.

Damaſonium aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioſcorides, quòd radix eius epota dyſſenterias ſanct, & aluum ſiſtat, atque oedemata mitiget. Nos verò ea experti non ſumus. Quòd autem conſtitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit pota comminuat, caſu experti ſumus. Ex quo liquet, quòd abſterſoriam quandam facultatem obtinet.

EX PLINIO.

Vſus in radice aduerſus ranas & lepores marinos. Lepori marino aduerſatur in vino potū. Stru-
mis imponitur ex aqua cœleſti folium tritū, vel radix cum axungio tuſa, ita vt impoſita folio ſuo operiatur. Sic & ad omnes cernicis dolores, tumoresſque quacunque in parte.

DE ARTEMISIA. CAP. XIII.

Artemiſia vulgaris nobis nomen retinet. Tenuifoliam pingis quā matricariā vulgo vocamus. Monoclonū verò Tanacetum ſeu Athanaſiam vulgo dictā. Tagetē verò quē Oculum Indicum vocamus.

NOMINA.

Aρτεμισία Græci, Artemiſia Latinis, Germanis Beyfuß, Bucken. S. Iohans gurtel, Sonnenuued gurtel, oder Groſſer reinfarn (Gallicè Armoife ou l'herbe de ſainct Iehā) appellatur.

appellatur. Officinæ veterem appellationem retinent. Nomen herbe inditum putant ab Artemisia Artemisia vxore Mausoli regis, quæ sibi hanc herbam adoptas unde diuit, cū ante Parthenis, id est, virginalis, quod virgo etia. dea illi nomen dederit, vocaretur. Non desunt qui ab Artemide cognominatam arbitrentur, quod priuatim sceminarum malis, quibus ἄρτεμις, hoc est, Diana præst, medeatur. Nomen Germanicum S. Iohans gurtel, quasi diui Ioānis zonam dicas, à supersticiosulis nonnullis monachis & mulierculis herbe huic impositum est. Nā fuerunt qui non coronas duntaxat, sed etiam zonas ex ista herba confecerunt, quas tandem in ignem, qui in die diuo Ioanni baptista sacro, in singulis plateis vrbium succendebatur, nescio in quē cunctum, proiecerunt, haud dubiè hac herba in deserto diuum Ioannem cinctum fuisse somniati.

G E N E R A.

Tres sunt, Dioscoride teste, Artemisia species quæ etiam hodie apud nos passim reperiuntur. Prima ὤλατύφυλλος, Latine Artemisia latifolia dicitur Artemisia test. Ea autem est quæ simpliciter hodie Artemisia latifolia vocatur. Huius iterum duo sunt genera colore duntaxat distantia: vnum caule & floribus rubes, Germanis Rotbucke, vel Rotbeyfusz dicitur: alterum cædicās caule, floribus verò flauis, Germanicè Vueiszbucken appellatur. Altera Græcè λεπτὸς Artemisia φυλλος, Latine vero Tenuifolia nominatur: quod tenuifolia quidem genus vulgus hodie Matricaria, Germani Matricaria

Muterkrant & Mettram, (Gallicè de l'Esparagoute) quod vteri quē matricē vocāt, morbis me-
 Artemi- deatur. Tertia species Artemisia monoclonos dici-
 sia mono- tur, Tanacetū corrupto nomine pro tagetem hodie
 clonos. nominant, Germani Reinfarn, quod filicis ferè
 Tanace- speciem referat & in aquarū ripis nascatur: alio
 tum. nomine Vurmkraut, quoniam lumbricos è ventre
 Tagetes. pellat. Esse verò hanc herbā aliquā Artemisia spe-
 ciem vel hinc etiā cōstare potest, quod primā spe-
 ciem, vt diximus, nonnulli Germanice Groffen
 reinfarn vocant: hac enim nomenclatura manife-
 stè docent, & eam quam Tagetem appellant Ar-
 temisia esse cōgenerem, quod scilicet eandem ha-
 beat appellationem. Huius haud dubiè generis est
 herba quae elegantissimos profert flores, garyophyl-
 los Indos vocatos. nulla enim in re nisi floribus, qui
 sunt elegantiores & longè maiores, ab hac nostrā
 distat: odore tamen nostrā hanc etiā vincit. Hinc
 est quod Tagetem Indicam appellauerimus, Ger-
 manicè autem Indianische negelen. His autem
 herbis tribus conuenire Dioscoridis descriptiones fa-
 cile vnusquisque ex iis quae paulò pòst dicemus co-
 gnoscet. Esse autē Artemisia genera ex manuscri-
 pto codice, quem ob vetustatem lubens cito, mani-
 festè colligi potest. Is enim pictas ordine tres iam
 commemoratas herbas ita ob oculos ponit, vt nemo
 qui illas vel semel saltem viderit, nō agnoscat. Pi-
 cturae accedunt descriptiones, & nomenclatura ho-
 die

die etiam vsitata. Primam enim Artemisiam, alteram Leptophyllon & Matricariam, tertiam vero Tagetem, quo nomine Apuleius vsus est, & Tanacetum appellat, ita vt nemo deinceps quin vera sint Artemisia genera dubitare debeat, aut meritò possit.

FORMA.

Prima species quæ priuatim Artemisia dicitur, Artemisia fruticosa est herba, Absinthio similis, maiora tamē sita. & pinguiora folia habet, quæ supernè ex nigro virescunt, subter autem cādicant, crebrò etiā resecta sunt. Flos illi tenuis, & semen rotundum. Altera, folia tenuiora obtinet, flores exiguos, tenues, albos, & grauiter olcentes. Porrò Sampsuchi odorem confricata eius folia & flores referūt. Quæ vtique descriptio ita Matricariam vulgò dictam herbā exprimit, vt nemo non, nisi talpa cecior sit, hanc esse alteram Artemisia speciem videat. Fruticosa enim herba est Matricaria, foliis quàm sit Artemisia propriè dicta gracilioribus, floribus tenuioribus, per ambitum albis, (intus enim lutei existunt) grauiter cum vninversa herba olentibus. Hallucinantur itaque qui Serapionis interpretem secuti, Dioscoridis Parthenium esse putant, vt suo loco abundè de Parthenio monstrabimus. Tertia $\mu\omicron\nu\omicron\kappa\lambda\omicron\nu\omicron\varsigma$, hoc est, vnicau- nium non lis dicta, simplici caule confurgit, foliis minutim est Matris- est Matris- scissis. Caulis in summo floribus luteis & tenuibus caria- abundat. Hæc odoris incūditate priorē vincit. Quæ sanè descriptio pulchrè herbam Tanacetum appellatam

PLANTARVM HISTORIAE

latam hodie, delineat, ita vt tertiam esse artemisiae specie nemo dubitare debeat, aut saltē iure queat, Tagetes Indica caule exurgit rubescente, ramulis multis brachiato, foliis tenuib. minutim scissis, & grauit̃ odoratis, florib. in summo caule luteis, & croci ferē colorem referentibus, elegantia nulli alteri cedentibus.

LOCVS.

Prima nascitur in aquosis, incultis, asperisque locis. Altera in hortis, locis siccis & lapidosis. Tertia in aquarum ripis, atque vinearum aggeribus passim prouenit, vnde Germanicē appposito vocabulo Reinfarn vocatur. Indica Tagetes non nisi sata prouenit in Germania.

TEMPVS.

Singula genera tria estate, potissimū cum vna maturescit, tunc enim abundant floribus, colliguntur. Indica paulō tardius in nostra regione floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & modicē desiccant, & sunt, quod ad calefactionem attinet, ordinis secundi: quod verò ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sunt etiam modicē tenuium partium.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Excalfaciunt & extenuant. Feruefacta prosunt ad infessus muliebres, ducendos mēses, secundas & fectus. Vteri præclusionem atque inflātionē iuuant, lapides frangunt, & vrinae suppressionem tollūt. Herba ipsa imo ventri illita copiosa mēses mo-

uet.

vet. Succus eius cū myrrha subactus & admotus,
ex vtero elicit quacunque, & infessio. Bibitur etiā
coma trium drachmarum pondere eorundē ducen-
dorum gratia. Si quis stomacho laborans Artemi-
siam leptophyllon contuderit probè cum oleo amyg-
dalino, & veluti malagma confecerit, stomachoq;
imposuerit, sanabitur. Nervorum quoque dolore si
quis affectus fuerit, ac succum eius cum oleo rosa-
ceo miscens inunxerit, curabitur.

EX GALENO.

Ad renum calculos mediocriter, & ad vteri fo-
mentationes prosunt.

EX PLINIO.

Artemisia priuatim feminarū malis medetur.
Eandem quoque secum habentibus, negant nocere
mala medicamenta, bestiāve vllam, ne solē qui-
dem. Bibitur & hac ex vino aduersus opium. Al-
ligata priuatim potens traditur, potāve aduersus
ranas. Alligatam qui habet viator, negatur lassitu-
dinem sentire.

APPENDIX.

Præter dictas facultates vsu compertum est, flo-
res Tanaceti pueris ex vino vel lacte datos, miris-
sicè ex ventre lumbricos pellere, ideoq; Germanis
herba lumbricorum, vt paulò antè diximus, appel-
lata est hac Artemisia species.

DE APARINE. CAP. XIII.

Aparine Rebulus.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Omphalocarpus. *ὀμφάλωκαρπος*, ἢ *φιλάνθρωπος*.
ἄψος Græcè, *Aparine* Latinè, *Klebkraut*
Philanthropos Germanicè. (Gallicè *Grateron*) nomina

tur. *Omphalocarpus* ab *umbilici* similitudine, quæ
semen eius refert, rectè dicta est. *Philanthropos* au-
tem vox humanitatis, amoris & comitatus illi im-
posita est, quòd blanda, comis, & hospitalis herba
fit, nec aliter prætereuntium vestes apprehendat,
quàm solent amici & hospitaliores à se discedentes
comprehensa veste retinere, aut si id nequeant, ali-
quandiu sequi. Quam appellationem pulchrè Ger-
mani exprimentes, *Klebkraut* nominant: est eo-
nim illis *Kleben*, quod Latinis tenaciter adhære-
re. *Officina* & herbarij nonnulli *Aspergulam* ho-
die vocant: rectius tamen una detrita litera nomi-
narent *Asperulam*, quòd asperitate sua attingen-
tium vestimentis pertinaciter hæreat.

Annotas-
 tio.

Errant qui putant legendū esse *ὀμφαλό-*
καρπος, nā *Dioscoridis* & *Pauli* exemplaria
 castigatiora omnia habent *ὀμφαλόκαρπον*.
 Cui sanè lectioni & ratio ipsa subscribit, cū
 sic nominata sit ab *umbilici* specie, quam fru-
 ctus eius refert. Quare cū altera lectio ra-
 tione omni destituta sit, immeritò ab *Oros-*
io Hispano Hermolaus, Marcellus, & Ruel-
lius Dioscoridis interpretes ὀμφαλόκαρ-
πος legentes, taxantur.

FORMA.

Ramulos habet Aparine multos, exiguos, quadrangulos, & asperos. Folia per ambitum orbemve Rubiæ modo per interualla circumposita. Flores albos. Semen durum, candidum, rotundum, à medio, umbilici modo, leniter concauum. Ipsa herba vestibus adhærescit.

LOCVS.

Nascitur in frumentario agro, aut hortis circa sepes & maceries.

TEMPVS.

Colligitur æstate dum semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Aparine modicè extergit & desiccatur, habetque nonnihil tenuium partium: unde satis constat hanc aliquam etiam caloris in se portionem habere.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Aperines seminis, caulium & foliorum succus cū vino potus, phalangiorum & viperarum moribus auxiliatur. Infusus doloribus aurium medetur. Herba ipsa cum axūgia trita coacta, strumas discutit.

EX PLINIO.

Efficax Aparine contra serpentes, semine potus ex vino drachma: & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex vulneribus reprimunt folia imposita. Succus auribus infunditur.

DE ACANTHO. CAP. XV.

Acanthus branca vrsina.

Acanthus Germanica nobis non visa.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Aκανθος, ἡ ἀκανθα Græcis; *Acāthus* siue *Acantha* Latinis dicitur. Officina à similitudine, quam eius folia cum anterioribus *vrforū* pedibus habent, *Brancam* *vrfinam* vocant. Ad quam etiam similitudinem respiciētes Germani, *Bernklauu*, oder *Berntaiz*, nominant. Illud non prætercundum esse putari, hanc herbam olim etiā Romanis *Marmorariam* esse dictam: quæ vox in omnibus *Dioscoridis* exemplaribus deprauata est, ac in *Mamolariam* detorta: quòd eius folia columnarum maximè *Corinthiarum* capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quàm vertices marmore splendebant. Antiqui etiam *Acantho* pateras pingebant.

Branca
vrfinā.

Marmoraria.

Dioscoridis locus emendatus.

GENERA.

Duo *Acanthi* genera damus. Primum quidem legitimam *Acanthum* nominauimus, quòd scilicet descriptioni per omnia respondeat, Germanis dicitur *Vuellichbernklauu*. Alterum *Germanicam*, quod nimirum in Germania officina omnes pro *Acantho* hanc vsurpent herbam. Germanis simpliciter *Bernklauu* vocatur.

FORMA.

Folia habet multò quàm *Lactuca* latiora, & longiora, *Eruce* modo incisuris diuisa, nigricantia, pingua, leuia. Caulem leuem, binum cubitorum, digitalis crassitudine, ex interuallis sub ipsum vsque verticem

verticem foliolis quibusdam oblongis veluti nucamentis, aculeatis, ex quibus candidus promitur flos. Semen illi est oblongum, luteum, caput thyrse specie. Radices subsunt glutinosæ, mucosæ, rubentes, longæ. Hactenus Dioscorides. Si autem veri Acanthi picturam diligenter spectare volueris, huic descriptioni prorsus quadrare videbis, ita ut nulla sit nota quæ illi non adamsim respondeat. Neque impedit quòd Acantha spinam significet, spinosa enim & hæc quidem herba est, sed mollibus duntaxat spinis, ideòque à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Germanicam tamen Acanthum ad Dioscoridis picturam non penitus accedere, est eius dentissimum. Potest tamen in prioris inopia, huius etiam commodus esse usus, ut ex ijs quæ paulò post dicemus, patebit.

LOCVS.

Nascitur vera in hortis, petrosis & humetibus locis. Germanica in hortis & pratis undique.

TEMPVS.

Colligitur in æstate dum floribus & semine abundat, Iunio præcipuè & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Folia Acanthi mediocriter digerentem facultatè obtinet. At radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Hanc vinum Acantho etiam Germanico inesse, gustus abundè monstrat. Folia enim eius modicè amara, radix aut subacris est.

VIRES.

PLANTARVM HISTORIAE
VIRE. EX DIOSCORIDE.

Acanthi radices vstis & luxatis illita prosunt.
Pota vrinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis,
ruptis, conuulsis, mirè vtilis sunt.

EX PLINIO.

Radices Acanthi vstis luxatisque mirè prosunt.
Item ruptis, conuulsis, & phthisin metuentibus in-
cocta cibo, maxime ptisana. Podagris quoque illis
nuntur trita & calefacta calidis.

APPENDIX.

Et si nostra Branca vrsina facies pictura Acan-
thi non vndiquaque respödeat, tamen eius radicem
eandem habere cum Acanthi veri radice facultatē
est euidentissimum. Cum enim gustu subacris sit, ne-
cesse est vt exiccet, incidat, & tenuium sit partiū.
Errant itaque nostrae aetatis medici, qui neglecta
prorsus radice, foliis tantum vtuntur, quae quidem
mediocriter discutere valent.

DE SPINA ALBA. CAP. XVI.

Spina alba hortensis carduus beatæ Ma-
riæ, syluestris palatium leporis.

NOMINA.

Καυθα λευκή Græcè, Spina alba Latine,

A Officina Bedegarim seu Bedeguar Pæno
Bedeguar nomine appellat, Germani Vucisdistel,
Spina alba oder Stechkraut. (Gallicè Chardron nostre
dame, ou Chardron argentin, ou Artichaut
sauuage.) Nomen herba hac ab albis foliis seu
lacteis

lacteis maculis, quibus folia conspersa sunt, accepit.

G E N E R A.

Quauis Dioscorides Spina alba duntaxat vñ faciat genus, tamen cum plures inueniantur apud nos herbe quae descriptioni respondent, piura etiam vt illius statuamus genera necesse est. Vnum itaque genus est, quod hodie vulgò Carduus Mariae dicitur, Germanis verò Mariendistel, oder Frauendistel nominatur. Nos spinam albam hortensem, quod nimirum in hortis tantum proueniat, appellauimus. Alterum genus sylvestre est, proximè ad Dioscoridis delineationem accedens, ideòque à Germanis Vuciszuegdistel vocatur. Ceterum vidimus herbam peregrinam siccam, quae sylvestri, quod ad formam attinet, per omnia respondebat, quae haud dubiè vera spina alba erat & descriptioni prorsus conueniebat. Picturam eius, quod videri destituebamur, dare non potuimus.

F O R M A.

Folia albo Chamaleonti similia habet, angustiora tamen & candidiora, subdèsa, subasperave, & aculeata caulem binos cubitos excedentem, digiti magni aut minoris crassitudine, subalbū, intus cauum. In cacumine eius caput est aculeatum, Echino marino nō absimile, minus tamen & oblongum. Flores purpureos, in quibus semen Cnici forma, sed rotundius. Quae descriptio in vniuersum quadrare videtur herba quae vulgò Carduus Mariae appellatur.

PLANTARVM HISTORIAE.

tur. Folia siquidem Chamæleonti nō dissimilia, angustiora, candidioraque (albis enim maculis vndique conspersa, vnde tam Græcum quàm Latinum, adde etiam Germanicum nomen Vveißdistel, vt diximus, illi impositum est) subdensa, subasperave, & minimè mollia, & mirum in modū aculeata sunt, ita vt contrectata immodicè pungant. Caulis eidē supra bina cubita altus, digiti maioris aut minoris crassitudine, et manis. In summo vertice Echino marino haud dissimile caput aculeatum obtinet. Flores denique purpureos, in quibus semen Cnicoco simile, sed rotundius habet, id quod ex vtriusque seminis collatione pulchrè deprehendes. His accedit, quod facultates quas albae spinæ Dioscorides tribuit, similes sint iis quæ Carduo Mariæ à nostris hodie herbariis assignantur, vt ex sequentibus innotescet clarius. Sylvestri sic quadrat descriptio vt nihil magis. Nam, vt cætera omittam, radix desiccatoria est, & modicè adstringens, atque adeo genuinas Spinæ albæ facultates obtinet.

LOCVS.

Nascitur in montibus & syluosis locis. Hodie in hortis passim etiam plantatur, vt alia quædā Carduorum genera. Sylvestre in locis incultis & arenosis provenit.

TEMPVS.

Colligenda est herba in æstate dum semine prægnans est. Floret autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Radix

Radix eius desiccatoria est, & modicè adstringens. Semē verò tenuis essentia, et calida facultatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix huius pota, sanguinem excreantibus, stomachicis & celiacis prodest. Vrinam cit. Oedematibus illinitur. Decocto eius dentes in dolore colluuntur. Semen potum convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Ferunt etiam quòd amuletum ex eo venenatas bestias abigar.

EX GALENO.

Radix celiacis, & stomachicis succurrit. Sanguinis reiectiones cohibet, & edemata illita contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur. Semen potum iis qui conuelluntur, prodest.

DE ASPARAGO. CAP. XVII.

NOMINA.

Aσπαργος Græcè, Asparagus Latine vocatur. Officina extrita priore litera Sparagū nominat, Germani Sparzen, (Galli Des asperges) Sic autem potissimū altilis sativusve, de quo nobis hic sermo est, nominatur, eò quòd cauliculos hos, qui prima germinatione prodeunt è terra, præcipuos habeat.

Asparagus unde dictus.

FORMA.

E radiculis thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increfcens explicatur in prægrandes ramos, quibus insunt folia capillamenti modo, & vt feniculi tenuata, quæ per
vetustas

PLANTARVM HISTORIAE

vetustate occalescunt in spinulas. Florē fundit paruum, quo decusso bacca dependent primum virides, quae tandem maturitate rubescunt, seminibus refertae. Radices spongiosa, longa & rotunda.

LOCVS.

In hortis seritur & plantatur, inq; nonnullis locis lapidosis sponte prouenit.

TEMPVS.

Thyrso primum cum ver appetit emicante vi-
ret, spica tum tibus expetita. Recentes hos thyrsus
los in voluptatem gula verterunt belluones. Hodie
decoctus in iure Asparagus, aceto, sale, & oleo com-
persus magno gula delectamento comeditur, & in
principum deliciis est. Semen suo legitur tempore,
nimirum aestate.

TEMPERAMENTVM.

Abstergendi facultatem habet Asparagus, idque
citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Asparagi cauliculi cocti & comesti aluum mol-
liunt, & vrinam mouent. Radicum verò decoctum,
difficultati vrinae, regio morbo correptis, nephriti-
cis, ischiadicis: cum vino autem idem decoctum pha-
langiorum morsibus auxiliatur. Si decoctum su-
per dente retineatur, eius dolori medetur. Facit ad
eamdem omnia semen etiam potum. Ferunt mori ca-
nes decoctum eius bibentes.

EX GALENO.

Renes

Renes ac iecur infarctū liberat Asparagus, & maximè herba ipsius radices & semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maximè dentes requirunt.

EX PLINIO.

Vtilissimus stomacho cibus, ut traditur, Asparagi. Cumino quidem addito inflammationes stomachi colique discutiūt. Idem oculis claritatem adferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumque vitiis prosunt. Vino concoquuntur addito, lumborum & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Urinam cient uticilissimè, præterquam quod vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & in vino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad vulnæ, dolorem radicem cum vino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant.

EX SIMEONE SETHI.

Asparagus olerum omnium maximè nutrit. Proinde si quis dicat eius naturam positam esse mediā inter olera & carnes, non procul à vero aberrabit, propter nutriendi facultatem plantarū & carniū, quæ similiter se habet. Urinam quoque cit, & obstructions iecoris & renū aperit: id quod manifestū ex eo, quod urina odorem in suum transmutat, ut hunc qui aliquantulum eius ederint, sentiant.

Neque

PLANTARVM HISTORIAE

Neque quispiã admireturillum statim vrinae suam qualitatem indere: nam & rubea tinctorum si manibus contineatur, vrinam in suum colorem transmutat: quod paradoxum etiam esse videtur, vt extrinsecus impositum vrinam tingat. Asparagi colicis & renum affectibus, qui à pituita proueniunt, auxiliantur: semen genitale augent, & celerius quàm reliqua olera in sanguinem mutantur. Menses ciunt. Cordis palpitationibus succurrunt: dentibus prosunt: sed nõ semper stomacho boni sunt, propterea garo & oleo conditis, cum mediocriter cocti sunt, iis vti oportet.

DE ANONE. CAP. XVIII.

Anonis, bubus grauis, & arresta bouis dicitur.
NOMINA.

AΝΩΝΙΣ, ἡ ὠνώνις Græcis: Anonis & Ononis Latinis appellatur. Vulgus herbariorum Restam bouis, quod in opere arantes boues subinde sistat, nominare solet. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellã vocent, quod acutella. suis scilicet spinis ingredientium pedes pungat & offendat. Germanis Hauuhechel nuncupatur, & Ochsenbrech, quia crebris inter folia aculeis, haud secus ac instrumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à crassiore purgant stuppa, horreat: vel quod ligone ad aculeatam hanc herbam eruendam & extirpandã cum in altum agitur,

tur, & sese propagat, opus sit. Equites Germani Stalkraut, eò quòd decoctū eius meiere nequeūtibus equis offeratur, vocant. Binominis autem antiquis est scriptoribus, vna tantum litera mutata. Sunt enim qui Ononim, vt Theophrastus & Galenus: sunt etiā qui Anonim, veluti Dioscorides & Plinius, nominent. Anonis haud dubiè à non iuuando, quod nullo iuuamine polleat, dicta est. Siquidē cur dicta. aratoribus inimica est, viuāxque nimis fruges opprimit, suisq; aculeis nocet. Ononis verò, quòd asinos, quos Græci οἰνός vocant, sese terentes ad illam vnde. scabentesq; inuict. Complures quoque Graui herbam sic appellari prodiderunt, quòd in ea se volutantes, spinis eius dorsum libenter affricent & scabāt. Officinis prorsus ignota & inusitata.

F O R M A.

Ramos habet palmares, aut maiores, fruticosos, frequētibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitula rotunda. Folia exigua, tenuia ceu Lētis, ad Ruta, aut fœnarij Loti figuram accedentia, subhirsuta, odorata, nec iniucūde olentia. Ramuli acutas spinas, spiculis acuminatis similes, solidasq; gerunt. Radice candida nititur. Theophrastus toto caule foliatam esse tradit, vt veluti coronam ex interval- lis tota species representet. Florem quoque illi esse minutulum, & in siliqua non vndique scriptū scribit. Quæ sanè singula pulchrè pictura respondent, & Anonim esse hanc herbam, quam Restam bovis

c ij hodie

PLANTARVM HISTORIAE

hodie herbarij nominant, euidenter, nulla reclamatione nota, ostendunt. Nam hæc ramos spargit fruticosos, palmo longiores, frequentibus cinctos articulis à quibus alæ funduntur. Capitula exerit orbiculata, folia Lentis parua, ad Ruta vel pratensis Loti figuram accedentia, hirsuta, iucundum odorem expirantia, inter quæ nocentiores, & mucronatæ cuspidis aculei quasi spicula subriguntur. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, in siliqua non vndique septus. Radix in nigro candicans.

LOCVS.

Nascitur culto solo, pingui, & glutinoso, præcipuè autè in segetibus & aruis, inimica agricolis, vix maxq; supra modum. Cū enim altam latamve natura tellurē fuerit, protinus in altum agitur, & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum versus acta pluribus ramis luxuriat, ideoq; runcanda & radicitus extirpanda venit.

TEMPVS.

Æstate germinare incipit, à frugibus perficitur, autumno sui incrementi finem faciens. Floret autem Iulio mense, & Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Ononis radix tertio quadatenus ordine excalfacit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Antequā spinosa sit sale conditur, & est cibus gratissima. Radix eius calefacit, & extenuat, cuius cortex cum vino potus urinam ciet, calculos rumpit,

pit.

pit, crustasque abstergit. Decocta radix in posca dentium dolorem collutions mitigat. Huius decoctum potum, hæmorrhoidas sanare creditur.

EX GALENO.

Radicis cortex maximè utilis est, habens quipiam absterforium & incisorium. Proinde non tantum urinas ducit, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas confestim detrahit. Utuntur quoque ea ad dentium dolores in posca decoquētes, & collui decocto eius iubentes.

EX PLINIO.

Radix decoquitur in posca dolori dentium. Eadem cum melle pota, calculos pellit. Comitibus datur in oxymelite, decocta ad dimidias.

DE ANISO. CAP. XIX.

NOMINA.

AΝΙΣΟΝ Græcè, Anisum Latine vocatur. Officinis nomen genuinum retinuit, Germanicè Anisz. (Gallicè de l'Anis) appellatur.

GENERA.

Anisum caule, folio, flore, Apio par esse videtur. Caulem nanque tenuiter striatum, rotundum, multisque ramulis brachiatum obtinet. Foliū ubi primū enascitur, rotundū, sed deinceps Apij modo dissectum. Florem candidum, muscarion fæniculi. Tota herba, haud aliter quàm semen odorata est.

LOCVS.

Ex Syria originem habet, iam autem passim
e iij satum

PLANTARVM HISTORIAE

satum in Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

*Iunio ac Iulio mensibus floret, semineque prae-
gnans est.*

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccat in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

*Anisum in vniuersum calefacit, exiccat, ὅτι πῦρ
rectius mea sententia interpretabitur pro eo quod
est, facile spirare facit. Oris halitum incundiorem
facit. Anodynum est, dolorémve leuat. Vrinam cit.
Diffundit. Hydropicis potum sitim arcet. Prodest
ad venenata animalia, & inflationes. Aluum, &
album foeminarum profluum sistit. Lac ad mam-
mas elicit, & Venerem stimulat. Suffitum naribus
capitis dolorem sedat. Tritum, cumque rosaceo in-
stillatum, aurium medetur rupturis.*

EX GALENO.

*Anisi semen maximè vtile est, acre & subama-
rū, vt propè ad vrētium accedat caliditatē. Proin-
de & urinam cit, & digerit, atque ventris infla-
tiones sedat.*

EX PLINIO.

*Anisum aduersus scorpiones ex vino bibitur, à
Pythagora inter pauca laudatum, siue crudum, si-
ue decoctum. Item viride aridumve, omnibus quae
condiuntur, quaeque intinguntur desideratum. Pa-
nis etiam crustis inferioribus subditum. Saccis quo-
que additur. Cum amaris nucibus vina comendat.*

Quin

Quin ipsum oris halitum incundiorem facit, fæto-
remq; tollit māducatum matutinis cū Smyrnao, &
melle exiguo. Mox vino collutum, vultū iuniorem
præstat. Insomnia leuat suspēsum in puluino, vt dor-
mientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat.
Dolores capitis leuat suffitum naribus. Epiphoris
oculorum radicem eius tusam imponit Iollas: ipsum
cum croco pari modo & vino, & per se tritū cum
polenta, ad magnas fluxiones, extrahendaq; si qua
in oculos inciderint. Narium quoque carcinôdes cō-
sumit illitū ex aqua. Sedat anginas cum melle &
Hyssopo ex aceto gargarizatum. Auribus infundi-
tur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum,
cum melle sumptum melius. Cum acetabulo Anisi
nucce amaras quinquaginta purgatas tere in melle
ad tussim. Præcipuum autem est ad ructus, ideo in-
flationibus stomachi & intestinorum torminibus,
& cæliacis medetur. Singultus & olfactum deco-
ctum potūmq; inhibet. Potum somnum concitat.
Calculos pellit. Vomitiones cohibet, & præcordio-
rum tumores. Et pectorū vitiis, nervis quoque qui-
bus succinctum est corpus, vtilissimum. Prodest e-
ius & capitis doloribus instillari succum cum oleo
decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis pu-
tant, ideo dysentericis & tenasmi datur tostū. Da-
lion herbarius dedit bibendum cum anetho pari-
turientibus. Phreneticis quoque illinunt recens
cum polenta. Sic & infantibus comitialē vitium

PLANTARVM HISTORIAE

aut cōtractionem sentiētibus. Pythagoras quidem non corripi vitio comitali in manu habētes, idcōque quā plurimum domi ferendum. Parere quoq; facilius olfactantes, Sosimenes cōtra omnes durities ex aceto vsus est. Semine eius poto, lassitudinis auxilium viatoribus spopōdit. Stragulationes vulue, si māducetur & linatur calidum, vel si bibatur cū castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines à partu cū semine cucumeris & lini pari mensura trinām digitorum, vini albi tribus cyathis, discutit. Vrinam ciet. Venerem stimulat. Cū vino sudorem leniter præstat. Vestes quoque à tincis defendit.

EX SIMEONE SETHI.

Prodest ad vetustos ex frigore iecoris affectus, & ad spirādi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatu qui in ventriculo sunt digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit.

DE ACUTE. CAP. XX.

NOMINA.

AKTĀ Græcis, Latinis Sambucus nominatur. Reliqua nomina dicemus paulò post, ubi huius genera indicabimus. Sambucus porrò videtur ab authore appellata, cui nomen Sambyx fuit: vel à sabuca musico instrumento, quod alij pectida nominant, alij magadin. Atque hinc est quod Sambucus potius quàm Sambucus, si Serenio Quinto credimus, scribendum sit.

Sambucus unde dicta.

GENERA.

Duo eius genera. Vnum arborefcit, quod priuatim officina Sambucum, Germani Holder à concauitate vocant. (Gallicè Du Sus, ou du Suin.)

Alterum Gracis χαμᾶδκτη, quasi humilis, & χαμᾶδ coacta breuitatis Acte nominatur, Latinis Ebulus, κτη.

Germanis Attich, vel niderer holder. (Gallis Ebulus. Hyeble.)

FORMA.

Sambucus in arborem affurgit, virgis harūdinū Sambuci. modo rotundis, subcanis, candicantibus, proceris.

Folia tria, aut quatuor, aut quinque, aut sex, aut septem per internalla circa virgas obtinet, nucis inglandis similitudine, graueolentia, pluribus incisuris, in summis ramis siue caulibus vmbellas rotundas ferētia. Flores albos, fructū acinūmve. Terebinthi in nigro purpureū, racemosum, succosum, & vinosum. Ebulus humilis minorq; est, herbaceo generi Ebuli. propius accedēs, quadrangulo caule, densis geniculis. Folia ex internallis circa singulos geniculos Amygdala similia ala instar expanduntur, per ambitum serrata, lōgiora, graueolentia. Vmbellam in summo fert Sambuco similem, flores itidem & fructum. Radice nititur longa, digitali crassitudine.

LOCVS.

Vtrunque genus in opacis, asperisq; potissimum locis, & iuxta aquas emicat. Ebulus verò in agris etiam quibusdam provenit.

TEMPVS.

Parum ante Solstitium aestiuum floret Sambucus.

PLANTARVM HISTORIAE

cus. Tardius autē Ebulus, Iunio nimirum & Iulio mensibus. In Augusto verò baccas suas profert.

TEMPERAMENTVM.

Sambucus vterque calefaciendi ac desiccandi facultatem habet, id quod amaritudo, & adstringitio modica abundè monstrant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem vtrisque facultas, & par vsus exiccans scilicet, aquam educens, stomacho nocēs. Folia oleum modo decocta, pituitam & bilem purgant. Quinetiam teneri caules in olla cocti, eadem praestant. Radix in vino decocta & in cibis data hydropicis auxiliatur. Eodem modo pota viperarum moribus subuenit. Vulvas emollit & aperit, & quae circa eas sunt affectiones, decocta cū aqua in sessione corrigit. Fructus cū vino potus eadem efficit. Illitus capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum polenta illita inflammationes mitigāt. Ambrustis etiam, & canis moribus illita succurrunt. Profunda & quae in caernas dehiscunt vlcera agglutinant. Podagricis, cum taurino hircinōve adipe illita, auxiliantur.

EX GALENO.

Vtraque Sambucus, & arborescēs & herbaceae, exiccādi, conglutinandi, modiceq; digerendi facultatem obtinent. Paulus Aegineta haec adiicit: Posita & manducata aquam per aluum educunt.

EX PLINIO.

Vtriusque

Vtriusque decoctum in vino veteri, foliorum, vel seminis, vel radicis, ad cyathos binos potum stomacho inutile est, alio detrahens aquam Refrigerat etiam inflammationem, maximè recētis am- busti. & canis morsum cum polenta, mollissimis fo- liorū illitis. Succus cerebri collectiones, prinatimæ que membranæ quæ circa cerebrum est, lenit infu- sus. Acini eius infirmiores quàm reliqua: tingunt capillum: poti acetabuli mensura, vrinam mouent. Foliorum mollissima ex oleo & sale eduntur ad pi- tuitam bilémque detrahendam. Ad omnia effica- cior quæ minor. Radicis eius in vina decoctæ duo cyathi poti, hydropicos exinaniunt, vuluas emola- liunt foliorum decocto insidentium. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti, aluum solunt. Resistunt folia serpentum ictibus in vino pota. Po- dagris cum seuo hircino vehementer prosunt cau- liculi illiti. Idémque in aqua macerantur, vt ea sparsa pulices necentur. Foliorum decocto si locus spargatur, muscæ necantur. Boa appellatur mor- bus papularum, cum rubent corpora. Sambuci ra- mo verberatur. Cortex interior tritus, ex vino al- bo potus aluum soluit. Ebuli fumo fugantur serpē- tes. Tenerum cum foliis tritum, ex vino potum, cal- culos pellit. Impositum testes sanat.

DE AMMI. CAP. XXI.

Ammi in hortis Parisiorum sponte luxuriat.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Aμμυ Græcis, Ammi Latinis, Ameos officinis corruptè, Germanis Amey appellari potest.

FORMA.

Ammi caule rotundo & herbacæo constat, surculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto per ambitum incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbellæ Anethi: semine exiliori multò quàm Cuminum, gustu origanum præ se ferente, acris & subamaro: radice candida & multifibra. Esse autè hæc

Ammi verum. herbam verum Ammi, seminis in gustu sapor, qui subamarus & acris est, omnium maximè ostendit: talem enim in eo saporem Ga. requirit. Origani etià gustu referre videtur. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, cuius pictura et descriptio satis docet, hæc herbam esse Ammi genuinum. Inter cetera enim semen Ammii piper gustu referre, ideoque à nonnullis piperculam dictam esse ait. Id quod certè verissimum esse comperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniam inesse senties.

LOCVS.

Nusquam in Germania sua sponte nascitur. Sæptum tamen facile & magna copia provenit, sic ut deinceps extirpari vix queat.

TEMPVS.

Augusto mense floret, ac deinceps ubi defloruit, semen abundè producit.

TEM.

TEMPERAMENTVM.

Ammi semen in calefaciendo desiccandóque ex ordine tertio intenso existit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vis semini excafactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, vrina difficultatē, venenatorū morfus cum vino potum. Menstrua ciet. Miscetur dero- dentib. ex cantharidibus confectus medicamentis, vt inde exortis vrina difficultatibus resistat. Sugil- lata cum melle illitum tollit. Colore potū & inune- Etum in pallorem mutat. Suffitum cum vua passa- aut resina vuluas purgat.

EX GALENO.

Herbæ quam vocant Ammi, semen maximè est vtile. Facultatis est excafactoria & desiccato- ria, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est quod digerat, & vrinā moueat.

EX PLINIO.

Inflationes & tormina discutit. Vrinā & men- strua ciet. Sugillata & oculorū epiphoras mitigat. Cum lini semine scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus: priuatimq; cecastarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium simi- liter mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa- aut resina, vuluas purgat, Tradunt facilius concie- pere eas, quæ odorentur id per coitum.

DE

PLANTARVM HISTORIAE

DE ARO. CAP. XXII.

Arus canis priapus.

NOMINA.

Aρὺν, ἢ ἀρίσταρον Gracè, Arum & Aris Latine dicitur. Officina corrupto, vt solent, vocabulo, Iarum appellant. Quidam, quòd folium effigie bubuli vestigii prodeat, Pedem vituli vocarūt. Alii, quòd dracunculum emulatur, sola magnitudine discrepans, Serpētariam minorem appellant: *ria minor.* neq; id sanè temere. Videtur enim Aron esse Dracunculus minor, cui Dioscorides folia *μυσσοειδῆ*, hoc est, Hederae similia esse dicit, quae prorsus Ari sunt, nisi quòd paulò sint longiora. Plinius etiā Aron eas facultates tribuit, quas Dioscorides Dracunculo minori. Vt hinc conicere liceat, Arum cū Dracunculo minori miscuisse veteres. Vulgus, quòd pistillum promit exerti fere genitalis effigie, Sacerdotis virile nominat. Id quòd & germani nostri faciunt qui sua lingua *Piaffenp nī* (Gallicè *Vit de prebître*) nuncupāt. Aliās Aron, & ob vehementē acrimoniā, teutschen Ingber (Gallicè *Pied de Veau*) vocant. **FORMA.**

Folia emittit Dracunculo similia, sed longiora & minus maculata, caulem dodrantalem, purpurascentem, pistilli figura, à quo croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis, quae quòd minore acrimonia est, cocta comeditur. Haec utique delineationes ad amussim, nulla reclamante

te nota, nostro Aro conueniunt. Siquidem folia promit Dracunculi, longiora, & paucioribus maculis respersa, caulem dodrantem altum, in purpurâ leniter tendentem. Ante seminis partum, sagaci naturæ artificio dignum, erumpit inuolucrum & cucullū, quod mucronata in turbinem vaginula pistillū cōplectitur, & suo fouet sinu. Verū ubi fructu prægnans fatiscit in hiatum, solida pistilli facies diluatiore purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum viridia, dein crocea spectantur semina, quæ in coronæ modum concinnè contexta, imam eius partem ambiunt. Radicem etiam obtinet albam, ad Dracunculi radicem accedentem, ut pictura graphicè monstrat. Neque obstat quòd Galenus radicem Ari elixam mandiscribat, nostri autem tam acris sit, ut vix gustari ob miras & diutinas, quas in lingua ac palato excitat puncturas, possit, tantū abest ut edendo esse queat. Siquidē Gal. lib. secundo de alimentorū facultatibus teste, non parem in omnibus regionibus acrimoniam obtinet, sed in nonnullis minimam, ut Cyrenis. Et Plin. quoque lib. xix. cap. v. teste, in Aegypto Aron nascitur radice mollioris naturæ, quæ etiā cruda editur. In quibusdam, ut Germania nostra, maximam. Verba Gal. paulò post in facultatum commemoratione citabimus. Hinc discendum erit, multa nobis in scriptoribus rei herbariæ, primo statim obtutu pugnātia videri, quæ si ad cæli regionūq;

Obiectio
nis dissolu
tio.

nūmq̃ue diuersitatem respexerimus, nihil prorsus
pugnantiae aut absurditatis habebunt. Quod nisi
diligenter animaduertas, multas genuinas herbas
pro adulterinis abiicias necesse erit. His accedit
quòd Galenus non simpliciter dicat mandi Ari ra
dicem, sed elixam. Non est autem mirum si acris
etiam edendo fiant, si elixentur. Bis enim aut ter in
aqua decocta, Galeno lib. 2. de aliment facul. cap.
ultimo, teste, acrimonia spoliatur. Porro si ista scio
lis quibusdam haud satisfecerint, dicendum planè
erit Arū Germania nostra esse Arisaron, quod que
stu, Dioscoride & Galeno autoribus, acrius est.
Quamuis ego cū Ruellio, diligentissimo earū rerū
inquire, Arisaron ab Aro differre haud putem,
quod scilicet forma utrisque eadem sit. Cuius et
tiam rei fidem facit ipsa nomēclatura, quae utrius
que retinuit appellationem: duobus tandem voca
bulis in vnū coalescentibus, dici cœpit Arisaron. A
pud veterrimos enim Aris primum: dein postero
ribus, copulatis vnā nominibus, Arisaron cōfectum
est nomen.

LOCVS.

Nascitur in syluis, locis umbrosis, humidis &
frigidis,

TEMPVS.

Folia statim in Martio, inter primas herbas ve
ris exiliunt, in Iunio dispereunt, ita vt haud faci
lè hoc nomine herba ipsa reperiri queat. Semen Iu
lio & Augusto mensibus reperitur, primum, vt di
ximus, viride, mox croceum.

TEMPERAMENTVM.

Arum Galenus in calefaciendo & desiccando primi ordinis esse statuit. Et locutus est de Aro qui non vehementi acrimonia pollet. Nostrū haud dubiè in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam, qua præditum est, acrimoniam.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix, semē, & folia Ari easdē Dracunculo vires habent. Radix priuatim cum fimo bubulo illita prodagricis prodest. Dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam edēdo est.

EX GALENO.

Arum terrena essentia constat, sed calida: proinde de extergendi facultatē possidet, verum non valentem, sicut Dracontiū. Radices eius maximè sunt vtilēs. Siquidem comesæ crassitiam humorū mediciter incidunt, adeò vt excreationib. ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontiū. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus sic de Aro scribit: Ari radix rapi modo mādatur. Quibusdam autē in regionibus acrior nascitur, vt Draccontio ferè similis sit. Dum rectè parare voles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidā iniicere oportet, vt in Brassica & Lēte dictum est. Cyrenis contrā quàm in nostra regione plāta se habet: nam illic minimum medicamento si, minimi q; acrimoniæ habet, adeò vt vel rapis utilior reputetur: idcirco radicem quoque in Italiam cernunt,

PLANTARVM HISTORIAE

ut quæ absque ut putrescat aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Perspicuum verò est alendis corporibus hanc accommodatiorem esse. Si quis autem in thorace ac pulmone collectos crassos lentosque humores extusare studeat, acrior ac medicamentosior magis conveniet. In aqua elixa estur cum sinapi aut aceto, ex oleo & garo. Quin etiam cum opsonijs, & sale, & iis quæ caseo constant, sumitur. Haud vero obscurum est, succū eius qui in iecur ac vniuersum corpus diffunditur, quo vno animal nutritur, crassiorē esse, idque maxime quum radix, quemadmodum sunt quæ Cyrenis, aduehuntur, medica vi caruerit. Apud nos namque in Asia, pleraq; Ari radices acriores sunt, & medicamentosam iam vim obtinent.

EX PLINIO.

Aron miris laudibus extulere Græci, primum in
 †aliās fœ- cibis † fœminarum præferentes, quoniam mas dul-
 minam. cior esset, & in coquendo lentior, pectorisque vitia
 expurgaret: aridum in potione inspersum, aut ecli-
 gmate, vrinam & menses ciceret. Sic & in oxyme-
 lite potum, stomacho: interaneis exulceratis ex lac-
 te onillo bibendum, ad tussim in cinere coctum ex
 oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum bibe-
 retur. Epiphoris elixum imposuere: item sigillatis,
 tonsillis. Ex oleo hæmorrhoidum vitio infudere, lē-
 tigines ex melle illinentes. Laudauit Cleopantus
 & pro antidoto contra venena, pleuriticis, peri-
 pneumonicis.

pneumonicis quoque & tuſſientibus. Semen intri-
tum cum oleo aut roſacco infundens, aurium dolo-
ri Dieuches. Cleophaſtus tuſſientibus aut ſuſpirio-
ſis & orthopnoicis, & purulenta excreantibus, fa-
rina permixtū in panc cocto dedit. Diodotus pthi-
ſicis ē melle ecligmate, & pulmonis vitiis, oſibus
etiam fractis impoſuit. Partus omnium animalium
extrahit natura circumlitum. Succus radicis cum
melle Attico, oculorum caligines, ac ſtomachi vitia
diſcutit. Tuſſim decocti ius cum melle. Vlcerata om-
nium generum ſive phagedena ſint, ſive carcino-
mata, ſive ſerpant, ſive polypi in naribus, ſuccus
mire ſanat. Folia ambuſtis proſunt ex vino & oleo
cocta. Aluum inaniunt ex ſale & aceto ſumpta. Ea-
tiam luxatis cocta cum melle proſunt. Item articu-
lis podagricis cum ſale, recentia vel ſicca. Hippo-
crates ad collectiones cum melle impoſuit. Ad men-
ſes trahendos ſeminis vel radicis drachma dua in
vini cyathis duobus ſufficiunt. Eadem potio ſi à
partu non purgantur, & ſecundas trahit. Hippo-
crates & radicem ipſam appoſuit. Dicunt & in
peſtilentia ſalutarem eſſe in cibis. Ebrietatem diſ-
cutit. Serpentes nidore cum crematur, priuatim-
que aſpides fugat, aut inebriat, ita vt torpentes
inueniantur. Perunctos quoque Aro vt laurco oleo
fugiant, ideo & contra iccus dari potu in vino
nigro putat utile. In foliis Ari caſeus optime ſer-
uari traditur.

PLANTARVM HISTORIAE

APPENDIX.

Recentior

res quas

facultates

Aro tri-

buant.

Posteriores medici Aron discutiendi, extenuandi, extergendique facultatem habere tradunt: ideoque tumoribus aurium, ficibus, strumis, scirrhisque mederi, faciei deformitatem cutisque auferre, eius denique radicem in puluerem redactam supercreascentem in vulneribus carnem minuere scribunt. Id autem posse prestare, acrimonia ipsa vehemens quae gustu sese exerit, abunde monstrat. Dioscorides etiam Arisarum acrimonia haud exigua praeduum scribit, ideoque illitum nomas sistere, collyriaque efficacissima ex eo contra fistulas fieri. Denique radicem cuiuscunque animalis pudendo impositam, id corrumpere tradit. Plinius quoque Arisarum ulceribus mederi manantibus, item combustis & fistulis scriptum reliquit. Praeterea commixtum collyrio nomas sistere ait.

DE ARCIO.

CAP. XXIII.

Arcium seu Personatia, Glouteron.

NOMINA.

Lappa

maior.

Personat

tia vnde

dicta.

Aρχιον, ἢ ὑποσώπιον, ἢ ὑποσώπις Graecis, Personatia Latinis dicitur. Officina Lappam maiorem, vulgus Bardana vocat, Germani Groszkletten (Gallicè Gleteron ou Glouteron) Personatia hac quondam ad personas utebantur, quoties in theatris aliisve locis qui cognosci à populo nollent, egisse quidpiam volebant. Est enim foliorum eius tanta amplitudo, ut tota humana facies

cies iis tegi possit: atque hinc haud dubiè tã Græci quàm Latini, nomen illi Prosopii & Personatiae indiderunt.

FORMA.

Personatia folia Cucurbitae similia habet, maiora tamẽ, duriora, nigriora & hirsuta. Caulẽ subcãdidũ, interdũ nullũ. Radicem grandẽ, candidã intus, foris nigrã. Ex qua descriptione nemo nõ intelligit, Personatiam esse eam herbam quã hodie vulgaris Bardana vocat, quæ folio constat omnium lapparum maximo, parte auersa herbido, aduersa ca- Bardana.
no, caule in purpureo albicante, grandibus lappis, quæ transeuntium vestibis adheret, in quibus flos purpureus nascitur, non euident, sed occultus, intra se germinãs, radice grãdi, intus cãdida, foris atra.

LOCVS.

Nascitur vbique, potissimũ circa margines praesorum, & agrorum.

TEMPVS.

Mense Iulio lappas cum floribus suis producit Personatia.

TEMPERAMENTVM.

Digerit simul et desiccatur, sed & adstringit non nihil.

VIRES. EX DIOSCORIDE

Radix Personatiae drachma pondere cum pineis nucibus pota, sanguinem & purulenta excreantibus auxiliatur. Articulorũ quoque dolores, qui ex
f iij mem-

PLANTARVM HISTORIAE

membrorum fractionibus collisionibusve fiunt, trita & illita sedat. Quinetiam folia vetustis vlceribus vtiliter illinuntur.

EX GALENO.

Arcium, quod Profopida vocant, cuiusque folia Cucurbitæ similima sunt, nisi quatenus tū maiora, tum duriora, discutit simul & desiccatur, sed & adstringit mediocriter: quamobrem folia eius veteribus vlceribus mederi possunt.

EX APVLEIO.

Personatiæ herbæ succus cum vino veteri in positionem datus, omnes morsus serpentium mirifice sanat. Eiusdem foliis cinges febricitatem, & statim febrem mitigat, caloremque sanat. Vulnus, etiam si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorum eius foeto: deinde ipsam cum nitro & axungia, cum acetere, & in panno inducito & imponito. Ad canū rabidorum morsus radix cum modico sale trita imponitur morsui, & statim ager liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, vrinam promoucat, & vesicæ dolorem tollit. Pulvis seminis eius cum vino optimo per quadraginta dies datus, ischiadicis mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui & imposita, ambusta mirifice curant.

EX L. COLVMELLA.

Venena viperae pellit super scarificationē ferro factam herba Personatia trita & cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest cō-

tra

tra serpentes. Ex vino bibitur duum denariorum pondere. Strumis radix eius medetur: item cum axungia operitur folio suo imposita.

DE ASCYRO. CAP. XXIIII.

Ascyron androssæmum, Hypericum nomine postremo omnes vulgò appellatur.

NOMINA.

Aσκυρον, ἢ ἀσχυροειδὲς Græcè, Ascyron Latine nominatur. Officinis ignotum. Germanicè Harthouu, id est, durum fenum appellatur. Græci à contrario, huic herbæ nomē imposuisse videtur, σκύρος enim illis asperitatē significat. Pulchrum dictū. chrè igitur ad Græcam appellationem Germanica alludere videtur.

FORMA.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus ramis, fruticosius, puniceo colore rubens. Flores fert luteos, semen Hyperico simile, odore resinæ, quod cum atteritur digitos ferè cruetat.

LOCVS.

In cultis & asperis locis prouenit.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Essentia tenue est, ideoque calefacit & desiccatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

f iiij Semen

PLANTARVM HISTORIAE

Semen Ascyri potum in hydromelitis heminis duabus, ad ischiadicos prodest dolores: biliosa enim multa excrementa ducit. Sed assidue dari oportet donec conualefcant. Præterea illitum ad ambusta conducit.

EX GALENO.

Semen eius purgatorium. Foliorum verò facultas modicè extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Ceterum in vino austero decocta, vinum ipsum magnorum vulnorum glutinatorium efficiunt.

EX PLINIO.

Vsus seminis ad ischiadicos, potus duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustis.

DE ANDROSAEMO. CAP. XXV.

NOMINA.

Aνδρῶσαιμον Græcis, Androsemon pariter Latinis dicitur. Officinis incognitum. Geramandrosēmanis Kunrath, quasi Græcè dicas Thrasibemon unde la nominatur. Dictum Androsemon, quod aut dictum. coma, aut floribus eius tritis, hominis sanguinem referat.

FORMA.

Differt ab Hyperico & Ascyro Androsemō. Frutex est prætenuib. ramis, surculosus, puniceo colore rubentibus virgū, foliis triploquaduplōve maioribus quàm Ruta, quæ contrita sanguineū succum remittunt.

remittunt. Alarū caua habet plura, in summo alarum auium modo pennata expansaue, circa quas flosculi pusilli lutei. Semen in calyce, nigro papaueri simile, veluti punctis depictū distinctūve. Coosma trita resinosum odorem reddit.

LOCVS.

Locis iisdem quibus Ascyron provenit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Androsami semen tritum, potūmq̃ue duarum drachmarum pondere biliosa alui excrementa ducit. Ischiadicis autem potissimum medetur, sed à purgatione aquam sorbere oportet. Herba illita ambusta sanat, & sanguinem compefcit.

EX GALENO.

Easdem cum Ascyro facultates obtinet.

EX PLINIO.

Vsus ad purgandam aluum tuse cum semine, potaq̃; matutino, vel à cœna duabus drachmis in aqua mulsa vel vino, vel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prodest ischidiacis maxime. Sed postera die, capparis radicem resina permixtam deuorare oportet drachmæ pondere, iterūmq̃ue quatridui intervallo idem facere. A purgatione autem ipsa robustiores vinum bibere, infirmiores

PLANTARVM HISTORIAE

maiores aquam. Imponitur & podagris, & ambu-
stis, & vulneribus, cohibens sanguinem.

DE ARCEVTHO. CAP. XXVI.

NOMINA.

Aρκευθος, ἡ ὑρκευθὶς Græcè, Juniperus Latine vocatur. Officinæ Latinam appellationē retinuerunt. Germanicè Vuckholder, Kram-
tber (Gallicè Du Genefure) id est turdori bac-
ca vocantur, quod fructibus eius turdi pinguescāt.
Juniperus Juniperus autem dici videtur, quod iuniores & no-
unde di- nellos fructus pariat: sola enim ferè arborum sætus
eta. suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quis-
dem, novis superuenientibus.

GENERA.

Juniperus Dioscoridi duplex est, maior & mi-
nor, sola arboris et seminis magnitudine inter se dif-
ferentes. Minor humilis est, sessilibus in terra ramu-
lis, baccis minoribus, radicibus summo cespite fusis.
Maior altius adolefcit, & in iustā arboris magnitu-
dinē exurgit, caudice procero, cortice fragili, ligno
fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum acera-
uo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamē.

FORMA.

Veriusque facies horrida, coma virent perpe-
tua, spinæque potius quàm folio, sed herbacea ve-
stiuntur. Cortex illis membraneus, fragilis, nec dif-
ficulter fatiscens, materies fulva, quæ si ignibus di-
catur, non inuicundum fumum expirat, qui odoris
suauitate

suauitate grassantia pestilentie contagia depellit. Ex ea etiam, vt recentiores Græci tradunt, æstiuis temporibus lachryma thuris odorem atque colorem emulans sudat, quæ caloris officio durata, coeat in gummi. Arabum familia, non sine magna confusione nominum, Sandaracham appellat.

Sandaracham

Officinarum verò Vernicem vocant. Baccas ferunt prius cha Aratum virêtes, deinde per maturitatem nigras, quæ bum.

biennio antequam maturescant in ramis pendent. Vernix.

Hinc sunt qui baccas in iis esse ternas eodem tempore dicant, anni proximè exacti nondum maturas, &

tertij ante presentem iam maturas, tertias novas &

recentes. Ceterum non desunt qui nostram Iuniperum Obiectio-
non genuinam putent, quod bacca eius ad Dioscoridis dissolu-
ridis magnitudinem, quæ nucis est ponticæ aut fa- tio.

bæ, non accedant. Sed cogitent locum in causa esse

cur minores producatur: vt plurimum enim omnia

quæ in Germania proueniunt, iis quæ in Græcia nas-

scuntur minora sunt. Nobis etiam Iuniperi grana

aliunde allata visa sunt, quæ nucis auellane quã-

titatem æquabant: ob id vt magnitudinem ac for-

mam eorundem etiã exprimeret pictor, curauimus.

LOCVS.

Amant Iuniperi montes, & maritima loca, in planisque & cultis nasci recusant.

TEMPVS.

Autumno fructus Iuniperorum decerpuntur, sed ad bimatum prorogati.

TEM

PLANTARVM HISTORIAE
TEMPERAMENTVM.

Iuniperus calida & sicca, vtrunque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed nō similiter siccus. verum in hoc primi fuerit ordinis. Vernix calefacit & exiccat secundo recessu.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Acris vtraque est, calefacit, & urinā mouet. Incensa suffitu serpentes fugāt. Earū fructus, hic quidem fabae, alius verò nucis pōtica magnitudine inuenitur, rotundus, odoratus, in mandendo dulcis, & subamarus, Modicē calefacit & adstringit, stomacho utilis. Potus ad vitia thoracis, tusses, inflationes, tormina, & venenata, prodest. Urinam cit. Cōmulsis, ruptis, & vulua strangulationibus confert. Folia acria obtinet Iuniperus, ideoque tam ipsa quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini & bibi prodest. Cortex patrerea crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Ramentū verò ligni deuoratum, interficit.

EX GALENO.

Iuniperi fructus iecur renesq; expurgat, nimirū crassos & glutinosos humores extenuando, eaq; de causa salubribus medicamētis immiscetur. Perexiguū corpori humano alimētum ex eo apponitur. Affatim sumptus hic fructus stomachū mordicat, capūtque calefacit: ex quo illud quandoq; implens, dolore diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit. Urinam ciēt mediocriter.

EX PLINIO.

Utraque excalfacit & extenuat. Accensa serpentes fugat. Semen stomachi, pectoris, laterisque doloribus utile. Inflationes languoresq; discutit, tusses concoquit & duritias. Illitum tumores sistit: item aluum, baccis ex vino nigro potis: item ventris tumores illitis. Miscetur & antidotis oxyporis. Vrinæ cit. Illinitur & oculis in epiphoris. Datur conuulsis, ruptis, torminibus, vuluis, ischiadicis cū vino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis viginti in vino. Sunt & qui perungant corpus è semine eius in serpentum metu.

VERNICIS VIRES EX RECENTIORIBVS GRAECIS.

Profluentem è naribus sanguinem sistit, si ex cādidō ouis liquore trita temporibus & fronti illinatur. Eadem vomitionem ex polline thuris & oui albo excepta supprimit. Item profluentem aluum cū eisdem illita firmat. Stomachum in biliosos vomitus effusum, deuorata in ouo sorbili polenta eius cohibet, cruentāque alui proluniciem retinet. Destillationes suspendit suffitæ nidor, arcetque ne præcipientes ad ima decumbant. Pituītā quæ in stomacho aut intestinis coit, digerit. Humorem etiam coeracet, qui pernix à cerebro deuoluitur. Tanias et cetera ventris animalia necat. Vliginosos fistularū sinus indita resiccat. Mēstruos continet fluxus. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiātibus manuum

tibus,abunde monstrant.Hinc satis constat Alceam
extra omnem insignem tum caliditatem,tum frigi-
ditatem siccare,ac planè emplasticorum consis-
tiam obtinere.Vide Galenum lib.iiij de simpl.me-
dic.facult.cap.iiij & sequenti.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Alceæ radices in vino aut aqua potæ,dysentericis
& ruptis medentur.

EX PAVLO.

Alcea syluestris maluæ genus est.In vino potæ
dysenteria & rupturis medetur,potissimum ipsius
radix.

EX PLINIO.

Vfus radicis Alceæ ex vino vel ex aqua, dysen-
tericis,aluo citæ,ruptis & conuulsis.

APPENDIX.

Celebratur ad caliginem oculorū ab Empiricis,
ita vt non desint qui credant radicem Alceæ è col-
lo suspensam,aciem oculorū supra modum acuerè,
& tueri posse.

DE ADIANTO. CAP: XXVIII:

Adiantum duplex Theophrasto ,triplex
Dioscoridi,nobis quadruplex.

NOMINA.

A δίαντρον, ἢ πολύτριχον, ἢ καλλιτριχον, ἢ
ἑβενόριχον. Græcè. Adiantū, Polytrichum,
Callitrichū, Cinnamalis, Terræ capillus, et Super-
ciliū terræ, Latine appellatur. Officinæ hodie Cas Capillus
pillum

PLANTARVM HISTORIAE

Veneris. pillum Veneris vocant, quo etiam nomine appellas-
Adiātum ri Latinis Apuleius testatur. Germani Frauen-
unde di- har, vel Lunck, frauuenhar. Adiantū nomen ab
Etum. euentu accepit, quòd folium eius persusum aqua &
 Διαιβετολ, id est, non madeat. sicco semper simile
 vt author est Theophrastus libro septimo de plan-
 tarum historia, cap. xiiij. Id quòd minimè intelligē-
 dum erit de mersione longiore in aqua: nam diu-
 tius mersum ac irrigatum, aequè ac alia herba ma-
 descit. Quare rectius de imbre descendēte è cælo,
 cuius stillicidium foliis eius nō insidet, vt testis est
 in Theriacis Nicander, accipiendū venit. Vel quòd
 magis aridet, ab interioribus puteorū parietibus,
 & fontium marginibus quas coronat, dictum est
 Adiātum, quòd nimirum quasi sitiēs illorū aquas,
Polytri- quas tamen odit & respuit, quærat. Polytrichō au-
chon. tem quasi multicomū, quòd capillos multos ac den-
Callitri- sos faciat, eiusq; defluuia expleat. Callitrichon ve-
chon. rò quasi pulchricomum, quòd capillos tingat, pul-
 chrioresq; reddat. Nec alia ratione capillus Vene-
Capillus ris hæc herba dicta est, quàm à speciosis reddēdis
Veneris capillis: nec alio noīe Veneris vox adiecta est, quàm
cur dicta. quòd hæc pulchricoma pingatur. Hinc patet ma-
Pharma- ximus pharmacopolarum nostri tēporis error, qui
copolarū sub trib. nominibus, vnā & eandē duntaxat herbā
error. significātib; tres diuersas herbas designatas esse
 putat. Aliam enim Polytrichū, aliam Callitrichū,
 quam tamen corrupto vocabulo Gallitrichum vo-
 cant:

cant: aliam etiam Capillum Veneris esse herbam existimant. Quales autem herbae sint, Polytrichū, & Gallitrichū illis nominata, suis locis ostēdemus.

FORMA.

Folia albicantia Coriandro similia habet, in summo incisuris diuisa. Caules ex quibus nascuntur prodeuntque, nigros admodum, tenues, dodrantaes, nitentesque. Neque florem, neque semen creat. Foliis vero Coriandri iam quidem erumpentis, vel paulo antea enati, necdum caulescentis, quae quidem in infima eius parte quodammodo lata sunt, & in extremitatibus incisa, constare Adiantum sciendum erit. Ex qua nimirum descriptione manifestissimū est, eam herbam qua ferè omnes Officinæ pro Capillo Veneris utuntur, & quam nos à muris in quibus puenit, Germanicè Maurrattē, & Steinrau Ruta muten vocamus, non esse verū Capillum Veneris, aut varia non Adiantum: caules siquidem eius non sunt nigri, sed est Adiantum virides: neque admodum tenues, sed pro herbae quantitate crassi: neque splendētes. In summa, neque figura, neque magnitudo, neque color, nec natales etiam respondent, quia in siccis & soli expositis muris nascitur, in humidis contrā Adiantum.

LOCVS.

Locis opacis, palustribusque, & humentibus muris, & prope fontes nascitur. In Germania tamen nostra, quod sciam, non provenit: copiose autem in Narbonensi Gallia, & Italia.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Aestate virescit, bruma non marcescit.

TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigidityte symmetrum est, verum desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herba potum, asthmaticis, difficultate spirandi laborantibus, ictericis, lienosis, & vrinae difficultatibus auxiliatur. Calculos coërit, & aluum cohibet. Venenatorum morsibus, & stomachi fluxionibus cum vino potum prodest. Menses cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda herba ad venenatorum morsus illinitur. Alopecias capillis explet. Strumas dissolvit. Furfures & achorres cum lixivio extergit. Cum ladano, myrrhino & susino, aut hyssopo & vino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixivio & vino abstergit. Gallinaceos & coturnices cibis eorum additum pugnaciores facit. Seritur & magna utilitate circa onilia.

EX GALENO.

Extenuat Adiantum & discutit. Alopecias capillis vestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum. Viscosorum crassorumque ex thorace pulmonumque excreationibus non mediocriter confert, & ventris fluxiones sistit.

EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

DE VITE VINIFERA.

CAP. XXIX.

NOMINA.

Aμπελος οἰνοφόρος καὶ ἡμερος Græcè, *Vitis vinifera* & *sativa*, seu *culta* Latinè appellatur. Germanicè *Vueinreb*. (Gallicè *vnevine cultiuée*.) *Vitis autem*, quòd inuitetur ad *Vitis vn-*
uas pariendas, dicta esse primò videtur. *de dicta.*

GENERA.

Innumera vitium reperiuntur genera, quæ singula persequi supernacaneum esse videtur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptores, Pliniumq; libro xiiij. naturalis historię, qui diligentissimè de iis scripsit, legat.

FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit *fulta*, fertur ad terrā. A radice eius caudex vnus cõtortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplicicortice cingitur, rimoso, flagellis longè latèque vagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmentis, foliis latis, & in extremitatibus incis, lasciuientibus. Floribus fructum ambientibus lanugineis. Vna compluribus acinis acernata, qui interdum purpureo, nonnunquam roseo, aliquando viridi colore fulgent. Seminibus tunica clausis.

LOCVS.

Passim & in multis Germania nostra regionibus
 g ij bus

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Aestate virescit, bruma non marcescit.

TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigidityte
symmetrum est, verum desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herba potum, asthmaticis, diffi-
cultate spirandi laborantibus, ictericis, lientosis, &
vrinae difficultatibus auxiliatur. Calculos cõterit,
& aluum cohibet. Venenatorum morsibus, & sto-
machi fluxionibus cum vino potum prodest. Menses
cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda
herba ad venenatorum morsus illinitur. Alopecias
capillis explet. Strumas dissolvit. Furfures & achor-
res cum lixivio extergit. Cum ladano, myrrhino &
susino, aut hyssopo & vino, capillos defluentes con-
tinet. Decoctum eius cum lixivio & vino abster-
git. Gallinaceos & coturnices cibis eorum additum
pugnaciores facit. Scribitur & magna utilitate cir-
ca omnia.

EX GALENO.

Extenuat Adiantum & disciuit. Alopecias ca-
pillis vestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque
frangit epotum. Viscosorum crassorumque ex tho-
race pulmonumque excreationibus non mediocriter
confert, & ventris fluxiones sistit.

EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

DE VITE VINIFERA.

CAP. XXIX.

NOMINA.

Aμπελος οἰνοφόρος καὶ ἡμερος Gracè, *Vitis* vinifera & sativa, seu culta Latine appellatur. Germanicè Vucinreb. (Gallicè vne vine cultuée.) *Vitis* autem, quòd inuitetur ad *Vitis vn-*
uas pariendas, dicta esse primò videtur. *de dicta.*

GENERA.

Innumera vitium reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esse videtur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticae scriptores, Pliniumq; libro xiiij. naturalis historiae, qui diligentissimè de iis scripsit, legat.

FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit fulta, fertur ad terrā. A radice eius caudex vnus cōtortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplici cortice cingitur, rimoso, flagellis longè latèque vagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmentis, foliis latis, & in extremitatibus incisis, lasciuientibus. Floribus fructum ambientibus lanugineis. Vna compluribus acinis acernata, qui interdum purpureo, nonnunquam roseo, aliquando viridi colore fulgent. Seminibus tunica clausis.

LOCVS.

Passim & in multis Germania nostra regionibus

PLANTARVM HISTORIAE

bus nascitur: & vix hortum inuenies in quo non
proueniat. TEMPVS.

Floret solstitio vitis, autumnio autem vvas ma-
turas profert.

TEMPERAMENTVM.

Omnium partium vitis temperamentum & fa-
cultatum enarratione patefcet. Vna tamen immat-
tura & acerba, frigida & sicca sunt: matura ve-
rò calida & humida in primo gradu, autore qui-
dem Simeone Sethi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vitis vinifera folia capreoliq; trita & illita ca-
pitis dolores, stomachique inflamationes & ardore
cum polenta mitigat. Folia etiã per se imposita, vt
Capreoli. pote quæ refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsis
potus dysentericis, sanguine expuentibus, stomachi-
cis & citra laborantibus mulieribus prodest. Ma-
defacti in aqua capreoli & poti eadem efficiunt.

Lachry- Lachryma verò eius quæ veluti gummi in caudi-
ma. cibus concrefcit, pota cum vino calculos pellit. Illis-
ta lichenas, scabies & lepras sanat. Oportet tamẽ
locum antea nitro confricasse. Eadem cum oleo fre-
quenter inuncta, pilos denudat: potissimum ichor,
aquosusve humor, qui ex incensis viridibus sarmẽ-
tis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eiicit.
Cinis sarmentorum & vinaceorum circa sedẽ quæ
antea ablata amputatãve sunt condylomata &
thymia, cum aceto illitus sanat. Cõfert luxatis &
vipercarum

viperarum morsibus. Lienis inflammationibus cū
 rosacco & Ruta, & aceto illitus. Vua recens quæ Vua.
 nis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus ho-
 rum particeps quæ aliquandiu decerpta pependit,
 quòd in ea copia humoris exaruerit. Stomacho ac-
 cōmodata est, appetentiamq; cibi excitat, & imbe-
 cillis conuenit. Quæ autem in vinaceis, aut è vina Vide Ga-
 rio vase seruata sunt, ori & stomacho grate sunt. lenū li. 2.
 Aluum sistunt, vesicam tamen & caput tentant. de alimē-
 Pro sunt sanguinem excreantibus. Similes iis sunt torū facu.
 quæ in mustum coniectæ sunt. Quæ verò sapa aut triplicem
 musto conditæ, stomachū magis infestant. Reponum hunc ser-
 tur & celesti cū aqua prius passæ factæ, minusq; uādarum
 vinosæ sunt, siticulosi, ardentibus & longis febris vuarū mo-
 bus vtiles. Vinacei earum reconditi, inflammati, dū expli-
 duris, turgentibusq; mammis cum sale illinuntur. cantem.
 Vinaceorū decoctū dysentericis, celiacis, & fluxui
 muliebri infusum confert. Ad inseciones quoque ac
 clysteres assumitur. Nuclei acinorum adstringunt,
 stomacho grati. Tosti autē, & triti & pro farina il-
 liti, dysentericis, celiacis et stomacho resolutis pro-
 sunt. Vua autem passa alba magis † extenuat. Cas † Serapiō
 ro illarum comesta, arteriæ, tussi, renibus ac vesicæ legit, ad-
 confert. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Ad- stringit.
 mixta milij & hordei farina & ouo, ac cum mel-
 le fixa, & per se etiam sumpta, atque cum pipere
 commanducata, ad capitis pituitam purgandā va-
 let. Testium inflammationes sedat, cum fabarum

PLANTARVM HISTORIAE

& cumini farina illita. Epinyctidas, carbunculos, fanos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta inposita, sanat. Podagræ cum opopanace illita auxiliatur. Mobiles ungues illita celeriter adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Plinio pete: superuacuum enim, imò tædio plenum esset, eas in vniuersum omnes commemorare.

EX GALENO.

Vitis satiuæ & cultæ adsimilis facultas est syluestri, sed ad omnia imbecillior. Vitis verò sylvestris racemi, extergendi vim obtinent, vt ephelis & nauios, & id genus quæcunque in cutis superficie fiunt, curare possint. Habet verò & astrictionem quandam ipsi, & extrema germina, quæ & sale cõdiri assolent. Plura de vuis habet idem Galenus libro secundo de Aliment. facult. cap. de vuis.

EX SIMEONE SETHI.

Vuæ plus nutriunt reliquis oporis, minus tamen ficis: neq; mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisitè. Tamen his non robusta, nec densa, sed laxa & flaccida caro gignitur. Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, quòd celeriter subeunt, atq; ideo si retineantur, ledunt: nec enim tunc probè concoquantur, sed crudum gignunt humorem, qui nõ facile in sanguinem transmutetur. Nucleorum natura, sicca & quodammodo adstringens est. Pertranscunt igitur omnia intestina, non alterati. Pensiles verò
vuæ,

vue, neque sistunt ventrem, neq; proritant, ceteris autem facilius concoquuntur. Neque vuarū parua est in dulcedine, & austeritate, & aciditate differentia. Dulces quidē calidiorem habent succū, austeræ verò & acidæ frigidū. Alium subducūt dulces, et maximē quādo humide fuerint. Omnium itaque tutissimus vsus est, quādo carnosæ fuerint & maturæ, & mediocriter quis ipsas assumat. Vue quæ albae sunt, magis subducunt alium quā nigræ. Omnes verò ciborum appetentiam excitāt, & venerem. Conuenit cum eduntur membranam & nucleos expuere, quòd difficulter conficiātur. Quæ immatura sunt, ventrem sistunt, & stomacho bona. Caliditatem à flaua bile ortam sedant. Minus verò nutriunt. Oportet autem non solum vuas, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos humidos, ante reliquos cibos apponere.

DE ACONITO. CAP. xxx.

Aconitum Pardalianches quadrifolium, quod quidā putauerunt Asters rectè pingis in syluis frequens.

NOMINA.

Aκόνιτον Græcis, Aconitum Latinis dicitur. Aconitū Sic autem Theophrasto lib. ix. de Plantarū vnde di-
historia teste, non ἀπὸ τῶν ἀκονῶν, id est, à cau- etum.
tibus, sed ab Aconis Periandynorum pago, ad Heracliam Pontis sita, vocatum est. Alij quod vis eadem in mortem esset, quæ cotibus ad ferri acie de-
g iij trahendam,

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

trahendam, statimq; admota velocitas sentiretur. Sunt qui aliam ob causam, quā referre minimè necessarium duco, sic nominatum fuisse existiment.

G E N E R A.

Pardaliā Duo Aconiti sunt genera: vnum Græcis Pardaliches. lianches dictum, quod pardi eo necentur. Vocatur Scorpium. etiam Scorpionum, quod radicem Scorpionum similem Vuæ verè habeat. Vulgus herbariorum Vuā versam, & vulsa. pinam, Germani Vuolffsbeer, & Doluurtz nominant. Alterum Lycoctonon Græcis dicitur, quoniam deuoratum lupos confestim interficit. Vulgus Luparia. Lupariam, Germani Voullfsuurtz appellant.

F O R M A.

Pardaliā Pardalianches folia habet tria aut quatuor Cycches de- clamino vel syluestri Cucumeri similia, minora ta
scriptio. men, & subaspera. Caulem dodrantalem. Radicē scorpionis caudæ similem, alabastrum modo nitentem. Ex hac descriptione omnibus liquido apparet, herbam eam quam Vuam versam aliqui nominant, cuiusq; hîc picturam exhibemus, primum esse Aconiti genus: habet enim tria aut quatuor folia, eaq; Cyclamini specie. Caulem palmi altitudine, & radicem incuruam, scorpionum caudæ similem, alabastrique modo splendentem. Quibus etiam accedit quod manuscriptus & vetustissimus herbarius planissimè eam herbam quam hîc damus pro Aconito pingat. Germanica etiam nomenclatura satis indicat hanc herbam ob suam facultatem perniciosam

ciosam esse Aconiti speciem. *Lycostemon* Platani *Lycostea* folia habet, magis tamen incisa diuisaue, longiora non. & nigriora. Caulem veluti Filix, cubiti altitudine, aut maiorem: pediculum glabrum. Semen in siliquis aliquatenus longis. Radices cirris marinarum squillarum similes, nigras. Vnde iterum constat *Lupariam* vulgò appellatam, esse alterã Aconiti speciem: ea enim folia Platani, quæ Cici aut Vitis foliis similia sunt, multas habetia diuisuras, obtinet. Caulem Filici similem, pediculum glabrũ. Florem oblongum, luteum, post quem longæ proueniunt siliquæ, in quibus est semen. Radices etiam nigras, ut nemo subinde quin verum sit Aconitum, dubitare possit.

LOCVS.

Primum Aconiti genus passim in nemoribus & collibus quibusdam nascitur: alterũ autem in montium vallibus altissimis. Magna autem illius copia est circa montem haud ultra vnum lapidem à Tubinga situm, quem Germanica voce *Farrenberg* nominant.

TEMPVS.

Aconiti primum genus Maio mense potissimum erumpit. Alterum autẽ astate, Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Erosione & putrefactione enecãt Aconita, ideo toto genere letalia sunt.

VIREs.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ferunt Aconiti primi radicem scorpionum admodum tam cum resolvere, & è diuerso admoto elleboro excitari. Ocularibus medicamentis dolorem tollentibus miscetur. Enecat pardos, fures, lupos, & feras omnes, carnibus impositum & obiectum. Alterius radice ad luporum venationes vtuntur. Inserta carnibus crudis, & à lupis deuorata, eos enecant.

EX GALENO.

Aconitum Pardalianches putrefaciendi facultatem obtinet & letale est, itaque in cibo potuque fugiendum: attamen ad putrefaciendum colliguan dumve quadam extra corpus, aut circa sedē, idoneum est. Herba verò radix ad hæc utilis est. Aliterum similem priori facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere con-
 igitur dō suauit.

μαζες, et

EX PLINIO.

non tunc Cōstat omnium venenorum ocysimum esse Aconitum, & tactis quoque genitalibus femininis sexus animalium, eodem die inferre mortē. Hoc tamen in vsus humana salutis vertēre, scorpionum exemplar etibus aduersari experiendo aconitū datum in vi Aldinum: no calido. Ea est natura vt hominē occidat, nisi inastipulan uenerit quod in homine perimat: cum eo solo collutibus huic etatur, velut pari intus inuēto. Sola hæc pugna est lectioni cum venenum in visceribus repererit: mirūque, Actio, pau exitialia per se ambo cum fuerint, duo venena in homine

homine commoriuntur, vt homo supersit. Imò verò lo, & an-
etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, de- tiquo in-
monstrando quomodo venenata quoque ipsa sana- terprete
rentur. Torpescūt scorpiones Aconiti tactu, stupēt Latino.
que pallentes, & vinci se consitentur. Auxiliatur
eis elleborum album, tactu resolvente: ceditq; aco-
nitum duobus malis, suo & omnium. Tangunt car-
nes aconito, necantque gustatu earum pantheras,
ob id quidam Pardalianches appellauere.

DE ARISTOLOCHIA.

CAP. XXXI.

Aristolochia longa videtur quam pro ro-
tunda pingis, quòd folio sit rotundo, sed
radice etiam rotunda esse debet Diosco-
ridi. Pistolochia autem tua radice rotun-
da est, foliis autem altè incisus.

NOMINA.

Aριστολόχια Græcis, Aristolochia Latinis, bar-
baris & officinis corrupta voce Aristologia,
quemadmodum etiam Germanis Holuurtz, &
Osterlucey. (Gallicè de la sarrasine) nomina-
tur. Dicta autem est Aristolochia, quod ἀριστή
τοῦς λοχοῖς, id est, optima puerperis sit, vtpote
quæ remoratos menses, hærentes secundas, & reli-
quias omnes à partu expellat.

Aristolos-
chia unde
dicta.

GENERA.

Aristolochiæ Dioscorides & alij Græci tria esse
genera statuūt. Vna est quæ rotunda et femina di-
citur.

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Germania citur. Altera longa & mascula. Tertia Clematidis, nie officii quasi dicas sarmetaria, appellatur. Harum certè nulla solà lō lā prater lōgā officinæ Germaniæ nostræ agnoscūt. gā Aristolochia Nam quæ sub Aristolochia rotunda nomine utitur lochia a herba, minimè genuina est, ut paulò post euidentissimè gnoscent. mis argumentis ostēdemus. Plinius tribus iis generibus addit quartum, ac Pistolochiam vocat, quæ chia quæ. certè ea est quæ nostræ officinæ Aristolochiā rotundam, & Germani Runde Holuurtz falso appellat, ut in eius descriptione fusius docebimus.

F O R M A.

Aristolochia rotunda. Aristolochia rotunda folia Hederae similia habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, cum multis in vna radice germinibus: sarmenta illi sunt oblonga, flores candidi, pileolis similes, in quibus quod rubet grauius odoratum est. Radix illius rotunda, rapo similis. Ex iis quidē verbis sole clarius fit, Aristolochiam rotundam officinarum, & quæ cōmuniter omnes utuntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij veteres pingunt. Hæc enim non Hederae folia, sed Rutæ potius, maiora tamen habere deprehenditur. Neque etiā odorata, neque subrotunda sunt. Grauis etiam qui ex floribus exhalat odor, in nostræ Aristolochiæ floribus nusquam apparet. Radix denique etsi rotunda sit, tamen quia concava est, globique formam obtinet, rapo, quod solidum est & oblongum, similis dici nō potest. Nō latet tamen interdum etiam reperiri eius generis

generis radices prorsus rotundas ac solidas, ut altera
 pictura monstrat: verum cum reliquæ Dioscori-
 dis notæ absint, legitima Aristolochia esse haud po-
 test. His accedit, quod manuscripti herbarum pictura
 planè hanc Aristolochiam Hederae folia habere
 doceat, ut hinc etiam euidentissimum sit nostram
 non esse genuinam. Aristolochia longa, folia quam Aristolochia longa.
 rotunda longiora habet. Ramulos tenues, altitudine
 ne dodrantales. Florem purpureum, grauiter odoratum,
 qui cum defloruerit pyro similis sit. Radicem
 digiti crassitudine dodrantalem, aut longiorem. Tam
 huius verò quam prioris radix colore buxco, gustu
 amara, & odore viroso est. Hæc sanè descriptio non
 abhorret à nostra Aristolochia, quæ Hederae etiam
 foliis constat, ramulisque tenuibus. Neque obstat Obiectio
 quod hæc non purpureos, sed luteos potius flores ha-
 beat: nam ut in Symphyto magno vberius dicemus, non
 ubique terrarum, earundem etiam herbarum flores
 similes esse, euidentissimum fit in Boragine, & Consolida
 maiore hodie nominatis herbis. Quamuis autem lutei
 sint, grauiter tamè odores non vbiaratos esse constat.
 Dein ubi flos nostræ etiam Aristolochiae defloruerit,
 tum pyro similis sit, ut pictura etiam pulchrè monstrat.
 Sed hic obtrudet nobis miles. quispiam Dioscoridem,
 qui Gentianæ radicem Aristolochiae longæ similem,
 crassamque esse scribit: huius autem nostræ
 nedum digiti crassitudinè ob-
 tinet, tantum abest, ut quantitate Gentianæ radi-

PLANTARVM HISTORIAE

ei similis esse queat. Respondeo, hac quidem vera esse, sed nihil mirum esse si apud nos minor reperiatur: variatur enim in vna etiam & eadem herba iuxta regiones diuersas radicum magnitudo. Sic visa est nobis radix Aristolochiae rotunda multò, quàm sit maximus digitus, maior & crassior. Hac tamen in Italia prouenerat. Neque dubium est quin nostrae etiam radix maior futura sit, ubi cultus, & terra apta admodum accesserit. Nā vt Theophrastus lib. i. de hist. Plat. cap. 5. autor est, quaedā ob culturā diuersa efficiuntur, atque à sua natura discedunt. Sic Malua in altum se attollit, & arborescit, atque in longitudine & crassitudine instar hastae grandescit. Quid multa? cum nostra maxima etiā praedita sit amaritudine, tutò illa pro vera & genuina, nihil obstatibus floribus luteis, & radice minima, vti licebit. Clematis ramulos habet tenues, foliis subrotundis, minori Sēperuiuo similibus, plenos flores Rutae haud dissimiles. Radices longiores, tenues, corticem crassum habentes, & odoratum. Pistolochia à Plinio lib. xxv. cap. viij. iis pingitur verbis: Est & quae Pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quàm tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrrhizon cognominant. Ex iis autem verbis nemo non intelligit, Aristolochia est Pistolochiam rotundam vulgò vocatam, esse Pistolochiam: hac enim supra modum tenuis, vel vt

apertius

Clematis
tis.

Pistolo-
chia.

Aristolochia
no-

apertius dicam, tenera herba est. Radix etiā multis capillamentis vestita, crassioris etiam iunci magnitudine, atque adeò concava, ut pictura monstrat. His accedit, quòd hæc quæ rotunda vocatur, canis ulceribus proffit, quam etiam facultatem Pistolochiæ, ut paulò post patebit, Plinius tribuit. Et quid multis opus est verbis? nomen ipsum abundè docet esse Pistolochiam: creditur enim, quāvis reuera non sit, esse Aristolochia hodie quoque, haud secus quàm Plinij temporibus. Hæc ut totam eius faciem teneas, caulem habet rotundum, leuem, folia Ruta hortensis, latiora tamen, flores ferè Eranthemi, purpureos: illa candidos, ut pictura quæ vtroq; vnà complectitur, pulchrè monstrat, quibus abeuntibus, siliquas profert refertas semine atro, lentibus haud dissimili: radices, ut ostensum est, hæc rotundam & cauam, illa verò rotundam, at omni tempore solidam obtinet, colore subcroceam.

LOCVS.

Vera rotunda, quòd sciam, nusquā in Germania nostra nascitur. Lōga passim in vineis, ac hortis aliis prouenit. Pistolochia in syluis & locis vmbrosis.

TEMPVS.

Longa Iunio & Iulio mensibus floret. Pistolochia in Martio & Aprili, quo præterito statim etiam disperit.

TEMPERAMENTVM.

Cum supra modū amara & subacres sint Aristolochia,

PLANTARVM HISTORIAE

lochiae, calidas & siccas esse in secundo, vel, quod magis credibile est, in tertio ordine rectè statuimus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rotunda contra alia venena valet. Longa verò drachmæ unius pondere cum vino pota & illita, aduersus serpentes & letalia. Menses, secundas & fetus omnes in vtero consistentes cum myrrha & pipere pota pellit. In pessa subdita eadem potest. Rotunda ad eadem omnia ad quæ prædicta conducit: ampliusq; asthmatis, singultui, rigori, licni, ruptis, conuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. furculos & spicula extrahit. Squamas ossium illita educit. Putrescentia excarificat, & sordida vlcera expurgat. Cana cum Iride & melle explet. Exterit gingiuas & dentes. Creditur & Clematidis ad eadem prodesse, efficacia tamen prædictis minor inferiorque est.

EX GALENO.

Aristolochiæ radix ad medicationes vtilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarum verò duarum Clematidis vocata magis odorata est: itaq; ea ad vngueta vtuntur vnguētarij: sed ad sanationes infirmior. Longa verò minus quidem tenuis est quàm rotunda, sed nec ipsa inefficax, verum abstergendi & calefaciendi facultatē possidet, minus tamē quàm rotunda abstergit atq; digerit: sed non minus calefacit, imò fortassis etiam plus. Itaq; in quibus vsus est

vsus est mediocriter abstergere, cōmodior est lōga, quēadmodū in carnis exulcerationibus, & in vteri fomētationibus. In quibus autem crassū humore validius extenuare oportet, illic vsus est rotunda. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crudorum flatuum natos, magis curat rotunda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera repurgat, ac dentes gingiuāsq; candidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisq; ut si quod aliud medicamentum, idonea est.

EX PLINIO.

Valent radice tantum. Rotunda contra serpentes. Oblōga in summa tamen gloria est etiā modō. A conceptu admota vuluis in carne bubula, mares figurat, ut traditur. Quæ Pistolochi & Polyrhixos cognominatur, conuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, utilissima esse traditur. Semine pleuriticos & nervos confirmare, excalescere. Putrida vlcera excut, sordida expurgat, vermesque extrahit Aristolochia. Clauos in vlceribus natos, & infixa corporis omnia, præcipuè sagittas, & ossa fracta, cum resina. Cava vlcera explet per se. & cum Iride: recentia vulnera ex aceto.

APPENDIX.

Et si nostrā Aristolochiā rotundā non genuinam esse dixerimus, tamen ob id in medico vsu nō repudianda erit. Quum enim habeat & in foliis & in

h

radice

PLANTARVM HISTORIAE

radice acrimoniam, eamque non leuem quidem, si
genuina desit, sine omni discrimine illa vti licebit
ad omnia ea ad quae vera vsurpatur.

DE AMPELO LEVCE.

CAP XXXII.

Bryonia nobis colubrina, quod sub hu-
ius vmbra densiori stabulare ament colu-
bri, aliis Ignis ardens dicitur à caustica vi
baccarum rubentium.

NOMINA.

Aμπελος λευκή, ἢ βρυονία, ἢ φίλωθρον
Græcè: Vitis alba, Psilothrum Latine appel-
latur. Officinis & herbariis Bryonia. Vulgus Vi-
ticellam nominat. Germanicè Stickuurtz, Schie-
szuurtz, Raszuurtzel, Hunds kurbisz, Romi-
schrub, Vuilder zituuau, Teufelskirsz. (Gal-
licè De la couleuree, aliis du feu ardent.) vo-
catur. Vitis alba verò dicta, non quod vitis sit,
ba cur di sed quod viti similis existat. Sic etiam Viticella,
Ita. Psilothrum, quod ex eius acinis coria depilari ac
Psilothrū confici possint. Bryonia verò à βρύω fortè, quod
vnde. est pullulo atque adeò extollo, & exalto, eò quod
Bryonia. in adjacentes sibi frutices scandens se exaltet at-
que latè pullulet.

FORMA.

Sarmēta, folia, capreoli, satinae viti similia sunt,
hirsutiora tamen omnia. Propinquis fruticibus se
implicat capreolis apprehendens. Fructum habet

vaccino=

racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna.

LOCVS.

Passim in sepibus & senticetis nascitur, eosque quos prope se nanciscitur frutices scandit, vt eleganter in carmine suo Columella cecinit, dicens:

Quaę tuas audax imitatur Nysie viteis,

Nec metuit senteis: nā vepribus improba surgēs

Achrados, indomitas bryonias alligat vltimos.

TEMPVS.

Floret tota aestate in bonam vsque partem autumnī, in quo fructum producit, qui primum viridis est, dein vbi maturitatem consecutus fuerit, rufus esse incipit.

TEMPERAMENTVM.

Prima germina subamarā & modicē acrem adstrictionem habent. Radix autem desiccā & moderatē calefacit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Bryonię in prima germinatione asparagi elixi manduntur, vrinā & aluum cientes. Folia, fructus & radix, acrem vim habent: capropter chironiis, gāgranicis, phagedemicis, & tibiis putrefacientibus vlceribus cum sale illita auxiliantur. Radix abstergit corpus & erugat. Vitia faciei, varos, lētiginēs, & cicatrices nigras, cum eruo, terra chia, & scēnogrāco emendat. Ad eadē prodest decocta in oleo vsquedū lique scat. Sugillata tollit, & digitorū
hij pterygia

PLANTARVM HISTORIAE

pterygia compescit. Cum vino illita inflammatio-
nes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit,
trita & illita. Mifectur aptè medicamentis quæ
exedendo sunt. Bibitur comitialibus drachmæ pon-
dere quotidie per annum. Attonitis & vertigine
laborantibus consimiliter assumpta prodest. Con-
tra viperarum ictus pota drachmis duabus pro-
dest. Foetus necat. Mentem aliquando subtrahit.
Cit urinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod
præfocatione oppressis, tussientibus, latera dolen-
tibus, & ruptis datur. Apposita utero, foetus & se-
cundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex
aceto triginta diebus pota consumit. Illinitur uti-
liter cum fico ad eadem. Ad incessus decoquitur:
vulvas siquidem purgat, & abortum facit. Vere
ex radice eius exprimitur succus, bibiturque cum
aqua mulsa ad eadem, pituitam ducens. Fructus
eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit.
Lactis abundantiam efficit succus eius fructus, si
cum tritico decocto sorbeatur.

EX GALENO.

Vitis alba, quam etiam Bryonia vocant, prima
quidem germina ab omnibus pro more per ver e-
duntur, utpote edulium stomacho eò quod adstrin-
gat gratū. Habent etiā amarā & modicè acrē ad-
strictionem, quare urinam moderate mouent. Ra-
dix autem abstergentem nonnullam, desiccantem
& tenuius partium, ac moderatè calidam vim
obinet.

obtinet. quamobrem & lienes induratos liquefacit, tum epota, tum foris cū ficibus imposita. Pforam etiam ac lepram sanat. Racemosus eius fructus pelles tingentibus utilis est.

EX PLINIO.

Bryoniae asparagi decocti in cibo alui & urinæ cient. Folia & caules exulcerant corpus: utiq; ulcerum phagedenis, & gāgrænis, tibiærumq; tadio cum sale illinuntur. Semen in vuararis acinis depēdet, succo rubente postea croci. Nouere id qui coria perficiunt: illo enim vtuntur. Pforis & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix numerosis utilitatibus nobilis: contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie, varosque & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. Eademq; præstat decocta in oleo. Datur & comitialibus potus. Item mēte commotis, & vertigine laborantibus, drachmæ pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquāto, purgat sensus. Illa vis præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua imposita, ut Bryonia: quare quidam hanc albā Bryoniam vocant. Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Cit menses & urinā. Eclegma ex ea sit suspiriosus, & contra lateris dolores, vulsis, ruptis. Splenē ternis obolis pota triginta dieb^o cōsumit. Illinitur eadē cū fico & pterygiis digitorū. Ex vino secundas fœminarū apposita tra-

PLANTARVM HISTORIAE

hit: & pituitā, drachma pota ex aqua mulsa. Sac-
cus radice colligi debet ante seminis maturitatē:
qui illitus per se & cum eruo, latiore quodam co-
lore & cutis teneritate mangonizat corpora: ser-
pentes fugat. Tunditur ipsa radix cum pinguisco,
crugātque corpus, si statim bina stadia ambulen-
tur. Aliās vrit, nisi frigida abluatur.

DE AMPFLO MELAENA.

CAP. XXXIII.

Tua vitis nigra videtur esse viburnū, etiā
vulgò Gallorum cum Virgilio dictum.

NOMINA.

Vitis ni-
gra vnde
dicta.

Aμπελος μέλαινα Græcis, Vitis nigra La-
tinis nominatur. Officinis incognita. Germa-
nis Vualdreben. oder Lynen, oder Lenen,
(Gallicè Espece de Couleuree; ayant les ra-
cines & sementz noirs.) vocatur. Nigra ve-
rò vitis dicta est à radice nigra, & quòd vitis si-
militudinem obtineat.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, magis tamen ad
Smilacis folia accedētia, cui & caules similes ob-
tinet: maiora tamē eius folia quàm illius sunt. Clu-
wiculis hæc etiam arbores amplectitur. Semen ra-
cemosum, initio herbaceum, cum maturuit deinde
nigrum. Radicem foris nigram, intus buxei colo-
ris. Ex qua delineatione omnibus constat herbam
hanc cuius picturam exhibemus, esse vitem ni-
gram.

gram. Foliis enim Hedera, maioribus tamen, Smilaci proximioribus, caulibus quoque cognatis. Clauiculis suis arbores perinde atque adminicula comprehendit. Semen racematim cohaeret, inter principia virens, post maturitatem nigrescens. Radix foris atra, intus buxeo colore nitet. Flores eius, quod omisit Dioscorides, sunt candidi, & odorati, quibus decidētibus semen subnascitur plumis quasi vestitum, aut barba cana effigiem praebens.

LOCVS.

In frutetis & dumetis potissimum nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, Augusto verò semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod vitis alba temperamentum habet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius caules in prima germinatione olerum modo manduntur, vrina & mensibus ducendis vtilis. Idem lienes minuunt. Comitibus, vertiginosis, & resolutis accommodati sunt. Radix eadem praestat quae vitis alba, minus efficax tamen. Folia cum vino illita ad iumentorum ceruices exulceratas conducunt. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

EX GALENO.

Viti alba ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

EX PLINIO.

Asparagi eius in cibo vrinae ciēda, lienisq; minuēdo vtilis. Radix ossa infracta efficacius extrahit
h iij quā

PLANTARVM HISTORIAE

quā supra dicta. Caterū eidē peculiare est, quōd iumentorum ceruicibus vnice medetur. Aiunt si quis eam in villa extruxerit, fugere accipitres, tāsque fieri aues villaticas. Aliter eadem in iumentō hominēque phlegma aut sanguinem qui scraetur, talos circumligata sanat.

DE AMARANTO. CAP. XXXIII.

Amarantus luteus in Santonia, & Gallia Narbonensi frequens est, in officinis propē omnibus Stœchadii citree nomine, Amarantus purpureus nobis Passe velours, quōd immortalī colore etiam villutum purpureum vincat.

NOMINA.

Aμάρωντος Græcis, Amarantus Latinis dicitur. Medicis & herbariis nostræ ætatis ex amore & anthos dictionem componi credentibus, Flos amoris vocatur. Hanc appellationem vsurpantes Germani Floramor nominant, aliās Samatblum & Tausentschon (Gallicè Dupassevelours) appellatur. Amarantus autem non alio nomine dici cepit, quā quōd flos eius nunquā marcescat. Hinc est quōd puellæ hyemales sibi corollas ex eo conficiant: id quod Erfordiæ, vbi non solum æstate, verum etiam hyeme gestant coronas, fieri potissimum solet.

GENERA.

Duplex est Amarantus: vnus luteus, qui Dioscoridi ἐλίχρεστον, Galeno Amarantus, officinis & imperitis Stichas citrina, vel vt ipsi loquuntur, Stichados

Amarantus vnde dictus.

Stichas
citrina.

caulos citrinum, Germanis Rheinblumen quòd in regionibus quæ Rheno adiacent, potissimum veniat: oder Mottenblum oder Lungling ap= Helichry pellatur. Helichryson dictum, quòd ad solis reper= son unde cussum comantibus in orbem florum foliis, fulgorè dictum. auri prae se ferat. Alter purpureus, qui hodie Flos Flos amoris vulgò, & Germanis Floramor oder Sa= ris. matblū vocatur, vt paulò antè à nobis dictū est.

FORMA.

Amarantus luteus qui Helichryson alio nomine Amaran= dicitur, virgam habet tenuem, virentem, rectā, so= tus luteus. lidamque. Folia angusta ex intervallis. Abrotono similia. Comam orbicularem, auri modo fulgentē. Umbellam rotundam, veluti corymbos arescentes. Radicem tenuem. Ex qua descriptione planum fit eam herbam quam hodie officinae solæcisimo vtentes, Stichada citrinam nomināt, esse Helichryson. Est enim herba surculosa, exilibus ramulis, folio vt Hyssopus angusto, gustu amaro, et instar Abrotoni albicante: coma orbiculari, auri modo splendente: umbella rotunda veluti corymbos arescentes: radice gracili. Et vt paucis dicam, non est nota quæ illi non aptissimè quadret. Purpureus verò pedali altitudine surgit, caule purpurascēte, foliis Ocymo si= Amaran= milibus, maioribus tamē & longioribus, spica pur= tus purpurea, verius quàm flore, inodora, qua nihil gratius aspectu cernitur.

LOCVS.

Nascitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in asperis, sabulosis, siccis & cōvallib.
locis luteus. Alter autē in hortis & siccilib. seritur.

TEMPVS.

Helichrysum Iunio & Iulio mensibus floret. Amarantus verò purpureus aestate, potissimum autē Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Luteus calidus & siccus hand dubiè est, id quod Amaritudo in gustu & facultates eius abunde demonstrant. Purpureus autem recentiorum herbariorum sententia, frigidus est & siccus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Coma Helichrysi cum vino pota difficultatibus urinae, serpentium ictibus, coxendicium doloribus, & ruptis auxiliatur. Menses ducit, & sanguinis grumos in vesica aut aluo cum oxymelite puta liquefacit. Destillationem trium obolorum pondere cum vino diluto albo ieiuno data compefcit. Reponitur etiam cum vestibus, quas ab erosione integras seruat. Vnde iterum colligere licebit, herbam quā Rheinblumen vocant, esse Helichrysum, quòd illam hac facultate vt vestes à tinea tueatur prædicitam esse, omnibus in confesso est.

EX GALENO.

Amarantus, luteus nēpe, facultatis est incidentis & extenuantis. Quapropter coma eius cū vino pota menses educit, & sanguinis grumos liquare creditur, non solum in vētre, sed & in vesica. Sed tūc
potius

potius illam cum mulso bibere conuenit. Omnes vero simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho tamē aduersa. EX PLINIO.

Heliocrysum ciet urinas è vino pota, & menses. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinē concretum ventris ac vesicæ absomit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluvia mulierū in vino albo. Vestes tuctur odore non ineleganti.

APPENDIX.

Recentiores purpureum Amarantum vehementer siccare tradunt, ideoque cum vino sumptū alui fluxiones sistere scribunt: sed, ut aiunt, stomacho aduersatur. Lutei floribus in vino decoctis, ad lumbricos educendos vtuntur: & ad pediculos enecandos in lixiuio coctis.

DE AQUILEGIA. CAP. XXIV.

Aquilegia aliis angelica ancolie vulgo Galorum, florum omnium pulcherrimus praesertim qui duplex est.

NOMINA.

QUæ Aquilegia vulgò ab omnib. appellatur herba, ea Germanis Ackeley Agley & Aquilegia Ageley nominatur. Quo verò noīe Græcō nō est Aescis aut Latinis medicis vocata sit, nobis nōdū cōsta gilops. re potuit. Non esse enim Græcorū Aegilopa, ut non Aegilops solum vulgares herbarii, verumetiā magni nominis quid.

PLANTARVM HISTORIAE

nisi medici putant, notius est quàm vt demonstrari à me debeat. Nam nihil in vniuersa Aegilops, quæ alterum Aucna genus est, historia reperitur, quod ad Aquilegiam referri queat. Neque enim tam ab anguilla cæcer, quàm Aegilops ab Aquilegia distinet: vt hoc nomine errare toto cælo evidentissimū sit, qui Aegylopa esse Aquilegiam arbitrantur.

FORMA.

Folia Chelidonij maioris habet, sed paulò rotundiora, ac molliora. Caulem cubitalem, & interdum proceriorem, in cuius summo flores purpurei sunt, ex caudis quibusdam veluti muliebres oculi propendentes. His decidentibus capitula subscuntur, haud secus atque in melanthio, in quibus semē atrum est. Radix eius crassa.

LOCVS.

Nascitur passim in hortis, & pinguibus quibusdam pratis. Inuenitur etiam in montibus syluosis, & interdum in petris & muris.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

In gustu dulcedinem quandam præ se ferre videtur, vt hoc nomine mediocriter calidam esse, ac modicè digerendi vim habere verisimile sit.

VIRE. EX RECENTIORIBVS.

Recentiores omnes, tum herbarii, tum medici, Aquilegie omnes Aegilopis facultates tribuunt, at
quàm

quàm rectè, ipsi viderint. Neq; enim verisimile est herbae quae subacris nō est, tātam discutiendi inesse facultatem posse. Quum verò modicè digerat & exiccet, scabiei & fistulis, potissimum si illi farina commisceatur triticea, conferre potest.

DE ALLIARIA. CAP. XXXV.

Alliaria vulgo scordotis ab odore allii herba qua sunt haecenus male vsi Pharmacopaei loco scordii nunc notissimi.

NOMINA.

Nondū constat quo nomine veteribus Graecis & Latinis herba haec appellata sit. Vulgò Alliaria tamē, cō quòd trita eius folia ingratū ac planè aliunde diuolentem odorem redolent, Alliaris & Alliaria nō est. Germanicè Knoblochkraut oder Leuchel oder Saszkraut. Pandectarum Autor Pedesasininum vocat. **FORMA.** Pesasinius.

Folia eius cū primū emicant sub orūda sunt, Viola similitudine, aliquantulum tamen maiora. Adulta autem in angulos exeunt. Herba ipsa bicinbitali proceritate consurgit, caule tereti, foliis Verticatis, nisi quod leuiora sunt, parcius fimbriata, & à pediculo latiora. Alii odoratu cum teruntur, flore lacteo albōve, exili in siliquis semine, atro colore, radice oblonga, eiusdem cum foliis odoris.

LOCVS.

Passim propter sepes & agrorum margines provenit.

TEMPVS.

Folia

PLANTARVM HISTORIAE

Folia statim primo vere, atque adeò Martio ipso erumpunt. Floret autem aestate, atque deinceps semen profert.

TEMPERAMENTVM..

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est vt temperamento eodē prædita sit. Calefacit igitur haud dubiè & desiccatur, non tamen perinde atque Allium in excessu quarto. VIRE S.

Easde propè Allii facultates habere vel hinc cōiici potest, quòd nonnulli in iuribus tortinisq; succis pro Allio substituant. Proinde corpus calefacere, crassos humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest: omnia tamen hæc minori quàm Allium efficacia. Semen eius cum aceto emplastrum modo mulieribus strangulatum vteri laborantibus impositum, & vuluæ admotum prodest, ac easdem excitat. Et summatim, omnia quæ Nasturtii semen, sed minori efficacia, potest.

DE ACALYPHE. CAP. XXXVII.

Vrtica Romana nobis mas dicitur, semine in globulis ceu lini sed minori. Maior in sepibus hortorum, minor agria nobis dicitur Ortie græce.

NOMINA.

Aκαλύφη, ἡ νιΐδη Græcis, Vrtica Latinis nūcupatur. Officinæ Latino nomine vtuntur, Acalyphe Germanis Neißel (Gallicè Ortie) appellatur. unde dicitur Acalyphe verò dicta est, Athenæo authore, quòd iniucundo

iniucundo sit tactu, & pruriginem cieat. Cnide autem Ela.
tem, quod vellicet, pungat ac suo morsu sensum la- Cnide.
cessat, à verbo $\chi\upsilon\iota\zeta\epsilon\upsilon$, quod pungere & vellicare Vrtica.
significat. Vrtica ab vrendo, quòd pruritum pustu-
lasq; igni similes excitet.

Vrticaros
mana.

GENERA.

Dioscorides duo facit genera. Vnam asperam,
quam hodie Romanā vocant: & est ea quam pi-
etam damus. Huius quidē semine in officinis uten-
dum, nō alterius quæ passim in sepibus ac dumetis
nascitur. Germanicè Vuelschnessel (Gallicè Or-
tie griesche) appellatur. Alterā minus asperam,
quā ob id mollem nominant. Hanc nondum videre
potuimus. In Germania nostra præter hæc genera,
alia duo inueniuntur. Vnū maius, quod Germanicè
Heyternessel nomināt: alterū minus, Germanicè Vrtica no-
Brennessel vel Habernessel quòd nimirū in a- stramajor
uena nascatur, appellari solet. Harū etiā picturas Vrtica mi-
adiicere placuit, quòd nō prorsus inefficaces esse pu nor.
temus, quandoquidem haud secus atque Romana
pungere videantur. FORM A.

Romana caule est rotundo & aspero, syluestrior
etiam & asperior, latior & nigrior foliis, semine
haud dissimili in globulis quibusdam semine lini,
sed minore. Altera priori similis est, nisi quòd non
similiter aspera est, tenuiusq; semen habet.

LOCVS.

Romana apud nos non nisi sata prouenit, non se Romana.

PLANTARVM HISTORIAE

cus atque mollis vocata urtica. Vulgares passim in
dumetis ac sepibus gignuntur.

TEMPVS.

Semen messibus colligi oportet.

TEMPERAMENTVM.

Subtilium est partium, & temperatura sicca, nō
tamen tantum habet caliditatis vt iam mordicat.

VIREŚ. EX DIOSCORIDE.

Vtriusque folia cum sale illita canis morsibus,
gangranis, malignis vlceribus, cancris, sordidisq; lu
xatis, tuberculis, parotidibus, phygetis, & abscess
ibus medentur. Lienosis cum cerato imponuntur.
Profluvia sanguinis ex naribus cum succo trita &
imposita sistunt. Cum myrrha trita & imposita
menses mouent. Recentia admota vteri prociden
tias emendant. Semen cum passo potum venerem
stimulat, & vuluas aperit. Cum melle linctum or
thopneas, pleuritidas, & peripneumoniam iuuat.
Ea quae in thorace sunt educit. Miscetur & exedē
tibus medicamentis. Folia cum conchulis decocta
aluum molliunt, vrinasq; mouēt. Cum ptisana deco
cta ea quae in thorace sunt educunt. Decoctum fo
liorum cum exiguo myrrhae potum menses elicit.
Succus gargarissatus, vuam inflammata reprimat.

EX GALENO.

Herba semen & folia, nam haec potissimum in
vsum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo
vt tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddā
flatuosum

flatuosum obtinēt, quo & venerem extimulāt, maximè vbi cum passō semen bibitur. Porro quòd non vehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur crassorum viscosorumque humorum ex thorace & pulmone eductio, tñ quòd partes quas contigerit, pruriant. Cæterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum cōcoquitur, nascitur: nō enim actu flatuosa est, sed potentia. Vētem autem mediocriter subducit ipsa dūtaxat absterfione, ac veluti titillatione, non purgatione. Gāgrænoſa & cancroſa, & in totum quæ exiccati cistēra mordacitatem postulant, ea cōuenienter sanat.

EX PLINIO.

Vrtica plurimis sciatet remediis. Semen eius Cicuta contrarium esse Nicander affirmat. Itē fungis, & argento vino. Apollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduersari Hyoscyamo, & serpentibus, & scorpionibus. Quin illa ipsa amaritudo mordax, vnas in ore, procidentesq; vuluas, & infantium sedes, tactu resiliere cogit. Lethargicos expergisci tactis cruribus, magisq; fronte. Eadem canis morsibus addito sale medetur. Sanquinem trita naribus indita sistit, & magis radice. Carcinomata & sordida vlcera, sale ammixto: itē luxata. Sanat & panos, parotidas, carnesq; ab ossibus recedentes. Semen potum cum Sapa, vuluas strāgulantes aperit, & profluvia narium sistit impositum. Vomitiones in aqua mulsa sumptum à cœ-

na,

PLANTARVM HISTORIAE

na, faciles praestat, duobus obolis. Vno autem in vino potio, lassitudines recreat. Vuluae vitiis tostum, acetabuli mensura. Potum in sapa, resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracē purgat eodem ecligmate. Et lateri medetur cum semine lini: addunt Hyssopum & piperis aliquid. Illinitur licni. Difficilem ventrem tostum cibo emollit. Hippocrates vuluam purgari potio eo pronunciat. Dolore leuari tosto acetabuli mensura dulci potio, & imposito cum succo malua. Intestinorum animalia pelli cum Hydromelite & sale. Deflunia capitis, semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum vrsino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto, non minus utilis. Item licni. Et cocta in vino discutit panos, cū axungia vetere salsa. Eadem psilothrum exiccat. Condidit laudes eius Phantias physicus, vtilissimā cibis coctam conditamve professus arteria, tussi, ventris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, perionibus: cum oleo sudorē, coctam cū cochulis ciere aluum, cum ptisana pectus purgare, mulierūque menses cum sale, vlcera quae serpunt cohibere. Succus quoque in vfu est. Expressus illitusque fronti sanguinem narium sistit, potus vrinam ciet, calculus rumpit. Vnam gargarissatus reprimat. Si quae drupedes foetum non admittant, vrtica naturā fricandam monstrant.

DE APHACE. CAP. XXXVIII.

Aphace vbique hic frequens.

NOMINA.

Aφάκη Grecis, Aphace Latinis, vulgò Syluestris vitia, & Os mundi, Germanis Vuildnuicken, oder. S. Christoffeliskraut (Gallicè Vesse sauage) vocatur. Alia est ab Aphaca Theophrasti, quæ syluestrium olerum genus est, de qua suo loco plura dicemus.

FORMA.

Exiguus frutex est, lenticula altior, tenuiorib. foliis. Quæ nascuntur in ea siliquæ lēte maiores, terna aut quaterna semina nigriora & minora cōtinent.

LOCVS.

In aruis sponte nascitur.

TEMPVS.

Maio mense floret, & subinde semen in siliquis producit. TEMPERAMENTVM.

Moderati caloris est, valentius autem desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semina adstringendi vim habent, quapropter stomachi & alui fluxiones tosta, fracta, & decocta lentis instar sistunt.

EX GALENO.

Aphace facultatem obtinet adstrictoriam, sicut & ipsa lenticula. Sed & similiter vt lenticula edis solet: ceterum ægrius quàm illa concoquitur. Aliud retinet.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Natura ei ad spissandum efficacior quàm lenti.
Reliquo vsu eosilem effectus habet. Stomachi alui-
que fluxiones sistit semen decoctum.

DE ANDRACHNE. CAP. XXXIX.

Portulaca vtraque nobis cum sereno pul-
læ pes, Poulle pied, corruptè Pourpier di-
citur.

NOMINA.

Portulaca. **A** VSA ² ⁹ ^{xvii} Græcis, Portulaca Latinis et Offi-
cinis, Germanis Burtzelkaut (Gallicè Du
pourpier, ou de la Pourceline,) dicitur, corrup-
pta tamen voce, cū offerendū esset Portzelkraut,
ac si porcellorum herbam dicerent. Aliàs Sauubō
iisdem appellatur.

GENERA.

Portulaca Portulaca in duas distribuitur species: vnā hor-
tensis. tenssem, & alteram syluestrem, quæ non est tertium.
Syluestris Aixoi genus, vt aliqui seducti mēdosis Dioscoridis
exemplaribus credunt. Nam quòd plarique nomi-
na harū duarum plantarum confuderint, factum
subinde est vt multa adulterina, quæ scilicet tertij
generis Aixoo debentur, apiti de Portulaca syluca-
stri inserta sint, quæ omnia prorsus expungenda ve-
niunt, vt paulò pòst clarius monstrabimus. Hortē-
sem Germani simpliciter Burtzelkraut, syluestre
verò Vuil oder ackerburtzel vocant.

FORMA.

Hortēsi, caules habet crassos, pingues, teretes, in-
altum

altum erectos, lentè vergentes in puniceū, folia pingua, à tergo candida, flores exiguos luteos, semina nigra in herbaceis calycibus cōtenta Syluestris folia olea obtinet, minora tamen multò, numerosiora & tenera, rubentes cauliculos ab vna radice multos in terra sessiles, qui commanducati succo abundant, glutinosiq;, & sapore falsi sunt. Hæc est genuina apud Dioscoridem Portulacæ delineatio, reliqua verò omnia sunt adulterina, & ab imperito aliquo rerum ex capite de tertio Aixoo excerpta, & huic sine omni iudicio inserta.

LOCVS.

Provenit in hortorum areolis, vineis, & aliis cultis locis, hortensis. Ceterū syluestris in petrosis & incultis etiam nascitur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus carpēda folia & flores: semen verò sequentibus.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat vtraque quidem in tertio ordine à temperatis ac mediis, humectat verò in secundo. Quare viribus etiā non distant: hinc quæ in Dioscoride leguntur non sunt propriæ, sed Aixoi tertij generis, & à sciolo aliquo temere Portulacæ syluestri attributæ.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Portulacæ vim habet adstrictoriam. Cū potentia illita, capitis doloribus, oculorū inflammationibus,

PLANTARVM HISTORIAE

& aliarum partium, stomachi ardoribus, crysipelatis. & vesicae doloribus auxiliatur. Commāducata dentium stuporem, stomachi & intestinorū aestuationē fluxionesq; sedat. Renes crosos & vesicā adiuvat. Veneris impetus exoluit. Pari effectu et succus eius prodest potus, & in febribus etiam valēs. Contra rotundos lumbricos, sanguinis excreationē, dysenterias, hæmorrhoidas, pfluuia sanguinis percocta efficax. Contra Sepis morsus. Ocularib. medicamentis vtiliter commiscetur. Intestinis fluxione laborantibus, aut vulua erosionē affecta infunditur. Contra dolores capitis ex vstione cum rosaceo, aut oleo ex alto destillatur. Exanthemata in capite cum vino exerit. Vulneribus ad syderationem spectantibus ex polenta illinitur.

EX GALENO.

Portulaca frigida & aquea tēperamento est, pauca cuiusdā austeritatis particeps. Proinde fluxiones reprimat, maximē biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Hac ratione & aestuantes, vt si quid aliud, adiuvat, tū vētris osculo imposita, tum totis hypochondriis, potissimū in hecticis febribus. Præterea dentium stuporem sanat, nēpe quæ ab acidorū contactu asperè exiccata fuerant, leniens atque replens, vtpote cū viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaq; non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè

Et toti herba comesa accidit. Quoniam autē adstringit, vtiliter dysentericis editur, & in muliebri profluuiō, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hac multo quidem efficacior est herba succus.

EX PLINIO.

Portulacæ memorabiles vsus traduntur. Sagittarū venena & serpentium hemorrhoidū & presterum restringit, pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Itē hyoscyamo poto, è passōq; expresso succo. Cum ipsa nō est, semen eius simili effectū prodest. Resistit & aquarum vitiis, capitis dolori, vlceribusq; in vino tusa & imposita. Reliqua vlcera cū melle cōmanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, vmbilicoq; prociduo. In epiphorīs verò oīm, fronte tēporibusq; cū polēta. Sed ipsis oculis, è lacte & melle. Eadē, si procident, prodest, foliis tritis cū corticibus fabæ. Pustulis cū polenta & sale, & aceto ac cera. Et vlcera oris tumoremq; gingiuarū cōmanducata cruda sedat. Itē dentium dolores: Tonsillarum vlcera succus decocta. Mobiles dentes stabilit cōmanducata. Cruditates sedat, vocemq; firmat, & sitim arcet. Cervicis dolores cū Galla & Lini semine parī mēsurā sedat. Mammarum vitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachū in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febrib. imponitur cum polenta. Et aliās manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteria

PLANTARVM HISTORIAE

& vomitis datur ex aceto, vel bibitur cū Cumino. Tenasmi autē cocta, & comitialib. cibo vel potu prodest. Purgationib. mulierum, acetabuli mensura in sapa. Podagris calidis, cū sale illita, et sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & vesicas. Ventris animalia pellit. Ad vulnerū dolores, ex oleo cū po- lenta imponitur. Nervorū duritias emollit. Venerē in- hibet, Venerisq; somnia. Prætorij viri pater est, Hispaniæ princeps, quem scio propter impatibiles vne morbos, radicem eius filo suspensam è collo ge- rere, præterquam in balneis, & ita liberatum in- commodo omni. Quinetiam inueni apud autores, ca- put inde litum destillationem toto anno non senti- re. Oculos tamen hebetare putatur.

DE ASPHODELO. CAP. XL.

Asphodelus mas Dioscoridi scriptus, no- bis est frequens folio porraceo, radicibus glandium magnarū effigie multis simul- agnatis, porcorū cibis. NOMINA.

Affodillus **A**σφόδελος Græcis, Asphodelus Latinis, Of- sicinis corrupta voce Affodillus, Germanis Golduurtz (gallicè Haste Royale) nominatur.

GENERA.

Duo As- **D**uo esse Asphodeli genera, ut cūque vno cōten-
phodeli **tus** sit Dioscorides, testatur Plinius libro xxi. cap.
genera. xvij. marem nimirum & fœminam. Mas propriè
Albucus. Albucus nominatur, fœmina verò Hastula regia,
quod scilicet dum floret, prorsus regij sceptri effigie
referat,

referat, Germanicè Goldhuurtz. Marem depingit
 Dioscorides, & radicem eius acrem atque adeo ci-
 bo inutilem esse tradit. Fœminæ Theophrastus lib.
 vij. de historia plantarū cap. xij. & Hesiodus men-
 tionem facere videntur, quandoquidem eius vsum fœminæ
 in cibo quotidianum fuisse scribant. Hoc enim de mentione
 mare dici haud posse, radicis mirifica acrimonia fecisse vi-
 facit. Galenus etiam lib. secundo de aliment. facul. detur.
 Asphodelon fœminam cognouisse videtur, dum scri-
 bit, Asphodeli radicem Scyllæ radici, magnitudi-
 ne, figura & amaritudine quadantenus similē esse.
 Hæc enim de Dioscoridis Asphodelo verè dici non
 possunt, cuius quidem radix nō Scyllæ, sed Pæoniæ
 potius similis est. Denique non est vt fœminæ ama-
 ra, sed acris. Neq; obstat quòd nostra Hastula rea-
 gia tantā amaritudinē, quantā ei Galenus tribuit,
 nō habeat. Nā neque ea quā Hesiodus suo carmine
 tātò opere celebravit, tanta prædita fuit amaritudi-
 ne: aliās enim citra cocturā multam, cuius tamen
 ille non meminit, cibo quotidiano idonea esse nō po-
 tuisset. Et certè vt Aron non in omnibus regionibus
 parē acrimoniam obtinet, ita nec Hastula regia pa-
 rē amaritudinem omnib. in locis fortitur. Adeò vt
 dubiū non sit Hesiodum de nostra Asphodelo, quæ
 fœmina est, loquutum esse. De fœmina autē loquu-
 tum esse Hesiodum, confirmat quòd alibi tradat in
 Syluis nasci Asphodelū. Quod certè de ea quā fœmi-
 nam fecimus, rectè dici potest, quando raro alibi
 quàm

PLANTARVM HISTORIAE

quàm in syluis nascatur. Sententiã nostram firmare videtur Apuleius ille, qui in libro suo de herbis inscripto, seorsim & Asphodelum, & hastulã regionem describit.

FORMA.

Asphodelus mas. Asphodelus mas folia habet Porro maiori similis. Caulem leuem in summo florem ferentem Anthericum vocatum. Radices sublongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Nos marem hac vice habere non potuimus. **Fœmina.** Fœmina folia habet oblõga, angusta, leuiter lenta, Plantagini minori non dissimilia: caulem leuem, in summo non vnum, sed plures flores pingues retrorsum incuruos, plenos puniceis maculis, radicem itidem bulbosam, capillis Allij instar multis sub bulbo enascentibus, comatam, gustuque glutinosam.

LOCVS.

Mas nõ prouenit in Germania, nisi in hortis culta & plantata Fœmina verò in montibus & syluis sua sponte ac copiose nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense florent.

TEMPERAMENTVM.

Maris radix calida & sicca est. Fœmina folia cum amara nonnihil sint & acria, itidẽ calida & sicca esse, quemadmodum etiam radicem, constat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radices Albuci vim calefaciendi obtinẽt, vrinas & menses pote mouent. Lateris doloribus, tussibus,
 communis

convulsionibus, ruptionibus, drachma pondere ex vino potæ medentur. Commanducata astragali mē sura vomitiones adiuvat. A serpēte demorsis datur vtiliter trium drachmarum pondere. Illinire autē oportet morsus foliis, radice, & floribus cum vino. Item vlcera sordida, & depascentia. Mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula & furunculos, decocta in vini fece radice: ad recētes autē inflāmationes cū polenta. Radicis succus, adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquā vtile sit oculis medicamentū. Ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, vino, & myrrha tepesactus prodest. In contrariā aurē per se infusus dentiū dolorē mitigat. Cinis ē radice cremata illitus, alopecias capillis explet. Oleū in excavatis radicibus igni decoctum, illitum exulceratis permionibus, & ambustis igni conducit. Dolori auris instillatus auxiliatur. Cādidā vitiliginē linteo antea perfrictā in sole, illita radix emendat. Semē & flores in vino poti, scolopendræ & scorpionum venenis egregiē aduersantur. Aliū quoq; deiciūt.

EX GALENO.

Asphodeli radix utilis est, perinde atque Ari, Asari & Dracontii. Extergentis siquidem & discutientis facultatis. Vstæ tamen cinis calidior, & exiccantior, magis tenuium partium, & ad discutiendū potētiōr efficitur, propterea & alopecias sanat. Inest itaq; ei extenuandi facultas, atque obstructa demoliendi,

PLANTARVM HISTORIAE

demoliendi, veluti etiam Dracontio. Ideoq; ipsius
cauliculus arquatis tanquam summum præse-
dium exhibetur. EX PLINIO.

Defectis corporib. & phthificis constat bulbos
eius cum ptisana decoctos aptissimè mederi, panēq;
ex his cum farina subactum saluberrimū esse. Ni-
tander & contra serpentes & scorpiones, vel caulē
vel semē, vel bulbos dedit in vino tribus drachmis
substravitq; somno contra hos metus. Datur & cō-
tra venenata marina, & contra scolopendras ter-
restres. Folia quoque illinuntur, venenatorum vul-
neribus ex vino. Bulbi nervis articulisq; cum polen-
ta tusi illinuntur. Prodest & concisis ex aceto liche-
nas fricare. Item vlcerib. putrescentibus ex aqua
imponere. Mammarū quoque & testium inflāma-
tionib. Decocti in facie vini, oculorū epiphoris sup-
posito linteolo medētur. Folijs in quocūq; morbo de-
coctis magis medici vtuntur. Itē ad tetra tibiārum
vlcera, rimasq; corporū quacūque in parte, farina
arefactorū. Succus quoque ex tuis expressus, aut
decoctus, utilis sit corporis dolori cum melle. Idem
odorem corporis incundū affectatibus, cū Iri arida
& sale exiguo. Folia etiā supradictis medentur, &
strumis, panis, vlceribus in facie, decocta cū vino.
Cinis è radice alopecias emandat, & rimas pedū.
Decocta radice in oleo succus, permiones & ambu-
sta. Et ad gravitatem aurī infunditur. A cōtraria
aure in dolore dentium. Prodest & vrina pota mo-
dicè

dicè radix, & menſtruis, & lateris doloribus. Item
 ruptis, conuulſis, tuſſibus drachma pondere in vino
 pota. Eadem & vomitiones adiuuat cōmanducata
 Semine ſumpto turbatur venter. Chryſerius &
 Parotidas in vino decocta radice curauit. Itē ſtru-
 mas admixta cachry ex vino. Quidam aiunt, ſi im-
 poſita radice pars eius in fumo ſuspendatur, &
 quarta die ſolnatur, vnā cum radice areſcere ſtru-
 mā. Sophocles ad podagras vtroq; modo, cocta cru-
 daq; uſus eſt. Ad perniones decoctā ex oleo dedit, et
 ſuffuſis felle in vino, & hydropicis. Venerē quoque
 concitari cū vino & melle perunctis, aut bibentib.
 tradiderunt. Xenocrates & lichenas & pſoras, ra-
 dice in aceto cocta tolli dicit. Itē ſi cocta ſit cū hy-
 oſeyamo & piceliquida, alarū quoque & ſeminū
 vitia. Et capillū criſpiorem fieri, raſo prius capite,
 ſi radice ea fricetur. Lapides renū in vino decocta
 atque pota eximit. Hippocrates ſemē eius ad impe-
 tus lienis dari cenſet. Iumentorum quoque vlcera
 ac ſcabiem, radix illita, aut decoctæ ſuccus ad pi-
 lum reducit. APPENDIX.

Animaduertendum facultates à Dioſcoride &
 Galeno commemoratas, Albuco ſeu Aſphodelo ma-
 ri conuenire, huius enim radix guſtu acris eſt. Quæ
 verò à Plinio recensentur, hæc partim mari, partim
 ſceminæ debentur. Fœminæ, cuius radix & folia
 glutinoſa & amara ſunt, vlcera glutinandi, ſca-
 biem, rimasq; corporum, & ſi quæ ſimiles ſunt
 facul-

PLANTARVM HISTORIAE

facultates conueniunt, quas periti methodi simplicium medicamentorum facile discernent. Experientia etiam quotidiana testatur, huius vsum esse in vlceribus malignis salutarem. Quae autem mari sint tribuendae, ex Dioscoride, Galeno, & gustu quiuis deprehendere poterit. Nos in transcurso tantum parum attentos monere volumus, ne indiscriminatum & promiscue vtrique generi has facultates inesse putarent.

DE ATRAPHAXI. CAP. xli.

Atriplex nomen retinet, aliis Bonne dame, & Preudefemme dicitur.

NOMINA.

Aτράφαξις, ἢ χρυσοῶδες ἄνθος Graecis, Atriplex Latinis et Officinis, Germanis Moltē, oder Miltē. (Gallis Des Arroches, ou Des bonnes dames) nominatur. Atraphaxis Atticis dicitur, quia int mutare frequēter amantibus, dicta est, quod ἄνθος ὄνυξ, id est, statim in amplitudinem adole scat. Siquidem octauo à satu die prosilit, cōfestimq; incremento proficere videtur. Fidem celeris augmenti facit creptum in consinio ceteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eā nasci quicquam tradunt, nisi languidum. Chrysolachanon verò, id est, aureum olus dixerunt, à luteo quem profert flore.

Atraphaxis quare dicta.

Chrysolachanon.

GENERA.

Duo Atriplicis sunt genera, satiuā seu hortensis,

& sylueſtris. Satiuam ſimpliciter Germani Mol-
ten, ſylueſtrẽ verò cum adiectione aliqua, Vuild
molten oder Ackermolten, oder Klein ſche-
iſzmilten nominant.

FORMA.

Hortensis caulem fundit quadratum, ramis bra
chiatum, quibus primum flores lutei exigui, dein
foliatum semen & obduetum cortice promitur. Ra
dicem vnã habet in altum descendentem, nõ gla
bram, sed fibris quibusdam capillatam. Sylueſtris
tam luxuriosa proceritate prodit, vt quaternos ſa
pe cubitos excedat: caule vt hortensis anguloſo,
ramoſo, & purpurascente: folio hortensi non ad
modum diſſimili, potiſſimum quòd ad colorem at
tinet: flore luteo exiguo, semine racematim con
geſto, radice ſimplici in altum descendẽte, ex qua
ſe multæ promunt. LOCVS.

Atriplex
hortensis.

Sylueſtris

Hortensis non niſi ſata provenit. Sylueſtris ſua
ſponte naſcitur. Vtraque autem aſſiduo humore ſa
tiari amat. TEMPVS.

Vtraque Iunio & Iulio menſibus floret, deinde
ſemen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Atriplex humidã in ſecundo ordine, frigida au
tem in primo. Hortensis tamen ſylueſtri humidior
frigidiórque exiſtit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eſtur olerum modo elixum. Aluum mollit. Cru
dum

PLANTARVM HISTORIAE

dum vel coctum illitum panos discutit. Semen eius potum cum aqua mulsa morbum regium sanat.

EX GALENO.

Atriplex celeriter, ob lubricitatem, ventrē permeat. Parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phlegmatis quidem incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac veluti feruentibus, hortensis: vigentibus verò, declinantibus, & indurescentibus commo-
dior est sylvestris. Semen eius abstergentis est facultatis, proinde ad morbum regium ex iccoris obstructione prognatum utilis est.

EX PLINIO.

Coquitur difficillimè. Addidere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos, nec nisi mutata sepius aqua coquendum: stomacho contrarium esse, lētigines & papulas gignere. Hippocrates vularum vitiis id infundi cum Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Panos, furunculos incipiētes, duritias omnes, vel cocto vel crudo illini utiliter putant. Item ignem sacrum, cum melle, aceto, nitroque. Similiter podagris. Ungues scabros detrahare dicitur sine ulcere. Sunt qui morbo regio dēt semen eius cū melle, arterias et tonsillas nitro addito perfricent, alium moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula concitantes vomitiones. Sylvestri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur medicina.

EX

EX SIMEONE SETHI.

Ventrem quidem cit, prodest ad caliditatem ic-
coris, ac ictericis, & calidam temperaturam habē-
tibus succurrit. Cōmodissima autem biliosis. Cum
malua illita inflammationes sedat.

DE ATRACTYLIDE.

CAPVT XLII.

Atractylus mitior frequens in viis flore
Cnici, sed pallidiore. Atractylis hirsutior car-
duus benedictus, nobis hodie duplex.

NOMINA.

ATRACTYLIS, ἢ ΚΝΙΚΟΣ ἄγριος Græcis: Atra- Atractyl-
ctylis, Cnicus syluester Latinis dicitur. Atra- lis vnde
ctylis autem ideo dicta, quod ea antiquæ mulieres dicta Syl-
pro fuso utebantur: ἄτρεκτος enim fusus est Græ- uestris
cis. Syluestris verò Cnicus, quia Cnico urbano si- Cnicus.
milis est. GENERA.

Syluestris Cnici seu Atractylidis, Plinio lib. xxi.
cap. xv. & Theophrasto libro vi. cap. iij. autori-
bus, duæ sunt species. Vna mitior, & Cnico satiuo Atractyl-
similior. Hanc propriè Græci Atractylida, Latini lis propriè
verò fustum agrestem, aut colum rusticam, quod e- dicta.
ius caule rigido admodum & exili, veteres mu-
lieres pro colo, ut dictum est, utebantur, nomina-
bant. Sunt qui Cartamū syluestre appellant. Ger Cartam-
manicè itaque vocetur Vuilder feldsaffran. (Cal mus sylue-
licè Vne espèce de Chardon ayant la feuille stris.
iaulne, ou du saffran batard,) ut hac ratioe di-
k scernatur

PLANTARVM HISTORIAE

Carduus benedictus. scernatur à Cnico, què aliqui Cartamum, & Crocū hortensem nominant. Altera hirsutior, caules & folia Soncho non aspera similia habens, quæ Officinis omnibus & vulgò *Carduus benedictus* nuncupatur. Germanicè *Cardobenedict* *Bornuurtz*, oder *Gelegneter distel* vocatur.

FORMA.

Atractylis propria dicta. Spina est Cnico similis, in summo autem virgularum folia multò longiora habens, caulem magna ex parte nudum, asperumque, quo etiam mulieres pro fuso vtuntur. Capitula in cacumine aculeata, florem pallidum, radicem tenuem, inutilem. Ex qua sanè descriptione omnibus perspicuum esse putamus, spinam quam pictam exhibemus esse *Atractylida*, quòd Cnico sativo similis admodum sit, & in cacumine virgularum folia quàm Cnicus longior habeat, caulem denique magna ex parte nudum, autumnì potissimum tempore, quo folia sua sponte decidunt, & minimè lenem, sed asperum striatumque obtineat. Idem etiam rigidus & exilis est, vt fusi vsum præbere queat. Summitati quoque eius capitula insident spinosa, flos illi pallidus, radix tenuis: & in summa, nulla est nota quæ huic non respondeat. *Carduum* autem benedictum vulgò nominatum esse alteram *Atractylidis* speciem, ex Theophrasti & Plinij verbis ostendi potest: hirsutus enim est, caulibus Soncheis, humi ferè reptantibus: propter sui enim mollitiem

veluti

veluti sessilis caducusq; solo procumbit, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, quod molli lanugine operitur. Flos ei pallidus luteusve.

LOCVS.

Mitior Atractylis in aruis & montibus, hirsutior autem in hortis iam passim prouenit.

TEMPVS.

Prior Augusto mense apparet, eius tamen semine ante autumnum non maturescit. Posterior citius nascitur, eius tamen semen sero etiam ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu cum amara sint spina hæ, euidentissimum est calido & sicco temperamento esse præditas, id quod ex earundem etiã facultatibus colligi potest.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Atractylidis folia, coma & semen trita cum pipere vinoque pota, cõtra scorpionum ictus prosunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos, quamdiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita verò, dolore affici.

EX GALENO.

Atractylis aut Cnicus syluestris. Hæc planta ex spinarum est genere. Facultatem habet desiccandi, & modice digerendi.

APPENDIX.

Prima spina in sanãdis vlcerib. & fistulis diuturnis efficacissima est. Altera quã Carduũ beneo-

k ij dictum

PLANTARVM HISTORIAE

dictum vocant, obstructions internerum viscerum tollit, urinam mouet, calculum frangit, vlcera, potissimum pulmonis, sanat. Percussis à feris venenatis medetur. Negant etiã pestis experiri contagia, qui aut cum cibo, vel potu præsumpserit. Iã quoq; correptis magno fore remedio sibi vulgus persuasit. Ex quibus etiam omnibus fit perspicuum, easdem quas veteres Atractyli tribuerunt, utraque spinã habere facultates. Item herbam quam Carduum benedictum vocant, contra serpentum & scorpionum morsus valere omnibus in confessio est: quã sanè facultatẽ cum Atractyli etiam assignet Dioscorides, consequitur ab eadem diuersam non esse. Recentiores Carduum benedictum contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem, memoriã amisissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Itẽ ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur.

DE ANGELICA. CAP. XLIII.

Angelica satiuã Parisiis frequens, syluestris desideratur. NOMINA.

Angelica
non est
Smyrniõ,
neque Sil
phion.

NUnquid veteribus cognita fuerit hæc herba, & quo nomine appellata sit, nondũ scire licuit. Neque enim Smyrnion est, quod scilicet vmbellam Anethi & semen rotundum, aliãque multa quæ descriptio requirit, nõ habeat. Silphion etiam esse haud poterit, quod folia Apii habere minimè deprehendatur. Recentiores autẽ vno ore omnes Angelicam

gelicam, & sancti spiritus radicem, à suauissimo Sancti spi-
eius radicis odore, quem spirat aut ab immensa cõ- ritus ra-
tra venena facultate, appellant. Germanis Ange- dix cur
lick oder des Heiligen geyst vurtz, oder dicta.
Brusttuurtz (Gallicè Angelic) vocatur.

G E N E R A.

Duo eius herbe inueniuntur genera. Vna enim Hortēsis.
mitior est, cuius quidē radix valde odorata, à Ger Syluestris.
manis Zam Angelick nominatur. Altera sylue-
stris, eius radix suauī odore destituitur, & à Germa-
nis vuilde Angelick nominatur.

F O R M A.

Caulē profert duūm cubitorum, concavum: fo-
lia oblonga, per ambitum serrata, subnigra: flores
in purpura candidos, semen latum, foliatum: radie-
cem crassam & multam, foris nigricantem, intus
candidam.

L O C V S.

Mitior in hortis plantata prouenit, & in mōtosis
etiam nonnullis locis, perinde atque syluestris.

T E M P V S.

Iulio & Augusto mensibus floret.

T E M P E R A M E N T V M.

Calefacientem & desiccatoriam vim in tertio
ordine ei assignant herbarii recentiores.

V I R E S.

Aperit, extenuat, discutit, vt recentiores perhi-
bent Vnicē venenis aduersatur. Pestilentia popu-
latim seuientis arcet contagia. Corpora à lue pe-
k iij. stisera

PLANTARVM HISTORIAE

stifera vindicat, si tantum, vt affirmat, in ore teneatur. Per hyemē ciceris magnitudinē cum vino, per astatem ex stillatitio rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec sensurum eo die contagionem pollicentur, quo quis deuorarit: nā vrina & sudore veneniā abigit. Lentitiā pituita digerit, quapropter tussi, quā frigus attulerit, medetur. Crassa quae in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in vino & aqua cocta, vulnera interna glutinat. Concretum sanguinem resoluit, stomachum esu corroborat. Cor recreat. Pituitam ventriculi deiecit, fastidia ciboriū discutit, & elanguescentem inuitat appetentiam. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta & melle folia indantur, deinde cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lassitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita, fertur ad se feruorem elicere. Valere cōtra fascinationes adfirmant, si quis eam secum gestarit.

DE AER A. CAP. XLIIII.

Lolium tuum est Githago & Nigella vulgaris, aliis iurea Gallis dicta.

NOMINA.

Officina-
riū error.

Aie & ἡ θυάπος, ἡ ζιζάνιον Græcis: Lolium Latinis dicitur. Officinae nonnullae, non sine magno errore, pro Melanthio seu Nigella vtuntur, vt non temere etiam Pseudomelanthion dici queat. Germanis Ratten, oder Kornnegele (Gallicè yuraie.

yuraie, ou Gasse,) appellatur.

FORMA.

Folio constat angusto, Theophrasto lib. viij. de Plantarum historia, cap. vij. teste, pingui & piloso, flore subpurpurco, semine exili in siliqua hispida, vel vt Plinius ait, in cortice aculeato. Ex qua siquidē descriptione satis perspicuum sit omnibus, Pseudomelanthion hoc esse Lolium, folia nanque Pseudoporri habet, oblonga, hirsuta, florem purpureum, melanthio semen in pilosa, longa, angulata, ac per intervalla est Lolium. striata siliqua. Et vt paucis singula complectar, hordeo, cuius vt reliquarum frugum pestis & vitium est, tota effigie non dissimile est.

LOCVS.

Non solum in triticea & hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit. Frugum acerba pestis, ideoque à Vergilio infelix appellatum.

TEMPVS.

Iunio mense floret, & subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat & calfacit efficaciter, vt propinquum sit acribus magis quam Iris: sed nõ est perinde vt illa tenuiū partium, verum multum abest. Secundū hoc ponat ipsum quispiā in principio tertii ordinis excalefacientium, in fine verò secundi exiccantiū.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Lolium molitum nomas, putredines, & gangrenas cum raphanis & sale illitum compescit. Feras

PLANTARVM HISTORIAE

impetigines, & lepras cū sulphure vino & aceto sanat. Strumas quoq; cum simo columbino & lini semine in vino decoctum discutit. Quæ egrè maturantur rumpit. Decoctum ex aqua mulsa & illitū, ischiadicis prodest. cum polentu, aut myrrha, aut croco, aut thure suffitum, conceptiones adiuvat.

EX PLINIO.

Lolium molitum ex aceto coctum impositumq; sanat impetigines, celerius quo sepius mutatum est. Medetur & podagris, alijsq; doloribus cum oxymelite. Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextarius vno dilui mellis uncias duas instum est: ita temperatis sextariis tribus, decocta farina Lolij sextariis duobus vsque ad crassitudinem, calidumque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Magis etiam cæteris purgat vlcera vetera & gangrenas. Cū raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure vino. Et capitis dolores cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos cōcoquit cum simo colūbino, & lini semine decocta in vino.

APPENDIX.

Iam commemoratas facultates huic etiam herbe, quam Germani Ratten nominant, recentiores tribuunt. Mirificè enim hanc in sanandis impetiginibus, alijsque scabiei generibus commendant. Itē in vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compescendoque sanguine, eius esse vsum tradunt, ut
hinc

hinc etiam liqueat hanc ipsam à Lolio non esse diuersam.

EX SIMEONE SETHI.

Vim æqualem Iridi obtinet.

DE ASCLEPIADE. CAP. XLV.

Asclepias in syluis frequens.

NOMINA.

Aσκληπίας Græcis, Asclepias Latinis, herz Asclepias bariis Hirundinaria, Officinis Vincetoxicū, vnde di Germanis Schuualbēuurtz appellatur. Asclepias etā Hirū autem ab Aesculapia antiquo medicinæ autore no dinaria. minata est. Hirūdinaria verò à siliquis quas pro Vincetoz ducit, quæ dehiscentes plumosum semen ostendūt, xicum. atq; adeò hirundinis effigiem referunt. Vincetoxi cū, vel rectius vixh Γξικόυ haud dubiè dicta est, quòd illi insignis aduersus venena vis sit, vt paulò pòst fusius docebimus.

FORMA.

Ramulos profert longos, in quibus folia longa Hederae similia. Radices numerosas, tenues, odoratas. Flores grauitè olentes. Semen Securidaca seu Hedydari. Ex qua delineatione nemini non perspicuum sit Vincetoxicum appellatam herbam, esse Asclepiada. Fruticosa siquidem herba est, caulem obtinens rotundum, leuem, tenuem, ac ferè iuncèū, ramulis longis, folio hederaceo, sed oblongiori, in viridi nigricante, floribus exiguis, candidis, aut verius

PLANTARVM HISTORIAE

rius in albo pallescentibus, grauitè odoratis, ex quibus siliquæ oblongæ fiunt, quæ dehiscentes semine plumosum Securidacæ simile, hoc est, rufum & lætum ostendunt, radicibus multis, exiguis, tenuibus, & odoratis, adeo vt nulla sit prorsus nota quæ illi non respondeat aptissimè. His accedunt locus natalis & facultates, quæ singula cum Asclepiade illi communia sunt, quemadmodum ex iis quæ statim subiiciemus manifestissimum fiet.

LOCVS.

Prouenit in montibus asperis, altis ac arenosis. Copiosissimè autem nascitur in monte haud procul à Tubinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur.

TEMPVS.

Augusto mense floribus abundat, ac subinde semina in folliculis oblongis, formam hirundinis cum dehiscent referentibus profert.

TEMPERAMENTVM.

Asclepias, Paulo teste, calida, sicca, & tenuis substantia est. Quo sanè temperamento Hirundinaria etiam prædita existit: amara siquidem & parum glutinosa eius est radix, folia verò aliquæ præ se ferunt adstrictionem: vt iterum euidenter appareat, Hirundinariam esse Asclepiada.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radices cum vino potæ, torminibus, & venenatorum moribus subueniunt. Folia verò illita maleficiis in mammis & vtero vitiiis opitulantur.

Ex paulo.

EX PAVLO.

Torminibus in vino pota competit. Illita verò
venenatorum morfibus, & malignis mammarum
& vteri vitiis succurrit.

EX PLINIO.

Radices torminibus medentur, & cōtra serpen-
tium ictus non solum pota, sed etiā illita prosunt.

APPENDIX.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mē-
sum prouocationem vtuntur, & ad rabidi canis
morsum, venenisq; potenter resistere affirmant, vnde
etiam haud temere Victrix toxicī ab iisdē ap- Victrix
pellata est. Hydropicis etiam radicē in vino mace- toxicī.
ratam & subinde coctā, mirificē auxiliari tradūt.
Flores præterea foliaq; siccata, mox trita, vulneri-
bus vtiliter inspergi aiunt. Sordida etiam vlcera
purgare, & ad cicatricē perducere, genitaliūque
vitiis & rupturis egregiē mederi docent. Quæ in
vniuersum omnes facultates cū iis quas Asclepias
obtinet pulchrē quadrāt, vt eandē esse Hirundina-
riā vocatā herbā, nullus deinceps dubitare debeat.

DE APIO. CAP. XLVI.

NOMINA.

Aπιος, ἡ ἰχθὺς, ἡ χαμαίβολλανος Gracis:
Apios, Raphanus sylvestris Latinis dicitur.
Officinis icognita. Germanis Erdnusz, Erckelē,
Erdfeigē, & Erdmandel, (Gallicē Vne Raue
sauuage, ou vne rayfort sauuage) appellatur.

Apion

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Apios cur *Apion* verò dixerunt Græci quod radicis extremū
dicta. in pyri formam turbinatur. Eadem etiam ratione
Ischas. *ischas* & *chama balanos* ab iisdem nominata est,
Chama quod in ficus, vel glandis effigiem radicis extremū
balanos. turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etiam
glans aut *ficus*, seu *carica sylvestris* nominabitur.

F O R M A.

Ramulos duos aut tres iunceos, tenues, rubentēs
 que profert, qui supra terram parum se attollunt,
 Folia *rutæ* similia, longiora tamen, & virentia.
 Semen exiguum. Radicem *Asphodelo* similem, &
 ad pyri figuram accedentem, rotundiorē tamen,
 & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cor
 tice tectam. Hæc *Dioscorides*. Alij adiiciunt *Apiō*
 habere tenues capreolos, florem *Piso* non dissimi
 lem, sed longè minorem. Quæ singula satis decla
 rant herbam cuius picturā exhibemus, esse *Apion*:
 ramulos enim magna ex parte duos, vel ternos,
 imò ut *Theophrastus* ait, quaternos, & interdum
 plures emittit, iunceos, tenuēsque, & infima parte
 rubentes, qui supra terram parum se extollunt. Fo
 lia quoque *Rutæ* habet, at longiora & virentia.
 Semen etiam exiguum. Radicem denique *Aspho*
delo mari similem, & ad pyri effigiem accedentē:
 quod tamen non de tota radice, quæ longissima est
 & tenuis, intelligendum venit, sed de extremis co
 iusdem, hoc est, nucibus seu glandibus ab ea depen
 dentibus, pyri aut ficus formam habentibus, qua
libus

libus etiā Paeonia femina radix assimilatur. Suc-
cosa quoq; radix est, intusq; candida. Quibus omni-
bus accedunt flores Piso similes, & mirificè odora-
ti, minores tamen: necnon capreoli tenues. Conue-
niunt etiam vires, vt ex sequentibus patebit, ita vt
prorsus nulla sit nota quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Prouenit in frumentaceis agris, hordeaceis po-
tissimum, tritici & ææ, quos interdum sues, ductæ
cupiditate eius radicis, seu rectius nucum ex radi-
ce dependentium, prorsus euertunt. Atque hinc est
quòd panis porcinus à quibusdam nominatur.

Panis por-
cinus cur
dictus.

TEMPVS.

Floribus abundat odoratis admodū Iunio mēse.

TEMPERAMENTVM.

Apios temperatura calida est & sicca mediocri-
ter, id quod ex gustu facile deprehenditur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Pars radicis superior sumpta, vomitione bilem
pituitamque extrahit. Inferior per aluum. Tota
verò vtrinq; purgationes mouet. Succus eius ses-
quioboli pondere haustus, vtraque parte, hoc est,
suprà & infra purgat. Cū verò liquorem colligere
volueris, tundito radices, coniectisq; in cra-
terem aquā plenum misceto, tum pennā collectum
qui supernatabit liquorem siccato.

EX PLINIO.

Succus purgat vtraque parte sesquiobolo in a-
qua

PLANTARVM HISTORIAE
aqua mulsa. Sic & hydropicis datur acetabuli
mensura.

APPENDIX.

Experientia testatur nuces has nauseam atque
ad eò vomitionem ciere, si quis illis vescatur.

DE ASTERE ATTICO.

CAP. XLVII.

Aster Atticus tuus hic non cognitus.

NOMINA.

Inguinalis. **A**ster à ἄστρος, βυβωνίον Græcis: Aster Atti-
cus, Inguinalis Latinis dicitur. Officinis ig-
nita herba. Germanis Sternkraut, (Gallicè Du
Aster vnde petit Muguet) commodè appellari potest. Asteris
de dicta. autē nomē, nō à foliorū in caulibus, sed in floribus
potius figura & situ, accepit. Siquidem foliorū in
huius herbe flore numerus & forma, stellā prae se
ferunt, vel ut Plinius ait, capitula per ambitū diui-
sa foliis pusillis, stellae modo radiata sunt. Errant
itaq; qui singula folia in caulibus stellae formam
representare putant. Buboniū & Inguinalis, quod
Inguinalis quare
appellata. inguinum praesentaneum sit remedium, dicta est.

FORMA.

Cauliculus lignosus, purpureum & luteum in
summo florem habens, veluti Chamemeli capitu-
lum, vndique per orbem incisuris diuisum, foliolis
stellae similibus. Quae verò circa caulem sunt folia,
oblonga & densa hirsutave. Ex qua quidem deli-
neatione omnibus perspicuum sit, herbam cuius pi-
cturam

Eturam exhibemus, esse Astera atticum. Nam caulis eius lignosus est, foliis vestitus oblongis & densis, in cacumine flos illi purpureus & luteus, stellæ modo radiatus, qui subinde in pappos abit: radix fibris multis capillata.

LOCVS.

Nascitur in collibus, montibus altis, & syluis.

TEMPVS.

Augusto mense vt plurimum floret, durantq; in magnam autumnæ partem eius flores.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est potentia, vti rosa: refrigerat enim, nõ tamen vehementer, & digerit atq; exiccat, quòd scilicet illi amara insit qualitas.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Aestuanti stomacho illita cõfert. Succurrit etiã oculorum inflammationibus, bubonibus, & procidenti sedi. Tradunt partem in flore purpuream, si bibatur ex aqua, angina correptis, & puerorũ comitialibus opitulari. Recens inguinũ inflammationibus illita prodest. Sicca sinistra manus doletis decerpta, inguini adalligata doloribus liberat.

EX GALENO.

Non tantũ illitum, sed etiam suspensum bubonas sanare creditur. Habet verò quiddam etiã digerẽs, vt mista sit facultatis, verũ id nõ astrigit.

EX PLINIO.

Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinũ medicinam

PLANTARVM HISTORIAE

licinā sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cin-
ctus alligari. Prodest & coxendicis dolori adalli-
gata.

DE AGROSTI. CAP. XLVIII. NOMINA.

Aγρωσις Græcis, Gramen Latinis, Germanis
Grafz, (Gallicè Dent de Chien) appella-
tur. Gramen verò dictum est, quòd geniculatis in-
ternodiis mirificè serpat, à gradiendo, vel à gignen-
di fecunditate: siquidem crebrò ab iis novas spar-
git radices.

Gramen
vnde di-
ctum.

FORMA.

Geniculatis per terram serpit ramulis, & ab iis
dulces geniculatasq; radices spargit. Folia eius acu-
minata, dura, & vt parua arundinis lata, quæ in-
menta bouesque pascunt. Ex quibus verbis planum
fit omnibus, plantam hæc, cuius picturam damus,
esse veri graminis genus: geniculatis enim ramulis
per terram serpit, & ab iis dulces, geniculatas, &
exiguas admodum ac tenues radices spargit. E do-
drantalibus etiam ramulis circa vnumquemque ge-
niculum bina folia acuminata, dura ac lata emit-
tūt. Floribus denique ad gramen Parnasi accedere
videtur, cædtdi enim sunt, & quinis distincti foliis,
& his ipsis dissectis: quibûs decidentibus folliculi
rotundi lini instar, semine pleni exiguo, vt Parnasi
gramen, prodeunt. Adcò vt nemo sit qui nō videat
illi per omnia graminis respondere notas. Quare rea-
prehen-

prehensione digni sunt, qui Euphrasiam esse putāt. Error quo

LOCVS.

Passim nascitur in vmbrosis locis, & dumetis. runda se-

TEMPVS.

plasiario-
rum.

In fine ferè Aprilis floribus suis cādidis & ele-
gantibus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Radix graminis mediocriter frigida & sicca est,
mordacitatem quandam exignam, & partium te-
nuitatem obtinens. Herba verò ipsa in primo quie-
dem excessu refrigerat, in humiditate verò & sic-
citate moderata. Semen alibi quidem imbecillum
est, in Parnaso verò desiccatorium, & tenuiū par-
tium & subacerbum.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Graminis radix trita & illita vulnera conglu-
tinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur,
& vrinae difficultatibus. Calculosa etiam vesicae
excrementa comminuit.

EX GALENO.

Radix cruenta vlcera glutinat. Caterum mor-
dacitas & tenuitas quae radici inest, exigua est
quidem, sed interdum tamen frangere lapides as-
solet, si quis ipsam decoquens bibat. Semen autē al-
terius quidē imbecillum est, eius verò quod in Par-
naso nascitur, vrinam ciet, & fluxus vētris & sto-
machi resiccet.

EX PAVLO.

I.

Gratien.

PLANTARVM HISTORIAE

Gramen Parnasi maximè vtile est, siccatur, mo-
dicè refrigeratur, tenuium partium, & subacerbum,
eoque vulnera cruenta glutinat, & decoctum eius
vesicæ calculos confringit.

EX PLINIO.

Decoctum gramen vulnera conglutinat, quod
& ipsa herba tusa præstat: tueturq; & ab inflam-
mationibus placat. Decocto adiicitur vinum ac mel:
ab aliquibus & thuris, & piperis, & myrrhæ ter-
tie portiones. Rursusque coquitur in æreo vase ad
dentium dolores & epiphoras. Radix decocta in
vino, torminibus medetur, & urinae difficultatibus,
ulceribusq; vesicæ. Calculos frangit. Semen vehe-
mentius urinam impellit. Aluum vomitionesq; si-
stet. Privatim autem draconum morsibus auxilia-
tur. Sunt qui genicula nouem vel unius, vel è dua-
bus tribusve herbis, ad hunc articulorum numerum
involui lana succida nigra iubeant, ad remedia stru-
me panorumve. Ieiunio debere esse qui colligat. Ita
ire in domum absentis cui medeatur, superuenien-
tiq; ter dicere, Ieiunio ieiunum medicamentum
dare, atque ita alligare, triquoq; id facere. Quod è
graminum genere septem internodia habet, effica-
cissimè capiti contra dolores adalligatur. Quidam
propter vesicæ cruciatus decoctum ex vino graminis
ad dimidias è balneis bibi iubent.

Supersti-
tiosum.

DE ALOE. CAP. XLIX.

Aloe in domibus frequens, Perroquet vul-
gò

CAPVT XLIX. 82

gd dicitur, quod foliorum habitu & colore psittacum viridem referat.

NOMINA.

Aloë Græcis, Aloe Latinis appellatur. Offici-
na veterem appellationem retinuerunt. Ger-
mani destituti peculiari nomenclatura, pariter La-
tinis Aloen vocant. Sunt qui hanc à crassīs foliis,
& similitudine quam cum Semperuino habet, Sē-
peruuum marinum nominent.

Semper-
uini ma-
rinum.

FORMA.

Scyllæ folium habet Aloe, crassum, pingue, mo-
dicè latum, rotundum, repandūque. Folia vtrin-
gerunt ex obliquis aculeos raros, & breues. Caulē
profert Antherico similem, florem album, semen
Asphodelo simile. Graui est tota herba odore, & gu-
stu amarissima. Radice vna, pali in terram adacti-
specie. Nostra pictura non nisi radicem & folia ob-
oculos ponit, reliqua hoc tempore habere nō potui-
mus. Dabimus autem operam, modò Deo sic visum
fuerit, vt aliquando integræ plantæ picturam stu-
diosius exhibere liceat.

LOCVS.

Nascitur copiosissima in India, præpinguisq; vnde
succus quoque defertur. Prouenit etiam in Ara-
bia Asiaq; & in maritimis aliquot locis & insu-
lis, vt in Andro. Nunc in aliquot hortis germanie
nostræ plantatur,

TEMPVS.

l ij

Neque

PLANTARVM HISTORIAE

Neque florem neque semen in stirpe nobis videre cōtigit, quare de iis quo nimirum proueniāt tempore, nihil certi monstrare possumus.

TEMPERAMENTVM

Aloe calefacientium est primi ordinis intensi, aut secundi remissi, tertij autem exiccantium.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Duo sunt succi concreti genera. Vnum arenosum, quod sedimētum purissimæ Aloes videtur (hoc officinis Caballinum vocatur.) Alterū iecinoris modo coactum (Succotrinum barbari appellant.) Eligito puram quæ nihil doli sensit, sine calculis, splendens, subruffam, friabilem, iecinoris modo cōcretam, facile liquefcētem, eximia amaritudinis. Reaprobato autem nigram, & fractu contumacē. Est aloe vis adstringere, somnum conciliare, exiccare, corpora densare, aluum soluere, & stomachum purgare. Pondere cochlearium duorum aqua frigida, aut tepida pota, sanguinis excreationes sistit. Regiū morbum purgat trib. obolis ex aqua, aut drachma pondere in potu. Denorata cum resina, aut cū aqua, aut cocto melle excepta, aluum soluit. Triū drachmarum pondere perfectē purgat. Mixta aliis purgatoriis medicamentis, stomacho minus noxia eareddat, Siccata & insparfa, vulnera glutinat, et vlcera ad cicatricem perducit, compescitq;. Priuatim autē exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantiū preputia agglutinat. Condylomata, rimasq;

rimasq; sedis cum passo mixta sanat. Sanguinis eruptiones ex hamorrhoidibus factas compescit. Digitorum redunias ad cicatricem perducit. Linores et sugillata cum melle delet. Palpebrarum scabries, angulorumque prurigines lenit. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos fluentes cum vino compescit. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, ex melle & vino prodest. Torretur oculorum medicamentis in testa pura & cadente, rudiculaque subinde versatur donec equaliter torreatur. Lauatur vt quod est arenosissimum subsidat, tanquam inutile, & leue & pinguisissimum assumatur.

EX GALENO.

Hæc herba non admodum apud nos prouenit: & que in magna nascitur Syria aquosior est, & facultatis imbecillioris: attamen vsque adeo desiccare potest, vt vulnere conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Coelesyria & Arabia multo est melior. Optima verò Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloe, ad plurimas res propter siccitatem mordicationis expertem vtile. Est autem non simplicis nature, sed, vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est. Adstringit quidē mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & vētrem, vtpote ex numero medicamentorū quæ Græci ab excernendo stercore vocāt ἐκκομπωτικά. Verūm

PLANTARVM HISTORIAE

& ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam & gratum stomacho est medicamen, vt si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & vlcera quæ agrè ad cicatricem duci possunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iunat etiam eorum inflammationes aqua liquata, & vulnera ad eundem modum glutinat. Congruuit similiter vnti & ad inflammationes in ore, naribus & oculis. In summa repellere & discutere simul potest, cum hoc vt paulum exerceat, quantum videlicet vlceribus puris non sit molestum.

EX PLINIO.

Natura Aloes spissare, densare, & leuiter calfacere. Vsus in multis et principalis, alium soluere, cum penè sit sola medicamentorum quæ per se id præstant. Cõfirmat etiã stomachum adeo vt nõ infestet vlla vis contraria. Bibitur drachma. Ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ vel frigidæ, cochlearis mensura, bis tẽrve in die ex interuallis, vt res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sit matur cibus. Capillum fluẽtem continet cum vino austero, capite in sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti imposita, ex aceto & rosaceo. Dilutiorq; infusa, oculorum vitia omnia sanari ea conuenit. Privatim prurigines & scabiẽ genarum, itẽ insignita ac liuida, illita cum melle, maxime Põtico: tonsillas, ginginas, et omnia

oris vlcera. Sanguinis excreationes, si modica sint, drachmæ pōdere ex aqua, si minus, ex aceto pota. Vulnecrum quoq; sanguinem, & vndecunque fluētem sistit per se, vel ex aceto. Aliās etiā est vulnecrib. vtilissīma, ad cicatricē perducens. Eadē inspergitur exulceratis genitalibus, virorū condylomatīs, rimisq; sedis, aliās ex vino, aliās ex passō, aliās sicca per se, vt exigit mitigāda curatio, aut coercēda. Hemorrhoidū quoq; abundātiā leniter sistit. Dysentericæ infunditur. Et si difficilīus concoquantur cibi, bibitur à cēna modico interuallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur pilule cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, vt quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, pennāque subinde versatur, vt possit equaliter torreri.

DE BECHIO. CAP. L.

Tussilago vngula Caballina & passus asini vulgō dicitur.

NOMINA.

Bήχιον Græcis, Latinis Tussilago aut Farsa= Bechiō vn-
bria dicitur. Sic vocata quòd βήχας, hoc est, de dictū.
tusses muare credita sit. Herbariis & officinis hoc Vngula
die vngula caballina appellatur. Germanis Ros- Caballi-
zhub, oder Brandelattich, Gallicè Patte à che na.
ual) quòd scilicet equina vngula persimilis sit, &
ambustis medeatur.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Folia hederæ habet, sed maiora, sex aut septē à radice prodeūtia, supernè virētia, inferiore autem sui parte albida, plures angulos habētia. Caulē pal-
 Bechiō nō mum altū. Florem vere prodeuntē pallidum, quem nascitur vnā cum caule confestim abiicit. Inde nonnulli exi-
 sine flore. stimauerunt sine caule hanc herbā nasci. Radix il-
 li tenuis est, quæ minimè inutilis esse potest, quan-
 doquidem illius, vt ex sequentibus patebit, in rum-
 pendis thoracis abscessibus, & eiiciendo ex vtero
 emortuo fœtu vsus sit. Subesse itaq; errorem in Dio-
 Dioscori = scoride manifestissimum est, vbi radicem Tusila-
 dis locus ginis & χρῆσθον esse inquit, quē tamen nemo inter-
 emēdatus pretum, quòd sciā, animaduertit. Hoc etiā adiciē-
 dum duxi pro confirmanda Dioscoridis descrip-
 ne, & confutanda erronea quorundam sentētia, flo-
 res Tusilaginis esse fugacissimos: iis enim enatis
 breui vigor vitæque durat, longissimāq; mora tri-
 duum aut quatriiduum, post quod illico tēpus flac-
 cescentes in pappos euanescent, & caduci marcent,
 ita vt non nisi vere sese forte fortuna ferant obuiā,
 quo potissimum tēpore flos & caulis sine foliis vi-
 dentur. Quapropter qui herbam ipsam hoc tempo-
 re non conspexerunt, & tam subitam floris & cau-
 lis iacturam haud animaduenterunt, sine vtrisque
 nasci crediderunt. Nos tamen & florem & caulem
 sæpius oculis contemplati sumus, ideòque vt vtrius-
 que pictura accederet diligenter curauimus.

LOCVS.

Nascitur prope fontes, & in aquis locis.

TEMPVS.

Flores vere, & in Aprili colliguntur: ab hoc enim tempore, vt paulò antè diximus, nusquam apparent. Folia & radix tota æstate durant.

TEMPERAMENTVM.

Folia Tusilaginis virentia aqueæ substantiæ admistionē habet, vt hac ratione frigida et humida dici possint. Sicca verò acriora sunt, ideoq; calida. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Tusilaginis folia trita cum melle illita, ignibus sacris, & inflammationibus cunctis medentur. Eadem sicca incensa, eos qui sicca tussi & orthopnoea infestantur, quum fumum per infundibulum hiati suscipiunt ore, sanant. Abscessus thoracis rumpunt. Eadem radix suffita potest, fœtumq; emortuum in aqua mulsa cocta & pota eicit.

EX GALENO.

Bechium ideo nuncupatum est, quòd βήχας, id est, tusses & orthopnoeas inuare creditū sit, si quis videlicet folia arida aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxæve omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sane folia viridia partes cruda inflammatione obfusas illitu extrinsecus adiunāt, propter aqueæ humiditatis admistionē, qua omnia virentia tenera, alia
plus,

PLANTARVM HISTORIAE

plus, alia minus participant. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quam vt inflammatione laborantibus partibus conueniant.

EX PLINIO.

Tussilaginis arida cū radice fumus per arūdinē haustus aut deuoratus, veterem sanare dicitur tussim: sed & in singulos haustus passum gustādū est.

DE BUGLOSSO. CAP. LI.

Buglossum Borrago.

NOMINA.

Bούλλωσος Græcis: Buglossum, Bubula lingua, Bovis lingua Latinis, quod scilicet eius folia bubulae linguae similia sint: officinis & herbariis Borrago, Germanis Burretsch (Gallicè bourrache, ou Bourroche) dicitur. Alia verò herba est quæ hodie Buglossa vulgò nominatur, (Buglose) vt suo loco indicabimus.

Borrage.

FORMA.

Buglossum Verbasco simile est, folium habēs in terram depressum, asperū, nigrius, bubula lingua nō dissimile. Florem cæruleum, speciosum. Quæ nimirum descriptio ita hodie vocata Borragini herba quadrat, vt nemo non, nisi talpa cæcior sit, veterum esse Buglossum videat. Qui tamen eius rei plura argumenta desiderat, ea quæ lib. primo, cap. xxxiiij. nostrorum Paradoxorum produximus, legat, & nihil puto deinceps dubitabit.

LOCVS.

Nascitur in plantis & sabulosis locis. Passim etiam hodie in hortis feritur, ob id olitoribus optime cognitum.

TEMPVS.

Carpitur Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Buglossum calidi humidique temperamenti est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folium Buglossi in vinum deiectum animi letitiam efficere creditur. Aiunt quæ tres caules emitat, si cum radicibus & semine tota teratur, & in potu detur, contra tertianos rigores prodesse: ad quartanas verò quæ quatuor. Horum autem decoctio in vino fiat. Herba abscessibus etiam vtilem esse ferunt.

EX GALENO.

Buglossum vinis injectum letitiæ et hilaritatis causa esse creditum est. Sed & iis qui ob faucium asperitatem tussunt, in melicrato coctum conuenit.

EX PLINIO.

Buglossum præcipuum quod in vinum deiecta animi voluptates auget, & vocatur Euphrosynum. Buglossum inarescente, si quis medullam à caule eximat, dicatque ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt à febre liberari.

EX SIMEONE SETHI.

Buglossum urinam cit, & sitim sedat. Caules eius
cocti

PLANTARVM HISTORIAE

cocti & crudi comesti iccoris affectibus profunt. A viatoribus ex eo conficitur xalapion, & est vtile.

DE BUPHTHALMO. CAP. LII.

NOMINA.

Bούφαλμον Græcè, Buphthalmum Latine. *Cotula* nō *Hodie oculus bonis, aut vacca, & Cotula foetida.* non foetida herbariis vocatur. Germanis Rind-Buphthal saug oder Kueaug (Gallicè Oeil de Boeuf, ou mum cur pisse en list) Buphthalmū autem non alia ratio dictum. ne dixerūt veteres, quā quod eius flores oculi imitentur formam, & boum potissimum oculis similes Anethum sint. Germanicè etiam Kudill hoc est, vaccinum vaccinū. anethum dicitur, quod scilicet verum Anethum cuius folia referre videantur.

FORMA.

Buphthalmum caulem tenerū emittit, folia foeniculo similia, flores luteos Anthemide maiores, oculorum figura, vnde & nomen traxit. Ha siquidem notæ adamussim conueniunt herbae quam vulgus herbariorum Cotulam non foetidam vocant: caules siquidem eius teneri, folia foeniculo similia. Nec te moueat quod à Dioscoride Buphthalmo lutei floribus tribuuntur. Cotula autem non foetida albi sint: ad discū enim mediūmve Diosc. respexit, quod luteū est, non ad ambitū, in quo folia radiata candida, vt in Chamamelo, existunt. Quod dicimus, cōfirmant quæ Galenus lib. vi. de simpl. med. facul. in hunc modum scribit: Buphthalmi, inquiens, flo-

res colore Anthemidis floribus similimi sunt, sed multò maiores. Serapion quoque florem eius magis luteum flore Chamameli esse ait. Si itaque Anthemidis floribus similimi sunt, nec nisi sola magnitudine differunt, & Anthemidis propriè dictæ flores in medio lutei, & per ambitum candidi existunt, necesse est, ut Buphthalmi etiam flores tales sint, ut scilicet candida illorum folia, luteum medium cingant. Quid multa? Buphthalmi flores ab Anthemidis floribus non nisi sola magnitudine differunt: grandiores enim Buphthalmi flores quàm Anthemidis conspiciuntur, reliqua facie quam similimi. Quòd igitur ad colorē attinet, in nullo variat. Iā dictis accedit, quòd Serapionis interpretis sub Cotula nomine Buphthalmum delineat. Denique congenerem esse planè herbam Buphthalmum cū Anthemide Dioscoridis tractandi ordo abundè docet, quum constet illum tres herbas sibi admodum similes, Chamamelum nempe, Parthenium, & Buphthalmum, vno in loco describere. Vnde iterum planum fit Buphthalmum esse Cotulam non fœtidam, quòd scilicet Chamamelo prorsus similis sit, excepto duntaxat flore, qui in illa maior est.

LOCVS.

In campis & circa oppida nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iulio Augustoq; mensibus, & durat etiam vsque ad Autumnii medium.

TEM.

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM

Flores Bupthalmi acriores sunt Chamamelis floribus, ob id illis sunt calidiores.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Bupthalmi flores cum cerato triti, cedemata & durities discutiunt. Ferunt post exitum à balneo potam, regionem morbo correptis coloris bonitatem tractu temporis reddere. EX GALENO.

Bupthalmi flores Anthemidis floribus vehementius discutiunt, adeo ut & durities ex cerato mixti sanent. EX PLINIO.

Bupthalmos cum cera scirromata discutit.

DE BELLIDE. CAP. LIII.

Bellides nobis Margarite & Pasquetes quod ad pascha ferè flores hi incipiant. Bellis maior consolida media vulgò.

NOMINA.

Bellis neque à Dioscoride, neque à Galeno, nec aliis etiam Graecis, quod sciam, descripta est, idèoque Græco nomine destituitur. Latinam itaque duntaxat appellationem habet, & Bellis sine Bellius, autòre Plinio, nominatur.

GENERA.

Duorum est generum, maioris & minoris discri-
Consolida mine insignis. Minor bellis est ea quam officina Cō
minor. solidam minorem appellant. Hec iterum duum est
generum. Quedam enim hortēsis & domestica est
Bellis, hanc Germani Monatblumle, oder rote
blumle

blumle (Gallicè Des marguerites, ou des Pas-
quettes) nomināt. Altera syluestris, quam vulgus
herbariorum Primulā veris, quòd scilicet vere in- Primula
choante mox erumpat, Germani autem Maslie- veris.
ble, & Kleinzeitlose (Gallicè Petite consyre) Consolida
nuncupant. Maiorem officina nonnullæ Cōsolidam media.
mediam quòd credatur vulnera glutinare, Germa-
ni Gensblum (Gallicè De la consyre) vocant.
Nos aliam Consolidā mediam infrā describemus.

FORMA.

Minor hortensis, syluestri, præter florem qui ru- Minor.
bicundus est, per omnia similis est, Constant verò
flores ii interdum simplici, interdum multiplici fo-
liorum contextu, vt pictura affabrè ostendit. Sylue-
stris, Plinio lib. xxvi. cap. v. teste, flore constat al- Plinii lo-
bo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, inter- cus expli-
dum etiam quinquagenis quinis barbulis circinato, catur.
folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblon-
go, leuissimè serrato. Neque obstat quòd Plinius
lib. xxi. cap. viii. Bellio luteum esse florem tradat,
quia non ad ambitum, sed ad discum mediūve
floris, quod sanè luteum est, respexit. Hinc est quòd
à quibusdam Plinii locus ita legatur. Luteum & Maior.
Bellio, vt subaudiatur semen. Maior Bellis proce-
rior assurgit, folio non admodum diuerso, altioribus
dūt axat crenaturis laciniato, cauliculis tenuibus,
surculosis, cubitum altis, flore priori non dissimili,
maiore, pauciorib. tātūm barbulis, & in vniuersum
candidis,

PLANTARVM HISTORIAE

candidis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus. LOCVS.

Passim in pratis vterque nascitur Bellius. Iam & in hortis feritur, sed flore multiplici, barbularum stipatu densiore. TEMPVS.

Minor primo statim vere apparet, & tota ferè aestate durat. Maior autem in Maio mense floret, quod etiam tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Bellius vterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorum ad discutiendas strumas usum esse scribit. Acetosus tamen sapor quem in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in ea portione esse monstrat. Quicquid tamen sit, exiccare Bellios evidentissimum est.

VIRE S.

Quotquot hodie viuunt vulnerariam herbam Bellium esse nouerunt, valétque potissimum in capitis fractura admota. Succus etiam herba vtiliter vulneratis bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorum resolutionem, quam Græci paraly sin vocant: itemque ad podagras, ischiada, & aduersus strumas.

DE BRATHY. CAP. LIIII.

NOMINA.

Bραθύς & βράθυρον Græcis, Sabina vel Sauina Romanis, Seuenbaum Germanis (Galliscè Sauinier) dicitur. Officina nomen vetus retinuerunt.

GENERA.

Duum

Duū est generum Sabina. Vnum quod hic
pictum exhibemus: alterum Tamaricis folia ha-
bens.

FORMA.

Primi generis Sabina foliis Cupresso similis est.
spinofior tamen, graui odore, acris & feruens. Ar-
bor breuis & in latitudinem magis se fundens &
explicās. Topiarius itaque frutex est, immortalis co-
ma virens, patulo fastigio, iuniperi similitudine.

LOCVS.

Pasim in hortis nascitur.

TEMPVS.

Quouis tempore colligi potest, potissimum autem
autumno, dum semine pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Tertii est ordinis excalfacientium & desiccantium,
& ex numero eorum quæ vel maximè te-
nuum sunt partium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Prioris foliis nonnulli pro suffitu vtuntur. Vtrius-
que folia nomas sistunt. Inflammationes illita miti-
gant. Cum melle illita nigritias repurgant, itemq;
sordes & carbunculos abstergunt. Cum vino pota
sanguinem per vrinam ducunt, fectumq; excutiūt.
Idem apposita & suffita præstant. Miscentur vna
guentis excalefacientibus, priuatim Gleucino.

EX GALENO.

Sabina ex numero est fortiter exiccantium, idq;
secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert
m similiter

PLANTARVM HISTORIAE

similiter Cupresso, nisi quòd ea acrior est, & vt sic dicam, magis aromatica, seu odoratior. Igitur huius quam modò dixi qualitatis est particeps, nempe acrimoniae consistentis in calido temperamento, praeterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quàm in Cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam vtriusque illi tantum inest, vt etiam tendat, & inflammationem asserat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maxime iis quae maligniores fuerint, & diuturniores. Nam haec itra noxam medicamento vehementiam perferunt. Quin & quae atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit. Porro ob essentiae partiumve tenuitatem menses quoque prouocat, vt si quid aliud. Et sanguinem per urinas mouet. Foetum etiam viuentem interficit, & mortuum eiicit. Vnguentis inditur, & potissimum Gluscino, & in multas antidotos iniicitur. Quidam verò etiam Cinnamomi vice duplū eius adiiciunt: est enim extenuandi & digerendi facultatis, si pota fuerit.

EX PLINIO.

Sabina à multis in suffitus prothure assumitur. In medicamento vero duplicato pòdere eosdem effectus habere quos cinnamomum traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita ulcera purgat. Partes mortuos apposita extrahit & suffitu.

fitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle
& vino pota, regio morbo medetur. Gallinacci ge-
neris pituitas fume eius herba sanari tradunt.

DE BATO.

CAP. LV.

Rubus ronce.

NOMINA.

Bάτος Græcis, Rubus aut sentes Latinis voca-
tur. Aliquibus Mora vaticana, corrupta voce,
eius fructus dicuntur, cum dicendum esset mora
vacinia. Nam in hodiernum vsque diem Græci
mora illa à Βάτῃ, Βάτινῃ & Βατινῇ cognomi-
nant. testis Galenus libro sexto, de compos. medic.
secundum locos: capite primo. Vergilius in Buc-
olicis vnius literæ inmutatione vacinia vocauit,
inquiens: Alba ligustra cadunt, vacinia nigra le-
guntur. Eclog. ii. A nostræ ætatis medicis barbaris
& Herbariis mora bacci appellantur, cum illis di-
cendum esset mora bati. Theophrasto libro tertio
de plantarum historia, capite xviij. Chamæba-
ros, quasi dicas humilis rubus, appellatur. Germa-
nicè Bromber (Gallicè Ronce.)

FORMA.

Rubum omnes nouerunt, vbique enim vestibus
prætereuntium sese affigit, remorâmq; viatori-
bus iniicit. Caulem habet minacibus ac pungenti-
bus spinis & aculeis vestitum. Folia incisuris di-
uisa, nigricantia ab vno latere, altero candentia.
Florem, initio rubescentem, dein cædidum profert,
m. ij quo.

PLANTARVM HISTORIAE

quo abeunte fructus exit, qui cùm maturuerit moro persimilis fit nigrescens, auiibus gratus, nec hominibus insuauis cibus. Inest illi succus sanguineus, & veluti cruore atro manus inficiens.

LOCVS.

Passim in dumis prouenit Rubus, qui protinus quàm paulò accreuit, retro vergit in terram, atq; ita radicatur, iterùmque ex se nascitur.

TEMPVS.

Diuersis temporibus folia, flores & fructus Rubi colliguntur. Folia nanque in vere: flores æstatis initio, Iunio nimirum & Iulio mensibus: fructus autem ubi iam maturuerit per menses & extrema æstate decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Rubi folia, germina, flores, fructus et radix qualitate adstringente participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se differant, quòd folia potissimùm & recēs nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum vero adstringant. Eadem ratione & germina. Est itaque eorum temperies ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. Fructus autem, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi temperati calidi, qui dulcis est. Proinde eam ob rem, & propter modicam adstrictionem, esui non insuauis est. At immaturus à frigida terrea substantia vincitur, ac proinde acerbus est, & exiccatorius. Vterque autem siccatus reconditur, validius quàm

quàm recens desiccans.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Rubus adstringit & desiccat. Capillos tingit. Ramorum eius decoctum potum aluum sistit, & foeminarum profluvia cohibet. Præteris morsui utilis. Gingiuas firmat. Oris vlceribus folia comman-
ducata medentur. Cohibent herpetas, & in capite achoras, oculosq; procidentes, condylomata & hæ-
morrhoidas, illita folia sanant. Cardiacis & stoma-
chi doloribus trita & imposita subueniunt. Succus
ex caulibus, foliisq; eius expressus, & in sole co-
ctus efficacius omnibus iã dictis medetur. Fructus
eius optimè maturi succus, ad oris medicamēta cō-
uenit. Sistit & aluum in media maturitate come-
stus. Flos quoque eius in vino potus aluum sistit.

EX GALENO.

Folia & germina Rubi si mandantur, aphthas
& alia oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera
glutinare valent. Flos eius eandem fructui imma-
turo facultatem possidet: vtraq; ad dysenterias, &
vëtris profluvia, eiusq; robur deperditū, & sangui-
nis expuitiones, idonea remedia. Radix præter ad-
strictionē nō paucam in se habet substantiam te-
nuem, propter quam etiam in renibus lapides come-
minuit. EX PLINIO.

Nec Rubos ad maleficia tantum genuit natura,
ideoq; ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vin-
habent siccandi, adstringendique, gingiuas, tonsil-
lis,

PLANTARVM HISTORIAE

lis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis, hæmorrhoidi & præsteri, flos & mora. Scorpionum vulnera sine collectionis periculo iungunt. Urinam ciunt. Caules eorum tunduntur teneri, exprimiturque succus, mox sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque sanguine excreantes, anginas, vulvas, sedes, cæliacos, potus aut illitus. Oris quidem vitis etiam folia commanducata prosunt, & ulceribus manantibus, aut quibuscunque in capite illinuntur. Cardiacis vel sic per se imponuntur à mamma sinistra. Item stomachi doloribus, oculisque procidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosacco cerato. Calculorum ex vino decoctum præsentaneum est remedium. Itè per se in cibo sumpti cymæ modo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firmant. Aluum sistunt & profluvia sanguinis. Dysentericis prosunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorum viam reprimat. Folia quoque arefacta & contusa, iumentorum ulceribus utilia traduntur. Mora quæ in iis nascuntur, vel efficaciorē stomatice præbuere quàm sativa morus. Eademque compositione, vel cum hypocisthis de tantum & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quæ styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foveantur. tantaque

vis

vis est vt spongia lapidescant.

DE BALLOTE. CAP. LVI.

Ballote marrubium foetidum.

NOMINA.

Bαλλωτή, ἢ μέλαια πρᾶσιον Græcis, ballote Latinis, Officinis Marrubium nigrum, aut Marrubiastrum, aut Prasium foetidum dicitur. Germanis schuuartz Andorn, oder Andorn Vueible (Gallicè Du marrubin noir.) Marrubium à similitudine foliorum, nigrum à caulis colore, qui niger est Marrubij respectu, dicta Ballote est.

FORMA.

Caules ex se mittit Ballote quadrangulos, nigrescentes, subhirsutas, ab vna radice complures. Folia Marrubio similia, maiora tamen, subrotunda, pilosa, per intervalla in caule disposita, Apiastro similia, graucolentia, vnde aliqui Apiastrum eā vocarūt. Flores in rotæ speciem caules circumiacent. Theophrastus etiam lib. vi. cap. ii. de historia plantarū, Ballotē folio herbido, serrationi, incisurisq; profundioribus & cōspēctioribus discreto cōstare scribit. Vnde liquidò constat hāc quā pictā damus esse verā Balloten, quòd illa sit herba fruticosa, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis scilicet, folio Marrubij sed maiore, piloso, cingente per intercapedines caulē, odore graui, orbiculato florū purpureorum ambitu, qui scapos verticillatim obducunt.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur propter vias, domos, sepes, camiteria.
& aliis vmbrosis in locis.

TEMPVS.

Floret in fine Iunij mensis, & initio Iulij, quo sa-
ne tempore carpi commodè potest.

TEMPERAMENTVM.

Amara & acris est, ideoque calefacit in secun-
do ordine iam cōpleto, aut tertio remisso: desiccatur
autem in tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius folia cum sale illita, canis morsibus me-
dentur. Feruenti cinere flaccescentia, condylomata
reprimunt, sordidaque vlcera cum melle purgant.

EX PAVLO.

Ballote, quod alij Marrubium nigrum dicunt, a-
cris est & abstersoria facultatis. Illitum cum sale
canis morsibus medetur.

EX PLINIO.

Vix eius, efficax aduersus canis morsus, ex sale
foliis tritis imposita. Item ad condylomata, coctis
cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vlcera cū
melle.

DE BATRACHIO.

CAP. LVII.

Ranunculi omnia hæc genera Gallis sunt
frequētissima in vineis, syluis, paludosis
locis.

NOMINA.

Βατραχία

Bατραχίον Græcis, Batrachium & Ranūcu-
 lus Latinis dicitur. Apuleius Sceleratam nos Scelerata
 minatur. Vulgus medicorum perperam Pedem corui
 vocat. Sunt etiam qui Flammulam, ab vrendi fa- Flāmula.
 cultate, appellant. Germani Hanenfusz. Batra-
 chion autem siue Ranunculus dicta est haud du- Ranuncu-
 diē, quod limitibus humidis opacisq; marginibus lus unde
 ranarum more letetur: aut quod aquis ubi rana dictus.
 degunt potissimum, gaudeat, aut quia inter eius fru-
 tices rana frequēter inueniantur. Agreste vero A- Agreste
 pium seu Apiastrum, quod foliis apium amuletur. apium.
 Scelerata, eo quod comesta noxia sit: vel, quod ma Scelerata
 gis arridet, quia validi sceleratiq; mendicantes si-
 bi crura & lacertos hac ipsa dilaniāt, quod possint
 impudentius stipem extorquere, atque hac impos-
 itura pecuniolam aucupari.

G E N E R A.

Plura sunt Ranunculi genera, Dioscorides verò
 & Galenus quatuor potissimum esse tradunt. Pri-
 mum duplex est: huius enim generis Ranunculus
 quidam syluestris est: & hic iterum duabus discris- Syluestris
 minatur differentiis. Vnus enim luteos flores pro- ranuncu-
 fert, & Germanis Vveisser Hanenfusz dici- lus.
 tur. Alter vero purpureos, qui mihi, quod sciam,
 nondum visus est. Quidam autem hortensis, quini- Hortensis
 si cultura accedat prouenire haud solet. Hic itidē
 duplex est. Vnus qui simplici florum textura con-
 stat, Germanicè Vngefulker garten hanēfusz.
 Alter

PLANTARVM HISTORIAE

Alter multiplicem foliorū in floribus compagem
 obtinet, ideoq; Germanis gefulter garten han-
 fusz dictus est. Alterum quod a foliorū similitu-
 dine quam cum Apū foliis obtinet, a nonnullis scē
 Apū syl- λωον & γελον, id est, Apū sylvestre, vel Apū rīsus
 uestre, cognominatur, Germani Vuasserhanenfusz vo-
 cant. Tertiū genus exigū est, ob id etiā Germanis
 Kleiner Hanenfusz nominatur. Quartum etiā
 minimū, germanicē Vualdhente appositissima
 voce appellatur, est enim iter reliquas herbas quae
 germanicē Pedes galli vocantur, & minima, & nō
 nisi in syluis vt plurimum prouenit, adeoq; compo-
 sita voce rectissimē Vualdhente nominatur, quasi
 dicas minima inter pedes Galli, & in syluis pro-
 gnata. Estq; duūm generum, vnum quidem lacteo
 flore, alterum luteo, vt pictura docet. Primum au-
 tem quod lacteo flore ornatur, est id quod a Dio-
 scoride pigitur, germanicē vocatur Vueisz Vual-
 dhenle. Alterum, das gelb Vualdhente.

FORMA.

Primum Ranunculi genus folia Coriandro simi-
 lia habet, latiora, vel vt Plinius ait, ad malua la-
 titudinem accedentia, subalbida & pingua. Florē
 luteum, interdum purpureum. Caulem non cras-
 sum, cubitali altitudine. Radicē paruum, albam,
 amarā, adnascētiā Ellobori modo habentem.
 Caterum effecit cultura, vt qui in limitibus sim-
 plici foliorum cōpage flores oriantur, gemino quo-
 dam

dam densoq; ac multiplici foliorum stipatu nunc in
 hortis collucescat, quemadmodum pictura affabre
 monstrat. Alterum genus lanuginosius, vel ut Plin. Alterum.
 nius inquit foliosius, altiore caule, pluribus foliorum
 incisuris, copiosissimum in Sardinia, acerrimumq;
 quod iam Apium sylvestre nominant. Tertium ge. Tertium.
 nus valde paruum, graui odore, flore qui auri spe-
 ciem refert. Quartum huic simile, flore autem la- Quartu.
 eteo aut luteo, radice longiore, & modo quodam
 nodosa, gustu acri.

LOCVS.

Primum genus Ranunculi sylvestris lutei sine
 cultura circa fluentia, & in limitibus pratisq; hu-
 midis & vliginosis prouenit. Hortensis vero adhi-
 bita cultura in hortis nascitur. Alterum genus se-
 cus aquas & fontes gignitur, & apud Sardos co-
 piosissimum. Ea si comedatur, vescentibus nervos con-
 trahit, rictuq; ora diducit, ut qui mortem appetunt,
 velut ridentium facie intereant. Ob id Sardonius Sardoni-
 risus in proverbium cessit. Etsi autem nostra non us risus.
 perinde efficax sit atque ea quae in Sardinia na-
 scitur, tamen hanc vehementissima etiam eroden-
 di facultate esse praeditam, gustus ostendit. Tertiū
 genus in pratis & campestribus passim prouenit.
 Quartum, ut Germanicum nomen palam demon-
 strat, syluis familiare est. Luteum vero in valle su-
 pra & infra Bebenhusum monasterium iuxta a-
 quas copiosissime nascitur.

PLANTARVM HISTORIAE TEMPVS.

Primum genus hortēsis Ranunculi lutei, statim inter initia Aprilis floret: Maio autem mēse disperit, & nusquam subinde conspicitur. Secundum & tertium genus itidem tota estate inueniri possunt. Quartum in vere, Aprili nimirum mense, tantum apparet, quo sanè tempore hoc ipso sylua, luci & nemora scatent, floribusq; eius candicant.

TEMPERAMENTVM.

Omnium tum radix, tum vniuersa herba vehementer calida & sicca est. Primi tamē generis syluestris lutei, non perinde ac reliquorum acris admodum est facultas.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia & caules teneri si illinantur, exulcerandi, & crustas cum dolore creandi vim habent. Proinde scabros vngues & scabiem tollunt, & stigmata delēt, myrmecias, acrochordonas & alopecias modico tempore illitu sanant. Tepido eorundem decocto perniones fomentur. Radix sicca tritataque, sternutamenta naribus admoda ciet. Dentium dolores adhibita lenit, eos tamen conterit.

EX GALENO.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias. Omnes verò vehementer acrem facultatē possident, adeò vt cum dolore exulcerent. Hac itaque ratione si moderatè vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues leprosos diucllunt, ac stigmata discutiunt.

cutiunt, & acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias inuant pauco tēpore admota. Nam si diutius inhaereant, non excoriatur solum cutis, sed & in crustam vritur. Atque igitur hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si illinātur viridia. Porro radix arefacta sternutatorium est medicamentum similiter aliis quæ valēter desiccant. Sed & dentiū dolores iuuat, vt & eos, vehementer scilicet exiccando, frangat.

EX PLINIO.

Omnibus vis caustica, si cruda folia imponantur, pustulasq; vt ignis faciunt. Ideo ad lepras & pforas vtuntur, & ad tollenda stigmata, causticisque omnibus miscent. Alopeciis imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore cōmāducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentū facit. Nostri herbarij strumeam vocant, quoniam medetur strumis, & panis, parte in fumo suspensa.

DE BRYO. CAP. LVIII.

NOMINA.

Bryon Græcis recentioribus, Lupus salictarius Lupulus. Latinis, Lupulus officinis, vulgò Humulus vocatur. Aliquot Italiae rura, ad Græcam appellationem alludentes, Brusculam, quasi Bryon scan Bryon. sile nominant. Germani Hopffen, (Gallicè Du houblon.) Græci autem Bryon à Bryonia similitudine haud dubiè nominarunt. Lupus verò salictarius, quia subit scanditque salices, & arbuscula
omnia

PLANTARVM HISTORIAE

omnia circūuoluēdo se circūplectitur, appellat^o est.

Lupus reptitius. Hinc quoq; Lupus reptitius nonnullis nominatur.

FORMA.

Caules habet aculeatos, longissimosq;. Folia vitis alba, hispida, & nigriora. Flores cinereos seu candicantes, ac multis. exilibus folliculis squamatis compactiles. Radicem subnigram, longam.

LOCVS.

Passim & copiose in Germania nostra iuxta uetres & salicta prouenit, ex eaque cernisiam potū, quo uini vice utuntur, Germani consciunt. Ideoq; in hunc usum in hortis plantatur.

TEMPVS.

Augusto mense floret & Septembri.

TEMPERAMENTVM.

Sunt qui refrigerare Lupulum dicant, alij temperamento medlum esse putant. At utrique, mea quidem sententia, falluntur: flores enim quorū potissimum vsus est, calidos & siccos esse, odoris & grauitas, & immodica amaritudo testantur. Antiquus etiam herbarius calidum & siccum in secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Bilem utranque detrahit. Abscessus discutit. Puitam in aqua inter cutem per aluum ducit. Succus eius crudus haustus ventrem magis subducit, minus verò obstructions aufert. Coctus verò magis ab

gis ab obstructionibus liberat, minusq; ventrē subducit. Auribus instillatus eas à putredine vindicat, & à fœtore liberat. Radices obstructiones tollunt, lienis potissimum & iecoris.

DE VERONICA. CAP. LIX.

Veronica utraque hic vsu rarissima.

NOMINA.

Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit nec ne hæc herba, nondum constat, Vulgus autem herbariorum hodie Veronicam, Germani Veronica. Erenbreisz oder Grundheyl, ob mirificam sanandi vlcera & vulnera facultatem, nominant.

GENERA.

Duū est generum Veronica: vna mas, altera verò fœmina. Discrimina earū ex descriptionibus patebunt.

FORMA.

Veronica mas herba est per terram serpens, cauliculo dodrantali & nonnunquam etiam longiore; rubescente & lanuginoso, foliis oblongis, nigris, hirsutis & serratis, floribus in cacumine purpureis, semen in vasculis loculi speciem habentibus, radice tenui. Fœmina itidem per terram serpit caule lanuginoso, foliis rotundis instar herbe quæ Cæzummorbia & Nummularia hodie vocatur, minime in ambitu incisus, paulò quàm maris viridioribus, floribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis.

PLANTARVM HISTORIAE

rotundis, radice, vt mas, tenui.

LOCVS.

Nascitur incultis & syluestribus locis.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudinem quandam & vehementem ad-
strictionem in gustu præ se fert, vt hinc calidam
& siccam esse coniicere liceat. VIRES.

Mirificè ad cruenta ac vetera vulnera & vl-
cera sananda confert. Scabiei denique & omnibus
cutis vitiis medetur. Ferunt quondam huius herbe
adiumento Regem Gallie elephantia morbo cor-
reptum, à quodam venatore sanatum esse, cum is
ceruum à lupo vulneratum eius herbe comestio-
ne, & assidua in illa volutatione, curasse seipsum
animaduertisset. Tumores etiam, in quacunque cor-
poris parte fuerint, potissimum autem in cervice,
discutere potest. Recentiores huius vsum vnicè cõ-
mendant in febribus pestilentialibus, iecoris & lie-
nis obstructionibus, potissimum vero pulmonis ex-
ulcerationibus.

DE BVLBO SYLVESTRI.

CAP. LX.

Bulbus sylvestris hinc videtur esse quod
leucoium Theophrasto pingitur & nobis
iam in hortis frequentius ad natalē Chri-
stianum floret.

NOMINA.

ὄλβος ἄγριος Græcis, *Bulbus sylvestris Cēpa* syl-
 B Latinis. Sunt quibus *Cēpa sylvestris* ap- uestris.
 pellatur. Germanicè *Feld, Vuild* oder
acker zuuibel. (Gallicè vn porrion.) *Bulbos* an *Bulbi*.
 tem nominant radices suis membranis tunicatas,
 siue pluribus capitulis coagmententur, vno follicu-
 lo omnes ambiente, siue quadantenus distincta se-
 parentur.

FORMA.

Herba est caule dodrātali, cauo, foliis porraceis,
 floribus lilij sinuatim emicantibus, speciosis, sex fo-
 liis è calatho stellatim radiatis, ex viridi in luteū
 tendentibus, capillo intus croceo, capitulo floribus
 decidentibus triangulari, seminibus pleno, radice
 bulbosa ceu *Allium*, citra odorem glutinosa.

LOCVS.

In locis vmbrosis, circaq; margines quorundam
 pratorum copiosè prouenit. Quare in vallibus non
 procul à Tubinga iuxta monasterium *Bebēhusen*
 se sitis, & radice montis *Austriaci* ad pratam te-
 nue vocatum, *Bulbus* plurimus nascitur.

TEMPVS.

Per initia veris, Martio & Aprili mensib. erum-
 pit, ac statim subinde euanescit. Semen non tantum
 in caulibus, verumetiam iuxta radicem profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara austerāque qualitate præditos inueniet,
 non hunc, sed & alios bulbos, qui gustū exactè con-
 suluerit.

PLANTARVM HISTORIAE

suluerit. Proinde hos abstergere simul & glutinare, & nimirum etiam exicare posse, nemini nō notum est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Omnes bulbi acres sunt et calefaciunt, veneremque stimulant. Lingua & tonsillas exasperat. Multum nutriunt. Carnes procreant, flatuq; faciunt. Ad luxata, collisa, surculos, articulorumq; dolores illiti conducunt. Gangranis & podagris cū melle, & per se, hydropicorumque tumoribus & canum moribus prosunt. Cum melle pariter & pipere trito illiti, sudores cohibent, & stomachi dolores sedāt. Furfures & achoras cum nitro tosto exterunt. Sugillata & varos per se, aut oni luteo purgant, & lentigines cum melle aut aceto. Fractis auribus cū polenta, & contusis vnguibus prosunt. Ficos in calidis cineribus tosti, & cum manarum capitibus crematis appositi, tollunt. Combusti verò & Alcyonio permisti vitia cutis in facie, & nigras cicatrices in sole illiti emendant. Cum aceto eixi & in cibo sumpti ad rupta faciunt. Cauere verò eorum in cibo copiam oportet, quoniā nervosas partes tētant.

EX GALENO.

Bulbi amarā austeramq; vim manifestam obtinent, quamobrem elanguescētis stomachi aliquatenus auiditatem excitant. At verò neq; iis inutiles sunt, quibus è thorace & pulmone pus expuendum erit, quāquam crassiore ac glutinosiore sit corporis substantia:

substantia : etiam amaritudo crassitudini aduersatur, lēta crassaq; nata incidere. Quapropter bis elixi vberius quidem alūt, sed excreare volētib. relus-
 Etabuntur, vtpote omni amaritudine exuti. Tū ve-
 rò ex aceto, oleo garoq; mistis, esitare satius fuit:
 nam ita magis oblectabūt ac nutrient, minusq; in-
 flabunt, & facilius concoquentur. Quidam horum
 cibo abundē & immodicē vsi, planē seminis auctā
 copiam, inq; venerem se esse promptiores senserunt.
 Hos quoque homines variē apparant. Non enim so-
 lum aqua elixos, verumetiam patinas ex ipsis va-
 riē conditas instruunt. Alij quidē in sartagine fri-
 gunt, multi in craticula assant. Verū hi multam
 coctionem haud sustinent, admodum pauca contem-
 ti. Sunt qui nihil prorsus præcoquant: delectat nā-
 que eos amaritudo ipsa ac austeritas integra, quip-
 pe qui amplius ab ea ad cibum alliciantur: quan-
 quam ad huiusmodi illecebrā duo aut tres plus sa-
 tis facient. Si verò liberalius sic apparati sumātur,
 præsertim, vbi vt mos est, crudiores ingeruntur, am-
 plius cruditatem generabunt. Quidam etiam non
 probē cocti, inflationes & tormina pariūt. Qui ad
 hunc modum esitantur, alimentū minimē boni suc-
 ci procreant. At plurimum decoctorum, aut bis e-
 tiam, succus crassior quidem ille erit, cætera verò
 melior ac alibilior reddetur.

EX PLINIO.

Bulbi ex aceto et sulphure vulnerib. in facie me-
 n ſ dentur

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

dentur: per se verò tritineruorum contractionem,
 & ex vino porrigines. Succū cum melle canū mor-
 sibus. Erasistrato placet cum pice. Sanguinē idem
 eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si è naribus
 fluat, Coriandrum & farinam adiiciunt. Theodo-
 rus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erupen-
 tia in capite cum vino austero aut ouo. Et bulbos
 epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur.
 Acquē vitia quæ sunt in facie, eorum rubentes ma-
 ximè in sole illitis, cū melle et nitro emendant. Len-
 tiginem cum vino, aut cum cumino coctis. Vulne-
 ribus quoque mirè prosunt per se, aut, vt Damion,
 ex mulso, si quinto die soluantur. Iisdem & auricu-
 las fractas curat, & testium pituitas. In articulo-
 rum doloribus miscent farinam. In vino cocti illi-
 ti ventri, duritiem præcordiorum emolliunt. Dyse-
 entericis in vino ex aqua cœlesti tēperato dantur.
 Ad cōmussa intus cum Silphio pilulis fabæ magni-
 tudine. Ad sudorem tussi illinuntur. Nervis utiles.
 Ideo & paralyticis dantur iuxtà in pedibus. Qui
 sunt ruffi ex his, citissimè sanant cum melle & sa-
 le. Venerem stimulant. Sylvestres interaneorū pla-
 gas & vitia cū Silphio pilulis deuoratis sedant. Et
 satiuorum semen cōtra phalangia bibitur in vino.
 Ip̃i ex aceto illinuntur contra serpentii iētus. Se-
 men antiqui bibendum insanientibus dabant. Flos
 bulborum tritus crurū maculas varietatesq; igne
 factas emēdat. Elixos asis minus vtilis adiiciunt
 esse,

esse, & difficile cōcoqui ex vi vniuscuiusq; nature.

APPENDIX.

Hic quem pictū damus Bulbus facultatē emolliēdi & discutiendi duros tumores habet. Humidis denique & depascentibus vlceribus tostus calido cinere, & cum melle tritus atque admotus prodest.

DE BICIO. CAP. LXI.

NOMINA.

Ἰνίορ Græcè, Vicia Latinè nominatur.

B Officina non sine maximo errore ea pro Officina = Orobo vtuntur. Germani alludentes ad rñ error.

Græcam appellationem, Vuicken simpliciter, vel cū adiectione zam Vuicken (Gallicè De la vesce) vocant. Vicia autem, vt Varroni placet, dicta Vicia vñ est à vinciēdo, quòd itē vt vitis capreolos habeat, de dicta quibus sursum versus serpit.

FORMA.

Cubitali altitudine surgit, foliis Aphaces, angustioribus tamen, flore Pisi, minutis, nigricantibusq; in siliquis seminibus, quorum quidem figura non rotunda est, sed, similiter lenti, latiuscula.

LOCVS.

Sicca loca maximè amat, inter autem segetes copiosè prouenit.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Medium tenet caliditatis & siccitatis, validius tamen siccatur, in secundo nimirum ordine.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX GALENO.

Semina hæc non solum insuauia, sed concoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, quum huiusmodi naturam obtineant, alimoniam quoque quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassiq; succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem.

DE BLITO. CAP. LXII.

Blitum iam in hortis frequens, viride, album, frequentius rubrum.

NOMINA.

Bλίττον Græci, Blitum siue Blitus Latinis vocatur. Officine hanc herbam cum Beta confundunt non sine magno errore. Germanis Maier (Gallicè De la blette, ou espinars) dicitur. Blitum nomen inde traxit quod iners & fatuum olus esset, sine sapore aut acrimonia vlla. Nam βλίττος stolidos & ignauos Græci dixerunt. Sic hodie Græca imitatione socordes, & nullius momenti homines, bliteos appellamus. Ita Plautus in Truculento bliteam meretricem nominauit.

Officina-
ri error.
Blitū vn-
de dictū.
βλίττον.

FORMA.

Blitum non pingitur à Dioscoride, sed ab Her-
molao Barbaro, homine non minus docto quàm di-
ce ligente, in suo Corollario iis verbis describitur: Bli-
tum erumpit ocysimè, feliis betaceis, sine acrimo-
nia fatuis & insipidis, semine vt Beta corticeo, co-
pioso, racemoso, vt Atriplex, radice non vna, non in-
rectum

rectum tendente, sed multiplici, obliqua, & proli-
xa. Ex quibus utique verbis omnibus perspicuum
fit, herbam quam depictam damus esse Blitū. Hæc
siquidem ocysimè erūpit, atque in altum tollitur,
foliaq; Betacea prorsus habet. Inspida denique &
sine acrimonia. Semen eius ut Beta corticem, co-
piosum, racematim singulis ramis insidens. Radice
non vna nititur, sed multiplici ac longa, non in re-
ctum, sed obliquum tendente. Rectiorem tamē &
magis descriptioni respondentem si quispiam pro-
tulerit, non grauabimur nostram mutare sententiā,
ut qui probe perspectum habeamus in iis herbis
quæ à Dioscoride non descriptæ sunt, facilimè ali-
quem in tanta rerum penè omnium caligine aber-
rare posse.

LOCVS.

Et si sponte sua interdum herba hæc proueniat,
tamen ut de Blito etiā tradunt, si culto solo semel
nata fuerit, ipsa se per multa sæcula seminis deie-
ctione reparat, ut etiā si velis vix possit aboleri, sic
semel nata plurib. annis restibili fertilitate proue-
nit.

TEMPVS.

Floret æstate & autumno, semineq; prægnās est.

TEMPERAMENTVM.

Blitum frigidū & humidum in secundo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Blitum oleris vice in cibum venit. Aluo vtile est,
nullam tamen medicamentosam vim obtinet.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Aquosum est olus, ac uti quis non absurdè dixerit, qualitatis expers, & insipidum: quapropter nō ex solo oleo garōq; sed addito aceto sæpius meliùsq; assumitur. Nonnihil etiam ad leuigandā aluū momenti affert, verū id ipsum perquam exiguū est, quoniā nulla ipsis acris nitrosāve adest qualitas, quæ aluum ad excretionem irritare possit. Liquet etiam quod minima ab ipso alimonia in corpus di-
manet.

EX PLINIO.

Blitum iners videtur ac sine sapore aut acrimonia vlla. Vnde cōiciū fœminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrē adeo turbat, ut cholera faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum è vino prodesse, et clavis pedum illini. Item licni & temporū dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat.

DE BVNIAD E. CAP. LXIII.

Napus bunias satius nobis Nauet, & eius semen Nauette.

NOMINA.

οὐνιάς Græcis, Romanis Napus, Germa-

B nis Steckrub (Gallicè Nauet, ou Nau-
ueau) appellatur. Buniadis autē appella-

Napus

Bunias

quare di-

ctus.

Bouvoi.

tionē à tumēte figura quā præ se fert, Græci dedu-
xerūt. Nanq; radix Napi buniadis in amplitudinē
excrescit, & in rotundum extuberat. Clinos siqui-
dem, colles, verrucosaq; loca βῆνῆς nominant.

GE-

G E N E R A.

Napi buniadis, quę Galenus & alij veteres in Napus Raporum sensum reponunt, duo sunt genera. Vnum Bunias satium, quod forma proximę ad Brassicam tertię tiuus. speciei accedit, radicemq; oblongiorem obtinet, Germani huius generis Napos, Trucken steckruben nominant: Alterum syluestre, quod foliis suis Eruce Syluestris non dissimile est, radice ampliore, & rotundiore. Germanicę Nasz steckruben appellantur eius generis Napi.

F O R M A.

Folia habet Rapi, leuiora, Eruce modo lacinia-
ta, caulem cubitalem, interdum altiore, rotun-
dum, flores luteos, Brassicę proximos, semen in sili-
quis, radicem oblongam.

L O C V S.

Bunias gaudet frigidis locis.

T E M P E R A M E N T V M.

Cum easdę quas Rapum vires habeat Bunias,
necesse est idem etiam vt obtineat temperamentū.
Est itaque Napus bunias in secundo ordine cali-
dus, & in primo humidus.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Radix Buniadis elixa, flatu creat, minus tamę
quām Rapum nutrit. Semen eius potum let alia ve-
nena inefficacia reddit. Miscetur antidotis. Radix
etiam eius sale conditur.

E X G A L E N O.

Easdem

PLANTARVM HISTORIAE

Easdem quas Rapa vires obtinent. Vide itaque caput de rapis.

DE BOTRY. CAP. LXIIII.

Botrys herba hic frequēs, diuersa à frutice quē Piment vocamus. Blattaria & vua crispa nobis ignotæ.

NOMINA.

Bότρυς Græcis, Botrys Latinis appellatur. Officinis & vulgaribus herbariis incognita. Germanis haud ineptè Traubenkraut (Gallicè Du Botrys vñ Pymment) nominabitur. Botrys verò dicta est à se de dicta. mine, quòd racematim ramulis adnascitur.

FORMA.

Herba tota est lutea, fruticosa, sparsa, multaq; alarum caua habens. Semen totis ramulis adnascitur. Folia Cichorio similia obtinet, totaq; valde odorata est, ideoq; vestibus apponitur. Ex qua quidē descriptione omnibus manifestum sit, herbā cuius pieturam exhibemus esse legitimam Botryn: vniuersa enim herba ad luteum colorem vergit, fruticosa est, & multis stolonibus fusa, foliis Cichorii, odoratis, semine circa ramulos totos in racemos collecto nascente. Quid multa? nulla est prorsus nota, quæ illi non appositissimè quadret.

LOCVS.

Nascitur circa profluentes aquas & torrètes. In Germania tamen, quod equidem sciam, non nisi scata prouenit.

TEMPVS.

Augusto

Augusto et Septēbri ad maturitatē maximē peruenit: quibus etiā mensibus, vt Ruellius annotauit, venalis herba per Parisiēsum urbē defertur. Odoris enim gratia Galli vestimentis, pānis, & linteis curiosē interponūt. Apud Germanos tamē eius herba nulla est gratia, quōd illis hactenus ignota fuerit.

TEMPERAMENTVM.

Calidā & siccā esse Botryn amaritudo eius quę gustui occurrit, faciliē monstrat. Itē vis eius incidendi, quę illi propter calorem, tenuitatemq; inest.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

In vino pota orthopnceas lenit.

EX PAVLO.

Planta est admodū odorata, quę cum vino pota non nisi recta ceruice spirantibus auxiliatur.

EX PLINIO.

Medetur orthopnoicis.

DE BARBA CAPRI. CAP. LXV.

NOMINA.

Quo nomine veteribus Græcis et Latinis hac herba vocata sit, nobis nondum compertum est. Neque enim Pycnocomon est, quōd Pycnocomon à descriptione illius prorsus abhorreat. Quare Barbam caprinam interea donec certius nomen nacti fuerimus, nūcupabimus, à florum nimirum figura, prius cur diu quę caprinam barbam referre videtur. Germanicē ēta. Vuald geiszbart, vt eam segregaremus ab altera eiusdem nominis, quę non in syluis, vt hac ipsa, nascitur,

PLANTARVM HISTORIAE

nascitur, sed in pratis & senticetis, appellare nobis placuit.

FORMA.

Caulem habet tricubitalē, angulosum, folia *Castanea* aut *Corylo* similia, in ambitu serrata, flores candidos, exiguos, racematim cōpactos, instar *barbae canae* dependentes, radicem nigram, lignosam, intus candidam. Flores eius in inlos abeunt.

LOCVS.

Prouenit in obscuris syluis, & vallibus nonnumquam minus apricis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse hanc herbam facile ex gustu deprehenditur: miram enim amaritudinem, in radice potissimum, gustata exhibet.

VIREs.

Abstergit haud dubiè expurgátque, & quæ in venis est, crassitiem incidit. Quamobrem menses ducit, educendóque, ex thorace & pulmone, puri auxiliatur. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam continetur eiusmodi, expurgat. Hac utique ratione & morbo comituali cōpetit. Extrinsecus illita & imposita, tumores ex pituita ortos discutit.

DE BLATTARIA. CAP. LXVI.

NOMINA.

Num

NVM Græcis authoribus cognita hac herba fuerit, nondum compertum habeo. Plinius certè libro xxij. cap. ix. Blattariam nominat. Inue- nit autem nomen hoc Latinum, à colligendis in se vnde dis- blattis. Ideoq; conuenientissimo nomine Germanis eta- appellabitur Schabékraut (Gallicè Herbe vera- mineuse semblable à Boillon blanc.)

FORMA.

Plinius loco iã citato Blattariã sic pingit: Blat- taria est similis Verbasco herba, quæ sape fallit pro ea capta foliis minus cãdidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Ex qua pictura satis constat, herbã cuius picturã damus esse Blattariã: sic enim Ver- bascum mentitur, vt pro eo sæpius ab imperitis decerpatur. Et sunt nō pauci herbarij, qui hac simili- tudine decepti, eã inter Verbasci genera connume- rent. Folia tamẽ, quæ minimè sunt hirsuta & can- dida, sed potius viridia, facilè ab hoc errore paulò attentiores renocare possunt. Plures deniq; caulicu- los habet, flores item luteos, ad Verbasci flores pro- ximè accedētes. Folliculos quoq; lini instar, in quibus semen cōtinetur.

LOCVS.

Nascitur iuxta aquas, & fluminum ripas.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vehemens amaritudo eius satis docet esse cali- dam & siccam.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX PLINIO.

Hac abiecta blattas in se contrahit, ideoq; Roma Blattariam vocant.

APPENDIX.

Non plura de huius herba facultatibus apud probatos autores inuenio, sed haud dubiè si quis ea vti voluerit, eadem quæ alia amara, in corpore nostro efficere potest. Quæ qualia sint, ex capite præcedente facile intelliges.

DE BROMO. CAP. LXVII.

NOMINA.

Bρῶμος Græcè, Avena latinis ac Officinis, Germanis Habern (Gallicè Auoyne) dicitur.

FORMA.

Foliis & culmo Tritico similis, geniculis intersecto. In summo verò fructum habet veluti locustas duplici crure dinaricatas, in quo semen includitur. Radicem copiosam.

LOCVS.

Passim in Germaniæ agris nascitur, ac iumentorum potius quàm hominum pabulum existit.

TEMPVS.

Seritur Martio mense, metitur autem Augusto.

TEMPERAMENTVM.

Avena vt medicamentum refrigerat, Galeno auctore: vt alimentum verò, eodem teste, calefacit sufficienter. Vtroque verò modo exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen

Semen eius haud secus quàm hordecum ad cataplasmata vtile. Plus etiam ex ea sit cohibenda aluo accommodata. Succus eius in sorbitione acceptus, tuſſientibus prodest.

EX GALENO.

Auena vt medicamentum similem hordeo vim obtinet. Nam illitum deficcatur, & digerit mediocriter, & sine morſu. Nonnihil etiam adſtriſtionis obtinet, vt ventris profluua inuet.

EX PLINIO.

Semen vtile ad cataplasmata atque hordecum & ſimilia. Prodeſt tuſſientibus ſuccus. Auenæ farina in aceto tollit naeuos.

DE VVA CRISPA. CAP. LXVIII.
NOMINA.

VEteribusne Græcis & Latinis frutex ille cognitus fuerit, me ignorare adhuc ingenuè fateor. Quare cùm nomen aliud quo hunc appellaremus in promptu non eſſet, vulgarem & qua omnes hodie herbarij vtuntur nomenclaturam uſurpare voluimus. Vnam autem criſpam fruticem hunc Vua criſpa dixerunt ab intortis ſerèque in circuli verſis (criſpa alij vocant) foliis, & acinis quos producit. Quò diſta. etiam reſpicientes Germani noſtri, Kruſzbeer, oder Kruſelbeer vocant. Latiniſ forte vua intorta nuncuparetur.

FORMA.

Frutex eſt ramulis multis, aculeatus, rectoq; ſpinarum

PLANTARVM HISTORIAE

narum mucrone horridus, foliis intortis ac circinata rotunditatis, Apij modo dissectis, flore ex herbido purpurascente, acinis candicantibus, & splendentibus, primum acerbis, à maturitate dulcibus. Ex iis abundè constare putamus, fruticē hunc cuius picturam exhibemus, non esse primam, vt nonnulli arbitrantur, Rhamni speciem. Nam etsi cetera respondeant, tamen folia quae rotunda & minime oblonga sunt, vt Rhamni, repugnare manifestè videntur. Posset tamen citra aliquod vitæ discrimen Rhamni generibus annumerari, quòd scilicet viribus illi similis admodum sit, quas etiā illi suo loco adscribemus.

LOCVS.

In frutetis & sepius nascitur, non tamè passim. Nusquam autem copiosius quàm Tubinga luxuriat, vbi circa omnes ferè sepes sese profundit.

TEMPVS.

Veris statim initio frutex ille pubet, primū hoc tempore folia, dein flores, ac non diu post acinos seu baccas acerbitate gratas profert.

TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè idem quod Rhamnus temperamentum obtinet. Vt enim hic adstringit & refrigerat, sic etiam illa. Refrigerat autem in primo cōpleto, aut secundo incipiente, desiccatur verò in secundo.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Folia ignibus sacris & herpetis illita auxiliatur.

Fertur

Fertur & ramos eius foribus & fenestris appositos veneficiorum arcere maleficia. E quibus Dioscoridis verbis satis liquet, Vuam intortam non hoc tantum nomine sepius apponi ut easdem muniat, atque adeo alienorum ingressum prohibeat, verum etiam ut veneficia ab hortis propulset. Ut hinc quoque colligere liceat, eiusdem cum Rhamno esse facultatis.

EX GALENO.

Herpetes sanant, & erysipelata non magnopere calida. Porro ad hæc teneris utendum est foliis.

DE BALSAMINE. CAP. LXIX.

Balsamine est in hortis religiosorum S. Germani frequens, Gallus Merueile à mirandis eius effectis, quæ in momordica scribit Pandeclarus in fine.

NOMINA.

Quo nomine veteribus tum Græcis cum Latinis appellata sint hæc plantæ, me ignorare ingenuè fateor. Puto autem illis planè fuisse incognitas, quòd de iis ne verbum quidem apud eosdè scriptum inueniatur. Hodie Balsamines nomine vocant. Causam indicabimus paulò post. Germani ad Latinam nomenclationem alludentes, Balsamkraut, haud (arbitror) ineptè appellabunt.

GENERA.

Duo Balsamines genera damus. Primam, quæ nos Prima certioris discriminis gratia mare fecimus, Ligures Balsami
o Padani ne.

PLANTARVM HISTORIAE

Hierosoly. Padani Balsaminam vocant, Hierosolymitanū po-
 mitanum mum Hetruria, Mirabile Gallia, vulgus Italarum
 pomum. Charantiam, quoniam septi modo in hortis fene-
 Charan- strisq; per cancellos opere topiario facile digeratur.
 tia. Alteram, quam fœminam nominauimus, Itali neu-
 Altera tro genere Balsaminum appellant, priori quidem
 Balsamie. quod ad fructū attinet similis, nisi quod minor est,
 Balsami- in aliis dissimilis: neque enim foliis, neq; etiam flo-
 num. ribus respondet. Vtraque planta visu pulcherrima
 est, vt hoc saltē nomine pingi meruerint. Et si præ-
 stet etiam harum habere picturas, vt de iis plura
 inuestigandi posteris occasio aliqua sit.

FORMA.

Prima. Prima tenuibus prælongisq; flagellis vltro citrô-
 que reptatibus euagatur, foliis Vitis albe seu Bryo-
 nia, articulationibus, exilibus pampinis ex alarum
 suū prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim
 vicinis implicant pergulis: flore cucumeris ex albo
 in luteum languescente, turbinato vtrinque fructū,
 carnosâ cute, & per versus verrucosa, ac rigidiori-
 bus bullis intumescente, cucumeris syluestris pusillo
 li similitudine, puniceus maturo color, chartilago
 intus punicea vel lutea, sanguineusque succus. Po-
 mum maturitate dissilit, inanitasq; confracto pa-
 tet, semina intus pomi formam referentia continēs.

Alterius Altera caulem habet crassissimū, Portulacæ as-
 milem, in herbaceo colore rubescentem, Folia Sali-
 cis, in ambitu incis, flores magnos, purpureos, in-
 star

star Consolida hodie regalis vocata herba caudatos, fructum priori non dissimilem, primo herbaceum, dem pallidum luteumve, pilosum, qui maturitate dissilit, inanitasque confraeto apparet, semina intus aliquot lenticula ferè figura continentem.

LOCVS.

Non nisi sata in Germania proueniunt. Sed iam in multorum hortis plantata nascuntur.

TEMPVS.

Floribus & fructibus pregnantibus sunt Augusto & Septembri mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Telephium temperamentum, potissimum alteram, obtinere arbitror. Quare in secundo ordine intenso, aut certè principio tertij exicare, nec insigniter calefacere, primo nimirum ordine, est verisimile.

VIRES.

Ex primi generis Balsamines seminibus oleum exprimitur, ad vulnera, quod in Corollario suo annotauit doctissimus Hermolaus, precipuum. Nonnulli pomum olco. prius imbutum aliquot dies insolant, deinde vel fimo, vel terra tantisper obruunt, dum prorsus intabuerit, sic Balsami vires glutinadis vulneribus adsciscere pollicentur, inde tractum Balsam. Balsamina vocabulū. Quid multa? in vulneribus sanare vox vnde Telephio non inferiores esse coniicio, hincq; Balde nata. saminas appellatas. Nos tamen de iis peculiarem

PLANTARVM HISTORIAE

experientiam nullam habemus. Poterunt itaque alij, si lubet, earundem virium facere periculum.

DE GLYCYRRHIZA. CAP. LXX.

Glycyrrhiza Gallis partibus transpositis
Rhiza glyceia, Riglice.

NOMINA.

Liquiritia. **Γλυκύριζα** Græcis, Dulcis radix Latinis, Liquiritia officinis, Germanis Sufzholtz (Gallicè Erculisse, ou rigolisse) dicitur. Nomen tum Glycyrrhiza apud Græcos, tum etiam Latinos à dulcedine, quæ radix eius prædita est, inuenisse notius est, quam de dicta. ut dici debeat. Theophrastus nono de plantarum Scythica historia libro, Scythicam nominauit radicem, quod in Scythia circa Maotim paludem plurimum proveniat. Sunt etiam qui ἄδιν, ἴον vocitent, quod sitim retenta in ore arceat.

FORMA.

Brevis frutex est, ramos binum cubitorum altitudine spargens, in quibus folia densa, Lentisco similia, pinguis, tactuque glutinosa, Florem fert Hyacintho similem. Fructum pilularum Platani magnitudine, asperiores tamen, siliquas Lentis modo rubescences, breuesque habentem. Radices illi sunt longæ, colore buxæ ut Gentianæ, subacerbæ, sed dulces, quæ Licij modo in succum coguntur & desantur. Hæc delineatio ita Liquiritiæ hodie vocate quadrat, ut nulla penitus sit nota quæ in illa non reperiatur. Fruticosa enim est, ramos, bicubitales emittens,

mittens, foliis lentiscinis, densis, pinguibus, tactuq;
sequaci lentore glutinosi. Flore Hyacinthi, fructu
pilularum Platani crassamento, sed asperiore, sili-
quas Lentis figura, & breues habente. Radicibus
praelongis, buxco colore, & dulcibus.

LOCVS.

Plurima & optima in Capadocia ac Pontona-
scitur. Multa præterea nec ignaua aliquot Germa-
niæ nostræ locis, Pabēbergēsi præsertim agro, IOA-
ger Gly-
CHIMI nostri Camerarij viri doctissimi patria, cyrrhix
producitur. Et hodie nusquā ferè non seritur in hor-
tis. His quæ semel comprehenderit, tam pertinaci Ioach. Ca-
fertilitate coheret, vt vix vnquā possit radicitus merarius.
extirpari, tam restibili fecunditate regerminat.

TEMPVS.

Carpitur Septēbre mense, quando semine præ-
gnans est, aut vergiliarum occasu. Flores suos Iu-
lio mense profert.

TEMPERAMENTVM.

Natura eius nostræ temperatura familiaris est:
nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed
quum adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum
eius temperamentum quantum ex caliditate &
adstrictione est, tepida potissimum caliditatis fue-
rit, quamproximè ad symmetrum temperatū ve-
accedens. Porro quum etiam dulcis sit, humida
quoque sit oportet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

PLANTARVM HISTORIAE

Succus radicis ad arteria exasperationes utilis est. Oportet autē vt linguae subditus eliquescat. Ar-
dori stomachi, & ad iecinoris thoracisque vitia
prodest. Vesicae scabiem, & renum vitia cum passo
potus emendat. Idem cliquatus sitim restinguit.
Vulneribus prodest circumlitus. Cōmāducatus sto-
macho succurrit. Radicum recētium decoctum ad
eandem conuenit. Radix verò sicca in puluerem tri-
ta, pterygiis commodissimè inspargitur.

EX GALENO.

Huius fruticis radicū succus in primis utilis est,
similiter vt eius radices dulcis, simulq; modicè ad-
stringens. Proinde asperitates lenire potest, nō solum
in arteria, verumetiam scabra vesica, idq; tempe-
ratura mediocritate. Quoniā autem temperie quo-
que humidum est quod modicè dulce est, iure sanè
sitim arcens medicamentum est, nimirum modicè
humidum, simul & natura humana frigidius. Re-
fert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem reda-
ctam, pterygiorum illitu idoneum esse remedium.

EX THEOPHRASTO.

Dulcis & Scythica radix utilis ad suspiria, &
tussim siccam, atque in totum thoracis laborantis
medicamēto comoda redditur. Quin & ex mel-
le vlceribus mederi potest. Sitim quoque extinguit,
si teneatur in ore. Qua de causa tum ea, tum Hip-
pace, Scythas decem & duodecim dies degere, &
vitam prorogare affirmant.

EX PLINIO.

Radiciſ uſus in ſubditis decocta ad tertias, ca-
 tero ad mellis craſſitudinem, aliquando & tuſa. E
 quo genere & vulneribus imponitur, & faucium
 vitis omnibus. Itē voci vtiliſſimo ſucco, ſicut ſpiſ-
 ſatus eſt lingue ſubdito: itē thoraci & iccinori. In
 ore habētes ſitim non ſentiūt: ob id quidā Adipſon Adipſon.
 appellauerūt eam, & hydropicis dedere ne ſitirēt.
 Nō parum auxilii conſert iis qui perpetua ſiti ex-
 cruciantur: ideo commanducata & ſtomatice eſt,
 & vlceribus oris inſpergitur, ſepe & pterygiis. Sa-
 nat veſica ſcabiem, renum dolores, condylomata, vl-
 cera genitaliū. Dedere eam quidam potui in quar-
 tanis drachmarum duarum pondere, & pipere, he-
 mina aque. Commanducata ſanguinem ſiſtit ex
 vulnere. Sunt qui & calculos ea pelli tradiderunt.

DE GALEOPSI. CAP. LXXI.

Galeopſis tibi pingitur noſtra cataria.

NOMINA.

Γαλιόψις, ἢ γαλεόβδολον Græcè: Galeopſis,
 Vrtica iabeo Latine, vulgò & officinis Scrophu- Scrophu-
 phularia maior, Ficaria, Millemorbia & Caſtran- laria ma-
 gula dicitur. Germanicè Kraunuuriz, Sauurtz ior.
 groſz feiguuart Zenkrant. Appoſitè autem Ga Galeopſis
 leopſis appellatur, nomine ex græco & latino cōpo- cur dicta.
 ſito, quod eius flores prorſus galeæ aſpectū referāt.
 Aut ſi græca cum latinis componi haud poſſunt,
 γαλιόψις cum η & υό i, vt habent multa exēpla.

PLANTARVM HISTORIAE

ria, scribendum erit, ut idem valeat ac *mustela* aspectum referens: flores enim non dissimiles esse capiti illius animalis videntur. Et ita legendum esse Plinius etiam testatur, qui *Galeopsin* hanc nominat herbam. *Scrophulariam* autem à curadis stramis, quas *scrophulas* vocant recentiores, dixerunt.

FORMA.

Totus cum suo caule & foliis frutex *Vrtice* similis est, leniora tamen habet folia, & cum teruntur grauiter odorata. Flores illi tenues, & purpurascens. Huius delineationis nota in vniuersum omnes, nulla prorsus reclamante, herba quam vulgus *Scrophulariam* maiorem nominat, conueniunt. Frutex enim est qui ad humani corporis ferè longitudinem interdum assurgit, foliaq; *Vrtice* habet, sed leniora, & quæ trita grauem fundunt odorem. Flores tenues, atque purpurascens. Respondet etiã locus natalis, ut ex sequentibus patebit. Esse autè veterum *Galeopsin* vulgi *Scrophulariam* maiore, præter ea quæ iam diximus, manuscriptus quoque codex euidenter ostendit, in quo pictura ita *Scrophularia* refert, ut nemo sit qui eam non agnoscat. Huc accedit quòd in descriptione, quam ex Dioscoride desumpsit, aperte testatur *Scrophulariam* maiorem alio nomine dictam esse *Galeopsin* & *Galeobdolon*. Neque facultates discrepant, sed vtræque similes sunt, adcò ut hand dubiè veterum *Galeopsis*, recentiorum herbariorum sit *Scrophularia* maior.

maior.

LOCVS.

Nascitur circa sepes, semitasq; & in arenis edificiorum passim. TEMPVS.

Colligitur Iunio & Iulio mensibus, tum enim potissimum floret.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, extenuatur, & discutitur, adeoque partium est tenuium, id quod amaritudo quā in gustu praese fert, satis indicat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia, succus, caulis & semen, duritias, carcinomata, strumas, parotidas & panos disciunt. Oportet autem bidie cum aceto tepidum cataplasma imponere. Fouentur & decocto eius vtiliter. Ad nomas, gangrenas, & putrescentia cum sale illita prosunt. EX PAVLO.

Galeopsis, quam alii Galeobdolon appellant, vritice similis herba est, maiorem tamen leuiorem habet, & odorem grauem. Scirrhosos tumores dissipat & emollit. Item ad nomas cataplasmatibus modo illita confert. EX PLINIO.

Galeopsis folia caulesq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos & parotidas disciunt. Ex vsu est & decocto succo fovere. Putrescentia quoq; & gangrenas sanat.

APPENDIX.

Recentiores etiam Scrophulariae tribuunt facultatem sanandi vlcera putrescentia, & mariscas. Succum

PLANTARVM HISTORIAE

cum eius mederi deformitati faciei iam ferè elephantica tradūt, vt inde satis constet à Galeopsi nō diuersam esse. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficax adiiciunt, id quod ab eius amaritudine non abhorret.

DE GALLIO. CAP. LXXII.

Gallium à florum pallidorum & odororū copia, florastre dicitur, aliis aspergula minori, quòd aspergilli formam habeat.

NOMINA.

Gallion **Γάλλιον**, ἢ γαλλέριον, ἢ γαλατίον Græcis, Gallion Latinis. Officinis, vt multæ aliæ optima herba, neglecta et incognita est. Germanis Vnser liebē frauēn Vueg oder Vual, oder betstro (Gallicè Petit muguet) dicitur. Nomen inuenit ex eo quod vim coagulandi, ac spissandi lactis habeat.

FORMA.

Ramulos rectos, & folia Aparinae similima habet. Florem in summo luteum, tenuem, frequētem, valde odoratum.

LOCVS.

Nascitur in aruis et humidis palustribusve locis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gallium siccum est & subacre.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flos eius ambustis illinitur, & sanguinis profluvia cohibet. Idē cerato rosacco miscetur, insolatū-

que

que donec albescat, & sic lassitudines recreat. Radix venerem stimulat.

EX GALENO.

Galliū inde adeò nomen sortitum est suum, quòd lac coagulet. Facultatem obtinet exiccatoriam & subacrem. Flos eius sanguinis profluuiis competere videtur, & ambustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

DE GLECHONE. CAP. LXXIII.

Pulegiū in syluis & locis æditis luxuriat.

NOMINA.

Ἀλήχων, ἢ βλήχων Gracè, Pulegiū Latine vocatur, Officina latinū nomē retinet.

Germanicè Poley (Gallicè du Pouliot)

Blechona.

Blechona autem appellarunt, quòd gustatum à pecore cū floret, balatū concitet. Id quod Plin. li. xx. capite xiiij. autore, de syluestri verè dicitur. Pulegium verò, quòd eius flos recens incensus pulices interficiat.

GENERA.

Plinius & Apuleius duo Pulegii faciunt genera, alterum fœminam, alterum marem: nec alia ratione differre scribunt, nisi quod mas cãdidū, fœmina verò purpureum florem habeat. Dioscorides Pulegium masculum, quod satium alio nomine in Dioscoridi descriptione vocat, duntaxat depingit.

Satium

Pulegiū.

Syluestre autem secundam Calaminthæ speciem facit, quam latini propriè Nepetam nominant, ut suo loco dicemus.

Syluestre.

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Pulegium mas seu satium, cuius picturam damus, fruticosum assurgit, & ad cubiti altitudinem increfcit, maxime si fit quo sustētetur: foliis Sampfychi, surculis hirsutis, rubicantibus, & per intervalla purpureo flore orbiculatim coronatis.

LOCVS.

Prouenit locis cultis & aquosis: semelq; satum diutina durat etate. TEMPVS.

Carpitur dum floribus pragnās est, id quod Iulio & Augusto mensibus accidit.

TEMPERAMENTVM.

Pulegium quum acre & subamarum sit, valde tum excalescit, tum extenuat, ideoque in tertio ordine calidum & siccum esse statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Extenuat, calescit, & concoquit. Potum mēses, secundas, & foetus trahit. Cum melle & aloe potum, ea quae circa pulmonem sunt, educit, & conuulsis auxiliatur. Nauseas stomachique morsus cum posca potum lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum vino potum venenatorū morsibus succurrit. Defectos animo cum aceto naribus obiectū recreat. Siccatum & in puluerem tritum crematūque gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert vsquedum rubescat cutis. Cum cerato varos tollit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctū

eius

eius prurigines si eo lauantur sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones vuluæ in desefſionib. iuuat.

EX GALENO.

Pulegium calefacere abundè magnum est testimonium, quòd illitum rubrificat, & quòd, si quis diutius toleret, exulceret. Extenuare verò satis indicat quum humida, crassa & lenta ex thorace et pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat.

EX PLINIO.

Magna societas cum Mentha, ad recreandos defectos animo, Pulegio cum surculis suis in ampullas vitreas aceti vtrisque deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona vertigini quam è rosis, cubiculis nostris pronunciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur lenare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorum æstusq; iniuriam, et à siti traditur: neque æstuarie eos qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cum polenta & aceto. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic et pectoris ac ventris dolorem. Stomachi autè ex aqua item rosiones sistit, et vomitiones cum aceto et polenta. Intestinatorum vitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit ex vino, et si aminæum sit, & calculos, et interiores omnes dolores, ex melle et aceto sedat. Menstrua & secundas, vuluas conuersas corrigit, defunctos partus eiicit. Comitibus in aceto cyathi mensura datur. Si aqua insalubres

PLANTARVM HISTORIAE

bres bibenda sunt, tritum inspergitur. Salsitudines corporis si cum vino tradatur minuit. Nervorū causa & in contractione, cum sale, aceto & melle confricatur opisthotono. Bibitur ad serpentium ictus decoctum. Ad scorpionum, in vino tritum, maxime quod in siccis nascitur. Ad oris exulcerationes, ad tuſſim efficax habetur. Flos recentis incēsus, pulices necat odore. Xenocrates Pulegii rami lana inuolutum, in tertianis ante acceſſionem olfactandum dari, aut stragulis subiici, & ita collocari agrum, inter remedia tradit.

EX SIMEONE SETHI.

Pulegiū attenuat & calfacit vehementer, quapropter humida & crassa in thorace, & in pulmone humida & glutinosa iuuat, & vt excrecentur efficit. Cum vino albo coctum & potum, calidumq; ſyncerū menses pronocat. Extrinsecus illitū ischiadicis, & aliis partibus frigore affectis auxiliatur.

DE GENTIANA. CAP. lxxiiii.

Gentiana ex monte Iura huc cōuehitur.

NOMINA.

ΕΥΓΙΩΝ, græcè Gētiana latinè appellatur.

¶ Nomen apud oēs officinas retinet. Germanicè Entzian, oder Bitterwurtz (Galli

Gentiana cè Gētiane) nominatur. Sic à Gentio Illyriorū re vnde dicitur, qui in bello primus eius vires reperit, dicta est.

Etia.

FORMA.

Folia Gentiana iuxta radicē crumpunt in glandi-

di aut Plantagini similia, subrubētia: sed quæ à medio caule, præsertim autem cacumine prodeūt, breuioribus incisuris secta sunt. Caulis illi inanis, levis, digiti crassitudine, binū cubitorum altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus internallis folia proferens. Flores eius lutei primum calycibus conclusi, postea intumescētes explicantur. Semen in calycibus obtinct latus, leue, glumofum, ad Spondilij semen accedens. Radicem mittit longam, similem Aristolochiæ longæ, crassam, & amaram.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montium cacuminibus, vmbrosis locis & aquosis. Plurima verò & copiosissima sub Alpinis montibus in Illyria, & in mōte Farremberg haud procul à Tubinga sito.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense, dein Iulio semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo immensa satis monstrat radicem eius esse calidam & siccam.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Gentianæ radix calefactoriam & adstringentē vim habet. Venenatorū morsibus succurrit. duarū drachmarū pondere cū pipere, ruta & vino pota. Succī drachma, laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis et cōuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo

PLANTARVM HISTORIAE

do subdita fœtus eiicit. Vulneraria est, imposita vt lycium, vulneribusq; sinuatim depascentibus, potissimum succus, medetur. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Pro meconio collyriis acribus misceatur succus. Radix alphas abstergit. Contusa radix diebus quinque aqua maceratur, postea in eadē decoquitur, dū aquæ radices superstant emineant: ve: deinde vbi refrixerit aqua linteolo percollatur, iterumque decoquitur, dum mellis crassitiem contrahat: demum in vase testaceo reconditur.

EX GALENO.

Radix Gentiana herbae admodū efficax est quā opus est extenuatiōe, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, quum impensè amara sit. EX PLINIO.

Vsus in radice & succo. Radicis natura est excofactoria, sed pregnantibus non bibenda. Precipue aduersus angues duabus drachmis cum pipere & ruta, vini cyathis sex, siue viridis siue sicca pota prodest. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non sufficientibus modo, sed ilia quoque trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota. Farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interancorum vitiis occurrit. Radix trita vel decocta, à ruptis, conuulsis, et ex alto deiectis potatur. DE GLYCYSIDA. CAP. lxxv.

Pæonia mas & fœmina nobis frequens, solam pingis fœminam.

NOMINA.

PΛΟΥΤΙΔΙ, ἢ ΠΑΛΟΝΙΑ Græcis, *Peonia* & *Cast*
sta herba Latinis dicitur. Nomen *Peonia* in
 officinis seruat. Germanis *Peō szblum*, *Konigz-*
blum *Gichtuurtz*, *Benignenrosz*, *Venedis-*
chrosz, *Benedictenrosz*, *Pfingstrosz*. (Gallicè
Piuoine) vocatur. *Glycysida* porrò dicta est quòd *Glycysida*
 grana mali punici acinis similia habere videatur. vnde di-
 Nā *sida* mali punici grana à *Bæotis* nominantur. Et a.
Peonia ab eius inuētore medicina peritissimo, *Pæo* *Peonia*
 ne appellata est. cur dicta.

GENERA.

Duo eius genera sunt, mas & femina. Mas in
 vulgaribus herbariis *Niniuenuuriz*, femina ve-
 rò *Peonienblum*, aliisq; nominibus Germanicis.
 paulò antè cōmemoratis nuncupatur. Idē, magno
 errore *Peoniam* à *Pionia* differre putant, atq; adeo
 diuersis etiam capitibus, imò & viribus disjungūt.
 Ferēdus tamen is error esset, nisi vtrique etiam her Error her-
 bæ, hoc est, *Peonia* & *Pionia*, duplex genus assi- bariorum.
 gnarent, marem nimirum & feminam, cū tamē
 sub vna *Peonia* nomenclatura, vtrunq; genus *Dio-*
scorides & alij veteres complexi sint.

FORMA.

Caulis duorum ferè dodrantum altitudine nasci-
 tur, multas propagines habens. Mas *Iuglandi* nuci
 folia similia obtinet: femina verò *smyrni* modo di-
 uisa. Summo caule siliquas quasdam *Amrygdalis*
 p^r similes

PLANTARVM HISTORIAE

similes profert, in quib. quum aperiuntur, grana rubra, multa, exigua, punici mali acinis similia inueniuntur, in medio nigra, purpurea, quinque aut sex. Radix maris digiti crassitudine, dodratali vero longitudine, gustu adstringens, alba. Fœmina propagines sobolesve seu glandes septem aut octo, ut Asphodelus habet. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, Pœoniam quæ passim in hortis nascitur, & cuius hæc picturam damus esse fœminā, quod eius folia Smyrni modo sint laciniata. & quod radix septem aut octo veluti glâdibus constet. Reliquæ notæ, potissimum quod in siliquis grana alia rubetia, alia nigra sint, utrique generi communes existunt.

LOCVS.

Nascitur in altissimis montibus, & passim hodie, fœmina potissimum in hortis provenit.

TEMPVS.

Maior floret mense.

TEMPERAMENTVM.

Pœonia radicem habet leniter adstringentem cum quadam dulcedine. Si verò plusculum dentibus mendas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies, id quod in radice etiā nostratis Pœonia, quam fœminam esse diximus, deprehendes. Pœonia verò in vniuersum temperamentum tenuium est partium, exiccatorium, hand tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Datur radix mulieribus à partu non purgatis. Cit menses Amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. Regio morbo correptis prodest, renum ac vesicæ doloribus. Decocta in vino & pota, aluū sistit. Seminis grana rubra decem aut duodecim pota in vino austero, nigro, rubentem fluxionem sistit. Stomachicis & crassationibus comesta profunt. A pueris pota et comesta, initia calculorum eximunt. Grana uigra nocturnis suppressionibus, ephialtas nominant, vuluæ stranguinationibus, & vteri doloribus in aqua mulsa aut vino quindecim pota, opitulantur.

EX GALENO.

Radix Pæoniæ menses cit ex mulsa Amygdalæ quantitate pota. Sanè tundere eam oportet ac cribrare, & sic inspergere. Expurgat etiā iecur obstruētum & renes. Sed hæc efficere nata est quā acris & subamara est, quā verò quiddam etiam adstrictiorum obtinet, fluxiones ventris sistit. Oportet autem tunc in austerorum vinorum quopiam eā decoctam bibere. Est omnino resiccatoria vehemēter, ut nō desperauerim eam ex collo pueris suspensam, meritò comitiale morbum sanare. Equidem vidi Historia. puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ex eo quo gestabat radicem tempore. Vbi autem forte fortuna quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo

p 9

correctus

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

correctus est: rursusq; suspensio in illius locum alio, inculpatè postea se habuit. Visum verò est mihi satius esse denuò id certioris experiètiæ gratia detrahere, id quum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationabile itaque erat aut partes quaspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aerem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus colummellam phlegmone affectam iuuat, & Nigella frigida pulam destillationes & grauedines desiccat, si quis eam in calidum linteum rarum liget, assidueque calorem ex ea per inspirationem quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, maximè marinæ purpuræ, collo viperæ inieceris, illis viperam præfocaueris, eaque postea cuiuspiam collo oblinxeris, mirifice profuerit tum consillis, tum omnibus iis quæ in collo expullulant.

E X P L I N I O.

Peonia medetur Faunorum in quiete ludibriis. Rubra grana rubentes menses sistunt quindecim ferè pota in vino nigro. Nigra granavuluis medetur, ex passo aut vino totidem pota. Radix omnes ventris dolores sedat in vino, aluumque purgat. Sanat opothotonum, morbum regium, renes, vesicam. Matricem autè et stomachum decocta in vino, aluumque sistit.

sistit. Estur etiam contra malum mentis, sed in me-
dēdo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra au-
xiliantur. & suppressionibus nocturnis in vino pē-
ta quo dictum est numero. Stomachio verò & eros-
sionibus, et esse ea et illinire prodest. Suppurationes
quoque discutiuntur recentes nigro semine, veteres
rubro. Vtrunque auxiliatur à serpente percussis, et
pueris contra calculos incipiente stranguria.

DE GERANIO. CAP. LXXVI.

Gerania omnia hīc frequentia.

NOMINA.

Theophrastus Græcè, Geranium Latine, vulgò & Rostrum
herbariis Rostrum ciconia appellatur. Gera- ciconia.
nium autem à gruini capitis imagine, quæ summo Geraniū
eius plantæ capitulo inest, Græcis aptissima simis vnde di-
litudine dictum est. Sic recentioribus à ciconia etum.
rostri effigie, Rostrum ciconia nominatum est.

GENERA.

Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum Primum
quod longioribus rostris, & in mucronem acumina genus.
tis constat. Hoc hodie officinis & herbariis Aeus
pastoris & Muscata, Germanis verò Storcken-
schnabel dicitur. Alterum quod malvæ folia ha- Secundū.
bet, Pes columbinus vulgò nominatur. Sūt qui tur-
piter aberrantes, Amomum esse existimant. Gera- Amomū
manicè Taubenfusz, oder Schartenkraut ap- non est Pes
pellatur. Præter hæc duo alia adieciimus genera, colūbinus.
inter quæ id quod tertium ordine est, foliis Arte- Tertium.

PLANTARVM HISTORIAE

- misia tenuifolia vel Charephylo simile existit.*
Robertia. herba Roberti & Robertiana à nonnullis, haud dubiè à superstitione aliqua Diui, qua superior aetas mirificè imbuta fuit, appellatur, Germanicè Ru-
Quartū. prechtskraut.. Quartū folia obtinēs lauiata, Germanicè p certiori discrimine Kranich halcz
Quintū. uocari potest. Quintum, quod folia Ranunculi habet, gratia dei nominatur, Germanicè Gottes
Sextum. gnad, ab insigni in sanādis vulnerib. effectu. Sextum, quod forma quarto generi similitimum est, nec ferè ab illo nisi sola magnitudine foliorum, florum & radice distat, Germanicè Blutuartz, à rubro colore aut mirifica insisterendo sanguinis profluvio facultate vocatur.

FORMA.

- Primi.** Geranium primū caules habet à radice rubētes, lanuginosos, folia Anemones, diuisuris incisa, flores purpureos, & in cacumine caulium fastigia capitulis ciconiae aut gruui cum rostellis longitudine acus emicantia. Radicem oblongam & subrotundā
Secundi. dulcemq;. Alterum ut praecedens caules tenues, rubētes à radice statim, lanuginososq; obtinet, folia maluae similia, candidiora, flosculos subpurpureos, capitella gruui capitis modo rostrata, radicē tenuē & oblongam.
Tertij. Tertium caules habet à radice rubescentes, lanuginosos, geniculatos, saporis & odoris iniucundi, folia Charephylo aut Artemisia tenuifoliae similia, flores purpureos, capitella gruui capitis modo rostrata, radicem intus viridem, & adstring.

adstringentē. Quartum cauliculos itidem vt re- Quarti.
liqua rubentē, lanuginosum, folia laciniata admo-
dum, flores purpureos, ex quibus capitella gruini ca-
pitis instar rostrata, & in iis semina quinque na-
scuntur: radicem intus candidam, extrā subluteā.

Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, Quinti.
caules emittit oblongos, rotundos, modicē lanugino-
sos, à radice statim rubentes, folia Ranunculo simi-
lia, flores ferē ceruleos, capitella præcedenti Gera-
nio similia, radicem crassam & longam, multis
exiguīs radiculis veluti capillamentis quibusdam
fibratam. Sextū ramos habet tenues, lanuginosos, Sexti.
folia laciniata, tenuia, flores in summo purpureos
ex quibus, vt in quarto, capitella gruini capitis for-
mam referentia proueniunt. Radicem extrā & in-
tus rufam. LOCVS.

Omnia Geraniū genera in incultis proueniūt. Pri-
mum passim in campestribus, & nonnunquā inter
segetes nascitur. Alterum in colliculis. Tertium in
vmbrosis locis & dumetis. Quartum in agrorum li-
mitibus, & iuxta sepes. Quintum in pratis. Sextū
in locis montosis & saxosis.

TEMPVS.

Primum statim inter initia veris Aprilī mēse flo-
res suos ostendit, & subinde per integram æstatem.
Alterum, tertium, & quartum, Maio mense florēt.
Quintum Iunio & Iulio mensibus, quemadmodum
etiam sextum.

PLANTARVM HISTORIAE TEMPERAMENTVM.

Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est quodāmodo, atque adeo discutienti vi prædita, adstringunt ac siccant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Geranij primi in vino drachmæ pondere pota, vteri inflationes discutit. Secundum nullū habet in medicina vsum.

EX PAVLO.

Geranium quod foliis respondet Anemones, radicem habet esculentam, quæ cum vino drachmæ vnius pondere sumpta, vteri inflationes dissolvit. Altera Geranij species in re medica inutilis est.

EX PLINIO.

Primæ Geranij speciei radix, rescipientibus se ab imbecillitate utilissima. Bibitur contra phthisin drachma in vini cyathis trib. bis die. Itē contra inflationes, quæ & cruda idē præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum.

APPENDIX.

Etsi secundū Geraniū genus à Dioscoride aliisq; nonnullis, tanquā nullius in medicina vsus damnatum sit, tamen posterior ætas quotidiana experientia in sanandis vulneribus & fistulis, eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit: proinde eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Et certè nō mirum est earūdem vires olim fuisse

fuisse ignoratas, cum & aliarum multarum plantarum facultates, quas constat esse hodie notissimas, veteribus fuisse incognitas, notius sit quàm vt demonstrari debeat. Antiquus quoque herbarius, prædictorum Geraniorum folia magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorum doloribus leniendis tradit. Primi autem radicem mouendi urinam facultatem habere ait, ideoque calculosis, stranguriæ & difficultati urinæ prodesse. Tertium genus ad oris, mammillarum, pudendorumque vlcera sananda vnicè conducit. Reliqua similiter ad glutinanda vlcera mirificè prosunt. Nullum verò ad sanguinem undecunque emanantem compescendum præstātius sexto est: vnde etiam Germani, vt comprehensum est, Blutwurtz hoc est, sanguinariā radicem appellare voluerunt.

DE GONGYLE. CAP. LXXVII.

Rapum satium Auberuillianum Parisiis commendant radice tuberosa multum & terra extāte. Rapum syluestre nobis cum Dioscoride Rapontium dicitur.

NOMINA.

Γογγύλι η γογγυλὶς Græcis, Rapum Latinis Gongyle & Officinis, germanis Ruben (Gallicè Nazeau quare diueau rōd) appellatur. Græci autem à figura eius, & tā quæ plerunque rotunda esse solet, vocabulū detorsērunt. Nanque quòd in rotunditatem coactum est, vel in orbem circumagitur, γογγύλιον dixerunt. γογγύλιον
Rapa λον.

PLANTARVM HISTORIAE

Rapa vnde. Rapa verò, quòd ex terra rure, quasi ruapa, Varone teste nominata est.

GENERA.

Rapunculus. Rapi duo sunt genera. Vnum satium, quod simpliciter Germani Ruben vocant. Estq; id iterum duum generum. Vnum candidum, quod Germani etiam Vueisruben vocant: & alterum rubrum, Rot ruben iidem appellant. Alterum sylvestre, quod vulgus Rapunculum, quasi paruum rapum, Germani Rapuntzeln nominant.

FORMA.

Sylvestre rapum. Rapum satium caule & foliis raphano simile est: floribus verò & siliquis, in quibus semen profert, Napis aut Brassicis. Sylvestre frutex est cubitali altitudine, ramosum, in summo leue, folia nimium leuia habens digitali latitudine, aut maiora. Semen in calyculatis fert siliquis: dehiscentibus verò seminum involucris, alia intus capitum specie est siliqua, in qua semina parua nigra sunt, sed quae fracta intus albicent. Flos eius in purpureum vergit colore. Radix digitalis ferè est. Quae delineatio prorsus alludit ad hanc herbam quam vulgus Rapunculum nominat: siquidem cubitalis est, fruticosa, ramosa, folio digitali, nigro in siliquis semine, quod cum frangitur album intus apparet. Flos etiã purpurei coloris est, radixq; digitimagna ex parte magnitudine constat.

LOCVS.

Satium

Satiuum solum putre & solutum desiderat. Syluestre in aruis nascitur passim.

TEMPVS.

Satiuum rapum floret æstate, ac siliquatur subinde. Syluestre autem verno quidẽ tempore priusquam in caulem attollitur, acetariis frequenter inscri solet, erutum radicitus cum foliis suis iam recens enatis, quo sanè tempore à pueris etiam agnoscitur. Deinceps verò exit in caule & adolescit, ac Iunio mense flores, ac subinde semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Rapa calida sunt in secundo ordine, & humida in primo.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Satini rapæ elixa radix nutrit, inflat, carnem flaccidam generat, venerem stimulat. Decocto eius podagra ac perniones fountur. Ipsa etiam radix trita illita prodest. Si verò quispiam in excanata radice rosaceum ceratum feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eduntur cienda vrina accommodi. Semen in antidota & theriaca, præsertim quæ dolores mitigare possunt, aptè additur. Potum venenis aduersatur. Venerẽ concitat. Muria conditũ, comestum minus nutrit, sed appetentiam excitat. Syluestre rapum miscetur medicamentis quæ ad detergendam faciem reliquumq; corpus, ex lupinorum, aut tritici, aut lolii, aut erui farina conficiuntur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Rapi semen venerem excitat, utpote spiritum fluctuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatque & semen generat. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoque si quis ultra modum esitauerit, & maximè si perfectè conficere eam nequeat, crudum succum in venis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpeffa. Sin crudior ingeratur, concoctioni pertinacius resistet, pariet inflationes, & stomachum infestabit, nonnunquam etiam mordere illum non verebitur.

EX PLINIO.

Rapo vis medica inest. Perniones feruens impostum sanat. Item frigus pellit è pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuicunque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, contra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis vero antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ipsum abdicauit in cibis propter inflationes. Diocles magnis laudibus extulit, etiam venerè stimulari ab eo professus. Item Dionysius: magisq; si cruca condiretur. Tosta quoque articulorum dolori cum adipe prodest. Syluestri ad leuigandam albicandamve cutem in facie totòque corpore, utitur

tur mixta, vrina pari mensura. Eius succus circa messem exceptus, oculos purgat, medetur caliginē admixto lacte mulierum.

EX SIMEONE SETHI.

Admodum nutriunt rapa, vrinam ciunt, inflāt, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum vsus crassum humore generat, et obstructions iecoris parit. Ventrē nec sistūt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum & haustū magna copia, venerem suscitāt. Fertur quod si quis hoc ipsum semen cum Calamintha & Lemnia terra commixtū sumat, eo die neque veneno, neq; morsu venenati animalis ladi. Appensum inguinū morbis peculiari quapiam proprietate medetur.

DE GINGIDIO. CAP. LXXVIII.

NOMINA.

Γγγιδιον Græcè, Gingidium Latine, officinū Chærefolium, germanicè Kerbelkraut (Gallicè Du cerfueil) dicitur. Chærefolium autē, Græca voce & Latina coalescentibus in vnum nomen, ob id dictum est, quod foliis luxuriat. Ne tamē vocabulorum vicinitas aliquam pariat confusionem, imperitōque lectori nomēclationum similitudo imponat, sciendum est officinarum Chærefolium diuersum esse à Chærefolio Plinii.

FORMA.

Herba est syluestri l'astinacæ similis, tenuior tā-

PLANTARVM HISTORIAE

tum & amarior. Radicula subcandida, amaricante. Vnde satis liquet herbam quam hodie Chærefolium nominant, esse Gingidium. Nam erratica Pastinace folium emulatur, aliquanto tenuius, radícula subalba, amaricante, floribus candidis, semine in siliquis exiguis oblongo, angusto & acuminato.

LOCVS.

Passim hodie in hortis colitur.

TEMPVS.

Maior mense floret, & subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Sicut gustu amaritudinem & adstrictionē præfert, sic temperamento quoque ipso caliditatem & frigiditatem. Secundum verò vtranque qualitatem desiccatorium in secundo ordine est: vnde iterum colligi potest, Chærefolium esse Gingidium, quod ipsum gustui amarorem & adstrictionem euidentissimè repræsentet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Crudum & coctum olerum modo esui idoneum est. Editur etiam sale conditum seruatumve. Stomacho vtile. Vrinam ciet. Decoctum eius cum vino potum, vesica accommodum est.

EX GALENO.

Estur Scandicis modo. Stomacho mirè vtile siue crudum, siue elixum libeat sumere. Longioris decoctionis impatiens est. Nonnulli ipsum ex garo oleoque esitant. Alii vinum aut acetum adiiciunt, ac multo

multo sic magis stomacho cōducit. Cū aceto assumptum, fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum verò est hanc herbam medicamentū magis esse quàm cibum, quippe quæ & adstrictionis & amaritudinis non obscuræ nec exiguæ particeps est.

EX PLINIO.

Coctum crudūque stomachi magna utilitate estur. Siccat enim ex alto omnes humores eius.

APPENDIX.

Facultates iam commemoratas etiam Chareso suo tribuunt recentiores: scribunt enim mirificè conferre ventriculo, ciendisq; mensibus, & vrinæ in vino decoctum, vt iterum hinc constet à Ginegidio non esse diuersum.

DE GENISTA. CAP. LXXIX.

NOMINA.

GENISTA latinis rei rusticæ scriptoribus & Plinio nominatur. Officinis & barbaram sectantibus medicinam, Genesta & Genestra. Germanis Ginſt vel Genist (Gallicè Du Genet) apud Genista pellatur. Genistam autem vocat haud dubiè quod vnde diu genu modo flexilis ad nexus sit: vel, vt aliis placet, etia, quia genibus medeatur dolentibus. Alia autem est Genista à Sparto, quod hoc virgas habeat longas sine fo- nō est ea- liis, vt suo dicemus loco, illa autem minutis foliis dem cum scatet.

FORMA.

Sparto.

Genista fruticat ramis herbaceis, scabris, foliis mi-
nutis

PLANTARVM HISTORIAE

in montibus scatentibus, flore luteo, apibusque gratissimo, semine lenticulis haud absimili, quod siliquis innascitur, radice sublutca.

LOCVS.

Per arida loca amat, ideoque in syluis & iuxta sylvas nascitur. TEMPVS.

Floret Maio et Iunio mense, ac subinde in siliquis hirsutis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccat in altero ordine, id quod amaritudo quam gustata refert, & eius facultates abunde docent.

VIRE. EX PLINIO.

Semen Genistae purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota in aqua mulsa cyathis quatuor ieiunis. Ramis similiter cum fronte in aceto maceratis pluribus diebus & tussis, succum dant ischiadicis utilem, cyathi vnius potu. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere clystere. Perunguntur eodem succo ischiadici, addito oleo. Quidam ad straguriam vtuntur semine. Genista tusa cum axungia, genua dolentia sanat.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis verbis perspicuum omnibus fit, Sparto & Genistae, non obstante quod forma non nihil distet candem inesse facultatem: vt enim Spartum pituitam per superna & inferna purgare potest, sic etiam Genista. Hinc adeo fit vt eius seminis hodierno

hodierno tempore contra podagram magnus sit vsus. Vrinā etiam amaritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidē tum in renibus, tum in vesica cōfringere, vt etiam recentiores tradunt, potest. Strumas denique atque alios tumores discutere posse iidem scribunt.

DE GENISTELLA. CAP. LXXX.

Genistella nobis frequens.

NOMINA.

PRiori non admodum dissimilem herbam nō Genistella nulli Genistellam vocant, quōd scilicet Genista exilior et humilior sit. Germanicē appellari potest, die stechende Ginſt. Alii vocant Erdpfrymē, oder klein streichblumen (Gallicē petit Genet) Sunt qui non sine magno errore pro Genista vtantur, quum facultatibus diuersis prädita sit. Rosmari. Sunt qui rosmarinum aculeatum nominent, quōd nus aculeus eius folia Rosmarino ferē similia sint. leatus.

FORMA.

Frutex est Libanotidis coronarie, quā Rosmarinum vocant, penē folio, sed rigido ac pungente, flore luteo, piso non dissimili. semine in exiguis filiis quis rufis, radice sublutea.

LOCVS.

Nascitur in arenosis locis, secus vias.

TEMPVS.

Maio mense flores luteos producit, quibus pastae apes improbum mel conficiunt.

PLANTARVM HISTORIAE
TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatē possidet, ac proinde valenter, simulq; citra mordicitatem exiccantem. VIRES.

Semen eius serpentibus aduersari tradunt. Decoctum foliorum, pro fluxuum mensruorum sistit. Idem etiam potum ventris fluori succurrit. Et ut rem in pauca contraham, idē Genistella, quod Hippuris seu Cauda equina potest.

DE GNAPHALIO. CAP. lxxxi.
NOMINA.

Cētūculū. Γενήλιον græcis, Centunculum aut Centum Centuncu- I- cularis herba latinis nominatur. Officinis igitur herba nota. Germanis Rhuikraut appellatur. Gnaphalium verò vocata est hæc herba, Galeno autore, à candidis mollibúsque eius foliis, quibus ἀπὸ τῶν
Gnapha- φάλλον hoc est, pro tomentis vtuntur. Gnaphalion
lium quia itaque dicitur, quasi tomentitia. Centunculum autem dictū. tem dixerunt, quod cetonibus cum tomento maxime
Centuncu ma sit cognatio. Germanicam nomenclaturam ab
lus cur vo eius facultate aduersus dysenteriam illi inditam
eata. esse nemini non notum est.

GENERA.

Duūm esse videtur generum: vnum enim paulò latioribus ac candidioribus foliis constat: alterum verò tenuioribus & minus candidis, quòdque flores in summitate ac cacumine tantum profert. Verum cum forma parum admodum, facultatibus verò

verò nihil distent, nos vna pictura genus vtrun-
que complexi sumus. **FORMA.**

Candida & mollia Gnaphalium obtinet folia,
atque adeò tomentitia, florisque luteos, radicem
vero capillatam actenuem, vt pictura ipsa mon-
strat. **LOCVS.**

Vulgaris herba vbique scatens Gnaphalium, in
locis siccis potissimum, interdum etiam pinguibus
proueniens. **TEMPVS.**

Iunio & Iulio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit atque adeò exiecat Gnaphalium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Gnaphalii foliis aliqui pro tomento vniuntur. Ta-
men faciunt hæc ipsa in austero vino pota ad dys-
enteriam.

EX GALENO.

Folia Gnaphalii mediocriter adstringunt, ac
proinde quidam id exhibent ex austerorum vino-
rum quopiam dysentericis.

EX PLINIO.

Datur in vino austero ad dysenteriam, ventris so-
lutiones, mensesq; mulierum sistit. Infunditur au-
tem tenasmo. Illinitur & putrescentibus vlcerum.

DE DIPSAO. CAP. LXXXII.

Dipsacus satius & erraticus nobis est.

NOMINA.

αἰ-ῖ-ανος

PLANTARVM HISTORIAE

Virga pa-
storis.

Δ ἰξνος Græcis, Labrum veneris, Carduus
veneris Latinis, Virga pastoris officinus, &
Cardo fullonū dicitur. Germanis Kartendiste l

Dipsacus
unde di-
cta.

Bubenstrel, Vueberkarten (Gallicè Chardon
à carder, Alūs Verge à Bergier, ou Chardon
à Foullon) Dipsaci autem nomen à contrario in-
uenit, quoniam concavo alarum sinu rorem vel im-
brem recipiat, quo velut ad abigēdas sitis iniurias
abutitur. Labri veneris nomenclationem à carinas

Labrū ve-
neris.

to foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa
sinuantia ambage, peluis vel lauacri speciem con-
stituunt, & intra se humorem nunquam non reti-

Virga pa-
storis.

nent. Virga pastoris haud dubiè dicta est, ob lon-
gas virgas, quibus caidui ad poliendos pannos uti-
les insident, quas pastores fortè sumunt, & ea par-
te qua possit manu capi aculeis nudāt, reliqua au-

Carduus
fullonius.

tem aculeata parte gregem ducunt. Carduus verò
fullonius cœpit appellari, quòd ea rudes pannos ve-
lut echino quadam expoliunt, detractisque floccis

Serapiōis
interpre-
perstringi
tur.

concinnaūt. Errat mirum in modum Serapionis in-
terpres, qui sub Virgæ pastoris nomine, Polygonon
Dioscoridis delineat. **GENERA.**

Duū est generum. Vnum quod à fullonibus in
hortis plātatur, alterū quod sua sponte passim pro-
uenit. Differunt inter se hac quidem ratione, quòd
primum folia latiora & profundius in ambitu in-
cisa, flores candidos, echinataq; capitula magis a-
culeata habeat: alterum contrā angustiora & mi-

nis laciniata folia, flores purpureos, capitulaq; minus aculeata obtinet. Nos discriminis illius ratione habentes, primi generis appellauimus *Dipsacum album*, alterius verò *Dipsacum purpureum*, ad forum nimirum respicientes diuersitatem.

FORMA.

Aculeatarum generis est hæc herba. Caulem habet altum, spinis horrentem, folia caulem amplectentia, lactuce similia, in singulis geniculis bina, oblonga, aculeis armata, quæ in dorso medio veluti bullas intus & extrâ spinosas habent, concauo quo se in geniculis cõiungunt sinu, quo aquæ, rores, et imbres asseruatur, vnde *Dipsaci* quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singulis surculis capitulum vnum echino simile inest, oblongum, aculeatum, quod postquam exaruerit candidum apparet. Dissectum per mediam medullam caput, vermiculos habet. Quod si itaque contempleris eam quæ herbarii hodie *Virgam pastoris* & *Carduum fulgonum* nominant herbam, offendes omnes huic notas respondere. Siquidem hæc pastoria virga profert caulem binum cubitorum, imò qui sæpiusculè supra hominis altitudinem increseat, spinis horridum, geniculatum, folia lactuce, in singulis geniculis bina, prælonga, aculeata, quorum toruli bullantibus turgent spinis, dorsoq; nocentibus aculeis rigent, carinato alarum sinu, qui peluis vel labri modo roris & imbris pluuii capax sit. Gnare la-

PLANTARVM HISTORIAE

tici huius auicula, cum solis ardentissimus opprimat aestus, huc appellantur ad satianda sitis desideria, illis facta bibendi potestate anfractu liberalem potum ministrante. Scaporum fastigia echinato minatur vertice, resupina hamulorum flexura, mucronibusq; leuiter vncinatis, quibus rude lanificium aspero ductu leuigatur. Singuli echini è rotundo in oblongum quod antenus turbinantur, inter quorum spicula candicans aut purpureus emicat flos. His dissectis in medullo vermiculos idētidem nobis in autumno quum exiccare incipit, licet inuenire. Vermiculi in echinulus autem albus est, qui per cavitatem echini dinis Dipsa mouetur, & in caudicem transit. Hyeme etiā cum ei inuenti. dem videre licebit antequā prae frigore moriatur, Imò etiā veris initio in quibusdam vermiculi à nobis reperti sunt, partim viui, partim mortui.

LOCVS.

Nascitur humectis locis, iuxta riuos aquarum & fontes: quapropter nonnulli Dipsacon à Grecis nominatum esse arbitrantur.

TEMPVS.

Carpitur in aestate, Iunio & Iulio potissimum mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Dipsaci spinæ radix ex secundo ordine exiccantium est, habetq; nonnihil absterforium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius radix cum vino decocta & tusa vsq; discerati

cerati crassitudine accipiat, imposita rimas fistulasq; sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc et rea pixide recondere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi & collo aut brachio appesi, quartanas sanare produuntur. EX PLINIO.

Sanat rimas sedis, item fistulas decocta in vino radice usq; dum sit crassitudo cere, ut possit in fistulam mitti. Item verrucas omnium generum. Quidam & alarum, quas modo diximus, succum in illinunt.

APPENDIX.

Aliæ facultates quæ à Serapionis interprete & aliis recentioribus illi conceduntur, non sunt genuinæ, sed spuria, & Polygono adscribenda.

DE DAPHNOIDE. CAP. LXXXIII.

NOMINA.

ΔΑΦΝΟΙΔΗΣ græcè, Daphnoides latinè nominatur, officinis & nostræ ætatis herbariis, græcam imitantibus vocem, Laureola. Germanis zeilant, & zeidelpast (Gallicè de la Laureolle) nuncupatur. Daphnoides autem & Laureola, à Lauri forma & specie, quam in foliis & fructu refert, dicta est.

Laureola.

Daphnoides unde dicta.

FORMA.

Frutex est cubitalis, ramos coplures habens lori instar flexiles, à medio sursum versus foliosos. Cortex ramos vestiens admodum glutinosus lentusque est. Folia Lauro similia, molliora tamen, tenuiora, nec facis

PLANTARVM HISTORIAE

lè fragilia, os & fauces erodentia, incendentiâque.
Flores candidi. Fructus ubi ematuruerit subniger.
Radix inutilis. Quae in vniuersum omnes notae
Laureola hodie dicta conueniunt. Nec obstat quòd
Obiectio = Dioscorides suae Daphnoidi candidos tribuat flo-
res dissolutes, cum Laureola purpurascens potius habeat:
tio. solet enim color secundum diuersas regiones in ea-
dè saepe herba mutari, vt fusius in Symphyto ma-
iore dicemus. Et certè nihil incommodi erit si e-
tiam Laureola flores quispiam candidos dixerit,
cum albi coloris non minor quàm purpurei in iis
portio reluceat. Verisimile quoque est Dioscoridem
ab extremo potius colore, quàm medio flores ap-
pellare voluisse.

LOCVS.

Nascitur in montanis & syluestribus locis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere antequàm folia erumpant.
Fructum autem autumno profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida est admodum & sicca.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ducit per inferna pituitosa siccum aut recens
Daphnoidis folium, Vomitus & menses cit. Com-
manducatum capitis pituitas elicit. Sternutamen-
ta itidem mouet. Purgant etiam seminis eius pota-
grana quindecim.

EX PLINIO.

Daphnoia

Daphnoides siue syluestris laurus aliu soluit, recenti folio vel arido drachmis tribus cum sale & hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus. Stomacho inutile. Sic & bacca quina de aere purgationis causa sumuntur.

APPENDIX.

Animaduertendum hoc loco mirum in modum Officinas errare officinas, propterea quod foliis Daphnoidis r̃ error. pro Mexcreon, quæ tamen Græcorum est Chamaelea diuersa admodum à Daphnoide, vtantur: & eius fructu pro cocco cnidio, quod fructum Thymelea esse notius est quàm vt demonstrari debeat. Sic in manifestissimis cacutire solent officinae, pulchre interim ad eos errores conuiuentibus medicis, non minus quàm illi, rei herbaria imperitis. Thymelea verò nō esse laureolam hodie appellatam lea nō est herbā, ex eo colligi potest, quod hæc ipsa, Dioscoride autore, linum nonnullis nominata sit, non alia quidem ratione, quàm quod satini lini similitudinem referat, cui quàm dissimilis laureola sit, nemo non nouit. Sunt etiam qui ad hanc similitudinem respicientes, in hodiernum vsque diem linum syluestre appellant.

DE DRYI. CAP. LXXXIIII.

NOMINA.

Δρῦς Græcis, Quercus Latinis & officinis, Germanis Eychenbaum (Galliæ Vng Cheine) appellatur.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Notissima est arbor *Quercus*, procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, foliis profundè lacinjatis. Glandes producit optimas, & grādisimas, gallas item & viscum. Radix eius latissimè circumiacentem terram amplectitur.

LOCVS.

Passim in syluis aliūq; locis nascitur.

TEMPVS.

Vere quidem germinat, sed tardius multis aliis arboribus.

TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, adstringit & excalfacit paulò infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Quercus omnis adstrictoriam facultatem habet, præsertim id quod inter corticem & caudicem membranæ simile clauditur: quinetiam membrana putamini glandis subiecta, Decoctū ex iis datur dysentericis & sanguinem excreantibus, & in pestis tritum cōtra fluxiones mulierum apponitur. Glandes idem possunt. Vrinam ciūt, capitis dolorem, & flatus comestæ pariunt. Resistunt esitata venenatorum ictibus. Decoctum corticis cum lacte bubulo potum, contra toxica prodest. Crudæ autem tritæ & illæ inflammationes leniunt. Ad malignas duritias, & malefica vlcera cum adipe suillo salso cōueniunt. Galla fructus est *quercus*. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, præ se ferēs formam

in digitis articulorum, solida, nullo foramine per-
 nia. Altera levis, plana, perforata. Eligi debet om-
 phacitis quæ efficacior est. Vtraque vehementer
 adstringit. Carnium excrescentias trita, fluxiones
 gingivarum & columellæ, atque in ore aphthas re-
 primunt. Nucleus earum cauernis dētiū inditus,
 dolores sedat. Cremata carbonibus donec igne fla-
 grent, & vino aut aceto, aut oxalme extinctæ, san-
 guinem reprimunt. Decoctum earū ad inſessus vti-
 le, contra vuluæ prociſidētias, fluxionēſque. Capillos
 denigrant aceto aut aqua macerata. Cœliaci, dys-
 enterici, cum vino aut aqua trita cōuenienter illi-
 nuntur aut bibuntur. Vtiles & obſoniis mixtæ, aut
 integræ in aqua præcoctæ, in qua aliquid coquenda-
 dum ſit quod ipsis conferat. In ſumma Galla vten-
 dum quoties opus eſt adſtrictione & exiccatione.

EX GALENO.

Quercus oēs partes adſtrictoriæ facultatis par-
 ticipes ſunt: Sed plus tamen quæ in trunci cortice
 membrana ſubest, tum quæ ſub glandis putamine,
 ea videlicet quæ fructus carnem conneſcit. Quam-
 obrem ad fluxum muliebrem, ſanguinis expulſionēſ-
 que, ventriſq; diuturnos fluxus, commodā eſſe cre-
 dunt. Maximè verò ea vtuntur decoctæ. Siquidem
 ego quandoque glutinaſſe me vulnus memini ſecu-
 ri inſiſtum, quum nullum ad manū eſſet medica-
 mētum præter ipſius Quercus folia. Terebam ve-
 rò in leui ſaxo, & vulnus cum circumiacētibus lo-

PLANTARVM HISTORIAE

cis illinebam. Eandem foliis vim habet & fructus Quercus, eoque medici nonnulli ad incipientes, & crescentes phlegmonas vtuntur. Nam quæ iam vehementes sunt, adstringentibus haud indigent. Galla quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbū est medicamentum, plurimum terrena & frigida substantiæ particeps, per quā desiccatur & reprimat fluxiones: adhuc constringit contrahitque partes laxas ac lāguidas, omnibūque fluxionum affectibus strenuē resistit. Esto verò tertij in desiccando, secundij autem in refrigerando ordinis. Altera autē galla, flaua, laxa, & magna, exiccat quidē etiā ipsa, sed tanto, quanto acerbæ qualitatis minus est particeps. Cocta itaque ipsa per se, ac deinde trita, cataplasma nō instrenuum est sedis phlegmonarum, ac procidentiarum. Porro coquenda est in aqua, si modica opus sit adstrictione: sin vehemētiore, in vino. Et si augere insuper adstrictionē sit opus, vino etiā vtare austeriore. Denique gallæ combustæ sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirū

Vsta acri etiam calorem & acrimoniā ex vstione assumunt, moniā as- suntq; iis quæ ignem non expertæ fuerint, tum subsumunt. tiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Ceterum quum ad sanguinis suppressionē præparare eas voles, carbonibus impositas dū vndequaq; candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

EX SIMEONE SETHI.


Glādes difficilis sunt coctionis, & valde nutriūt, tardius

tardius descendunt, crudosque humores generant,
proptereaq; illarum vsum deuitari precipimus.

DE DAUCO. CAP. LXXXV.

Dauci primum genus nobis tantum frequens.

NOMINA.

 *Αὔκος* Græcè, *Daucus* Latine nominatur.
Officina alijs & adulterinis herbis sub hoc nomine vtuntur. Germanicas appellationes in generum explicatione indicabimus.

GENERA.

Dioscorides tria *Dauci* commemorat genera. Primum *Creticū daucū* vocat. Germanis *Beruurtz*, (*Gallice* *Carotte sauage*, ou *panet sauage*) propter capillatam radicem, aut quia vteri dolorē, *Beruurtz* qui iisdem *Bermuter* appellatur, sanat. Alterum cur dicta nomine peculiari caret, folijs *Laserpitio* simile, Germanis *Vuei z Hirtzuurtz* dicitur. Tertium genus itidem nomine destituitur proprio, Germanis autem nonnullis *schuuartze Hirtzuurtz* (*Gallice* *Ces deux autres, les herbiers appellent asiniani daucum*) nominatur.

FORMA.

Creticus daucus folia *Feniculo* similia habet, *Creticus* minora tamen & tenuiora. Caulem dodrantalem, *daucus*. *umbellam Coriandro* similem. Flores candidos, & post hos semen acre, candidum, hirsutum, & in comanducando odoratum. Radicem crassitudine digitali,

PLANTARVM HISTORIAE

gitali, & longitudine dodrāali. Omnes huius descriptionis note, herba quam Beruutz Germani vocant conuenire ad vnguem videntur, vna duntaxat excepta: siquidē semen non est hirsutum. Sed quum omnia alia, atque adeò facultates etiam ipsae respondeant, non est cur vna hac nota nos impediat, cur minus Creticum daucum credamus, aut saltem Germanicum qui Cretico per omnia respondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quae diximus, dicat planè hanc herbam esse Seseli Creticum, cuius etiam herbae nota omnes huic nostrae conueniunt, neque etiā facultates quas similes Dauco cretico habet, discrepant. Alterum Apio syluestri, vel, vt antea diximus, Laserpitio simile est: aromatum modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens. Tertium foliis Coriandro assimilatur, flore candido, capite & semine Anethi, in quo umbella erratica. Pastinaca similis est, semine oblongo plenum, sapore vt Cuminum acri.

LOCVS.

Primum in petrosis & apricis locis nascitur, nusquam verò in Germania copiosius quam in Martiana sylua quibusdam pratis prouenit. Reliqua duo genera in altis montibus gignuntur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Semen Danci admodum calefacit & exiccat.

Idem.

Idem etiam, sed minori efficacia, facit herba.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium Daucorum semen calefaciēdi vim obtinet. Potum menses, fetus, & vrinas mouet. Torminibus liberat. Tusses diutinas lenit. Succurrit phalāgiorum morfibz cum vino potum. Oedemata illitum discutit. Ex aliis seminis tātum vsus est, ex Cretico radicis etiam, quæ cum vino præsertim ad venenata bibitur.

EX GALENO.

Dauci semen, efficax admodum tum mouenda vrinae medicamentum, tum prouocandis mensibus. Multum etiam discutere foris impositum valet. Ipsa etiam herba eandem vim obtinet, semine tamen inferiorem, nimirum ob aqueæ humiditatis misturam.

EX PLINIO.

Vehementer vrinam impellit. Creticum magis contra serpētes pollet. Bibitur è vino drachma vna, datur & quadrupedibus percussis, aduersatur phalangio, capitis dolori medetur, tussi subuenit, stranguria medetur drachma seminis. Eius radix in vino pota, dysenteriam sistit. Contusis & euersis portū duobus obolis in mulsi cyathis tribus subuenit, aut si febris adsit, in aqua mulsa. Menses & secundas potum facilius pellit. Calculos eiicit. Folia omnia tela infixæ corpori extrahunt.

DE DRACONTIO. MAGNO.

PLANTARVM HISTORIAE

CAPVT LXXXVI.

Dracunculus serpentaria vulgò.

NOMINA.

ΔΡΑΚΟΥΝΤΙΑ ΜΕΓΑΛΗ, ἢ ΔΡΑΚΟΥΝΤΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ
 Græcis, Dracunculus maior Latinus, nonnulli

Serpentaria maior dicitur. Officinis ignota heraria maior ba. Germani Schlangenkraut (Galli Serpentaria Dracuncus, ou Serpentine) vocant. Nomen autem à filiis unde gura sumpsit: caulis enim glaber, purpureis que res dicta. spersus lituris, versicolori facie, corpus anguinum

repræsentat & æquat longitudine. Vertex quoque sinuoso oris hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. Atque hinc est quòd veteribus etiã

Colubris Romanis Colubrina ac Serpentaria nuncupata sit: na. vel sic dicta, Plinio autore, quòd è terra ad primas serpentium vernationes exeat, rursusq; cum iisdem se in terram recondat, nec omnino occultata ea appareat serpens.

FORMA.

Caulem habet glabrum leuissimq; rectum, bicubitalem, baculi crassitudine, versicolorem, vt anguis similis videatur, purpureis etiam maculis abundat. Folia fert Rumicis inflexa, & plicata. Fractum in summo caule racemosum, coloris inter initia cineracei, postea quàm maturuit crocei & punicei. Radicem grandem, rotundam, candidam, tenui cortice vestitã. Ex qua delineatione omnibus perspicuum sit, plantam eam cuius picturam exhibemus,

mus, esse Dracunculum maiorem. Simplici enim caule attollitur, binum cubitum alto, laui glabrò & recto, baculi crassitudine, versicoloribus anguim maculis variegato, purpureis etiã intercurrentibus lituris, ita vt planè serpentis habitum coloremq; mentiri videatur. In vertice comoso folia prodeunt sena septenave, crassiore pediculo digitorum modo propèdientia, puniceis respersa notis, Rumicis primi generis figura. E foliato scapi fastigio, vagina quedã foris herbacea prosilit, in mucronem sensim turbis nata, velut erupturi partus involucrium, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distenta dissilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensque perit relicto cornu. Cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis primo vircentibus, dein croceo & puniceo colore rutilantibus. Radix denique magna, rotunda, alba, tenuique cortice vestita. Et in summa, nulla est prorsus nota, quæ reclamare videatur.

LOCVS.

Nascitur in opacis sepibus.

TEMPVS.

Carpitur semen cum maturitate nigrescit. Radix per messem effoditur, hoc est, Iulio mense, aut initio Augusti.

TEMPERAMENTVM.

Dracunculus acris & amarus est, leniculamque
quãdam

PLANTARVM HISTORIAE

quandam adstrictionem habet, vt calidam & siccam esse nullus dubitare possit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radix calefaciendi vim obtinet. Tosta & elixa cum melle delicta orthopnoicis, ruptis, cōuulsis, tussibus, & destillationibus prodest. Pota cum vino venerem stimulat. Concisa & ex melle illita, vlcera maligna atque phagedanica expurgat, praesertim cum vite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas, & fletus euocandos componuntur. Ad vitis liginēs cum melle efficaciter illinitur. Polypos & carcinomata absumit. Succus eius ad oculorū medicamenta, item contra nubeculas, albugines, caliginemq; utilis est. Odor herba radicisq; recens conceptos abortu vitiat. Idem praestant triginta grana eius in posca pota. Sunt qui eius succum cum oleo aurium do'oribus insudere. Quinetiam folia eius, vt pote adstringentia, vulneribus recentibus imponere, in vino autem cocta permionibus. Ferunt non feriri à vipera eos qui folia manibus affricuerint, aut radicem gestauerint.

EX GALENO.

Dracuntium quiddam Aro persimile habet, tum foliis, tum radice. Acre etiam est & amarum, tenuiumq; partium. Obtinet quoque leuem quādam adstrictionem, quā quandoquidem cum praedictis duabus qualitatibus, acris scilicet & amara, cōiuncta est, medicamentum factum est, vtique maximè
efficax.

efficax. Nam radix viscera omnia expurgat, crassos potissimū & lētos humores extenuās. Optimūq; remedium est cōtumacium vlcerum. Expurgat extergetq; strenuē tum alia quæ extersionem desiderāt, tum albos cum aceto. Folia quoque, vtpote similem facultatē habentia, vlceribus, vulneribsq; recens inflictis accommoda sunt, & quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant: nam quæ sicciora sunt, viribus sunt acrioribus quā vt vlcneribus cōueniant. Creditum est cascum humidum si illis foris tectus reponatur, ob tēperatura illorum siccitatem, à putredine cōseruari. Fructus valētior est, non foliis tantum, sed & radice: proinde & cācros, & polypodas eliquare creditus est. Succus quoque eius vitia oculorū expurgat. Dracōtū radicem hū tērvē elixā, quo omnem exuat medicamētosam vim, in cibo interdum Ari modo exhibemus, quum crassi ac glutinosi thoracem pulmōnemq; infestantes humores fortiore vi expellendi veniunt.

EX PLINIO.

Omnino habentem Dracunculum serpentes fugiunt. Ideo percussus prodesse in potu maiore aiūt: vt & menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus eius & aurium dolori prodest. Reliquas facultates in Ari descriptione offēdes. Videntur enim veteres Arum cum Dracunculo minori miscuisse.

APPENDIX.

Hæc est vera Serpentaria quo officinis vtedum

PLANTARVM HISTORIAE

erit, & minimè ea quam alio nomine Bisortam vocant. Nam viribus planè ab ea qua genuina est dissidet, vt suo etiam loco monuimus. Quare non est cur deinceps eandem medicamentis qua thoraci expurgando adhibentur admisceat medici, sed hæc potius, cuius picturam oculis subiicimus.

DE DAPHNE ALEXANDRINA.

CAP. LXXXVII.

Laurus Alexandrina bislingua & bonifacia, mihi ex Germania delata visa est qualis hic pingitur.

NOMINA.

ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ἢ Ἰδαία grecis: Laurus Alexandrina, aut Ideā latinis, officinis.

Vuularia Vuularia, nonnullis Bonifacia, multis etiā Pagana. **Epiphyl-** lingua, Germanis zapflinkraut, hauck aut, & **locarpos.** auffenblatt dicitur. Theophrastus appellat **Ἰω-
Alexan-** Φυλλόκαρπον, quod fructum super foliis ferat. **drina lau** Alexandrinam: autem laurum dictam putamus, **rus cur di** quod Alexander victor ea usus fuerit. Hinc est **sta.** quod Apulcius hanc victorialam nominet, quod **Victoria-** nimirum victores ea pro Lauro in triumphis & vi- **la. Ideā.** ctorie signum uterentur: quanquam in eo capite Daphnoidu cum Victoriala confundat. Ideā verò ab Ida monte, quo in loco speciosior & copiosior nascatur.

FORMA.

Folia Rusco seu Myrio sylvestri similia habet, maiora

maiora tamen molliora & candidiora. Fructum in medijs folijs fert rubentem, Ciceris magnitudinis. Ramos spargit à terra dodrantaes, & aliquando ampliores. Radicem Rusco similem, maiorem tamen, odoratam: & molliorem. Ex qua sanè delinitione satis perspicuum fit, eam herbam cuius pecturam damus, esse Laurum Alexandrinam. Folio siquidem Myrti sylvestris, sed ut Plinius lib. xv. cap. xxx. ait, acutior, mollior, & candidior, fructu inter folia rubro, magnitudine Ciceris, ramulis à terra sparsis dodrantalibus, radice sylvestri, Myrto proxima, odorata & molli.

LOCVS.

Nascitur in locis montanis, & in Ida monte, ut comprehensum est, speciosissima. Nunc adfertur ex inferiore Pannonia, atque in nonnullis hortis plantata provenit.

TEMPVS.

Fructum in aestate in medio folij, in geniculo alterius folij quod maiori supernascitur profert.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod gustus euidenter monstrat. Siquidem gustatibus acris simul & subamara est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius pota pondere senum drachmarum cum dulci vino, difficulter parientibus, & stillicidio vrine laborantibus succurrit. Sanguinem quoque menstruum elicit.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Potatum urinas, tum menses prolicit.

EX PLINIO.

Celeres partus facit, radice pota trium denariorum pondere, in vini dulci cyathis tribus. Secundas etiam pellit mensesq; eodem modo pota.

APPENDIX.

Recentiores in faucium vlceribus, & humecta supra modum columella vtuntur. Hinc est quod nonnulli appendant hanc herbam pueris, vt nimia illorum humiditas exiccetur.

DE EPHEMERO NON LETALI.

CAP. LXXXVIII.

Ephemerum non lethale quod nonnulli Hemerocalles, alij Liliū cōuallium, alij grand Muguet dicunt.

NOMINA.

Eφμερον, ἢ ἱρίς ἀγρία Græcis, Ephemeron, Iris syluestris Latinis dicitur. Cū autem Galenus, Paulo, & Dioscoride testibus, duo sint Ephemerū duo generis genera, alterum, quod Colchicon à natali solo dicitur, interficiens, de quo suo loco plura: alterum quod non letale est, & præcipuo nomine Ephemerum dicitur, hic de secundo, nempe non interficiente, nobis sermo duntaxat erit. Ephemerum autem cur nominatum est, non quod eadem die ingulet (nulla enim ei vis mortifera inest) sed quod flos illius confestim marcescat, nec longius vno & altero die cōmoretur.

moretur. Vulgus & officinae Liliū conuallium, Liliū con-
quod in opacis & lucis nascatur, appellant. Geruallium.
mani May enblumle (Gallicè du Muguet.)

FORMA.

Caulē & folia Lilio similia habet, tenuiora
tamen. Flores candidos amarosque. Fructum mol-
lem. Radicē vnā digitali crassitudine, longā,
adstringentem, odoratā. Quae siquidem delineā-
tio ita herbae illi quam vulgus Liliū conuallium
nominat, conuenit, vt nulla prorsus in ea sit nota,
quae ei non respondeat. Caulē enim & folia Liliū
habet, sed tenuiora. Flores candidos & suauiter os-
lentes, gustu amaro. Fructum mollem, colore puni-
ceum, asparagi fructui non dissimilem. Radicē
singularem digiti minimi crassitudine, longā, ad-
stringentem & odoratā. Nec obstat quod nūquā Obiectio
aut rarissimè apud nos reperiatur radix quae mi- diluitur.
nimi digiti crassitudinem aequet. Dioscorides enim
cū alicui herbae aut radici mensuram tribuit, id
facit vt maiori parti indiuiduorum illius speciei
quadret, nec adeo statim mensuram assignat, quin
quandoque infra aut supra hanc esse possit. Cui
hoc etiam accedit, quod magnitudo secundum di-
uersas regiones in vna eademque herba saepe va-
riatur, ita vt nihil mirum sit radices nostri Ephes-
meri, paulo quā illius quas Dioscorides vidit,
minores esse.

LOCVS.

r iij

Nascitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

In Maio mense flores illius magna copia erumpunt, ac mox iterum euanescent atque decidunt. Deinde Iulio mense fructus profertur Asparago haud dissimilis, vt dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Mista est temperatura, Galeno teste, nempe repellentis & discutientis, quia scilicet radix adstringit, floresque amari sunt.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius radix in dentium doloribus remedio est, si decocto eius colluuntur. Folia in vino decocta & illita, cedemata & tubercula, quae nihil adhuc puris contraxerunt, discutunt. $\tau\upsilon\omicron\upsilon$ enim & non $\upsilon\pi\omicron\upsilon$ legendum, vt ex Galeno liquet.

EX GALENO.

Ephemerum nō illud letale, quod etiam Colchicum nomināt, sed alterum, quod & Irin agrestem vocāt, folia & caulem Lilio similem obtinet, radicem oblongam, non rotundā ceu Colchicum: digiti autem potissimum crassitudine est, adstringens & boni odoris. Ex quibus palam fit quod mista sit facultatis, nempe repellentis, & halitu digerentis. Testificantur vero id quae particulatim adit opera. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Folia tuberculorum tum augmēto, tum vigori cōgruunt. Oportet autem in vi-

no decocta prius quàm pus moueas illinere.

EX PLINIO.

Radice[m] vnam digiti crassitudine obtinet, dentibus præcipuam concisam in aceto, decoctamque vt tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit, canis & excisis imprimitur.

APPENDIX.

Recentiores roborare cor, iecur, cerebrumq; tradunt. Hinc est quòd eius succum aut decoctum syn-
copa, vertigine, morboq; comitiali correptis, attoni-
tis, & phreneticis exhibeant. Caterum incipienti
elephantia, ne latius serpat, & altius radices agat,
viam præcludere scribunt. Ocularij medici ad oculorum
caligines discutiendas eo etiam vtuntur.

DE ELENIO. CAP. LXXXIX.

Elenium vulgo cum Latinis Enula Cam-
pana.

NOMINA.

EΛΕΥΙΟΝ græcis, Elenium & Inula latinis, offi-
cinis Enula, rusticis Campana, vulgo iunctis Enula cā-
vtrisque vocabulis Enula Campana dicitur. Ger-
manis Alant. Elenium autem ab Helena lachry-
Eleniū vn-
mis, è quibus natum fabulatur, quidam dictum es-
se volunt. Alij quoniam contra serpentes ex eo pri-
mum ab Helena remedium inuentum sit.

FORMA.

Caule[m] ex se mittit Elenium crassum, hirsutū,
cubitale[m], & aliquando maiorem (interdum enim
iustam

PLANTARVM HISTORIAE

istam hominis staturā altitudine aequat) angulosumq; Huic supernè lutei flores insident, & in his semen Verbasco simile, tactu pruritus excitās. Folia angustifolio Verbasco similia obtinet, lanuginosa tantum & oblonga. Radicem subruffam, odoratam, magnam, subacrem, ex qua ad consitionem Liliorum aut Ari instar, pingues propaggines appendicēve auferuntur. Haec siquidem nota Enula cā diluitur. panis vulgo dicta pulchrè quadrant, neque obstat quòd non in cūctis Græcis exemplaribus omnes illa habeātur, cum in nonnullis, iisq; probatissimis

Marcellus saltem legantur. Sic Marcellus Virgilius Florentinus in suis quos edidit in Dioscoridem commentariis testatur, sibi visum esse antiquissimum ac probatissimum codicem, in quo adhuc omnes seruētur. Et certè nihil absurdi committemus, si nonnullas Dioscoridem notas subticuisse dicamus, cum euidentissimum sit Inulam non passim vna forma prædictam nasci, quando, eodem Dioscoride teste, in quibusdam locis caulem haud emittat: in irriguis denique procerior & elegantior, quàm in siccioribus proueniat. Huc accedit quòd aliàs saepe notas etiā admodum necessarias prætermittat.

LOCVS.

Nascitur montanis, vmbrosis, & siccis locis. In hortis etiam passim hodie plantatur.

TEMPVS.

Radix aestate effoditur, & concisa siccatur. Flo-

ret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Elenij radix non primo statim occurſu excaleſcit, ac proinde non dicenda eſt calida & ſicca exaſtè, ceu mel & piper album, ſed cum recrementitio humore.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radiciſ Elenij decoctum potum, vrinã & menſes ducit. Ipſa deniq; in eclegmate cum melle ſumpta, tuſſi, orthopncea, rupturis, conuulſionibus, inſtationibus, venenatorum morſibus prodeſt, caleſcaciendi vi quam in vniverſum habet. Folia eius in vino cocta iſchiadicis vtiliter illinuntur. Radix etiam Elenij in paſſo cõdita, ſtomacho vtilis eſt. Si quidem ſalgamarij paululum ſiccata eam, mox decoctam, frigida aqua demergunt, poſtremo in defrutum coniectam ad uſum recondunt. Ea trita & pota ſanguinem excreantibus auxiliatur.

EX GALENO.

Elenij radix maximè vtilis eſt. Eclegmatiſ quæ faciunt ad educendos lentos & craſſos qui ſunt in thorace & pulmone humores commodè miſcetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis & diuturnis vexatas affectibus, cuiuſmodi ſunt nonnullæ coarum paſſiones iſchiadas vocant, & exigua aſſiduãq; quorundam articulorum præ humiditate luxationes.

EX PLINIO.

Inula

PLANTARVM HISTORIAE

Superstiosum. Inula à ieiunis com manducata dentes cōfirmat, si vt cruta est, terram non attingat. Cōdita iussim emendat. Radici verò decocta succus tineas pel- lit. Siccata autem in vmbra farina tusa, & con- uulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Vene- natorum morsus abigit. Folia ex vīno lumborum dolori illinuntur.

DE EUPATORIO. CAP. XC.

Eupatorum Agrimonia.

NOMINA.

Agrimo-
nia.

Eupato-
rium cur-
dictum.

Hepato-
rium.

Eὐπατόριον, ἡ ἡπατόριον Græcè, Eupato- rium & Hepatorium latinè, officinis Agrimo- nia dicitur. Germanis Odermenig, Bruchvurtz (Gallicè de l'Empatoire, ou aigremoine.) Eu- patoriū ab Eupatore rege, qui illā primus inuenit, nominatā esse volunt. Hepatoriū verò quoniā ieco- ri præcipuè medeatur. **FORMA.**

Fruticosa est herba, vnum, interdum alterum et- tiam scapum efferens, tenuem, lignosum, rectum, ni- grum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem. Fo- lia per intervalla partibus potissimū incisa quin- que, & aliquando pluribus, Quinquesfolii vel Cā- nabis potius foliis similia, nigricantia, & serræ mo- do in extremitatibus incisa. Semen à medio caule enascitur, deorsum inclinatum, hirsutum, adeò vt siccatum vestibus hæreat. Hæ delineationes ada- mußim, nulla reclamāte nota, herba quam vulgus & officina vocant Agrimonia, cōueniunt. Qua- propter

propter hanc verum & genuinum esse Eupator Agrimon-
rium facile deprehendet, qui singulas descriptionis nra est vs
partes diligenter expendet. Siquidem Agrimonia rum Eu-
fruticosa est herba, scapum vnum aut alterum ob- patoriū.
tinens, lignosum, tenuem, rectum, nigricantem, hir-
sutum, cubitalem vel maiusculum. Folia ex inter-
uallis Cannabina aut Quinquefolio similia, quin-
quepartita vel plurifariam incisa, per ambitum
ferrata. E medio caule semen erumpit deorsum spe-
ctans, subhirsutum, vt resiccatum vestibus adhae-
rescat. Proinde praefracta quadam ac immedicabi-
li cecitate captos esse eos iudico, qui hoc ipsum ho-
die nō animaduertunt.

LOCVS.

Nascitur passim locis montosis, campestribus co-
tiam, pratis nempe, & circa sepes.

TEMPVS.

Carpitur in aestate, dum floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Eupatorium herba tenuium partium, incidendi
extergendiq; facultatem citra manifestam calidi-
tatem obtinet. Inest ei & adstrictio modica.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Contrita huius folia & cum veteri suillo adipe
imposita, vlceribus difficile cicatricem contrahen-
tibus medentur. Semen aut herba in vino pota-
dyntericis, iecinorosis, & serpentium morsibus au-
xiliatur.

EX GALENO.

Obstruo

PLANTARVM HISTORIAE

Obstructiones iccoris expurgat, & robur huius visceri addit. EX PLINIO.

Semē dysētericis in vino potū auxiliatur vnicē.

DE EUPHRASIA. CAP. xci.

NOMINA.

Ὠφθαλμική
vñ cur di-
cta.

Ophthalmi-
ca.

HAud dubiè Euphrasia herba nomen à Græcè lingua imperitis pharmacopolis deprauatum est, cū olim Ὠφθαλμική dicta sit, quod nimirum oculos, quorum caliginem discutit, delectet. Ad quod nomen Germani nostri pulchrè alludētes Augentrost hoc est, oculorum solatium appellāt. Nonnulli hac quoque ratione moti ophthalmicam & oculariam nominant. Officinæ, vt ferè in omnibus aliis herbis, corruptam vocem retinentes, Euphrasiam vocant. Etsi autem herba hæc Græco & eleganti nomine donata sit, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres græcos & latinos, nempe Dioscoridem, Plinium, Galenum, adde etiam recentiores, Actium, Paulum, & Aetuarium scriptum reperitur. Cū verò appellatio ipsa Græcam testetur originem, videtur sanè à Buglossō veterum mutuata & desumpta esse. Vt enim hoc in vinū coniectum animi laticiam parit, atque ad id Ὠφθαλμική dictum est, ita etiam illa quia oculos inuat & delectat, Ὠφθαλμική appellari cœpit. Quā subinde vocem imperiti linguae, vt diximus, deprauantes, in Euphrasiam verterunt.

FORMA.

Herba

Herba est parua, palma vnus longitudine, Hys-
sopo similis, cauliculis purpureis, foliis exiguis, per
ambitum serratis, flosculis albicantibus, radice exi-
gua & inutili. Nec obstat quòd Hermolaus, immò Hermo-
se eruditionis vir, libro tertio, capite decimo octauo laus bar-
sui Corollarii, luteolos esse dicit: is enim ad partem barus.
duntaxat florum respexit, quæ lutca esse euidenter
apparet. Certè si flores Euphrasia exquisitè consi-
deres, neque prorsus luteos, neque in vniuersum es-
tiam candidos esse deprehendes: tribus enim colo-
ribus, nempe purpureo, cādido & lutco, vt pictura
ipsa ostendit, maculati sunt. Quum verò potior flo-
rum pars candido colore constet, factum est vt fer-
mè omnes herbam hanc depingentes, albos illi assi-
gnarint flores, nobis autem hos candicantes dice-
re placuit. **LOCVS.**

Nascitur in apricis collibus, et pratis ferè oībus.

TEMPVS.

Inter autumnii initia magna copia crumpit.

TEMPERAMENTVM.

Quas particulatim facultates obtinet, abūdè do-
cent calidam & siccam esse herbam.

VIRES.

Vtuntur ea ad oculorum caligines & suffusio-
nes vel per se imposita, vel ex vino decocta. Memo-
riam etiam oculorūque aciem redacta in pulue-
rem, & in vino albo pota, mirificè roborat, amiss-
samque reparat.

DE

PLANTARVM HISTORIAE
DE ELELISPHACO. CAP. XCII.
Salvia minor franca nobis dicitur.

NOMINA.

Eλελίσφακου Græcis, Salvia Romanis & of-
ficinis, Germanis Salbey appellatur. Porro cū
ipsa herba semper retorrída & exucca videatur,
factum est, vt Græcis Elelispheon, quasi in tabē
redacta, vel in syderationem flaccescens dicta sit.
διελίξειν & σφάλκος vocibus in vnā coalescen-
tibus appellationem. Est autem σφάλκος, seu potius
σφάλκε- σφάλκελος, malum in plantis quum per aestatem
λος. & ardentissimum canis aestum vi solis altius pe-
netrante, humorēque quo nutriuntur deficiente, lā-
guent & arcescunt. Latini syderationē nomināt. Sal-
Saluiacur uia autem dicta latinis, quòd ad multa, præsertim
vocata. ad fecunditatem, salutaris sit.

GENERA.

Duo sunt Salvia genera, quemadmodum etiam
plebeij abundè nouerunt. Vnum quod priuatim E-
lelispheon dicitur, squalidius folio & scabrinus, la-
cunosa facie præasperum, multo latius, quasi cultū
sensserit, adèò vt domestica aut hortensis Salvia di-
ci possit. Nos euidentiori distinctione vsi, Saluiam
maiorē nominauimus. Germanis etiam groß O-
der breyt Salbey (Gallicè de la Sauge) voca-
tur. Alterum folio lenius & contractius, quasi syl-
uestrem ob id referat figuram, syluestris Salvia ap-
pellari potest, minus etiam squalore obsitū est. Nos
Saluiam

Saluiā minorem diximus. Germani creutz Sal- *Salvia mi*
bey oder klein Salbey, oder ipitz Salbey, e- *nor.*
del Salbey (Gallicè De la saulge franche) no-
minant. Dioscorides vtrunque genus sub vno Ele-
lisphaci nomine complexus est, quod scilicet facul-
tate nihil distent, sed idem prorsus efficiant.

FORMA.

Frutex est oblongus, ramosus quadrangulus &
candidas virgas habēs Folia mali Cotonei effigie,
oblongiora tamen, asperiora, & crassiora, qua sen-
sim attritarum vestium modo hirsuta, subalbida,
vehementer odorata, sed virosa sunt. Semē in sum-
mis caulibus sylvestri Ormini simile gerit. Hec de-
scriptio, nulla prorsus reclamante nota, cum herba
quam Saluiam vulgò vocant quadrat: nanque
ea fruticosa est, rugosis foliis, extritarum latenter
vestium asperitatem scabritiamve referētibus, in-
canis, vehementer odoratis, purpureo in spica flore,
in aquilini rostri speciem falcato, semine sylvestris
Ormini, vt pictura graphice monstrat.

LOCVS.

Nascitur in locis asperis, & vtrunque genus ho-
die passim in hortis inuenitur.

TEMPVS.

Carpitur in Iunio & Iulio mensibus, quādo ni-
mirum floribus & semine prægnaus est.

TEMPERAMENTVM.

Elelisphacos euidenter exca'facit, ac leuiter ad-
stringit.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Foliorum ramorumq; decoctum potū vrinā cit, menses fetusq; extrahit. Pastinaca marina ictibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemq; compescit. Ferina tetrāve vl cera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum vino, si eo abluantur, sedat.

EX AETIO.

Tradunt quidam suffitam Saluiam menses immoderatē fluentes, & omnino muliebri profluvio compescere. Agrippa sacram herbam vocavit, quā pregnantēs mulieres, si fluida laxaq; fuerint, vtilissimē comedunt: continet enim conceptum vitalemq; reddit, ac si succi huius heminam cum modico sale quarto à secubitu die mulier potauerit, deinde in le viro misceatur, proculdubio concipiet. Aium in quodam Aegypti loco post seuas pestilentias ab his qui supersunt, ad eum succum bibendum mulieres cogi, plurimosq; inde produci fetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi Salviae cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis ilico cohibetur. Tabidis pilula in hunc modum parantur. Spicae nardi, Zingiberis singul. drach. ij. seminis Salviae assati triti & cribrati drach. viij. Piperis longi drach. xij. cum succo Salviae pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam unam exhibeto, eodemq; modo in vespere, ac postea aqua pura quippiam propinato.

EX

EX PLINIO.

Menses Salvia cit & vrinas. Pastinace marina ictus sanat. Torporem autem inducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit. Abundantes sistit decocto eius potio. Per se imposita vulnerum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Partus emortuos apposita extrahit, item vermes aurium. Ad tussim laterisq; dolores bibitur. Contra scorpiones eadem & dracones marinos efficax. Contra serpentes quoque ex oleo perungi ea prodest.

DE SERPYLLO. CAP. XCIII.

Serpyllum nobis Serpolet.

NOMINA.

ἑρπύλλον Græcè, Serpyllum Latine. Offici-

E na latinum nomen retinuerunt. Germanicè

Quendel, Kinlin, Hunerkol (Gallicè

Du Serpolet) appellatur. Serpyllū autē, vt autor Serpyllū est Varro, ab eo quod serpat tā Græcis quàm latine vnde dinis dictū est, quoniā si qua eius particula terrā attingit, inibi radices demittit. Est enī vt Theophrastus libro sexto de plantarum historia, capite septimo ait, proprium quoddam eius ramulorum incrementū, quippe cū possit in quantā voluerit quispīam longitudinem trahi, adiecto illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plāctur, aut ex altiore loco aliquo deorsum demittatur: sic enim in longum

s. ij. protra-

PLANTARVM HISTORIAE

protrahuntur: & ab hac planta in ramulis eius natura, quòd in longum serpit, græci & latini peculiariter Serpyllum nominauerunt.

GENERA.

Serpyllū Duo eius genera. Hortense, quod Germanicè hey, hortense. mischer Quendel dicitur. Sylvestre, quod priuā tim Zygis vocatur, quod fortè eo iugarentur vites. Sylvestre **Zvyeiv.** Zvyeiv enim Græcis interdū idem quòd Latinis ligare & vincire significat. Germanicè simpliciter, Quendel dicitur. Nos sylvestristantum Serpylli picturam damus. **FORMA.**

Hortense. Hortense non dissimile est Origano, potissimum quòd ad folia & ramulos ipsos attinet, quos candidiores tātum habet, odore tamen prorsus Sampsychum representat. Repit humi, & in rectum nō at-

Sylvestre. tollitur. Sylvestre contrā humi non serpit, sed rectū exilibus ramulis & lignosis attollitur, Ruta foliis plenis, angustioribus tamen. Flosculos habet subpurpureos, gustu acres, odore iucundo, radicem mul-

Plinii er- tificam. Plinius secus quā Dioscorides hortense **ratum.** serpyllum nequaquam, sylvestre verò humi serpere asserit, adeo vt subesse in hoc mendam verisimile sit: res enim ipsa & viue herbarum imagines satis testatur, Dioscoridis sententiam esse veriore. Dioscoridi subscribit Aetius. Neque mirum est magis humi reptare cultum, quòd infirmius humoris copia est, atq; ad cō ramis inuvalidioribus stare nequit, quā sylvestre, quod illo rigidius ac lignosius existit. **LOCVS.** **Horo**

Hortense non nisi satum prouenit, & Columella teste, neque pinguem, neque stercoratum, sed aprium locum desiderat, ut quod macerrimo solo nascatur. Syluestre autem in petris, collibus, & montibus plerisque copiosissime nascitur, ita ut eo quasi vestiri videantur. TEMPVS.

Syluestre tota estate floret, hortense autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Serpyllum gustu acre est, ob id calidum valde, ita ut menses & urinam moueat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Syluestre efficacius & maiori calefaciendi vi quam hortense, atque ad vsum medicina aptius. Menses trahit, & urinam cit potum. Torminibus, ruptis, conuulsis, iecinoris inflammationibus auxiliatur. Aduersus reptilia potum & illitum. Capitis dolores sedat coctum adiecto rosaceo, & aceto madefactum. Maxime verò lethargo & phrenitidi conuenit. Sanguinis vomitum sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus.

EX AETIO.

Serpyllum ita calefacit ut menses & urinam ducat. Huius genus duplex. Syluestre efficacius calidiusque hortensi, atque omnino vsus eius in medicina praefertur. Prodest torminibus, conuulsionibus, rupturis, inflammationibus iecinoris, reptilibusque. Potum ac illitum capitis dolores sedat. Madefactum
s iij autem

PLANTARVM HISTORIAE

autem aceto ac decoctū admixto rosaceo lethargicis, & diutina phrenitim patientibus summopere cōgruit. Præterea drachmæ vnius pondere ex aceto bibitum, sanguinis eiectiones comescit.

EX PLINIO.

Aduersus serpentes efficax, maximè Censhrin & Scolopendras terrestres ac marinas & scorpiones, decoctis in vino ramis foliisq; . Fugat & odore cominus si vratur, & contra marinorum venena præcipuè valet. Capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibus, ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina & iccinorū dolores. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruentas excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis.

EX PLINIO VALERIANO.

Serpyllum calidū, simul nobis vtile medicina vsus ostendit. Capitis dolores coctū ex aceto & rosaceo tēpori ac fronti illitum mitigat. Serpentes & omnia animalia venenata adustum nidore repellit, ideo & messoribus in cibo miscetur, vt si fatigatos fortè somnus oppresserit, tutè quiescant contra animalia quæ hoc tempore venenatis hausibus sauire cōsueverunt. Cōtusi puluis ex scrupulis xij. in aqua datus tormina emendat, vrine difficultates resoluit, lienis quoq; iniuriæ idē puluis ex aceto mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit, ex duobus cyathis mellis & aceto tēperatur.

DE ELYMO. CAP. XCIIII.

Panicum nomen retinet.

NOMINA.

Eλυμος Græcis, Panicum Latinis, Germanis Heydelpfenich, oder Fenich (Gallicè du Panir semblable au Millet) dicitur. Panicum Panicum autem à paniculis in quibus semen est, Latini apud unde dictum.
pellauerunt. FORMA.

Milij similitudine profilit, denis vt plurimū foliis luxurians, culmo penè in surculum extenuato, nutante, rubido panicularum fastigio, prædensis ac ceruato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, nigris aliàs, item & candidis.

LOCVS.

Satum facile quouis ferè loco prouenit, leuem autē & solutam terrā potissimum desiderat. Nec in sabuloso duntaxat solo, sed in arena quoque nascitur, modo humidum cælum, vel rignum solū sortitur.

TEMPVS.

Quadragesimo die postquā satum est absolui, vt omnia aestiua, inter omnes conuenit. Quocunq; igitur tempore satum fuerit, vbi semine prægnans erit, tum carpendum venit.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat et exiccat, præsertim si foris illinatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Milij similitudinem refert, eodemq; modo in panes desingitur, & ad idem accommodatum est, minus

s iij tamen

PLANTARVM HISTORIAE

tamen quàm milium nutrit & adstringit.

EX GALENO.

Panicum facultate pauci nutrimētī, & exiccatoria. Sistit quoq; nōnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam Milium. Panis itaque eius exigui est alimētī & refrigerans. Constat insuper praearidū & instar arena aut cineris friabilem esse: caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur alium humentē desiccāt, Agricola farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo vescūtur. Panicum in omnibus Milio cedit insuauius esu, concoctu difficilius, vētrēmque magis coercescit, minusq; nutrit. Huius farinam interdum cum lacte coctam, rustici veluti triticeā esitāt. Clarumq; est id edullij tanto quàm illud per se solum assumptū melius esse, quanto lac huius seminis natura ad boni succi procreationem, aliāque omnia eminētius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoq; ipsam in edendo suauitatem & voluptatem. Hoc nāque semen nulla gratia aut iucunditate commendatur.

EX PLINIO.

Panicum Diocles medicus mel frugum appellauit. Effectus habet quos Milium. In vino potū prodest dysentericis. Similiter iis quae vaporanda sunt excaesactum imponitur. Sistit aliu in lacte capri no decoctum, & bis die haustum. Sic prodest et ad tormina.

DE ERICA. CAP. XCV.

Erica Bruiere.

NOMINA.

Eρίκη Græcis, Erica Latinis, Heyd Germanis
(Gallicè Briere) dicitur. Officinis inusitata.

FORMA.

Erica fruticosa arbor est, Tamarici similis, multo tamen breuior. Eius flore vtentes apes, reprobum mel conficiunt. Plinius lib. xxiiij. cap. ix. fruticem esse scribit non multum à Tamarice differentem, colore Rosismarini, & penè folio. Id quod verè de ea Erica, cuius nos picturam damus, dicitur. Theophrastus etiam Rosmarino similem Ericam facit. Habet flores in candido purpureos.

LOCVS.

In montibus & syluis locisq; arenosis nascitur.

TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erica coma & flores illita serpentium moribus medentur.

EX GALENO.

Discutiendi facultate prædita est Erica: flore eius potissimum & foliis vtendum.

EX PLINIO.

Erica

PLANTARVM HISTORIAE

Ericen aduersari serpentibus tradunt.

APPENDIX.

Recetiores herbarij præter iam commemoratas, alias facultates addūt, nimirum florum decoctum lumborum ac ventris dolores lenire posse. Succum ex foliis floribusq; eliciti, oculis imbecilibus guttatim instillatum, aut foris inunctum conferre.

DE ERYSIMO. CAP. XCVI.

Erysimum in fossis huius partis virbis luxuriat prope solum. NOMINA.

Eρῑσιμον Græcè, Irion Latine vocatur. Officinis nostris incognita. Vulgares herbarij non ineptè Sinapin sylvestrem, nonnulli etiam Rapistrū, Germani Hederich & Vuilden ienff (Gallicè Velar, ou de la Tortelle) appellāt. Sūt qui perperam, eo quòd gustu Erucam imitatur, sylvestrem Erucam nominant. Alia enim est Eruca sylvestris Rapistrū ab ea quam Rapistrum nominant herba, ut suo loco dicemus. Erysimon quidam ἀπὸ τοῦ ἐρῑνεῖς nostris Erucæ nomen mutuatum esse credunt, id est, à multiplici foliorum sectione: nam Eruca modo laciniata conspiciuntur. Alii ab oleris præstantia dictum vocant, unde dicunt, quasi ἐρίτιμον, quod est preciosum & nobilitum. Ii. Mihi ἀπὸ ἐρῑνεῖς potius dictum esse videtur, Irion quia quòd ob suam caliditatem maxima trahendi facere vocata. cultate prædita sit. Latini autem Irionē ab irruendo dixerunt, quòd ignea vi, & feruido sapore irruat in gustum.

FORMA.

Folia habet syluestri Eruca similia, caules lorī modo flexiles, flores luteos. In cacumine siliquas corniculorū figura, vt Fœnigraci graciles in quib. semina continentur parua, Nasturtio similia, gustu feruido. Hæ utiq; notæ in vniuersum omnes, herba illi quā pictā hīc exhibemus adamussim quadrāt.

LOCVS.

Nascitur passim prope vrbes, domorum areas, rudera & hortos.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret, autumnō autem semen in siliquis profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Erysimi haud secus quā Nasturtij calfacit & exiccat. Herba etiam ipsa arefacta similem semini vim obtinet. Humida tamē ac viridis, multo semine inferior est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erysimi semen thoracis fluxionibus purulentis, tusientibus, regio morbo, coxædicum doloribus lintum cum melle confert. Bibitur etiam contra leſtalia venena. Ex aqua aut melle illitum, occultis carcinomatibus, duritiis, parotidibus, testiū ac mārmarum inflammationibus prodest. In vniuersum extenuat & calefacit. Mitius ad eclegmata fiet, si aqua madesiat & torreatur, aut lintcolo illigatum circumlita pasta perassetur.

PLANTARVM HISTORIAE

rendi facultatem habet.

DE HEPTAPHYLLO.

CAP. XCVIII.

Heptaphyllum tormētilla quauis & vulgare pentaphyllum sæpe cum foliis septē inuenitur, vt Tormētilla cum quinque.

NOMINA.

Tormētil-
tilla.

Hepta-
phyllon.

Eπῑάφυλλον Gracè, septifoliū Latinè, vulgò Tormētilla nominatur. Sunt ex recentiorib. qui perperam Bistortam vocent. Germanicè Tormētill, Rotheil Vurtz (Gallicè Tormētille) appellatur. Heptaphyllum autē à septenario foliorum numero dicta est. **FORMA.**

Quinquefolio similima est, nisi quòd septem non quinque habet folia, vtrinque lanuginosa, exigua, parua, serrata, caulem certis scilicet interstitiis ambicentia, flores luteos, radicē puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnib. constare puto, herbam nostris Tormētillam dictam, non esse Diosco-

Tormētil-ridis Quinquefolium. Hoc enim, vt reliqua omit-
la non est tam, radicem non intortam, sed rectam & oblongā.

Quinque-habet. Plinius etiam lib. xxv. cap. ix. herbā quin-
folium. quefolium incipere & desinere cum vite scribit.

Tormētilla autem non maturè prouenit, sed cū vi-
tes iā florent. Accedit quòd hæc in montosis & syl-
uestribus incultisq; hoc verò prati, cultis & aquo-
sis in locis potius prouenit. Apuleius etiam vtrinq;
herbam seorsim describit.

LOCVS.

Nascitur montosis, vt diximus, locis ac syluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam vites florent, herba hæc apparere incipit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores iudicant hæc herbam in tertio ordine frigidã & siccam esse. Caterum non esse frigidam, potissimũ in tertio ordine facultates eius abudẽ declarant. Gustus etiam adstrictionem illã tãta frigiditate prorsus carere palam ostendit. Quare cum easdem quas Quinquosoliũ facultates habeat, idem etiam temperamentum obtineat necesse est. Erit itaque radix desiccatoria ex tertio ordine, nulatenus tamen manifesta caliditate participans.

VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herbatrita & cum oleo mixta, pedes perunges, & tertio die dolorem tollit.

EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet glutinandi vulnera. Farina herbe vel radice ex succo. Plantaginis propinatur in difficultate vrine. Eadem respersu vulnera ad cicatricẽ perducit. Cum albo oui subacta & siglino decocta, datur cholericis. Foliorũ vis deploratis fistulis instillatur, neque non oculis ad discutendas nubes. Ad putrescẽtiã oris vlcera herba & radix cõmanducata, & in ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismatãque sanant.

PLANTARVM HISTORIAE

nat. Ervt antea diximus, facultates ferè easdem
quas Quinquesfolium obtinet. Quapropter venenis
resistit, dysenterias, & omnes sanguinis eruptiones
compefcit.

DE ERUCA. CAP. XCIX.

Eruca nobis Roquete.

NOMINA.

Eϋζωμορ Græcis, Eruca Latinis, officinæ Lati-
num nomen retinuerunt, Germanis Vueisz
senff (Gallicè de la Roquette) appellatur. Euxo-
Euxomos mos autem Græcis, quoniam iura commendet, hæ-
unde di- beatq; in eisdem peculiarem gratiã, dicta est. Eru-
cta. cam verò ideo nominatam volūt quòd erodat: hæc
Eruca. enim vbi degustaueris, os & linguam satis acriter
vellicat.

GENERA.

Duplex est Eruca. Vna hortensis seu sativa, quæ
Germanis zam Vueisz senff dicitur. Altera syl-
vestris iisdem Vuilder Vueisz senff appellatur.

FORMA.

Sesquipedali thyrso consurgit sativa, folio longo,
angustoque, in profundas sed rariores crenas laci-
niato, gustu præter modum acri, floribus pallidio-
ribus, semine in siliquis rapi, vel sinapi, firmo, radice
candida. Sylvestris folio sativæ simili, strictiore
tamen & minore flore luteo.

LOCVS.

Sativa in hortis nascitur. Sylvestris Hispania fa-
miliaris:

miliaris: prope tamē aquas prouenit magna copia. Quae autem apud nos creditur esse syluestris Eruca, ea non est, sed Erisimon, de qua quidem herba suo in loco abundē scripsimus.

TEMPVS.

Satiua tota estate floret: syluestris autem circa Calendas Iunij potissimum erumpit: alio enim tēpore vix reperitur.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum Eruca idem cum temperamēto Erisimi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca satiuā largius comesta venerē stimulat. Idem potest semen eius, quod vrinam cit, coctionem adiuvat, aluumq; bonū efficit. Vtuntur semine ad condimenta. Quod ut plurimo tēpore seruetur, aceto vel lacte maceratum, & in pastillos digestum recodunt. Syluestris semine homines in Hispania sinapis vice vtuntur. Est autem ad ducendā vrinam efficacior, & multo quā satiuā acrior.

EX GALENO.

Olus hoc perquam manifestē calefacit, adēdō vrinam non facile solā absque iunctis Lactuca foliis edatur. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere. Caput magis dolore afficiet si solum edatur.

EX PAVLO.

Eruca tēperamēto Erysimō similis, flatulenta est, ob quod

PLANTARVM HISTORIAE

ob quod ad venerē instigat. Semē eius vrinā quodq;
mouet. Caterū sylvestris domestica valentior est.

EX PLINIO.

Eruca diuersa est quā Lactuca natura cōcita-
trix veneris: idcirco iungitur illi ferē in cibis, vt nī-
mio frigori par feruor immixtus tēperamētū aquet.
Eius semen scorpionū venenis & muris aranci me-
detur. Bestiolas omnes innascētes corpori arcet. Vi-
tia cutis in facie cū melle illitū. Lētigines ex ace-
to. Cicatrices nigras traducit ad candorem cū felle
bubulo. Aiunt verbera subituris potū ex vino, du-
ritiam quandam contra sensum induere. In cōdiē-
dis opsoniis tanta est suauitas, vt Græci euzomora
appellauerint. Putāt subtrita Eruca si foucantur o-
culi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari.
Radix eius in aqua decocta, fracta ossa extrahit.
Trita folia sylvestris Erucae sinistra manu decerpta,
& trita ī aqua mulsa, si bibātur, venerē stimulat.

DE EVPATORIO ADVLTERINO.

C A P. C.

Eupatorium adulterinum quod hactenus
officinæ celebrarunt.

N O M I N A.

NVm herba hæc veteribus Græcis & Latinis
cognita fuerit, & quo nomine ab iisdem ap-
pellata sit, mihi nondum constare ingenuè fateor.

Officina. Officina tamen ferē omnes pro Eupatorio vero,
rā error. cū tamen non sit, haud sine magno errore vtun-
tur.

tur. Hinc cū nomen aliud non esset quā illam appellaremus, Eupatorium adulterinū nominare placuit. Germanicè Kunigundkraut, hoc est, herba riū adul-
s. Kunigundis vocatur, & Vuasserdost, (Gal-
licè Curaige) ab Origani similitudine, & quòd
iuxta aquas proueniat. Aliis Hirtzenklee, quòd
vulnerati cerui sibi hac medeantur herba.

FORMA.

Caulē edit rotundum, purpureum, geniculatū,
solidum & hirsutum, circa quam alæ panduntur,
folia longa, Canabinis ferè similia, amaraq;. Flores
in summo paruos coacervatos, in candido purpuras-
centes, tandem in pappos tenuēs abeuntes. Radi-
cem multis fibris capillatā & inutilem. Errant
haud dubiè qui herbam hanc Dioscoridis Hydro-
piper esse putant. Nam etsi ferè tota eius herbæ fa-
cies floribus demptis, Hydropiperis delineationi re-
spondeat, tamen quia nulla prorsus piperis in foliis
aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydro-
piper dici possit aut mereatur.

piper.

LOCVS.

In fluminum ripis, alijsq; locis humidis nasci-
tur, potissimum verò iuxta residues aquas, aut tar-
do fluxu prorepentes.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu vehemèter amara est, vt calidam & sic-

t ij

cam

PLANTARVM HISTORIAE

cam esse in secundo ordine, aut in medio tertij non sit. dubium.

VIRE S.

Haud dubiè herba hæc abstergit, expurgâtque, & quæ in venis est, crassitiem incidit: quamobrem menses & vrinas mouet, educendoq; ex thorace pulmoneq; puri auxiliatur, aliasq; facultates amari saporis, quas recenset Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. obtinet. Potest itaque obstructions iccoris & lienis aliarumq; partium corporis solueret. Ex recentioribus sunt qui hanc vulnerariâ esse tradunt, neque temerè: id ipsum enim posse, siccitas eius testatur. Suffitum præterea eius herbae venenatas fugare feras iidem scribunt. Euidentiissimuma. Verò est hanc etiam contra venena. esse admodum efficacem.

DE EREBINTHO. CAP. CI.

NOMINA.

EΡΕΒΥΝΘΟΣ græcè, Cicer latinè, officina latinè nomen retinuerūt, Germanicè zyflern (Gallice pois cices) nominatur.

GENERA.

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum præturam damus. Differunt potissimum in floribus: hoc enim ut cernis purpureos, album verò candidos flores producit.

FORMA.

Cicer

Cicer satiuū caule est lignoso, obliquo. foliis exiguis, multis, circinatis, flore albo vel purpurco, siliis quibus rotundis, radice tenui & non admodum longa.

LOCVS.

Pullo crassoque solo gaudet.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliquis semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est primo in ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cicer satiuum bonum facit aluum, urinā cit, inflationes parit, cutis colorem commendat, menses & fetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, acoras, impetigines, vlcera cōcrescētia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum genus *arictinum* nominatur. Vtrunque cit urinas, dato cum Rosmarino contra regium morbum & cutem subeuntes aquas eorum decocto. Ledunt autem vesicā exulceratam & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiāsvē singulis Ciceribus tāgere, deligataq; in linteolo semina illa post se abicere, ut acrochordones decidant.

EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, aluo mouendæ habile, ciendæ urina idoneum, &

t iij semini

PLANTARVM HISTORIAE

tamen quàm milium nutrit & adstringit.

EX GALENO.

Panicum facultate pauci nutrimētī, & exiccatoria. Sistit quoq; nōnihil ventris fluxus, ceu ipsum etiam Milium. Panis itaque eius exigui est alimētō & refrigerans. Constat insuper prae aridū & instar arenae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur aluum humentē desiccāt, Agricola farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo vescūtur. Panicum in omnibus Milio cedit insuauius esu, concoctū difficilius, vētrēmque magis coercescit, minusq; nutrit. Huius farinam interdum cum lacte coctam, rustici veluti triticeā esitāt. Clarumq; est id edullij tanto quàm illud per se solum assumptū melius esse, quanto lac huius seminis natura ad boni succi procreationem, aliāque omnia eminētius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoq; ipsam in edendo suauitatem & voluptatem. Hoc nāque semen nulla gratia aut incunditate commendatur.

EX PLINIO.

Panicum Diocles medicus mel frugum appellauit. Effectus habet quos Milium. In vino potū prodest dysentericis. Similiter iis quae vaporanda sunt ex calfactum imponitur. Sistit aluū in lacte capri no decoctum, & bis die haustum. Sic prodest et ad tormina.

DE ERICA. GAP. XCV.

Erica Bruiere.

NOMINA.

Eπειν Græcis, Erica Latinis, Heyd Germanis
(Gallicè Briere) dicitur. Officinis inusitata.

FORMA.

Erica fruticosa arbor est, Tamarici similis, multo tamen breuior. Eius flore vtentes apes, reprobum mel conficiunt. Plinius lib. xxiij. cap. ix. fruticem esse scribit non multum à Tamarice differentem, colore Rosmarini, & penè folio. Id quod verè de ea Erica, cuius nos picturam damus, dicitur. Theophrastus etiam Rosmarino similem Ericam facit. Habet flores in candido purpureos.

LOCVS.

In montibus & syluis locisq; arenosis nascitur.

TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erica coma & flores illita serpentium morsibus medentur.

EX GALENO.

Discutiendi facultate prædita est Erica: flore eius potissimum & foliis vtendum.

EX PLINIO.

Erica

PLANTARVM HISTORIAE

Ericen aduersari serpentibus tradunt.

APPENDIX.

Recetiores herbarij præter iam commemoratas, alias facultates addūt, nimirum florum decoctum lumborum ac ventris dolores lenire posse. Succum ex foliis floribusq; elicītū, oculis imbecillibus guttatim instillatum, aut foris inunctum conferre.

DE ERYSIMO. CAP. XCVI.

Erysimum in foliis huius partis virbis luxuriat prope solum. NOMINA.

Eρύσιμον Græcè, Irion Latine vocatur. Officinis nostris incognita. Vulgares herbarij non ineptè Sinapin sylvestrem, nonnulli etiam Rapistrū, Germani Hederich & Vuilden scnff (Gallicè Velar, ou de la Tortelle) appellāt. Sūt qui perperam, eo quòd gustu Erucam imitatur, sylvestrem Erucam nominant. Alia enim est Eruca sylvestris Rapistrū ab ea quam Rapistrum nominant herba, vt suo loco dicemus. Erysimon quidam ἀπὸ τοῦ ἐρείκειν nostris Erucæ nomen mutuatum esse credunt, id est, à multiplici foliorum sectione: nam Erucæ modo laciniata conspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum vocant, unde dicunt, quasi ἐρίτιμον, quod est preciosum & nobile. Mihi ἀπὸ τοῦ ἐρύειν potius dictum esse videtur, Irion quia quòd ob suam caliditatem maxima trahendi facere vocata. cultate prædita sit. Latini autem Irionē ab irruendo dixerunt, quòd ignea vi, & feruido sapore irruat in gustum.

FOR.

FORMA.

Folia habet syluestri Eruca similia, caules lori modo flexiles, flores luteos. In cacumine siliquas corniculorū figura, vt Fœnigræci graciles in quib. semina continentur parua, Nasturtio similia, gustu feruido. Hæ utiq; notæ in vniuersum omnes, herbe illi quā pictā hīc exhibemus adamussim quadrāt.

LOCVS.

Nascitur passim prope vrbes, domorum arcas, rudera & hortos.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret, autumno autem semen in siliquis profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Erysimi haud secus quā Nasturtij calfacit & exiccat. Herba etiam ipsa arefacta similem semini vim obtinet. Humida tamē ac viridis, multo semine inferior est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erysimi semen thoracis fluxionibus purulentis, tussientibus, regio morbo, coxædicum doloribus linctum cum melle confert. Bibitur etiam contra leſtalia venena. Ex aqua aut melle illitum, occultis carcinomatibus, duritiis, parotidibus, testiu ac mæmarum inflammationibus prodest. In vniuersum extenuat & calefacit. Mitius ad eclegmata fiet, si aqua madesiat & torreatur, aut linteolo illigatum circumlita pasta perassetur.

EX

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Irionis semen sicut gustu Nasturtio simile apparet, ita facultate igneum est & excalefactoriū. Porro vbi in eclegmate vti ex vsu est, praestat aqua premaceratum torrere, aut lintcolo illigatū subindeque crusta pistoria inuolutum assare. Vtile est cum eclegmatis ad promouendas crassorum lentorumque in thorace & pulmone humorum expuitiones. Quin & parotidas induratas, atque duritias mammarum & testiculorum veteres inuat. Refert Dioscorides, quod cū aqua & melle illitum, oculis proffit canceris.

EX PLINIO.

Vtilissimum tuſsientibus cum melle, & in thorace purulentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborum vitiis, pleuriticis, torminibus, cœliacis. Illinitur verò parotidum & carcinomatum malis. Testium ardoribus ex aqua, aliās ex melle. Infantibus quoque vtilissimum. Itē sedis vitiis & articulariis morbis cum melle & fico. Cōtra venena etiam efficax potum. Medetur & suspiriosis. Item fistulis cū axungia veteri, ne intus addatur.

DE HELXINE CISSAMPELO.

CAP. XCVII.

Helxine Cissampelos à ligando lizet & lizeron.

NOMINA.

Eλξίν κισσάμπελος græcis, Helxine cissampelos et Cōmolulus Latinis nominatur. Vulgus herba

herbariorū & officina, Volubilē mediam & Vitalem appellant, Germani Mitteluinden, oder Vitæalis. Vuingartenuinden (Gallicè Campanette, Cissampes ou Vitreole, aliis I zet) Rectè autem Cissampelos quare los dicitur: in vineis enim potissimum nascitur, & dicitur folio hederaceo. Conuolulus verò, quod crebra re= Cōuoluuolutione vicinos frutices & herbas implicet. lus.

FORMA.

Folia habet Hedera similia, minora tamen. Ramulos exiguos circumplectentes quodcunque contingerint. Folia denique eius scāfili ordine alterna subeunt. Flores primum candidos Lilij effigie, dein in puniceum vergentes, profert. Semen angulosum in folliculis acinorum specie.

LOCVS.

In vineis nascitur, vnde etiam ei appellatio Cissampeli, vt diximus, indita est.

TEMPVS.

Aestate, potissimum autē Iulio & Augusto mensibus, floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse ex viribus quas illi veteres tribuunt, facile conicere licebit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius potus, aluum subducendi facultatem obtinet.

EX GALENO.

Helxine, quæ & Cissampelos nūcupatur, digerendi

PLANTARVM HISTORIAE

rendi facultatem habet.

DE HEPTAPHYLLO.

CAP. XCVIII.

Heptaphyllum tormētilla quauis & vulgare pentaphyllum sæpe cum foliis septē inuenitur, vt Tormētilla cum quinque.

NOMINA.

Tormētilla.

Heptaphyllum.

Eπτάφυλλον Gracè, septifoliū Latinè, vulgò Tormētilla nominatur. Sunt ex recentiorib. qui perperam Bistortam vocent. Germanicè Tormētill, Rotheil Vurtz (Gallicè Tormētille) appellatur. Heptaphyllum autē à septenario foliorum numero dicta est. **FORMA.**

Quinquefolio similima est, nisi quòd septem non quinque habet folia, vtrinque lanuginosa, exigua, parua, serrata, caulem certis fere interstitiis ambicntia, flores luteos, radicē puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnib. constare puto, herbam nostris Tormētillam dictam, non esse Diosco-

Tormētilla non est
Quinquefolium.

ridis Quinquefolium. Hoc enim, vt reliqua omittam, radicem non intortam, sed rectam & oblongā habet. Plinius etiam lib. xxv. cap. ix. herbā quinquefolium incipere & desinere cum vite scribit. Tormētilla autem non maturè prouenit, sed cū vires iā florent. Accedit quòd hæc in montosis & syluestribus incultisq; hoc verò prati, cultis & aquosis in locis potius prouenit. Apuleius etiam vtrinq; herbam seorsim describit.

LOCVS.

Nascitur montosis, vt diximus, locis ac syluis.

TEMPVS.

Serò ac cum iam vites florent, herba hæc apparere incipit.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores iudicant hæc herbam in tertio ordine frigidā & siccam esse. Caterum non esse frigidam, potissimū in tertio ordine facultates eius abunde declarant. Gustus etiam adstrictionem illā tāta frigiditate prorsus carere palam ostendit. Quare cum easdem quas Quinquefoliū facultates habeat, idem etiam temperamentum obtineat necesse est. Erit itaque radix desiccatoria ex tertio ordine, nulatenus tamen manifesta caliditate participans.

VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herbatrita & cum oleo mixta, pedes perunges, & tertio die dolorem tollit.

EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet glutinandi vulnera. Farina herbe vel radice ex succo Plantaginis propinatur in difficultate vrine. Eadem respersa vulnera ad cicatricē perducit. Cum albo oui subacta & figlino decocta, datur cholericis. Foliorū vis deploratis fistulis instillatur, neque non oculis ad discutendas nubiculas. Ad putrescētia oris vicera herba & radix cōmanducata, & in ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismatāque sanant.

PLANTARVM HISTORIAE

nat. Eſſet antea diximus, facultates ſerè eaſdem
quas Quinquęfolium obtinet. Quapropter venenis
reſiſtit, dyſſenterias, & omnes ſanguinis eruptiones
compeſcit.

DE ERUCA. CAP. XCIX.

Eruca nobis Roquete.

NOMINA.

Eϋζωμορ Græcis, Eruca Latinis, officinae Lati-
num nomen retinuerunt, Germanis Vueiſz
ſenff (Gallicè de la Roquette) appellatur. Euxo-

Euxomos mos autem Græcis, quoniam iura commendet, ha-
vnde di- beatq; in eiſdem peculiarem gratiã, dicta eſt. Eru-
ca. cam verò ideo nominatam volūt quòd erodat: hæc

Eruca. enim vbi deguſtaueris, os & linguam ſatis acriter
vellicat.

GENERA.

Duplex eſt Eruca. Vna hortenſis ſeu ſatiua, quæ
Germanis zam Vueiſz ſenff dicitur. Altera ſyl-
veſtris iſdem Vuilder Vueiſz ſenff appellatur.

FORMA.

Seſquipedali thyſo conſurgit ſatiua, folio longo,
anguloque, in profundas ſed variores crenas laci-
niato, guſtu præter modum acri, floribus pallidior-
ibus, ſemine in ſiliquis rapi, vel ſinapi, firmo, radia-
ce candida. Sylveſtris folio ſatiuæ ſimili, ſtrictiore
tamen & minore flore luteo.

LOCVS.

Satiua in hortis naſcitur. Sylveſtris Hiſpania ſa-
miliaris:

miliaris: prope tamē aquas prouenit magna copia. Quae autem apud nos creditur esse syluestris Eruca, ea non est, sed Erisimon, de qua quidem herba suo in loco abundē scripsimus.

TEMPVS.

Satiua tota estate floret: syluestris autem circa Calendas Iunij potissimum erumpit: alio enim tēpore vix reperitur.

TEMPERAMENTVM,

Temperamentum Eruca idem cum temperamēto Erisimi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca satiuā largius comesta venerē stimulat. Idem potest semen eius, quod urinam cit, cōtionem adiuuat, aluumq; bonū efficit. Utuntur semine ad condimenta. Quod vt plurimo tēpore seruetur, aceto vel lacte maceratum, & in pastillos digestum recōdunt. Syluestris semine homines in Hispania sinapis vice utuntur. Est autem ad ducendā urinam efficacior, & multo quā satiuā acrior.

EX GALENO.

Olus hoc perquam manifestē calefacit, ad cō non facile solā absque iunctis Lactuce foliis edatur. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in venerem stimulos addere. Caput magis dolore afficiet si solum edatur.

EX PAVLO.

Eruca tēperamēto Erysimo similis, flatulenta est, ob quod

PLANTARVM HISTORIAE

ob quod ad venerē instigat. Semē eius urinā quod
mouet. Cæterum sylvestris domestica valentior est.

EX PLINIO.

Eruca diuersa est quàm Lactuca natura cōcita-
trix veneris: idcirco iungitur illi ferē in cibis, vt nū-
mio frigori par feruor immixtus tēperamētū aquet.
Eius semen scorpionū venenis & muris aranci me-
detur. Bestiolas omnes innascētes corpori arcet. Vi-
tia cutis in facie cū melle illitū. Lētigines ex ace-
to. Cicatrices nigras traducit ad candorem cū felle
bubulo. Aiunt verbera subituris potū ex vino, du-
ritiam quandam contra sensum inducere. In cōdiē-
dis opsoniis tanta est suauitas, vt Græci euzomōn
appellauerint. Putāt subtrita Eruca si foucantur o-
culi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari.
Radix eius in aqua decocta, fracta ossa extrahit.
Trita folia sylvestris Eruca sinistra manu decerpta,
& trita ī aqua mulsa, si bibātur, venerē stimulat.

DE EUPATORIO ADULTERINO.

CAP. C.

Eupatorium adulterinum quod hactenus
officinæ celebrarunt.

NOMINA.

N Vm herba hac veteribus Græcis & Latinis
cognita fucrit, & quo nomine ab iisdem ap-
pellata sit, mihi nondum constare ingenuē fateor.

Officina. Officina tamen ferē omnes pro Eupatorio vero,
vā error. cū tamen non sit, haud sine magno errore vtun-
tur.

tur. Hinc cū nomen aliud non esset quo illam appellaremus, Eupatorium adulterinū nominare placuit. Germanicè Kunigundkraut, hoc est, herba riū adulterinis. Kunigundis vocatur, & Vuasserdost, (Gallicè Curaige) ab Origani similitudine, & quòd iuxta aquas proueniat. Aliis Hirtzenklee, quòd vulnerati cerni sibi hac medeantur herba.

FORMA.

Caulem edit rotundum, purpureum, geniculatū, solidum & hirsutum, circa quam ala panduntur, folia longa, Canabinis ferè similia, amaraq;. Flores in summo paruos coacervatos, in candido purpurascetes, tandem in pappos tenues abeuntes. Radicem multis fibris capillatam & inutilem. Errant haud dubiè qui herbam hanc Dioscoridis Hydro-piper esse putant. Nam etsi ferè tota eius herbæ facies floribus demptis, Hydropiperis delineationi respondere videtur, tamen quia nulla prorsus piperis in foliis aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydro-piper dici possit aut mereatur.

LOCVS.

In fluminum ripis, alijsq; locis humidis nascitur, potissimum verò iuxta residues aquas, aut tardo fluxu prorepentes.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustus vehemèter amara est, vt calidam & sic-

PLANTARVM HISTORIAE

cam esse in secundo ordine, aut in medio tertij non sit dubium.

VIRE S.

Haud dubiè herba hæc abstergit, expurgâtque, & quæ in venis est, crassitiem incidit: quamobrem menses & urinas mouet, educendoq; ex thorace pulmoneq; puri auxiliatur, aliasq; facultates amari saporis, quas recenset Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. obtinet. Potest itaque obstructions iecoris & lienis aliarumq; partium corporis soluerre. Ex recentioribus sunt qui hanc vulnerariâ esse tradunt, neque temerè: id ipsum enim posse, siccitas eius testatur. Suffitum præterea eius herbae venenatas fugare feras iidem scribunt. Evidentiissimum. Verò est hanc etiam contra venena esse admodum efficacem.

DE EREBINTHO. CAP. CI.

NOMINA.

EΠΙΒΥΘΟΣ græcè, Cicer latinè, officina latinâ nomen retinuerût, Germanicè zyßlern (Gallicè pois cices) nominatur.

GENERA.

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum pieturam damus. Difficiunt potissimum in floribus: hoc enim vt cernis purpureos, album verò candidos flores producit.

FORMA.

Cicer

Cicer satiuū caule est lignoso, obliquo. foliis exiguis, multis, circinatis, flore albo vel purpureo, siliquis rotundis, radice tenui & non admodum longa.

LOCVS.

Pullo crassoque solo gaudet.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliquis semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est primo in ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cicer satiuum bonam facit aluum, urinā cit, inflationes parit, cutis colorem commendat, menses & fetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, acoras, impetigines, vlcera cōcreſcētia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrunque cit vrinas, dato cum Rosmarino contra regium morbum & cutem subcunctes aquas eorum decocto. Lædunt autem vesicā exulceratam & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiā sū singulis Ciceribus tāgere, deligataq; in linteolo semina illa post se abiicere, ut acrochordones decident.

EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, aluo mouenda habile, cienda vrina idoneum, &

t iij semini

PLANTARVM HISTORIAE

semini generando aptum. Prolicit verò & menses. Porro quod vocatur arietinum, ceteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renum confringit. Reliquum autem Cicerum genus quod Orobiaum vocant, eadem vi pollet, puta attrahēdi, digerēdi, incidēdi, extergendi. Lienem & iecur, & renes expurgant, scabiēsque & impetigines extergunt. Parotidas & testes induratos discutunt. Maligna etiam vlcera cum melle sanant.

EX SIMEONE ANTIOCHENO.

Cicera difficulter cōcoquuntur & excremēta gi-
gnunt. Venerem stimulāt, magisq; quā fabae nu-
triunt, obstructiones tollunt, & menses ediscūt. Ha-
bent salsam simul & dulcem qualitatem, & ob sal-
uginem ventrem mouent, propter dulcedinem au-
tem urinam. Inflationes quoque faciunt, & lac gi-
gnūt, extergendiq; facultatem obtinēt. Nigra me-
dicamentosam vim habent: urinā enim vehemen-
tissimē mouent, & calculos renū & vesica frāgūt.
Nullū verò legumen sic vt Cicera, precipuē autem
nigra & parua, lapides frāgere potest. Id verò ma-
gis eius ius, quod tamē vesicae morbis supra cate-
ra legumina officit. Cicera verò rubra calidiora
& crassiorū sunt partiū quā alba. Oīa autē urinā
ducūt. Madesacta nocte vna ī aqua & sumpta, li-
bricos eiiciunt, sed qui vtitur, sex ieiunet horas o-
portet. Imposita vt cataplasma parotidibus, mol-
liūt & discutunt tumore. Farina horū aceto suba-
cta.

Etia, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorūdem ictericos inuat, & urinam albā reddit. Oportet verò iis neque ante cibum, neque post vti, sed in medio.

DE ECHIO. CAP. CII.

Echion in viis frequēs agro Pharrhifino.

NOMINA.

Eχιον, ἢ ἀλκυδιόδιον *græcis*, Echion & Alci-
biacum *latinis* dicitur. Officinis ignotū. Vul-
gares herbarij syluestre Buglossum nominant, quos Buglossū
sequētes Germani Vuild Ochsenzungen, (Gal- syluestre.
licè Pois cices) appellant. Echion autem dictū vo Echion
lunt, quòd contra ferarū ictus sit vtile. Alij quòd quare di-
florescit capitulis viperæ similibus. Rectius Diosco etum.
rides, quòd semina viperino capiti similia habeat.

FORMA.

Folia obtinet oblonga, aspera, tenuia, Anchusæ
proxima, minora tamē & pingua. Habet & acu-
leos exiles folijs adiacentes. Cauliculos tenues mul-
tos, & vtrinque foliola tenuia, pennata, nigra, mi-
nora proportionē ad cacumen caulis. Iuxta folia flo-
res purpureos, in quibus semen est viperino capiti si-
mile. Radix digito exilior, subnigra. Ex qua sanè
delineatione sole clarius fit, herbam cuius picturā
hīc exhibemus esse Echion. Folia enim habet præ-
longa, hisuta, tenuia, ad Anchusam accedētia, mi-
nora tamen pinguiāque, tenuibus spinis horridula,
cauliculos tenues, numerosos, minutaq; folia vtro-
que latere dependentia, nigra, in summo caule
t iij minuscula.

PLANTARVM HISTORIAE

minuscule, inter quæ purpurei flores emicant, in quibus semina viperarum capitulis similia insidēt, à cervice paulatim in rostellum extenuata, tumidiore superna parte, in qua quadā prominula quasi sedes oculorum apparent, id quod ego hisce oculis non semel, sed iterum atque iterum conspexi. Radix digito tenuior nigricat.

LOCVS.

Vbiq; ferè ad itinera, & in asperis locis nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum esse citra tamen insignem siccitatem inde coniicitur, quòd lactis procreatricem facultatem obtinet. Medicamenta enim, Galeno lib. quinto, capite vigesimo de Simp. med. facul. teste, quia pituitosos humores calefacientia in sanguinem vertunt, lac procreare solent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix nō solum iis qui à serpentibus morsi sunt succurrit pota cum vino, verumetiam præsumentes eam ne feriantur facit. Idem præstant folia & semen. Sedat etiam dolores lumborum, & cum vino aut sorbitione sumpta lac prouocat.

EX PAVLO.

Echion spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur.

DE ELEOSELINO.

CAPVT. CIII.

NOMINA.

Eλεοσελινον, ἢ ὑδρῶσελινον *græcis*, *Apium* palustre & rusticum latinis, Germanis Vuasefer epff, oder Eppich, oder bauren. eppich (Gallicè de Lache, ou esgrun perfil) nominatur. Sic dictum *græcis*, quòd in paludibus & aquosis locis proueniat.

FORMA.

Apio satiuo maius est, caule tenero, concauo, folio molli, raro nec hirsuto, simile Apio sapore, odore, floribus, semine & radice.

LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquosis locis.

TEMPVS.

Iulio mense floribus & semine pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Idem quod Apium satiuum temperamētum obtinet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eadem omnia quæ satiuum potest.

EX PLINIO.

Eleoselino vis priuata contra araneas.

DE ELLEBORO ALBO.

CAP. CIIII.

Ellebori radice nobis sola cogniti, noster enim elleborine quædam verius fuerit.

NO-

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

EΛλ'Εορρς Λδυχς Græcis, Elleborus cādidus
& Veratrum album Latinis, officinis pariter
Latinis Elleborus albus, Germanis Vucisz niesze-
uurtz (Gallicè Ellebore blanche) appellatur.

Elleborus Elleboron autem Græci dictum volūt, quòd cibum
cur dictus corporis eripiat. Album à radice vocarunt, qua ni-
Albus quagri respectu candida est.

re cognos-

FORMA.

minatus.

Plantagini similia folia obtinet, aut Beta sylue-
stris, breuiora tamen, nigriora, & colore rubentia.
Caulem palmi altitudine, cauum, quum siccari in-
cæperit corticibus seu tunicis inuolutum. Radices
illi subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo
capite ceparum modo prodeuntes. Quod autē Dio-
scorides dicit colore rubere folia, id de costis eorum
intelligendum erit.

LOCVS.

Nascitur in montanis locis frigidis & asperis.

TEMPVS.

Radices eius per messem legenda sunt.

TEMPERAMENTVM.

In tertio ordine est excalefacientiũ & exiccantiũ.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Optimũ habetur qui mediocriter extensus est
& albus, fragilis, carnosus, nõ acuminatus, iũccũse
que, aut quũ frangitur puluerulentus, exilem inter
viorem medullam habens, gustu non admodum fer-

uens,

uens, neque saluam confertim ciens. Huiusmodi autem strangulat. Purgat vomitionib; varia educens. Miscetur collyriis, quæ claritati oculorū officientia purgare possunt. Menses ducit, & fetus in utero appositus enecat. Sternutamenta cit, & mu- res interficit, cum melle & polenta subactum. Car- nes simul coctum minuit. Datur ieiunis per se & cum Sesamo, aut Ptisana succo, aut Alica, aut mul- sa, aut pulte, aut lenticula, aut alia sorbitione. Pa- ni compinsitur & torretur. Apparatus & victus ratio ab iis tradita est, qui de ratione & modo dā- di eius, dicato priuatim opere, scripserunt. Potissio- mum autē Philonidi Siculo ab Enna subscribimus. Longum enim esset ei qui de medica materia agit, curandi quoque rationem docere. Dant autē aliqui cum copiosa sorbitione, aut succo multo, aut modicū cibum dari præcipientes, statim Elleborum offerūt, præsertim iis in quib; suspecta timendāve erit strā- gulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tutō e- nim ea sic peragitur purgatio, quod non intempe- stiue medicamentum corporibus cibo munitis acce- dat. Sedi etiam balani ex Elleboro subdita cū acce- to, vomitiones eliciunt.

EX GALENO.

Elleborus extergentis simul & excalfacientis facultatis est. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, leprasq; accommodus est. Quinetiam si in fistulam callo indurata infundatur duobus tri-
būsve

PLANTARVM HISTORIAE

hūſve diebus, callum detrahit. Dentibus ſi cū aceto colluantur prodeſt.

EX PLINIO.

Candidum veratrum vomitione, cauſasq; morborum extrahit: quondam terribile, poſtea tã promiſcuū, vt plerique ſtudiorum gratia ad prouidenda acrius quæ cōmentabantur, ſepius ſumptitauerint. Carneadem reſponſurum Zenonis libris: Druſum quoque apud nos, tribunorum popularium clariſſimum, cui ante omnis plebs adſtās plauſit, optimates verò bellum Marſicum imputauere, conſtat hoc medicamēto liberatum comitiali morbo in Anticyra inſula. Ibi enim tutiſſimè ſumitur, quoniam vt diximus, Seſamoides admiſcent. Italia veratrum vocat. Farina eius per ſe & mixta radicle qua lanas diximus lauari, ſternutamentū facit, ſomnūque. Leguntur autem tenuiſſimæ radices breuesq; ac veluti decurtate etiam hæ. Nā ſumma quæ eſt craſſiſſima, cepis ſimilis, canibus tantū datur purgationis cauſa. Antiqui radicem corticemq; carnoſiſſimum eligebant, quò tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis ſpongiis opertam turgeſcentēque, in longitudinem ſindebant. Deinde fila in vmbra ſiccabant, iis vtentes. Nunc ramulos ipſos à radice ſua grauiſſimi corticis, ita dantes. Optimum quod acre guſtu, feruensq; in frangendo puluerem emittit. Optimum præterea quod celerrimè mouet ſternutamenta, ſed multo terribilius nigro, præci-

pui si quis apparatus potuorum apud antiquos
 legat, contra horrores, strangulatus, intempestivas
 somni vires, singultus infinitos, aut sternutamenta,
 stomachi dissolutiones, tardiores vomitus aut longi-
 quiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum vi-
 tium erat, quod propter hos metus parcius dabāt,
 cum celerius erumpat, quò largius sumitur. The-
 mison binas non amplius drachmas donauit. Se-
 quentes et quaternas dedere, claro Herophili præ-
 conio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini
 aquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in-
 primis exire. Præterea mirū inuentum est, quod in-
 cisum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, me-
 dulla cadit. Hac in nimia purgatione data, vom-
 itiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne
 nibilo detur die, quippe impatientes cruciatus exis-
 sūt. Nam æstate potius quàm hyeme dandum, nō
 est in dubio. Corpus septem diebus preparandum
 cibis acribus, abstinentia vini, quarto & tertio die
 vomitionibus, pridie cœna abstinentia. Albū è dila-
 ti datur, aptissimè verò in lacte aut pulce. Nuper
 inuenera dissectis raphanis inserere Elleborum, rur-
 susq; comprimere raphanos, vt transeat vis, atque
 eo lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas
 incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Me-
 detur in morbis comitialibus, vertigini, melanchon-
 licis, insanientibus, lymphaticis, glephātia albæ, le-
 pri, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, inci-
 pientibusq;

PLANTARVM HISTORIAE

natalem, vt comprehensum est, floret. Sylvestris autem verè & initio aestatis.

TEMPERAMENTVM.

Quā experientia testetur Elleborum nigrū adulterinum, potissimum hortensem, eandem quam genuinum habere facultatem, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaque & siccus in tertio ordine erit.

VIRE S.

Purgat perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flauā bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, melancholicis, insanientibus, articulorum doloribus correptis, & resolutis. Menses in pessa subditis trahit. Foetus necat. Porro cum illis etiam insit extergendi vis, alphas, impetigines, scabiem, leprasq; curant. Erodentibus medicamentis commiscetur. Ideoque sylvestris non temere, quod pediculos interficiat, Leuszkraut Germanis meis dicitur. Non verò pediculos tantum, verum etiam oues & alia animantia comestus necat.

DE HELXINE. CAP. CVI.

Helxine Parietaria nobis.

NOMINA.

Ελξίνη, ἡ ποδάρκιοις Græcè, Helxine & Vrsceolaris Latine nominatur. Officina vocant parietariam, & dempta vna litera Paritariam. Vulgus Muraliū & Muralem, Germani Tag vnd nacht, s. Peterskraut, oder Glaszkraut. (Gallicè

licè Parietaire.) Helxine autem ab aspero semi- Helxine
ne quòd tenaci nexu vestibus adhæret, dicta est. vnde di-
Perdiciū verò, quod ea perdices præcipue vescan- et a.
tur. Vrceolaris autem, quòd detergendis vitreis, vr- Perdiciō.
ceolis vasisq; efficax sit. Muralis & Parietaria, Vrceola-
quòd muros ac parietes natales locos sibi fecerit. ris.

FORMA.

Muralis.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia Mercuriali similia, hirsuta, circa caules veluti exigua raria semina, aspera, vestibus adhærentia. Hæc sanè pietura sic planta illi respondet, vt nulla prorsus sit nota quæ illi non adamussim conueniat. Est enim fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter rubescentibus, foliis Mercurialis herba, hirsutis, floribus purpureis minutissimis, exili per ambitū eius semine, aspero, vestibus adhærente, radice subrubra, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, maceriis, parietibus & vinetis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergendis & constringendis cum humiditate subfrigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi constringend. q. vim obtinēt.
 Quare illita sacros ignes sanant, condylomata, a-

v

dusta,

PLANTARVM HISTORIAE

natalem, vt comprehensum est, floret. Syluestris autem verè & initio aestatis.

TEMPERAMENTVM.

Quā experientia testetur Elleborum nigrū adulterinum, potissimum hortensem, eandem quam genuinum habere facultatem, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaque & siccus in tertio ordine crit.

VIRE S.

Purgat perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flauā bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, melancholicis, insanientibus, articulorum doloribus correptis, & resolutis. Mensēs in pessa subditis trahit. Foetus necat. Porro cum illis etiam insit extergendi vis, alphas, impetigines, scabiem, leprasq; curant. Erodentibus medicamentis commiscuntur. Ideoque syluestris non temere, quod pediculos interficiat, Leulz kraut Germanis meis dicitur. Non verò pediculos tantum, verum etiam oues & alia animantia comestus necat.

DE HELXINE. CAP. CVI.

Helxine Parietaria nobis.

NOMINA.

Ελξίνη, ἢ ποδάρκιοις Græcè, Helxine & Vireccolaris Latine nominatur. Officina vocant parietariam, & dempta vna litera Paritariam. Vulgus Muraliū & Muralem, Germani Tag vnd nacht, S. Peterskraut, oder Glaszkraut. (Gallicè

licè Parietaire.) Helxine autem ab aspero semi- Helxine
ne quòd tenaci nexu vestibus adheret, dicta est. vnde di-
Perdicium verò, quod ea perdices præcipuè vescan Eta.
tur. Vrccolaris autem, quòd detergendis vitreis, vr- Perdiciò.
ccolis vasisq; efficax sit. Muralis & Parietaria, Vrccola-
quòd muros ac parietes natales locos sibi fecerit. ris.

FORMA.

Muralis.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia Mercuriali similia, hirsuta, circa caules veluti exigua
 semina, aspera, vestibus adherentia. Hæc sanè pi-
 ctura sic planta illi respondet, vt nulla prorsus sit
 nota quæ illi non adamussim conueniat. Est enim
 fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter ru-
 bescentibus, foliis Mercurialis herbae, hirsutis, flo-
 ribus purpureis minutissimis, exili per ambitum eius
 semine, aspero, vestibus adherente, radice subrubra,
 fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, maceriis, parietibus
 & vinetis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergendi & constrin-
 gendi cum humiditate subfrigida.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi constringend. q. vim obtinet.
 Quare illita sacros ignes sanant, condylomata, a-
 v
 dusta,

PLANTARVM HISTORIAE

dista, incipientes panos, inflammationes omnes, & cedemata. Succus eius cerussæ mixtus, ignib. sacris & iis quæ serpunt malis vtiliter illinitur. Inungitur podagris cum cerato Cyprino, vel seuo hircino. Diuturnas tusses adiuuat, cyathi mensura absorptus. Contra inflammatas tonsillas gargarissatus & illitus prodest. Aurium quoque dolores cum rosaceo infusus iuuat.

EX GALENO.

Vim habet abstergendi & paulatim constringendi ac refrigerandi. Quare phlegmonas omnes inter initia, & in augmento vsque ad statum sanat, maxime calidas. Quinetiam incipientibus phrygethlicis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoque eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandum item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum iis qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerunt. Certè euidentis extergendi experimentum præbet & in vasis vitreis.

EX AETIO.

Exterit alopecias & impetigines priuatim aspiduè illita. Sedis hæmorrhoidas aperit, fistulis medetur, & sinus cohibet trita & cum modico sale apposita.

EX PLINIO.

Hæc inscit lanas, sanat ignes sacros, tumores, collectionesq; omnes & adusta. Panos succus eius cum psimmythio, & gutturi incipientia turgescere. Itè

veterem

veterem tuſſim cyatho hauſto. Et omnia in humido. Sicut tonſillas & varices cum roſaceo. Imponitur & podagris cum caprino ſeuo ceraq; Cypria.

APPENDIX.

Monēdi ſunt hoc loco medici vt rectum Helxines uſum diſcant. Nam haſtenus non rectē eam in frigidis vitiis pro fomento uſurparunt, cum refrigerandi conſtringendiq; vim habeat. Ceterum cum abſtergendi quoque illi facultas inſit, poteſt etiam calculoſis, & iis qui difficultate vrinae laborāt exhiberi potiſſimum ſi aliquid cōſimilem facultatem obtinens ei admiſceatur. Sic Aetius ſedis hēmorrhoidas aperire tradit, ſi trita cum ſale, cui etiam abſtergendi vis ineſt apponatur. Quare qui calculoſis hanc herbam propinant, curent vt aliquid quod abſtergendi facultatem habeat, commiſceāt.

DE ERYTHRODANO.

CAP. CVII.

Rubia ſatiua nobis Garance, & ſylueſtris frequens.

NOMINA.

Eρυθρόδανον Græcè, Rubia Latine vocatur. Rubiacur Officina rubeam tinctorum appellant. Ger- vocata. manicè Kote (Gallicè Garance) nominatur. A rubore radice, quo lana & coria tinguntur, factum illi vtrunq; nomen eſt.

GENERA.

v. ij

Dioſco

PLANTARVM HISTORIAE

Satīna. Dioscoridi & aliis duo Rubiæ sunt genera. Altera enim satīna est, altera verò sponte provenit, et sylvestris existit: nec esse videtur alia quàm quæ à nostris Stellaria vocatur.

FORMA.

Caules satīnæ quadranguli, longi, asperi, similes Aparinæ, multo tamen maiores robustioresq; folia per intervalla in singulis geniculis habentes, stellarum modo in orbem circumiacentia. Fructus rotundus, per initia viridis, mox ruber, postea cū maturuit niger. Radix tenuis, longa, rubra. Sylvestris itidem caules quadrangulos, vt diximus, emittit, folia per intervalla in singulis geniculis stellarū instar in orbem circumiacentia, flores candidos, radicem tenuem, longam & rubram, adeò vt suo colore tingere etiam videatur.

LOCVS.

Nascitur in plerisque nunc Germaniæ locis, agropotissimum Argentoracensi & Spirensi. Seritur autem propter emolumentum quod ex ea quaestuosissimum sentitur.

TEMPVS.

Aestate colligitur fructus, & subinde etiam effoditur radix.

TEMPERAMENTVM.

Calida est in secundo ordine, & sicca in tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix urinā ciet, quæ de causa regio morbo la-

borantibus cum aqua mulsa auxiliatur: itē ischiadiciis & resolutis. Vrinam multam & crassam ducit, nonnunquam etiam sanguinem. Bibentes quidē quotidie lauari oportet, & excrementorū quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus venenatorum morsus succum cum foliis bibere prodest. Semen ex oxymelite potum, lienem absomit. Apposita radix, foetus, menses, & secundas trahit. Albas vitiligines ex aceto illita sanat.

EX GALENO.

Rubia tinctorum radix acerba & gustu amara est. Itaque quacunque agere diximus vbi eiusmodi coinerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicias: quippe quum & lienem & iecur expurget, et urinam crassam copiosamq; ac nonnunquam etiam sanguinolentam moueat. Quin & menses ciet, ac mediocriter quæ extersionem postulant, extergit: proinde vitiligines albas cum aceto illita inuat. Sūt qui eam ischiadicis & resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

EX PLINIO.

Erythrodanū, quam nos Rubiam vocamus, quæ tinguntur lane, pellesq; perficiuntur, in medicina urinam cit, morbum regium sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & paralyticos, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix semenq; trahūt menses, aluum sistunt, & collectiones discutiunt. Contra serpentes rami cum foliis impo-

PLANTARVM HISTORIAE

nuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum.

DE ZEA. CAP. CVIII.

Zea spelta nobis.

NOMINA.

Zεία Græcis, Zea & Semen Latinis, vulgo
Semen
cur dicta
Zea. & Italis Spelta dicitur. Gallicè del'espeau
(tre) Semen autem latini à præstantia frugis appel
larunt. Hinc est quòd Homerus etiã hanc celebra
uerit dicens, ξείδιωπος ἀπρεα. Quibus sanè verbis
ξείδιωπος
ἀπρεα. innuit aruum Zeam largiens, non vt nonnulli ara
bitrantur quòd vitam donet, Plinio autore.

GENVS.

Duo Zea Dioscorides facit genera. Vnum cuius
grana in singulis tunicis seu glumis gemina, quod
Δίκοκκος Græcis eam ob causam Δίκοκκος cognominatur.
Germanis hoc genus Speltz, oder Dinckelkorn
vocatur. Alterũ simplicis est grani, & Germanicè
nominatur. Einkorn, oder S. Peters korn.

FORMA.

Primum
genus. Primum genus culmo, geniculis & spica tritico
simile est, duobusq; vtriculis iunctis duo grana si
mul fert. Alterum culmo & spica est breuioribus,
Alterum. grana singula in singulis tunicis duplici ordine seu
versu dispositis proferens, ac in summitate aristis
suis plane hordeum refert.

LOCVS.

Letum pingueq; solum desiderat.

TEMPVS.

Iunio mense floret, Iulio autem maturitatem consequitur.

TEMPERAMENTVM.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeum, quatenus ad calefaciendi & refrigerandi facultatem attinet, placidè verò exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Zea magis nutrit quàm hordeum. Ori suavis est. Digesta in panificia minus quàm triticum alit.

EX GALENO.

Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici & hordei: itaque ex illis cognoscatur.

EX PLINIO.

Zea farina efficacior hordeacea videtur, trimestris mollior. Ex vino rubro ad scorpionum iclus tepida, & sanguinem excreantibus. Item arteria. Tussi cum caprino seuo aut brutyro. Ex Fænogreco mollissima omnium. Vlcera manantia sanat, & furfures corporis, stomachi dolores, pedes & mammas cum vino & nitro cocta.

EX SIMEONE SETHI.

Zea facultatē habet proximam tritico. Est verò facilis concoctionis, bonique succi: ad hæc etiam emplastica existit.

PLANTARVM HISTORIAE
DE ERIGERONTE. CAP. CIX.
Senecio nobis senecon.

NOMINA.

Hειρύπων Græcis, Senetio latinis, officinis in-
usitata, Germanis Grindtkraut (Gallicè
Erigeron du Senelton) dicitur. Græcis autē Erigerō quasi
cur dicta. vernus senex nominatur, seu citò vel vere senescēs
quod celeriter in pappū & lanuginem abeat. Ita-
que compositione nominis, tempus simul quo floret,
& floris mox deflorescentis euentum, indicare vo-
luerunt Græci, vt quo tempore querenda, & qui-
bus notis inuenienda esset, omnes scirent. Non igitur
senectutis ratio aliqua in ea est, sed canescentes
humani capilli modo post florē eius pappi, vt à se-
nectute denominaretur, effecerunt. Eam etiam ob
Senetio. causam Romani Senetionem illam vocauerunt.

FORMA.

Herba est cauliculo cubitali, subrubro, foliis cō-
tinuis, in extremitatibus Erucæ modo incisuris di-
uisis, sed minoribus multo: floribus luteis, celeriter
scissis dehiscentibusve, & in pappos deflorescenti-
bus: vnde & Erigeron dicta est, quod vere scilicet
capilli modo flores canescant. Radice inutili. Oma-
nes hæ Dioscoridis notæ; herbe quam Germani
Creutzuurtz & Grindtkraut nominant, respō-
dere deprehenduntur. Siquidem cauliculus est illi
cubitalis, subruber, folia cōtinua habēs, per extre-
mitates Erucæ instar laciniōsa, minora tamen. Flo-

*res lutei, qui scissi statim in lanuginem abeunt. Erigeron Senetio-
rant toto cælo qui Senetione Nasturtium esse gar- nō est Na-
riunt. LOCVS. sturtium.*

Nascitur passim in sepibus, & circum oppida.

TEMPVS.

*Verè erumpit, quo etiam tempore, vt dictū est,
canescit,, & durat ferè tota æstate eius herba pro-
uentus. TEMPERAMENTVM.*

*Erigeron, Paulo Aegineta autore, mixtā tempe-
raturā obtinet: refrigerat enim & modicè discutit.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Folia cum floribus refrigerandi vim obtinent,
quapropter cum exiguo vino, aut per se illita folia,
testium sedisq; inflammationes sanant. Cum mana-
na, tum reliquis vulneribus, tum nervorum quoq;
medentur. Idem præstant pappi per se ex aceto illi-
ti, verum recentes epoti strangulant. Totus autem
caulis in aqua decoctus, & cum passo potus, stoma-
chi dolores à bili contractos persanat.*

EX PLINIO.

*Lanugo eius cum croco & exiguo aqua frigide
trita illinitur epiphoris. Tosta cum mica salis, stru-
mis. Erigeron quoque cum farina thuris & vino
dulci, testium inflammationes sanat.*

DE HEDYOSMO. CAP. CX.

*Mentha nobis nomen retinet, & Balsamū
quoque dicitur multiplex.*

NO.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

H $\delta\upsilon\omicron\sigma\mu\omicron\varsigma$, ἢ $\mu\acute{\iota}\nu\theta\eta$ Græcè, Mēta Latinè dicitur. Officina nomen latinum retinuerunt. Hedyos Germanicè Muntz (Gallicè de la Mente) vocatur. Hedyosmon Græci, quod suauem spiret odorem dictum. nominauerunt. Menta autem dicta est, quod odore Menta. suo mētem excitet, aut quod grato, vt ait Plinius, odore mensas percurrat.

GENERA.

Menta in vniuersum duo sunt genera. Vna enim Satina ge satina & hortensis est: altera sylvestris & fera. Satina iterum quatuor præcipua sunt genera. Vna est quam Germani Deyment simpliciter, vel kraufz Deymēt vocant. Altera, quā iidē kraufz Balsam. Tertia, quæ iidē Balsammuntz appellatur, & Vnser Frauen mütztz oder spitz mütztz: à nostra ætatis herbariis Romana vel Saracenica. Quartam Germani quidam Hertzkraut nonnulli Balsamkraut vocant. Per me tamen licebit has species, quādoquidem facultatib. similes sint vt cuius placuerit, nominare. Nobis autem vt certius discernerētur prædictis nominib. appellare placuit. Sylvestris, quæ latinis Mētastrum vocatur, & vulgò equina Menta, Germanicè Roszmuntz Vuilder Balsam, oder Vuild Muntz dicitur. Non ignoramus plures esse Mēta species, nos tamen eas duntaxat quas vidimus, pictas exhibemus.

FORMA.

Satina

*Satiua prima caulē habet quadrangulum, à ras Prima.
dice lentē punicantem, & lanugine pubescentē, fo-
lium ferè rotundum, serratum, molle & odoratum,
flosculos purpureos internodia geniculatim coro-
nantes, verticillato semper ambitu. Altera priori Secunda.
per omnia similis est, nisi quòd illi subpurpureus
flos circa cauliculorum fastigia spicatur. Tertia fo-
lio longiore & acutiore constat, flosculis purpureis
coliculorum cacuminibus spicatim insidentibus.
Quarta itidem longioribus foliis est, floribusq; pur-
pureis internodia geniculatim, haud secus quàm in
prima, caules coronantibus. Mentastrum verò foliis
lanugine canescentibus, atque hirsutioribus, Sism-
brioprocerius, odore magis viroso, flosculis spicatim
coliculorum fastigia coronantibus.*

LOCVS.

*Satiue passim in hortis proueniunt. Amant apri-
cum locum, non pinguem, non stercoratum, humidis
facilius adoleseunt. Sylvestris autem, quæ Menta-
strum alio nomine appellatur, viginosis gaudet lo-
cis, passimq; irrigua hoc Mentastro pubent.*

TEMPVS.

Florent omnes mense Augusto.

TEMPERAMENTVM.

*Vtraq; tam hortensis scilicet quàm sylvestris, gu-
stu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine
excalefaciētiū. Infirmior tamē est hortēsis, minusq;
calefacit. Exiccat autē in secundo ordine: illi enim*

PLANTARVM HISTORIAE

ex cultura aliquid humiditatis accedit.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi, adstringendi atque exiccandi vim habet menta hortensis. Proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerē concitat. Singultus, vomitiones, choleramq; sedant duo aut terni surculi cum acidi granati succo poti. Cum polenta illita abscessus discutit. Imposita fronti, capitis dolores mitigat. Mammæ quæ tenduntur, aut lacte turgent, compefcit. Cum sale canum morfibz illinitur. Aurium doloribus eius succus cum aqua mulsa subuenit. Mulieribus ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabritiem confricata lenigat. Lac coire densariq; in caseum nō sinit, immersis in iis foliis. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarē rem vsū habet. Sylvestris in sanitate deterioris vsus est quā satina.

EX GALENO.

Menta satina ad venerem mediocriter excitat, id quod omnibus inest, quæ humiditate semicocta & flatuosa participant. Denique in abscessibus aliqui eam cum polenta imponunt. Habet etiā quidam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit, acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis excreationes reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba tenuium partium. Actius addit, potum eius decoctum tribus seriati-

tim diebus, colicos omnino sanare.

EX PLINIO.

Mente hortensis odor animum excitat, & sapor
 auiditatem in cibis: ideo in mammarum mixtura
 familiaris ipse accedere, vt coire densariq; lac nō
 patiantur. Quare lactis potionibus additur, ne hu-
 ius coagulati potu strangulentur. Data in aqua &
 mulso, eadem vi resistere & generationi creditur,
 cohibendo genitalia densari. Acquē maribus &
 fœminis sanguinem sistit, & purgationes fœmi-
 narum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, cœlia-
 cerum impetus. Syriation & vomicas vuluæ cura-
 uit. Ille & iecinorum vitia ternis obolis ex mulso
 datis. Item sanguinem excreatibus in sorbitionem.
 Vlcera in capite infantium mirè sanat. Arterias hu-
 midas siccatur, siccas adstringit, pituitas corruptas
 purgat in mulso & aqua, Voci succus sub certami-
 ne utilis duntaxat, qui & gargarisatur vna tumē-
 te, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis et cō-
 tra tonsillas cum alumine, lingue asperæ cum mel-
 le. Ad conuulsa intus per se, vitiisq; pulmonis. Sin-
 gultus & vomitus sistit cum succo granati, vt De-
 mocritus monstrat. Recentis succus narium vitia
 † Aliās
 † spiritu subducto emendat. Ipsa trita cheleras in spiritus
 aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus: Ileū subdu-
 etiam imposita cum polenta, & si mammae tēdan-
 tur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumi-
 tur & contra scolopendras, & scorpiones marinos,

PLANTARVM HISTORIAE

& ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis vitis. Impetigines quoque, vel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eam in horto gustatā, ita ne vellatur. Aridae quoque farinam tribus digitis apprehensam, & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersa in positionem, ventris animalia pellere.

APPENDIX.

Animaduertendum, ea quæ Plinius Mentastro tribuit, Calaminthæ deberi, ut satis liquet Dioscoridem legenti. Neque sanè mirum, quandoquidem autores societate quæ est inter Mentam, Mentastrium & Nepetam decepti, tum species, tum nomina confundunt.

APPENDIX ALTERA.

Ceterum appendicis etiam vice hic annotandum erit, Aristotelem sectione xx. proble. secundo, cum asserit Mentam refrigerare posse corpora, non pugnare cum Galeno aliisque medicis qui illā esse calidam affirmant. Per se nanque calida est Menta: at quia esæ libidinem prouocat, & hæc cum immodica fuerit corporis vires detrahit, atque adeò animum & corpus refrigerat, ideo eam ex accidente, quia videlicet ut in venerem immodicè ruamus efficit, refrigerare dixit Aristoteles.

EX SIMEONE SETHI.

Iunat iecur frigidum, & ventrem corroborat

ac stomachum, coctionem facit, vomitum sedat & singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lubricos interimit, potissimum sylvestris Mentæ ius. Venerem stimulat, & iccinoris obstructiones tollit. Verum hoc vesi ad satietatē non oportet, quoniam sanguine extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauā bilē mutat: deinde efficit ut sanguis qui maxime est tenuiū partiū discutiatur, & crassus ac melancholicus relinquatur, atq; idcirco oportet biliosos ab ea abstinere. Cōtrita cū sale, & morsui rabiosi canis imposita medicamentū sit salubre. Arida verò trita, & post cibum sumpta, ad concoctionē facit, & lienosos iuuat. Cū vino pota difficulter pariēti succurrit. Ferunt etiā quod mansa lippienti imposita, fiat remedium: quodq; eius decoctum absortū, confestim sanguinem ē faucibus eiicientes sanet. Huius semen ventrem purgat, & pulmonem ledit.

DE HEMIONITIDE CAP. CXI.

Hemionitis tua est Dioscoridis phyllitis, vulgaris scolopendria. NOMINA.

Hμιονίτις, ἢ σκολοπένδιον Græcis, Hemionitis Scolopendria latinis, Plinio Tescrion, officinis et hebarariis draca officina Scolopēdria & Lingua ceruina, Germanis Hufnarum. zung (Gallicè Langue de Cerf) nominatur. Aza, tamen est à Dioscoridis Scolopendrio, quæ Azsplenon alio nomine dicitur. FORMA.

Folium Dracunculo simile profert, lunatū. Radices

PLANTARVM HISTORIAE

Scolopendria est Hemionitis. dices verò illi multæ subsunt, tenues. Neque caulem, neque semen, neque florē fert. Ex qua descriptione satis liquet, eam herbam quam vulgus Scolopendriam vocat, esse Hemionitid, quòd tota illi

Scolopendria non est Phyllitis. Dioscoridis pictura, nulla reclamante nota, conueniat. Sunt enim illi folia Dracunculi seu Ari, instar lunæ corniculantis falcata. Et si enim interdum in altum surgant, tamen inter initia potissimum incurua, & lunæ crescentis modo falcata sunt. Radicibus etiam coheret multis exilibus, nunquā florescens, nec caulem, nec semen proferens. Non esse autem Phyllitid in primis folia docent, quæ in ea sunt recta, & minimè sicut in Lingua ceruina lunata. Dein in tergo veluti vermiculi, qui in Phyllitide pensiles, in Lingua ceruina autem sessiles & nequaquam propendentes sed liratim digesti sunt. Tertio natales ipsi: Phyllitis enim in vmbrosis opacisve, & hortis nascitur, Scolopendria verò seu Hemionitis in petrosis. Quarto, quod me omnium maxime mouet, Phyllitidi nulla prorsus lienem liquandi facultas inest, quam tamen Scolopendriae vulgari adesse, præter communem consensum, quotidiana etiam experimenta demonstrant. His itaque de causis Phyllitis, Scolopendria vulgaris esse aut dici nõ debet. Dato enim quòd descriptio per omnia conueniret, facultates tamē ipsæ, quæ diuersæ sunt, aliam à Scolopendria esse manifestè docerent.

LOCVS.

Nascitur

Nascitur locis vmbrosis, montosis ac petrosis, copiosissime autem iuxta montem haud procul à Tubinga situm, què Germanico vocabulo Farnberg nominant, prouenire solet. Nunc passim in hortis habetur.

TEMPVS.

Aestate vsque ad autumnum abundè nascitur.

TEMPERAMENTVM.

Adstringens simul & parum amara est, vnde credibile est in primo ordine esse calidam, & in secundo siccam.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba gustu adstringit. Hæc autem cum aceto pota lienem liquat.

EX GALENO.

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota, lientosis auxilio est.

EX PLINIO.

Medetur lienibus. Constatque sic inuentum: cum exta super eâ proiecta essent, fertur adhæsisse lienibus, cumq; exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion Splenion vocatur. Narrant fues qui radicem eius edunt, si vnde dicitur ne splene inueniri.

Etum.

DE ERYNGIO. CAP. CXII.

NOMINA.

Hέρυγιον Græcis, Eryngium latinis, officinis Iringum corrupto vocabulo Iringus vocatur. Plerique Centumcapita nominant, à numero nimirum capitum quæ in summo obtinet. Plinij tamē Centumcapita, ab Eryngio est diuersa, vt etiā Serapion

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Serapio Serapionis. Si quis enim diligenter eius descriptionis Censuram excutiat, eam planè esse deprehendet, quæ Dioscoridi **Aster Atticus** & **Inguinalis** appellatur. Vt ta est Aster. triusque enim picturae sic sibi respondent, ut planè una esse herba videatur. Germanis **Eryngium** nominatur **Mansztreu**, **Brachendistel**, & **Raddistel** (Gallicè **Chardon** nommè cent testes.

F O R M A.

In genere aculeatarum stirpium est **Eryngium**, cuius folia initio sale condita olerum modo comeduntur. Sunt autem lata, & in ambitu aspera, gustu odorata. Quum vero adolescunt, in multis caulium eminentiis spinis aculeantur: in quorum summitatibus globosa capita, durarum acutissimarumque spinarum ambitu stellæ instar circumuallantur, quorum color modo viridis aut cædus, interdum cæruleus inuenitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & odorata. E qua nimirum delineatione omnibus perspicuum fit, spinam cuius picturam nunc exhibemus, esse **Eryngium**: aculeatis enim foliis & per extrema spinosis conspicitur, odoratis, caule cubitali, in cuius vertice coacta in globum capitula, durorum & acutissimorum spiculorum vallo, stellæ instar radiantur, quorum color in pubertate viridis, adultæ cæruleus flaccescenti candidus conspicitur: radice pollicari, intus candida, foris nigra, sed odorata.

L O C V S.

Nascitur

Nascitur in campestribus & asperis locis. Prope Argentoratum eius magna est copia.

TEMPVS.

Colligi hanc quidam, vt Plinius tradit, cum sol Cancri hospitium tenet, hoc est, sub solstitio, iussere.

TEMPERAMENTVM.

Eryngiū caliditate aut parum aut nihil ea quæ moderata & temperata sunt superat. Siccitatem vero in tenui essentia cōsistentē nō exiguā obtinet.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vim habet calefactoriam radix. Pota mēses & vrinas pellit. Tormina & inflationes discutit. Cum vino iecinorosis, venenatorum moribus, & iis qui letiferum hauserunt succurrit. Bibitur aduersus plura cum Staphylini semine ponere drachma vnius. Appensa & illita tubercula discutere proditur. Radix cum hydromelite pota, opisthotonicis et comitialibus medetur.

EX AETIO.

Potum radice decoctum colicis medetur. Mulso addito calculos, stillicidia, difficultates vrinae, & renū vitia sanat: quod per quindecim ingiter dies, & ieiunos, & in lectū ituros bibere oportet. Quod si cum co Sium quoque decoxeris, magis proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij vsu, nūquam postea minxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissimè vexaretur.

EX PLINIO.

x ij

Clara

PLANTARVM HISTORIAE

Clara in primis aculeatarum Eryngion est, contra serpentes & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachma pondere in vino: aut si plerunque tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra chersydros ac ranas. Omnibus verò cōtra toxica & aconitæ efficaciorē Heraclides medicus, in iure anseris decoctam, arbitratur. Apollodorus aduersus toxica cū rana decoquit, ceteri in aqua. DE THRIDACE. CAP. CXIII.

NOMINA.

Quidam Græcè, Lactuca Latine: officinae latinū nomen retinuerūt: Germanicè Lattich, oder Lactuck (Gallicè Vne Laitue) nominatur. Dicta autem Lactuca est, quòd copia lactis, quod credebatur leniter mouere ventrem, exuberet: vnde apud veteres in primis epulis veniebat, quod Martialis etiam iis testatur verbis:

Prima tibi dabitur ventri Lactuca mouendo
Vtilis.

GENERA.

Lactuca primū in satiuam & syluestrem deducitur. Satiuæ tria sunt genera, crispa nimirum, rotunda, & capitata. Nos vna icone duo complexi sumus genera. Folium enim quod statim à radice erumpit, eam Lactucam refert quæ Latinis crispa, à foliis crispissimis, Germanis krauser Lattich appellatur. Columella lib. xi. cap. iij. Cecilianam & à regionibus in quibus crescit, nominat. Reliqua.

Liqua folia eam quæ rotunda à foliis rotundis vo- Rotunda.
catur, præ se ferunt. Germanicè Breiter Lattich
nominatur. Tertiæ generis Lactuca, quæ Capitata
dicitur, à foliis suis, quæ ubi parum à terra attollũ- Capitata
tur, mæli cuiusdam speciem rotundam obtinent, &
instar Brassicæ capitatæ, in capitis ferè formã ex-
tuberât. Germanis grosser Lattich vel Vueisser
Lattich à semine candido nominatur. Sylvestris
Lactuca sativæ opponitur, sponte enim sua in arvis
nascitur. Germanis Vuilder Lattich nuncupatur.

FORMA.

Sativa prima, cuius imaginem hîc damus, folia
Intybo sativo haud dissimilia habet, in rectumque
surgit, caulibus in summo brachiatum, in quorum
cacumine flores sunt lutei. Altera foliis, quæ crispa
admodum sunt, duntaxat à priori variat, aliàs per
omnia similis. Sic etiã capitata non nisi foliis suis,
idq; dũ paululũ creuerũt, à prioribus differt. Ideo
que duabus picturis, quæ omnes referunt, contenti Lactuca
fuimus. Sylvestris similis est sativæ Lactucæ, radi- Sylve-
ce tamen brevior, proceriore caule, candidioribus stris.
foliis, gracilioribusque, asperioribus, & gustu a-
maris, quæ ut addidit Theophrastus, ubi consum-
mata sunt, aculeantur. Ex qua delineatione abun-
dè constat, Lactucam sylvestrem esse eam herbam
quæ passim nunc ab officinis & herbariis, non sine Officina
magno errore, Endivia dicitur. Ea enim in arvi error.
& vinearum limitibus sponte nascitur, folio La-
s rû

PLANTARVM HISTORIAE

Et luce, & cum adoleuit per oras aculeato, & laci-
niatim serrato, caulibus bicubitali proceritate con-
surgentibus, spinulis inhorrescentibus, quibus succus
inest lacteus, amarusq; , flore vt Lactuca satina lu-
teo. Desinant itaque deinceps ea herba pro Endi-
uia vti medici, si modo rectè cōsultū agris cupiūt.

LOCVS.

Satina in hortis provenit. Sylvestris in arvis &
vinearū hortorūmq; maceriis sua sponte nascitur.

TEMPVS.

Florent Iulio mense, atq; subinde semen proferūt.

TEMPERAMENTVM.

Lactuca satina humidum est frigidumq; olus,
non tamen extremè: siquidem edendo non foret: vt
rūm maximè secundum aqua, vt sic dicam, fonta-
ne frigiditatem. Simeon Sethi frigidam & humi-
dam in tertio ordine statuit. Sylvestris autem mi-
nus refrigerat & humectat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Satina Lactuca stomacho accommodata est, re-
frigerat, somnum conciliat, aluum molliat, lactis a-
būdātiā facit. Elixā magis alit. Illota autem cō-
esta stomachici prodest. Semen eius potum vene-
rem assidue somniantibus opitulatur, & concubia-
tum arcet. Ipsa tamen frequentiores in cibo, claria-
tati oculorum officiunt. Condiuntur muria. Quum
in caulem prodierunt, vim quandam nanciscuntur
succo aut lacti sylvestris Lactuce similem. Sylue-
stris

stris viribus in totum Papaueri similis est, vnde aliqui eius succum Meconio permiscuerunt. Aquosa per aluum purgat potus in posca liquor obolorum duorum pondere. Exerit argema & caliginē. Cum lacte muliebri inuncta ad ambusta prodest. In vniuersum soporifera est & dolorem leuat. Menses trahit. Contra scorpionum ictus, & phalangiorū morsus bibitur. Semen haud secus quā satiuæ libidinum imaginationes in somno, ac venerē arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur succus eius in fictili vase, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolatus.

EX GALENO.

Lactuca ad calidas phlegmonas accommodata est, et ad parua et leuia erysipelata, maioribus tamē satis facere minimē idonea est. Est etiā eduliū sitim arcens. Semē potū genitura profluiū cohibet: quā obrem etiam iis qui libidinosi somniis vexantur, datur. Sic & syluestris Lactuca semen. Cuius quoque succus colligitur, argema & caliginem expurgans. Ad adustiones cū lacte mulierū inungitur. Omnibus alijs oleribus paucissimū sanguinē et vitiosum generantibus, ex sola lactuca non multus quidē, nec vitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis gignitur. Vt plurimum cruda ipsa vescuntur. Aestate autem cū in semen iam proruptura est, in aqua dulci praecoquentes, cum oleo, garo & aceto assumunt, aut cū aliquo ex condimentis, opsoniisve, x iij praesertim.

PLANTARVM HISTORIAE

praesertim iis quae casco constant. Plerique etiam
antequam excaulescat, in aqua elixa vtuntur: uti
ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse coe-
perunt. Nā amicus quidam meus, quum olere hoc
à longo tempore me ut familiari cibo vsum fuisse
sciret, videretque post mandī à me citra magnam
molestiam non posse, cocturae rationem indicauit.
In iuuentute enim, quoniam assiduo os ventriculi
bile effervescebat, aestus moderandi gratia Lactu-
cis utebar. Quum autē ad prouectam aetatem per-
uenissem, olus hoc contra quā in iuuetute somnū
iā studio & industria accersenti mihi, auxilio fuit:
quippe qui etiamnum iuuenis vigiliis dedita opera
me assuefeceram declinante iam aetate, ipsa ex se
in somni, grauius hoc incommodo molestabar. Ad-
uersus quod vnicum mihi praesentissimum remediū
Lactuca vespere cōmāducata semper fuit. Frigidū
ergo humidumq; succum profert, haud quaquā ta-
men vitiosum. Itaq; sicut alia olera à iusta cōcoctio-
ne non excidit, neque alium cohibet, uti neq; im-
pellit. Atque haec illi non immeritō accidunt, quum
nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in
vniuersum aluus sistitur, quemadmodū a salsis, a-
cribus, & omnino abstergendi vim habentibus ad
excretionem concitatur, quorū nihil Lactuca inest.

EX PLINIO.


Est quidē natura omnibus refrigeratrix, & idē
estate grata à stomacho fastidium auferunt, cibiq;
appetentiam

appetentiam faciunt. Diuus certè Augustus Lactuca conseruatus in ægitudine fertur, prudetia Musæ medici, cùm priores eam ob religionem minimè commanducarent, in tantum recepta commedatione, vt seruari etiam in alienos menses eas oxymetrite repertum sit. Venerem inhihent, æstum refrigerant, somnumq; faciunt. Cruditatē ipsa nequaquā faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatē incitat inhihentq;. Ambustis prosunt recentibus, priusquam pustule fiāt, cum sale illitæ. Vlcerā etiā quæ serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in vino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt. Eruptiones papularum ex vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederūt, ad quod vtilissimæ quammaximi caulis & amara. Quidā lacte infundunt. Deferuefacti ii caules & stomacho vtilissimi traduntur, sicut somno, & satina maximè Lactuca, & amara lactensq; quam Miconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse præcipitur, dū tempestiuè capiti inunguntur. Semen satinarū contra scorpiones dari. Semine trito ex vino potu & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edētibz. Quidam tamen frequētiore in cibo officere claritati oculorum tradiderunt.

DE THYMBRA. CAP. CXIIII.

Satureia nomen retinet Sarriete, NO

PLANTARVM HISTORIAE NOMINA.

 ὕμπερ & Græcis, Thymbra Cunilâque latinis, Kunel Germanis (Gallicè de la Sarriette) appellatur.

GENERA.

- Hortensis** Thymbra seu Cunila duæ sunt species. Vna hortēsis seu sativa, quæ quia minori est acrimonia, in condimentario genere eduliis concoquitur: hinc à **Satureia** saturando Satureia dici cœpit. Alii tamen à Satyrus unde dicitur nomen traxisse putant, quòd scilicet marcescentes coitus stimulet. Germanicè Saturon, Hunerful, Ioseplen, Zuuibel oder Gartenhyssop, oder Sergenkraut nominatur. Altera agrestis siue **Sylvestris** rustica Cunila est, quæ peculiariter Thymbra nuncupatur.

FORMA.

- Thymbra similis est Thymo, sed minor atq; tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris viridis. Satureia pedali altitudine surgit, fruticosa, surculosis utrinque cauliculis, folio Hyssopi, flosculis per intervalla ex purpurea candicantibus, odore saporeque gratissimo.

LOCVS.

Thymbra in tenui solo & asperis locis nascitur. Satureia in hortis scribitur passim.

TEMPVS.

Aestate utraque Cunila floret.

TEMPERAMENTVM.

Thymbra calida & sicca in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Thymbra

Thymbra eadem quæ Thymus præstat si consue-
militer sumatur. Vtilis etiam in sanitate eius vsus.
Est etiam satius Thymbra in cunctis syluestri mi-
nor: ad cibum verò utilior, propterea quod non æ-
deò efficax illi sit acrimonia.

EX PAVLO.

Thymbra syluestris eadē quæ Thymus præstat.
Hortensis autem omnibus quidem imbecillior, sed
ad cibum laudatior.

EX PLINIO.

Nusquam vtrunque Thymbrae genus additur,
quippe similis effectus.

EX HERBARIO ANTIQVO.

Farina eius ex vino pota, medetur pulmonis, tho-
racis, & vesicæ vitiis. Ciet vrinas, menses pellit.
Herba ipsa cum floribus Lethargicos excitat calo-
factu, aut coronæ modo capiti imposita. Succus cū
rosaceo auribus infunditur. Cū triticea farina co-
xedicibus illinitur. Satureiæ vsus marcescentes coitus
stimulat, quare à Satyris traxisse nomen putant.
Stomachi concoctiones adiuvat, fastidia discutit,
hebetes oculos exacuit.

DE THLASPI. CAP. CXV.

Thlaspi nobis frequens.

NOMINA.

Θλάσπι, ἢ θλασπίδιον, ἢ σὶ νηπι ἄγριον
græcis dicitur: Thlaspi, Capsella, et Scādula
cū latinis Gal. Senene sauuage. Sūt hui⁹ repositi
herbarii

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Nasturtiū herbarij qui Nasturtium tectorū, & Sinapirusti-
 tectorum. cum, quod digitis friatum sinapim suboleat, appet-
 Sinapiru- lent. Alij Bursam pastoris vocant, non sanè quod sit
 sticum. reuera eius herbe species, sed quod ad formā illius
 Bursa pa- quamproximè accedat. Sic antiquo herbario Bur-
 storis. sam pastoris appellare Thlaspin placuit. Thlaspi
 Thlaspi autem Græcis a fructus forma dictum est, qui Na-
 unde di- sturtio similis est, sed latior, & velut infractus &
 ctum. contusus, θλάσσει enim iisdē contundi est & in-
 fringi, infringēdoq; quod globosum tumidūmveerat
 malleo, lapide, pedēve cū dilatatione exæquare.

G E N E R A.

Duo Thlaspi genera damus, Vnū latioribus fo-
 liis, quod ad Dioscoridis descriptionē proximè ac-
 cedit. Hoc Germanicè Baurnsenff, oder Kresz
 nominatur. Alterum foliis angustioribus constat, et
 Germanicè Besemkraut, quod scoparū vices sup-
 pleat, vocatur. Quare si quispiam hæc duo genera
 ab inuicem distinguere certis appellationibus vo-
 luerit, primum Thlaspi maius aut latifolium, alte-
 rum verò minus aut angustifolium appellet. Dio-
 scorides etiam duo Thlaspios genera facit, vnum la-
 tifolium, alterum angustifolium.

F O R M A.

Herbula est angustis foliis ad digiti longitudi-
 nem, in terrā versis, in extremitatibus incisis, sub-
 pinguibus. Caulem tenuem, duorum dodrantum e-
 mittit, adnascens sibi paucos ramulos habentem,

¶ per totam eius ambitum fructus est in summo modicè latus, in quo semē exiguum Nasturtio simile, disci figura, veluti conquassatum, vnde & nomē inuenit. Florem obtinet album, semenq; acre. Ex ea sanè descriptione satis constat, herbam hanc quam pictā damus esse Thlaspin, angusta enī folia habet, potissimum suprema eius parte, digitali longitudine, in terram se cōuertentia, per extrema leniter incisa, cau' em duūm dodrantum, agnatis in eo paucis calycibus, breui pediculo nitētibus, quadam ligularum vel cochleariorum effigie, in quib. semen continetur Nasturtio simile, sed latius & veluti cōquassatum, quod acerrimi esse gustus deprehenditur, ita vt māsūm Sinapis modo, os & linguā vel licet.

LOCVS.

In fossis, semitis, & sepibus prouenit.

TEMPVS.

Māio & Iunio mēsibus floribus & semine praeagnans inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Semen calfacit & exiccat in quarto ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDĒ.

Calefacit, bilem per superna & inferna purgat acetabuli mensura potum. Ischiadicū in clystere infunditur. Potum sanguinem ducit, & interiores abscessus rumpit, menses cit, & foetus necat.

EX PAVLO.

Semē Thlaspi facultatem habet acrem, adeò vt
internos

PLANTARVM HISTORIAE

internos abscessus potum disrumpat. Menses cit, & fœtus enecat. Per sedem infusum sanguinolēta euacuans ischiadibus prodest. Potest enim alioqui tum supernè, tum infernè biliosos vacuare humores acetabuli mensura epotiū. Infunditur & contra coxendicum dolores. Quinetiam potum sanguinem trahit, & internos abscessus rumpit.

EX GALENO.

Thlaspi semen facultate acre est, adeò vt internos abscessus potum rumpat. Menses mouet, & fœtus necat. Per sedē infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum infernè, tum supernè biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum.

EX PLINIO.

Semen asperi gustus, bilcm & pituitam utrinque extrahit. Modus sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem extrahat. Menses quoque cit, sed partus necat.

DE THERMIS. CAP. CXVI.

NOMINA.

◉ *ῥεμος ἡμερος* Græcis, *Lupinus sativus* Latinis: Officina Latinum nomen retinuerunt: Germanis *Feigbon* (Gallicè *Lupin.*) appellatur.

FORMA.

Vnicum caulem obtinet *Lupinus*, folium quinque fariam aut septifariam dissectum, florem candidum, siliquas in quibus quina senæve intus gran-

na,

na, dura, lata, rufaꝫ; continentur. Radicem luteam capillamentis fibratam.

LOCVS.

Exilem amat terram, arenosam & rubricā præcipuè. Limoso agro nõ exit, culturāꝫ; reformidat.

TEMPVS.

Ter floret, primum Maio, deinde Iunio, & tertio Iulio mense. Post vnumquemque florem siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Immensa amaritudo euidenter calidum & siccum esse monstrat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Farina eius cum melle linctā lumbricos pellit. Ipsi quoque macerati, & amari adhuc comesti idē efficiunt. Decoctum corundem cum Ruta & Pipe re potum idem facit: vnde & lienosis prodest. Eodem gangrenis, vlcera tetra, incipientem scabiem, alphos, maculas, exanthemata, & achoras perfundere vtile. Menses & fetus idem decoctum cū myrrha & melle subditum trahit. Farina eorum cutem liuorēque expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cū aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, et carbunculos rumpit. Decocti pluuiāli aqua donec in succum liquecant faciem abstergunt. Cum radice nigri Chameleonis onium scabiei medetur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta



PLANTARVM HISTORIAE

Et pota cit urinam. Vbi autem edulcati fuerint, triti cum aceto Et poti stomachi fastidium leniunt, Et cibi auiditatem excitant.

EX GALENO.

Lupinus editur coctus, multis antè diebus maceratione in aqua amaritudinē deponens, sitq; tunc nutrimentum crassi succi. Ceterum ut medicamen ita preparatus ex genere est emplasticorū. Qui vero natiuam amaritudinem habet, huic extergendi Et dirigendi vis inest. Lumbricos occidit illitus, Et cum melle linctus, aut cū posca potus. Quin Et decoctum eius lumbricos eiicere potest. Foris identidē persusum, alphos, achoras, exanthemata, scabies, gangrenas, vlceraq; maligna inuat, partim extergendo, partim digerendo, citraq; mordacitatem siccando. Expurgat iecur Et lienē cum Ruta Et Piperis suauitatis gratia assumptum. Elicit menses ac fœtum cum myrrha Et melle adpositum. Porro Lupinorum etiam farina sine mordacitate digerit: nec enim liuida tantum, sed Et strumas Et tubercula curat: atqui tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca hanc decoquere oportet, pro laborantis nimis rum temperamento, Et affectus diuersitate, quod ex vsu est inueniēdo. Digerit item quæ liuida sunt, Et quæcunque modo dictum est prestare decoctū, eadem omnia efficit Et farina. Sunt verò etiā qui Ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

EX PLINIO.

Ex omnibus quæ eduntur sicco nulli minus ponderis est, nec plus utilitatis. Mitescunt cinere aut aqua calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant. Amari contra aspidas valent. Ulcera atra, aridi decorticatiq; triti, supposito lintecolo, ad viuum corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti discantunt. Succus decoctorum cum ruta & pipere, vel in febris datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta annorum. Pueris vero impositi in ventrem ieiunis prosunt. Et alio genere tosti, & in defuncto poti, vel ex melle sumpti. Idem auditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina coram aceto subacta, papulas pruritusq; in balneis illita cohibet, & per se siccatur ulcera. Liores emendat. Inflammationes cum poicenta sedat. Si ad mellis crassitudinem decoquantur, vitilignes nigras & lepras emendant. Rumpunt carbunculos impositi, panos & strumas minuunt, aut maturant. Cocti ex aceto cicatricibus candidum colorem reddunt. Si vero celesti aqua decoquantur, succus ille sinagma fit, quo solent fouere gangrenas, eruptiones pituitæ, ulcera manantia, vtilissimum. Expedit ad lenem bibere, & cum melle menstruis hærentibus. Lienis crudi cum fico sicca triti ex aceto imponuntur. Radix quoque in aqua decocta, urinas pellit. Medentur pecori cum Chamæleonte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in asmurca decocti, utroq; liquore posita mixto. Fumus

PLANTARVM HISTORIAE
crematorum culices necat.

DE IO. CAP. CXVII.

Viola purpurea aut nigra nobis Marria
& quadragesimalis quòd tunc ferè flo-
reat.

NOMINA.

Ion quare dicta. **I**ον τωρ φυρσούη Græcis, Viola muraria vel pur-
purea Latinis, blauu Veiell oder Mertzē vio-
len Germanis (Gallicè Violette de Mars) dici-
tur. Officina simpliciter Violam nominant. Nican-
der Ion Græcis dictam credit, quòd Nympha quæ-
dam Ionie, florem illum Ioni primum dedere mu-
neri. Alij Græci Ion vocatum putant, quòd cum Io
Viola vn- in vaccam à Ioue conuersa esset, terra florem illum
de voca- pabulo bonis eius fuderit. Latini quoque detrita t
ta. litera, Violam quasi vitulam imitatione Græcavis
deri possunt appellasse.

FORMA.

Folium habet minus tenuiusq; quàm Hedera, ni-
grius tamen nec dissimile. Cauliculus statim à ra-
dice medius prosilit, in quo flosculus suauiter olens,
purpureus. Humilis præterea est, statimq; à nume-
rosa radice orbiculata folia sine ramis exeunt. Se-
mē quoq; minutū in folliculis vasculisve rotundis,
ut pictura indicat, extrema ferè æstate producit.

LOCVS.

Nascitur in opacis & asperis locis, ad radices ma-
ximè murorum, hortorum marginibus, & sepibus.

TEM-

TEMPVS.

Viret hac perpetuò, Theophrasto teste, si cultus adhibeatur: tamen vere, & Martio mense floret, quo potissimum tempore colligi flores eiusdem debent. Semina verò in æstate, vt dictum est.

TEMPERAMENTVM.

Viola folia aquam & subfrigidam substantiam superantem possident. Frigidæ autem sunt primo ordine, humidæ verò secundo.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Refrigerandi vim obtinet. Folia eius per se et cū polenta illita, stomacho æstuant, oculorum inflammationibus, sedisq; procidentis auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est cum aqua potum, angina correptis, & puerorum comitialibus mederi affirmant.

EX GALENO.

Folia per se, aut cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigat, Imponuntur & ori ventriculi æstuant, & oculis.

EX PLINIO.

Purpureæ violæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorum priuatim epiphoris, & sede procidente, vuluæve. Et contra suppurationes. Crapulæ & grauedines capitis impositis coronis olfactiue discutiunt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex iis comitialibus medetur,

PLANTARVM HISTORIAE

maximè pueris, in aqua potum. Semē scorpionibus aduersatur.

EX SIMEONE SETHI.

Profunt ad intestinorum dolores, cor vero offendant. Dolores capitis qui sunt à flaua bile sopiunt potæ & odoratæ. Ventriculum irritant, & flauam in eo inuentam bilem. Caput siccum humectant, calidūque refrigerant suo odoratu. Somnum inducunt. Humida capita destillationibus obnoxia reddunt.

DE VIOLA MATRONALI.

CAP. CXVIII.

Violæ matronalis tibi pictio dictæ, nobis Bachares videntur.

NOMINA.

VEteribus Græcis & Latinis cognita fuerint nec ne Viola quæ hodie, quòd eas matronæ colere soleant, matronales vocantur, nondum compertum habemus. Quare vulgari & vsitato nomine, donec rectius inuentum fuerit, utemur. Germanicè, quòd raræ adhuc in Germania dum ista scriberemus fuerint, Vuelsch veiel appellare volumus, ut nimirū hac nomenclatura à Leucoiis, de quibus suo dicemus loco, segregaremus. Possent etiam haud ineptè Frauenuciel, ad imitationē Latini nominis appellari.

GENERA.

Tria Violarū matronalium damus genera. Pri-

mi enim generis candida est, alterius punicea, tertij purpurea: nec differre admodum nisi solis floribus videntur.

FORMA.

Fruticosa est herba, cubitali altitudine, ramosa, caule & foliis lanuginosis, oblongis, angustis, mellibus ac canescētibus, floribus aut albis, aut puniceis, aut purpureis quadrisoliis, semine in oblongis siliis quis lato ac tenui, radice longa, lignosa, subinsa & acri.

LOCVS.

In hortis & cultis locis proueniunt.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus florent.

TEMPERAMENTVM.

Admodum calidas esse sapor foliorū & radice, qui acris est, abundē docet. Humiditatē autem multam, Galeno lib. 4. cap. 18. de simplic. medi. facult. teste, eo quod amara non sint, admistam habent.

VIREs.

Incidendi & digerendi per halitum vim obtinent. Ideoq; radix aut folia decocta in aqua, conuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Vrinam & menses ducunt, sudoresq; ciendi facultatem habent.

DE IRIDE. CAP. CXIX.

NOMINA.

Iris Græcis, Iris Latinis appellatur: officinis suam appellationem retinuit. Germanis blauu Gil-
y iij gen.

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Iris vnde dicta.

gen, blau Schuuertel, Veieluurtz (Gallicè du glaieul, ou de la flâbe) dicitur. A cœlestis arcus similitudine, quam flores eius representât, vt paulò post dicemus, nomen accepit Iris. Sunt qui non sine pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ita vt Iris ab Ireos, tanquam purpureus color à nīneo, distingui putetur imperitis herbariis. Promanasse autem hunc errorem ex

Causa vulgaris erroris.

Græca voce λείριον, qua Liliū, quod candidos profert flores, genti illi significatur, parū per vnius literæ abiectiōem deprauata verisimile est. Primam nanque literam abiicientes, vltimam verò in σ vertentes, εἶριος dixerunt pro λείριον. Sed hæc opinio indigna est quæ explodatur, cū Dioscoridem & alios veteres omnes seorsim de Iride & Lyrio sine Lilio agere constet.

F O R M A.

Folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora. Flores in caule aequalibus inuicem spatiis distantes, inflexi, varij. Aut enim cādidi, aut virides, aut lutei, aut purpurei, aut cœrulei conspiciuntur. Vnde ob hanc varietatē arcui cœlesti assimilata est. Radices subsunt geniculatæ, solidae, odoratæ: quæ simulatq; fuerint dissectæ, siccantur in vmbra, & filo traictæ recōduntur. Hæc Dioscoridis pictura tota huic herbæ, quam Irim hodie herbarij & officina vocant, suffragatur. Siquidem ea radicibus nititur solidis, geniculatis & odoratis,

adco

adeò vt violarum purpurearum odorem prorsus referre videatur, & hoc nomine à Germanis nostris Veieluurtz, hoc est, Violacea radix, sit appellata. Folia Gladioli faciem simulant, maiora duntaxat, latiora & pinguiora. Caule recto sesquipedalì, è cuius fastigiis pari internacante spatio flores erumpunt, inflexis mutuò foliorum labris, qui nitēt varia colorum mistura, instar cœlestis arcus. Quē admodum enim aquarius ille arcus, qui est imago malè expressi solis, cana nube recepta, varios menitur colores, sicut cœruleas, virides, luteas, purpureasq; lineas ducat, ita cauo calyculi sinu versicolores lituras flores ostendunt, qua diuersa specie cœlestem emulantur arcum. Falluntur itaque qui in toto floris ambitu huiusmodi varietatem perquirūt, cū inflexa foliorum labra vel purpureus, vel cœruleus semper color inficiat.

LOCVS.

Passim in hortis & maceris vinearū puenit. Latissima tamē est quæ in Illyrio & Macedonia nascitur, & melior inter has quæ densa & breui radice constat, quæq; frangenti contumax est, colore subruffa, admodum odorata, gustuq; feruida.

TEMPVS.

Floret vere, Maio potissimum mense, quo sanè tempore flores colligi debent. Radices autem suo tempore, hoc est, autumno.

TEMPERAMENTVM.

y iij

Iris

PLANTARVM HISTORIAE

Iris in altero calefacit ordine, in tertio autē deo-
siccatur. Abstergit quoque & maturat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Irides omnes calefaciendi extenuandiq; vim ob-
tinent. Contra tussim efficaces, humoresque non fa-
cile excreabiles extenuant. Biles ex hydromelite
drachmarum septem pondere pota purgant. Som-
num conciliant. Lachrymas cient. Torminibus me-
dētur. Cum aceto pota venenatorum morsibus, lie-
nos, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus
genitura effluit, auxiliatur. Menses cum vino pota
ducunt. Decoctū earum ad muliebria fomenta vti-
le, molliens aperiensq; locos. Ischiaticis infunditur.
Fistulas & sinus carne explent. Quinetiam glan-
dis modo cum melle apposita, fetus extrahunt.
Strumas veteresq; durities cocta & illita emol-
liunt. Arida vlcera explent, & cum melle purgāt.
Nullata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum
aceto & rosaceo vtiliter illinuntur. Lentigines, cu-
tis in facie vitia cū Elleboro albo, & duabus mel-
lis partibus illita emendant. Pestis, malagmatis &
acopis miscentur. In vniuersum magni vsus sunt.

EX PAVLO.

Iris tussi utilis. Humores in thorace nō facile ex-
creabiles extenuat. Torminibus medetur, vlceraq;
sordida expurgat. Cum mulsā pota aluum ducit.

EX PLINIO.

Infantibus eam circumligari salutare est. Den-
tientibus

rientibus præcipua est & tuſſientibus, tinearum ve
 vitio laborantibus inſtillari. Caterum vlcera pur
 gat, capitis præcipue, ſuppurationes veteres. Aluum
 ſoluit duabus drachmis cum melle. Tuſſim, Tormi
 na, inflationes, pota. Lienes ex aceto. Contra ſer
 pentium & araneorum morſus, ex poſca valet. Cō
 tra ſcorpiones, duarum drachmarum pondere in
 pane vel aqua ſumitur. Contra canum morſus ex
 oleo imponitur. Et contra perfrictiones. Sic & ner
 uorum doloribus. Lūbis verò & coxendicibus cum
 reſina illinitur. Viſ ei concalſactoria. Naribus ſuba
 dita ſternutamenta mouet, caputq; purgat. Dolori
 capitis cum Cotoneis mālīs aut Strutheis illinitur.
 Crapulas quoque & orthopnceas diſcutit. Vomi
 tiones cit, duobus obolis ſumpta. Offa fracta extra
 hit, impoſita cum melle. Ad paronychias farina
 eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet,
 alarūque vitia. Succo duritias omnes emollit.
 Somnum conciliat, ſed genituras conſumit. Sedi
 rimas & condylomata, omniāque in corpore excre
 ſcentia ſanat.

DE HIERACEO. CAP. CXX.

Hieraceum vtrunque hic frequens.

NOMINA.

ΙΕΡΕΚΙΟΝ, ἢ ΣΟΥΧΙΤΗΣ Græcis, Hieraceum Latī
 nis dicitur officiis inuſitatū. Germanicè, quum
 aliud nomen expiſcari non potuerimus, Habich
 kraut (Gallicè Cichorée iaulne) appellauimus.

ad

PLANTARVM HISTORIAE

ad Græcam alludentes appellationem: neque enim Hieraceū alia ratione Græci hanc herbam Hieraceum nō vnde dīcunt, nisi quod accipitres, quos illi ἰόποιγες dīctum. scalpendo eam, succoq; oculos tingendo, obscuritatem cū sensere discutiant. Sonchites autē dicta est, quod Soncho non admodum dissimilis sit, maximè quod ad eius circumferentiam & extremam partem, in qua caules & flores sunt, attinet. Hæc enim & illa concavo, & lacteū succum emittente caule, luteisq; floribus est. Apuleius Lactucā syluaticā appellat. Plinius quoque libro vigesimo, cap. 7. ut alij omnes ferè, in Lactucarum sponte nascentium numero, propter similitudinem, Hieraceon hoc habet. Quàm autem inuicem similes sint Hieraceum & Lactuca sylvestris, vtriusque icones & effigies collatæ monstrabunt.

GENERA.

Hieracei duo sunt genera. maius nimirū & minus. Maius Germanicè groß Habichkraut, minus autem klein Habichkraut nominatur.

FORMA.

Hieraceū maius. Hieraceum maius caulem habet asperum, modicè rubentem, spinosum, cōcavum. Folia per intervalla rarinsculè diuisa, Soncho per circumferentiā similia. Flores in oblongis capitulis luteos. Quæ designatio prorsus hæc quam pictam damus herbam exprimit. Siquidem caulem emittit scabrum, subrubrum, spinulis horrentem, canum, folia ex intervallis

uallis & raro laciniata, Sonchi foliis non dissimilia. Flores in longiusculis capitulis luteos. Minus Hieraceum folia ex intervallis per ambitum diuisuris scissa obtinet. Caules de se emittit cauos, tenebrosos & virides, in quibus flores lutei circulum circumscriptibentes. Quae itidem notae omnes herbae illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

LOCVS.

Vtrumque in quibusdam pratis provenit.

TEMPVS.

In fine Iulij mēsis, & per vniuersum Augustum floret Hieraceum. Succus eius capitur per messes inciso caule.

TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum planè Sonchi temperamento constare videtur, refrigerat itaque & mediocris adstrictionis est particeps. Minus in gustu paulò maiorem amaritudinem refert.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Hieraceum maius refrigerandi, & modicè adstringendi, ideoq; aestuanti stomacho, & inflammationibus illitum prodest. Succus erosionē eiusdem in sorbitione mitigat. Herba ipsa cum radice illita scorpionum ictibus auxiliatur. Minus facultates habet superiori easdem.

EX PLINIO.

Succus sanat omnia oculorum vitia cū lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesque omnes.

PLANTARVM HISTORIAE

omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentium ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalagia, commixto vino ex aceto.

APPENDIX.

Sunt qui tantā inesse huic herba vim cōtra oculorum vitia credant, vt radicem etiam à collo suspensam caliginem oculorum sanare posse dicant.

DE HIPPVRI CAP. CXXI.

Hippuris cauda equina vulgo, multiplex etiam nobis est.

NOMINA.

Equisetū. **Ιπποϋρις** Græcis, Equisetum, herba aut salix equinalis Latinis, recetioribus herbariis verbum **Cauda equina.** verbo reddētibus, Cauda equina, Germanis Roszschuuantz, Pferdtischuuantz, Roszuuadel, Ratz, enuuedel, katzenzagel, kantenkraut, Schaffthouu (Gallicè. Queue de Cheual) nominatur. Nomen tam Græcum quàm Latinum à **Hippuris** caudæ equinae imagine, quam comæ illius præsecur dicta. ferunt, accepit.

GENERA.

Eius duo sunt genera. Vnum longius, quod nonnulli etatis nostræ herbarij ab asperitate quam obstat **Asprella.** tinet Asprellam vocant. Hinc est quod materiarij fabri

fabri ligneam pectinum & aliorum minorum operum rudiatem huius herbae scabritia in nitorem expoliant. Germanicè groß Roizschuuantz dicitur. Alterum breuius est, ad abstergenda vasa aptum. Germani klein Roizschuuantz appellant.

FORMA.

Primum Equiseti genus cauliculos habet inanes, leniter rubentes, subasperos, solidos, geniculis qui inuicem inferuntur dissectos, in quibus folia iuncea, crebra & tenuia. In altitudinem adsurgit, scādendo proximas stipites comis circumfusa depēdet multis, nigris vt equorum cauda. Radix illi est lignosa, dura. Alterum comas per internalla habet breuiiores, candidiores & molliores.

LOCVS.

Longius Equisetum in aquosis locis & scrobibus prouenit, nec eo in fossis prope aquas & vmbrosis locis alia planta frequentior est, vt hoc nomine χαράδραρον Gracis dictum sit. Neque enim χαράδραρον aliud est illis nisi terrae rima & fissura δραρον. εφυσδρον etiam non alia ratione, quā quod εφυσδρον, in aquosis produceretur, nominauerunt. Alterum in pratis inuenitur, nec ferè frequentius occurrit, innisa farnisecis.

TEMPVS.

Vtrunque aestate suis in locis copiose prouenit.

TEMPERAMENTVM.

Adstring

PLANTARVM HISTORIAE

Adstringentem cum amaritudine facultatem, ac proinde valenter simulq; citra mordicationem exsiccantem, obtinet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adstringit, quapropter succus eius sanguinem ex naribus erumpentem sistit. Dysentericis cum vino potus confert. Vrinam cit. Folia cruenta vulnera glutinant trita & inspersa, Herba & radix tussietib. orthopnoicis, ruptisq; succurrit. Quin etiam intestinorum diuisiones, vesicae dissectionem, & intestinorum ramicem coalescere cogique folia in aqua pota feruntur.

EX GALENO.

Vulnera maxima conglutinat, etiamsi praefectos esse nervos contingat: praeterea intestinorum ramices cogit. Caterum ad sanguinis reiectionem, ad fluxum muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alia venteris profluvia generosum est medicamentum herba ipsa aut ex aqua, aut ex vino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam vesicae, & tenuium intestinorum vulnera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluvio sanguinis ex naribus, tum fluxu obnoxii in ventre affectibus ex austerorum quopiam vinorum potus, ac si febre teneatur ex aqua.

EX PLINIO.

Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem ex naribus fluentem inclusus sistit, item aluum. Medetur dysente.

*dysentericis in vino dulci potus cyathis tribus. Vri
nam cit. Tuſſim, orthopnœam sanat: item rupta,
& quæ ſerpunt. Intestinis & veſicæ folia bibun-
tur. Enterocœlen cohibet.*

DE HIBERIDE. CAP. CXXII.

Hiberis in pratis frequens.

NOMINA.

IΒΕΡΙΣ, ἢ καρδὰ μαυτίνη, ἢ ἀγριοκάρδαμου
Græcis, Galeno & Paulo alio nomine Lepidion:
Hiberis, Nasturtium agreste Latinis appellatur. Nastur-
Officinis nostris incognita. Germanis Gauchblum tū agre-
(Gallicè Passeraige sauvage) non alia ratione sc.
quàm quòd pleròsq̃ue qui in illius notitiam non-
dum pervenerunt infatuet. Potest etiam commodè
dici Vuilder Kreiz. Cardamantice, & Agrio- Agriocan-
cardamum Græcis appellata, quòd radici odor in- damō cur-
sit Nasturtij: vel quòd eius folia partim Nastur- dicta.
tio aquatico, quod à Dioscoride Sisymbrium car-
damine dicitur, partim etiam hortensi, quod Car-
damon Græcis nominatur, similia sint: vel quòd gu-
stu Nasturtium referant.

FORMA.

Folia Nasturtio similia habet, verno tēpore vi-
rentia, cubitali lōgitudine, aut minore, flore lacteo,
radicibus duabus, sed vna apud nos frequentius, ni-
titur, odore Nasturtij quàm acerrimo. Ex qua ni-
mirum descriptione omnibus perspicuum sit, hera-
bam cuius picturam exhibemus esse Hiberidæ:
caulem:

PLANTARVM HISTORIAE

caule enim cubitale obtinet, foliaque Nasturtio similia. Quae enim à radice statim exeunt, æquaticæ, quæ verò in supremo caule emicant, hortensis. Nasturtij folia referunt. Verno quoque tempore virent, flos denique lacteus est, hoc est, in albo purpurascens: hunc enim Dioscoridem vocare lacteum florem, satis testatur quarta Ranunculi species, cuius etiam florem, qui colore huius similis est, lacteum esse scribit. Semen quoque in siliquis tam exiguum producit, ut, Plinio etiam teste, vix aspici possit: radicem autem exilem atque acrem, cui inest Nasturtij odor.

LOCVS.

Nascitur incultis locis, circa itinera & prata.

TEMPVS.

Verno tempore apparet, Aprilis potissimum mense & Maio duratque ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus videtur: efficaciorémque usum obtinet, quòd tum semen etiam in siliquis proferat.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine calefacientium, ut Nasturtium, minus tamen eo desiccatur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix calefacit & adurit. Vtilis est ad coxendicis dolores cum suillo adipe salso, emplastrum modo quaternis horis illita. Deinde in balneum descendatur,

scendatur, & oleo cum lana locus perungatur.

EX GALENO.

Similis Nasturtio tum odore, tum gustu, tum viribus.

EX PLINIO.

Coxendicibus & articulis omnibus cum axūgia modica vtilissima, viris plurimum quaternis horis, fœminis minus dimidio adalligata, vt dein in balneum descēdatur in calidā, & postea oleo & vino corpus perungatur, diebusq; vicens interpositis idē fiat, si qua admonitio doloris super sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur in ipsa inflammatione, sed imminuta. Adalligata capiti cum Quinquefolio, epiphoras & si qua in oculis vitia sunt, emendat.

APPENDIX.

Recentiores herbarij eius herbie cuius picturam damus vsū probant contra pediculos, si lixiuio incoquatur. Vnde colligere licebit, eam exiccandi & ex alto euocandi trahendiq; facultatem, haud secus atque Nasturtium aut Sinapi, habere. Nā, Galeno lib. i. de composit. medic. secundum locos, cap. vii. teste, medicamenta quæ phthiriasi medentur, necessariò exiccant atque ex alto trahunt. Vt iterū euidentissimum sit hanc herbam, eo quòd Nasturtij facultates obtineat, esse veram Hiberidā, nō obstante quod rarò aut nunquam duabus, sed vna potius & exili nitatur radice.

PLANTARVM HISTORIAE
DE HIPPOSELINO. CAP. CXXIII.
NOMINA.

Ιπποσελίνον Græcis, Olus atrum Latinis dici-
Officina = tur: officinae eius semine perperam pro Petroselinio
rū error. no macedonico vtūtur. Germanis grosz Epffich,
oder grosz Eppich (Gallicè ache, ou hache)
Hippose = appellatur. Hipposelinon autem à magnitudine di-
linum vn- Etum est: siquidem Græci magnis & amplis re-
de dictū. bus hippo præponere solent, adeò vt Hipposelinum
Olus atrū Latinis nihil aliud nisi grande Apium sit. Olus au-
quare ap- tem atrum vel pullum à foliis, quæ atro colore ni-
pellatum. tent, appellatum esse videtur.

FORMA.

Maïus est hortensi Apio, caule cauo, alto, tenero,
veluti lineas habente, foliis latioribus, subpuniceis,
Libanotidis coma, plena flore, in corymbos ante-
quam defloreat congesta, semine nigro, oblongo, solis
do, acri, odorato, radice odorata, intus candida, ori-
grata, pro caulis magnitudine non admodū densa.
Porro ne mireris quod pictura non ex omni parte
respondeat descriptio: neque enim Hipposelinū inte-
grum, & quod ad perfectam peruenit ætatem, flo-
resq; & semen produxit, damus, sed id tantū quod
primo erumpit. Radicē itaque tantū & folia de-
pingi curauimus, vt quæ Oleris atri, cuius sæpe fit
apud Dioscoridem mentio, forma, saltē in foliis &
radice, esset, cerneret. Annitemur tamen vt aliquā-
do integram eius herbe picturam exhibeamus.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis, & iuxta paludes.

TEMPVS.

Satum tardè prouenit, idèoque factum vt integrè depictum dare nobis haud licuerit. Floret, Plinio teste, aestate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, vt Apium, & siccum in medio tertij.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo ceu Apium. Radix etiam cocta & cruda estur. Quinetiam folia & caules cocti manduntur, & per se aut cum piscibus preparantur. Crudaque ad salgama condiuntur. Semen potum in mulso menses ducit. Rigore concussos calfacit potum & illitum. Vrinae stillicidio auxiliatur. Radix eadem praeostat.

EX GALENO.

Hipposelinisimilis Apio vis est, validior tamen. Mensium autem & vrinae ciendae potissimum facultatem habet, vt liquet ex capite eiusdem de Smyrnio.

EX PLINIO.

Olus atrum quod Hipposelinum vocant, aduersatur scorpionibus. Potosemine torminibus interaneis medetur. Itemque difficultatibus vrinae semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in vino decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur.

PLANTARVM HISTORIAE
DE IXO. CAP. CXXIIII.
NOMINA.

Iξos Græcis, Viscum Latinis & officinis, Germanis Mistel, oder Affolter (Gallicè du Guy, ou de la Glu) nominatur.

FORMA.

Planta est fruticosa, lenta, semper virens, intus porracei coloris, extrà subflava, foliis buxi, acinis exiguis, sine flore.

LOCVS.

Nunquam in terra, sed semper in arbore, quercu præsertim, piro, mâloq; provenit.

TEMPVS.

Autumni initio cum suis acinis decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit cū acrimonia: ex plurima enim æria & aquea, paucissima terrena substantia cōstat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Discutit, emollit, attrahit: tubercula, parotidas, cæterosq; abscessus cum resina & pari cera mixtū, maturat. Epinyctidas in splenio curat. Cū thuæ re antiqua vlcera, et malignos abscessus mollit. Lienes cum calce, aut gagate lapide, aut asio coctum & impositum minuit. Cum auripigmento aut sandaracho illitum, vngues extrahit. Mixtum cū calace & fece, vim suam intendit.

EX GALENO.

Valente.

Valenter ex alto humores extrahit: nec tenues tantum, sed & crassiores eosq; diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus admotæ calfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut Thapsia.

DE ISATIDE. CAP. CXXV.

Isatis sylvestris nobis Guesde.

NOMINA.

IŒTIS Græcis, Isatis Latinis vocatur. Gallis, ut in commentariis suis testatur Cæsar, Glaſtum olim dicebatur, nunc Guadum. Germanis autem ad hoc nomē alludētibz, Vueydt (Gallicè du Guesde, ou Pastel) nominatur. Arabibus Nil, Nilech, & Indicum, ut libro primo Paradox. cap. vigesimo sexto monſtrauimus. Barbari deprauata voce Osatis, Osatim appellant.

GENERA.

Duo Isatidis sunt genera. Vna enim satina, qua tingendis lanis infectores vtuntur. Altera verò syluestris, qua lanarum infectores haud vtuntur. Priorem Germani simpliciter Vueydt, alteram verò cum adiectione Vuild Vueydt nominant.

FORMA.

Satina folia habet Plātagini ſimilia, ſed pinguiora, nigrioraque, cauē duobz cubitis altiorē. Hæc Dioscorides, qui reliquas notas, quæ ſylueſtri ſimiles per omnia ſunt, commemorare noluit. Ex ſylueſtris tamen effigie facile quales ſint æſtimare potez

PLANTARVM HISTORIAE

Syluestris *Isatis* hac enim teste Dioscoride, satina similis est, folia tamen maiora obtinet, ad Lactuce folia accedentia: caules etiam tenuiores, multifidos, rubicantes, qui in cacumine folliculos linguarum figura multos dependentes habent, in quibus semen. Flos ei lutescens & tenuis.

LOCVS.

Isatis satina copiose in Germania prouenit praefertim agro Erphordiano, cui magnum questum adfert. Viridem enim herbam trusatilibus molis premunt, ut herbaceam sanie excludant: dein abacto liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis computrescere in aestate feruente sinunt. Hos cortinis insectoriae coquunt officinae, & lanceos pannos, ac vellera demergunt, ut caeruleum imbibant colorem. *Syluestris* sua sponte in quibusdam Germaniae locis nascitur, ut Tubinga, ubi omnes vinearum maceries hac herba sepe videntur.

TEMPVS.

Maius & Iunius mense florent, ac subinde semen proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Isatis satina valenter admodum exiccantis, nondum tamen mordentis facultatis est: amara enim simul atque adstringens existit. *Syluestris* vero acre quiddam tum gustu, tum actione praefert: proinde valentius quam satina desiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Isatidis

Isatidis sativæ folia omnia cedemata & tubercula illita discutere possunt. Cruenta vulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Ulcera phagedænica, herpetas, erysipelata, & putrescentia sanant. Sylvestris eadem quæ sativa potest. Lienosis etiam pota & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Sativa magna ulcera durorum corporum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint, & sanguinis profluvio laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores cedematodes mirifice discutit, simul & reprimat, omnibusq; ulceribus malignis mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si erodantur. Quod si quando laborantis natura validior appareat, foliis eius tritis aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, pro vincete in vnoquoque affectu, miscere oportebit. Sylvestris vero potentissime humidis putredinibus obsistit, ad cetera vero iam comprehensa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate desiccatur, talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone gravari incipiunt. Ceterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis est, quum altera prodesse nondum possit.

EX PLINIO.

Isatidis folia trita cum polenta, vulneribus pro sunt. Sanguinem sistit. Phagedænas & putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanat. Item tumores ante supurationem. Contra ignem sacrum, radice vel foliis.

PLANTARVM HISTORIAE

prodest, vel ad lienes pota.

DE ITEA. CAP. CXXVI.

NOMINA.

Itea Græcis, Salix Latinis, Vuiden, oder Felber Germanis (Gallicè Saulx) appellatur. Salix verò à saliēdo dicta est, quòd ea celeritate cre-
Itea vnde scat, vt quasi salire videatur. Sic etiam Itea quasi
vocata. Salicem vocauerunt Græci.

GENERA.

Tria Salicis genera Theophrastus lib. iij. capi.
Salix nigra. xij. de historia plantarū recenset. Primam nigram
Candida. nominari dicit, quòd nigro aut puniceo cortice ob-
Pumila. ducta sit. Secundam candidam, quod cādido obdu-
catur cortice. Tertiā coactæ breuitatis ac pumilā,
Helicen Arcadibus appellari scribit. Plinius etiam
lib. xvij. cap. xxxvij. tria Salicis nomina cōmemo-
Viminalis rat: Viminalem, eandemq; purpuream. Vitellinam
Vitellina. à colore luteo, graciliorem priore: Gallicam, quæ sit
Gallica. tenuissīma. Lucius Columella lib. iij. ca. xxx. eius-
Græca. dem quoq; tria facit genera, Græcam, Gallicam, et
Sabinam, quā etiam Amerinam vocari à plurimis
scribit. Græcam flauī coloris, Gallicā obsoleti pur-
Sabina. purei, tenuissimiq; viminis, Sabinā gracilib. virgis
atque rutilibus esse asserit. Quæ sanè singula pul-
chrè cum iis quæ Theophrastus tradit, cōuenire vi-
Prima Sa dentur. Nam primam Salicis speciem, quam Theo-
licis spe phrastus nigram aut puniceam vocat, Plinius Vi-
cies. minalem, Columella verò Sabinam & Amerinam
appellat,

appellat, Germani rot Vuiden nominant. Secunda. Secunda.
 dā speciē, quam Theophrastus candidam, Plinius
 Vitellinam, Columella autem Gracam vocat, Ger-
 mani, geel Vueiden. Tertiam, quæ Theophrasto Tertia.
 Helix dicitur, Plinius & Columella Gallicā ap-
 pellant, Germani verò à tenuitate klein Vueidē.

FORMA.

Salix breui caudice cōsurgit, ramis longis, è trun-
 co extremo veluti à capite prodeuntibus, lentis, fle-
 xilibus: foliis longis, subtus incanis, supernè viren-
 tibus: flore seu nucamento squamatim compactili,
 lanuginoso, propendente, fructu qui facilè ante ma-
 turitatem evanescat.

LOCVS.

Aquosis latatur, ideoq; auctu perquam facilis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere. Ocyssimè amittit fru-
 ctū, antè quàm omnino maturitatem sentiat, ob id
 dicta Homero ὠλεσίκαρτος, hoc est, frugiperda
 Odyss. η. ubi sic canit: μακρὰ τ' αἰγίροι καὶ ἰ-
 τέα ὠλεσίκαρτοι. Fructū siquidem fert, Plinio
 autore, abeuntē in araneā antequam percoquatur.

TEMPERAMENTVM.

Salicis tum folia, tum flores, citra mordacitatem
 exiccantis sunt facultatis, ac modicè adstringunt.
 Cortex tamen eius siccior.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Adstringunt Salicis folia, fructus, cortex & succo
 cus.

PLANTARVM HISTORIAE

eius. Folia trita cum exiguo pipere & vino pota in leosis conueniunt. Per se etiam cum aqua sumpta, praestant mulieribus ne concipiant. Fructus potus anguinem expuentibus prodest. Cortex eadem praestat. Vstus & cum aceto subactus, clauos & callos illitus tollit. Ex foliis & cortice succus in putamine mali punici cum rosaceo calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras ferri optimum. Furfures exerit. Excipitur etiam è Salice succus exciso cum floret cortice: in interiore enim eius parte concretus inuenitur. Vim autem habet exterendi quaecunque pupilla claritati obstant.

EX GALENO.

Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinationem quis uti posset. Verum floribus eius maxime prope omnes utuntur medici ad exiccatis emplastri praeparationem: est enim vis eorum desiccatoria: habet etiam quandam adstrictionem. Sunt qui succum ex ea expressum, medicamen feruent mordacitatis expers & exiccatorium, ad multas res utile. Haud enim inuenias quid ad plures res utilius medicamento citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat. Porro arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod temperatura sit siccioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, cuiusque cinere utuntur ad ea omnia quae valenter desiccare oportet. Nam clauos

nos quos vocant, callos, myrmeciasq; tollunt, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligunt, vtunturq; ad ea quæ pupillas obfuscant, extergente videlicet simulq; tenuium partium medicamine. Vti verò illo ad multa alia quis posset, siquidem talis sit.

EX PLINIO.

Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit. Sed si prius colligatur, sanguinem reiiciētibus prodest. Corticis è ramis primis cinis, clauum & callū aqua mixta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admixto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterum manat in plaga cum floret, exciso cortice trium digitorū magnitudine. Hic ad purgāda quæ obstant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciēs dāmque vrinā, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramorum à falce destillans. Ex iis aliquis cum rosaceo in calyce māli punici calfactus, auribus infunditur: vel folia cocta, & cum cera trita imponuntur. Ite podagricis. Cortice & foliis in vino decoctis fouere nervos vtilissimum. Flos tritus cum foliis surfures purgat in facie. Folia trita & pota intemperatiam libidinis coercent, atque in totum auferunt vsum sæpius sumpta.

PLANTARVM HISTORIAE
DE CAPNO. CAP. CXXVII.
NOMINA.

KΑΨΥΟΣ Græcis, Fumaria Latinis: officinis
Fumus terra, Germanis Erdtrauch, Dau-
benkropff, katzenkorbel (Gallicè Fumeterre,
ou pied de Geline) appellatur. Fumaria verò
hæc herba dicta est propterea quòd succus eius o-
culis inditus, veluti fumus lachrymas mouet, ocu-
lósque mordicat.

FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandro similis, tenera
admodum: foliis candidioribus, cineracci coloris,
vndique numerosis: flore purpureo.

LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, vineis,
sepibus, & maceriis, alijsque locis incultis atque
pinguibus.

TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

TEMPERAMENTVM.

Capnos calida & sicca in secundo esse videtur ordi-
ne, id quod ex gustu patet: acris enim & amara est.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius succus acris est, visum acuit, lachrymas
ducit, vnde & nomen traxit. Illitus cum gummi
duplices palpebrarum pilos renasci non sinit. Com-
manducata herba biliosam vrinam trahit.

EX GALENO.

Capnos

Capnos acris simul & amare qualitatis est par-
 riceps, nec tamen planè expers est acerba. Quò ob-
 rem biliosam vrinā multam prouocat, sanatq; iccia-
 noris obstructiones & debilitates. Succus eius ocu-
 lorū aciem acuit, nō parū lachrymarum trahēs, ve-
 luti ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Ple-
 beius quidam ea vti solebat ad stomachum robo-
 randum, vnaq; ventrem lubricandum. Siquidē her-
 bam primū desiccata cōdebat: dein cū vti volebat
 subductionis quidem gratia melicrato inspergebat
 roborandi verò causa, vino nimirum diluto.

EX PLINIO.

Claritatem facit inuēctis oculis, de lachrymati-
 onemque cecū fumus vnde nomen accepit. Eadem
 emulsas palpebras renasci prohibet. Bilem per vri-
 nam trahit.

DE CICI. CAP. CXXVIII.

NOMINA.

Kικιν, ῥικινος græcis, Ricinus latinis, Mau-
 ritanis Kerna, officinis nonnullis Cataputia Cherna.
 maior, quibusdam etiam Pētadaetylon & Palma Cataputia
 Christi, quod scilicet eius folia in humane manus
 effigiem articulentur: Germanis. Vunderbaum,
 oder Creutzbaum dicitur. Croton autem & Croton
 Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius Ricinus
 referre videtur, nominata est. Sunt enim Græcis vnde δι-
 κικινος, & Latinis Ricini, insecta animantia, &c.
 quæ canibus præsertim adherent, quibus cibi nul-
 lus.

PLANTARVM HISTORIAE

lus exitus est, colore livido, nullis discreta membris, in globum continuè crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies sponte sua decidat. Hinc est quod à Germanis nostris Zeckenkornet nominentur.

FORMA.

Arbor est parvae fici magnitudine, folia Platanosimilia habens, maiora tamen, leniora & nigriora. Caudices verò & ramos arundinis modo concavos. Semen in vvis racemisve asperis, quòd cortice nudatum, Ricino animali simile est. Quae descriptio ita pictura quadrat, ut nihil magis.

LOCVS.

Nascitur nusquàm in Germania nostra, nisi satum fuerit. Satum autem semel copiosè provenit. Sine difficultate etiam passim iam in hortis provenit.

TEMPVS.

Carpitur Autumno dum semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Ricinus in secundo vel summum tertio ordine calefacientium & siccantium esse apparet.

VIRÈS. EX DIOSCORIDE.

Oleū Ricini-
um.

Ex semine Ricini oleū nomine Ricininum exprimitur, ad edendū minimè aptū: alioquin tamen lucernis & emplastris vtile. Grana triginta numero putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, & aquam per alium deiciunt. Vomitiōes etiam mouent. Est verò iniucunda admodū & laboriosa

beriosa huiusmodi purgatio: stomachũ enim valide subuertit. Tusa & illita varos, maculãque sole contractas purgant. Folia trita cum polenta, oculorum cedemata & inflammationes sedant, mammasque turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita, ignes sacros restinguunt.

EX. GALENO.

Semen Ricini, quod etiã purgat, extergedi & digerendi facultatem obtinet. Sic verò & foliũ, sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine cõfiscitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quoque digerit.

DE CIRSIO. CAP. CXXIX.

Circium Buglossum.

NOMINA.

Kίρσιον Gracè, Spina mollis, Buglossum maximum Latine nominatur: officinæ, necnon herbarij Buglossam vel linguam bovis vocant. Cirsiion autem eò quod varices, quos Graci κίρσιον nominant, sanet, dicta est. Germanis Ochsenzung (Gallicè Buglose, ou langue de Beuf) appellatur.

Buglossa.

Cirsiõ cur dicta.

GENERA.

Nos duo damus genera, quorum vnum Germanicum, alterum verò Italicum est, in quo omnia sunt maiora.

FORMA.

Caulis est tener, duũ cubitorum, triangularis.

Ab

PLANTARVM HISTORIAE

Ab inferiore parte folioli rosaceorum figura, angulos spinosos per intervalla, sed molles habentibus. Folia Buglosso similia, modicè hirsuta, longiora, albicantia, extremitatibus aculeata obtinet. Cacumen in caule orbiculatum, hirsutum, in quo capitula in summo purpurea, quæ in lanugines evanescent. Hæc sanè descriptio satis monstrat, Cirsson esse Buglossam hodie vocatam, cum ei delineationes omnes, nulla ferè reclamante nota, conveniāt.

Buglossa nostra.

Siquidem caulis ei tener, bicubitalis, triangularis, spinosis per intervalla angulis, sed mollibus & in-

Locus Dioscoridis est medicatur.

noxiis aculeis. Folia Buglosso similia, longiora tamen aut lege μικρότερα, hoc est, minora, cū Plinio: subcandida, leniter hirsuta, in extremis partibus aculeata. Cacumen quoque caulis circumscriptum, hirsutum, in quo capitula purpurea. Et si verò reliqua omnia conveniant, tamen capitula purpurea non abeunt in pappos neque in nostra, neque in Italica.

LOCVS.

Producitur locis cultis & incultis, arenosis potissimum & petrosis. Italicum etiam hodie in multis hortis magna copia nascitur.

TEMPVS.

Carpitur Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM,

In primo calefacere & humectare ordine apparet.

VIREŚ. EX DIOSCORIDE.

Radicem Cirsii laboranti loco adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

EX PLINIO.

Hanc herbam radicemve eius adalligatam, dolores varicum sanare tradunt.

APPENDIX.

Non plures iam commemoratis facultates Cirsio, Dioscorides & veteres alij tribuunt. Videant igitur nostre ætatis medici, ne temere Buglossæ suæ quas non obtinet vires adscribant.

DE CORIANNO. CAP. CXXX.

Coriandrum nobis frequens, odore dum viret stercoris humani.

NOMINA.

Kόριον, ἢ καὶ γέλιον ἁπλοῦς græcis: Corion seu Coriās non latinis, vulgò & officinis Coriandrum, Germanis, qui latinā seu officinarū appellationem imitatur Coriander (Gallicè Coriandre) nominatur. Corio nomen fecisse cimices verisimile est, quos folia & caules eius olent: καὶ γέλις enim Græcis infecti id genus est, quod latinis cimex dicitur.

Coriandrum.

Coriō quare vocatū.

καὶ γέλις.

FORMA.

Caulis Corianno exilis, sesquicubitalis, ramosus. Folium dum primum erumpit adiatum, dein Fumariæ, odore gravi. Flores candidos. Semen rotundum ac nudum, firmū & diutinum. Radicem breviusculam, ligneam, neque admodum fibratam.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Amat terrā pingvē, Palladio teste, sed & macro-
solo nascitur. Nūquam autem nisi satum provenit.

TEMPVS.

Autumno dum semine pręgnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Coriandri temperamētum minimē frigidum ac
simplex est, sed variē coalitum & compositum. Est
enim copiosa quidem amaritudinis particeps, quā
in tenui simul ac terrestri substantia fundatur: sed
& aquosę humiditatis tepidę ei non parum ingit.
Habet etiam adstrictionis nōnihil, sicut paulō pōst
ex Galeni verbis clarius innotescet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hęc Dioscoridis. Vim refrigeratoriā habet Coriandrum, vnde il-
litum cum pane aut polenta eryspelatıs, & herpes
verba pau- tibus medetur. Epinyctidas, testium inflammatio-
lō pōst Ga nes, carbunculōsque cum melle & vna passa sanat.
lenus exis Cum lomento strumas & tubercula discutit. Lum-
bilat. bycos semē cum passo potum pellit, geniturāque
auget. Largius tamen sumptū, mentem non sine pe-
riculo mouet, quā propter copiosiorē & cōtinuum
eius vsum cauere oportet. Succus cum cerussa, aut
argenti spuma, necnon aceto & rosaceo illitus, ar-
dentes in summa cute inflammationes iuuat.

EX GALENO.

Coriannon siue Corion, aut vtcunque vocare li-
bet. Vetusiores. Gręci Coriannon nominabant, ac
recentiores.

recentiores omnes medici Corion appellant, sicut
& Dioscorides refrigeratoriam esse herbam dictis Dioscori-
tans, sed perperā. Siquidem ex cōtrariis constat fa- des repre-
cultatibus, plurimū habens amaræ essentia, quam henditur.
ostendimus esse tenuium partium, & terrenam, nec
modicum etiā aquea humiditatis obtinentem, quæ
est facultatis tepida. Habet autem & adstrictio-
nis paucillum. Ex quibus omnibus variè quidem a-
git ea quæ scribit Dioscorides; & non tantū ex re-
frigeratione. Caterū ego cuiusque particulatim
actionis causam enarrabo, tametsi propositum fue-
rat mei vnius duntaxat hoc in libro sententiā ex-
promere. Sed fortè nihil obstabit, imò si verum fa-
tendum est, proderit nonnihil superiores metho-
dos, quæ in paucis medicamentis sunt dictæ, hunc
in modum repetere. Primum ergo non Dioscorides
tantū, sed & alij complures medicorum indeter-
minatè, & citra limitationem de morbis pronun-
tiant, sicut sanè hac quoque tempestate non paucos
reperias medicos insignes, præter alia, hac in re ma-
ximè hallucinantes. Interdū enim atra, liuida, fri-
gidaq; reddita parte quæ erysipelas habuit, nec am-
plius refrigerantia poscente medicamenta, ceu an-
tea, sed ea quæ infixum parti præter naturam hu-
morem euacuent, ū tamen refrigerare perscuerant.
Aliquādo autē ad digerentia quidē transeunt, cate-
rū erysipelas sanare dicūt. Et sanè scribunt inci-
pientibus etiamnū & crescentibus erysipelatis alia.

PLANTARVM HISTORIAE

conuenire medicamenta, aliaq; declinantibus. Verum res ita non habet. Neq; enim erysipelas etiam vocari debet posteaquam inflammatio eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neq; quæ facultate sunt frigida, neq; quæ illa sanant, remedio esse putandum est, sed velut si vel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum frigidum esse affectum existimabis, & quæ digerant excalfaciantq; poscere: ad eundem modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio nomine appellanda. Aut si displicet nominis mutatio, saltim sicut aliqui alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sane est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed cum etiam calidam dicere ubi iam refrigerata est, id verò nequaquam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratoriū esse credamus, sicut Dioseorides Coriannon, quod, ut ipse ait, cum pane aut polëta illitum, erysipelas sanat. Nam quod exquisitum est erysipelas & iam utique inflāmatum & flauum est, nequaquam cum pane sanabit Coriannon, sed illud quod iam refrigeratū est. Proinde nos superioribus voluminibus, quum determinata ac definita experientia cuiusque medicamenti facultatem explorandam censuimus, quam maximè fieri posset simplicissimum

eligi

eligi affectum cōsuluimus. At plerique medici, ne-
 que quòd vel plurimi morborum protinus ab ini-
 tio compositi innadant, norūt, neq; quòd alius affe-
 ctus sit erysipelas exactum, alius verò is qui voca-
 tur ab omnibus nobis vsitatè, vt à veteribus quoq;
 phlegmone. Alij autē inter hos medij plurimi, par-
 tim vt sic dicam erysipelata phlegmonode, partim
 phlegmone erysipelatodes. Ac inuenias nōnūquam
 vbi neutrū vincat, sed ad vnguē paria sint. Quin-
 etiam nonnunquam edematodes esse erysipelas cō-
 spicitur, sicut aliud scirrholes, vt cōpositorū mor-
 borum haud paruus aceruetur numerus. De quib-
 us copiosius cum alibi differuimus, tum in libris
 de curandi ratione. Dicitur autem & nunc, quòd Lib. 14.
 ad saltem eorum meminisse necesse est, quòd exa-
 ctum erysipelas haud vnquam ab antedictō cata- Exquisi-
 plasmate curari possit. Voco autem exactū, quum tum erysi-
 à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quòd pelas.
 longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex iis
 quæ ipse scripsit Dioscorides discere licet, Nā stru-
 mas, inquit, cum lomento discutit. Quòd verò nul-
 lum refrigerantium medicamentorum idoneum sit
 discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem nō du-
 bitare arbitror, vt qui sexcenta scripserit medica-
 mēta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie
 calida, & actionibus digerentia esse confessus est.
 Haftenus Galenus: cuius quidem, etsi prolixa sint,
 verba ideo recēdere placuit, vt vulgi & nōnullorū

PLANTARVM HISTORIAE

etiam medicorum errore detegeremus, qui præter
veritatem Coriãdri temperamentũ esse frigidũ as-
serunt. Denique vt ex hoc loco discerent studiosi,

Periculo- quàm periculosum sit Dioscoridis ac aliorũ veterũ
sum Dio= scripta sine limitatione sequi. Admonitos quoq; le-
scoridis ctiores esse volumus, hoc caput ex eorum esse nume-
scripta si= ro, in quo Galenus à Dioscoride dissentit.
ne limita= EX PLINIO VALERIA=
tione le= NO MEDICO.
gere.

Non dubitanter Coriãdro refrigeratrix potestas
datur, non tamen simplex, vt prudentissimè Galeno
videtur, sed cui quaedã portio austeritatis immixta
sit, inde quòd quaedã ex eo vitia curantur, quæ nũ-
quã omnino curaret, si sola virtute frigida nitere-
tur. Cum melle & vna passa tritum & impositũ,
omnes tumores collectionesque compescit. Præcipuè
tamen isto genere medicaminis doloribus testium
subuenitur. Succo mali granati & oleo in potione
permixtum, animalia interancis innata persequi-
tur. Semen ex aqua potum solutionem vètris strin-
git. Scriptũ à multis legitur tria Coriandri grana
tertianas excludere ante accessionem si fuerint de-
uorata. Iisdem quoque repellendis efficax est ipsum
Coriandrum ante solis ortum ignorantì cervicali
viride subiectum. Mirum est quod Xenocrates tra-
dit, si vnum seminis granum femina biberit, vno
die mens̃trua cõtineri, biduo si duo, & totidem die-
bus quot grana sumpserit.

Eadem

Eadem ferè sunt quæ alter Plinius lib. naturalis histo. xx. capite xx. scribit, idèoque omittere placuit. Tantùm addit, Marcum Varronem putare Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam æstate seruari.

APPENDIX.

Non transcundum silentio erit quod Dioscorides hic diligenter monet, Coriandri copiosum & cōtinuum vsum esse fugiendum. Idèoque errare vehementer recentiores medicos, qui eo tam frequenter, potissimum ad caput roborandum, cui insensissimum est, vtūtur, manifestius est quàm vt probatione indigeat. A quo sanè errore vel id saltē reuocare eos deberet, quod idem Dioscorides, libro sexto, Coriandrum inter venena connumeret.

Coriandrum nō copiose & continuò vtendum.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Tibos in ventriculo donec probè concoquantur retinet. Tostum igne ventrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis profluvium potum, & si imponatur, compescit. Cum vino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius vsus delirium facit. Huius etiam succus potus venenū est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

DE CASSUTHA. CAP. CXXXI.

Cassutha si thymo innascitur Arabum est Epithymum, nobis in satureia, hyssopo

PLANTARVM HISTORIAE

& maiorana est sæpe visa omnino eadē, nec genere ab hac variare videtur quæ in lino, orobo, lente, vicia etiam luxuriari solet. Ea omnis primum radiculis nititur, quæ tū arcescunt & vanescunt quando primum à planta cui inuoluitur cirris suis alienum depascitur alimentum.

NOMINA.

Kασούθα recentioribus Græcis: Cassutha, γ litera in υ transeunte, ut sæpè fieri solet, latinis appellatur: officinis & herbariis nostræ ætatis hinc deflexa quadam pristini nominis umbra, Cuscutha dicitur, cum primū Cassutha, dein conuersa Cascuta, postremo Cuscuta cœperit appellari. Sunt qui podagram lini vocant, quòd quasi compedibus id cui incederit illiget, nec vinctum eo facillè possit extricari. Germanis Filtzkraut, oder Flachszseiden, oder Todtern (Gallicè Goutte de lin, ou agoure de lin) dicitur. Errant qui Dio-

Androsæ scoridis Androsacen esse putant, cum veteres Græce non est ci, quod sciam, de Cuscuta hodie dicta, nihil meo Cassutha. moriæ prodiderunt. Plinius tamen lib. xvi. capite ultimo, eius videtur meminisse iis verbis: Est & in Syria herba quæ vocatur Cassythas, non tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese:

Plinii loci Cassythas enim legēdū non Cadytas: sic enim codicis emendatus. Etissimus Hermolaus admonet, ijq; emendatiores, habent.

habent. Iam igitur memoria Plinij Cassytha herba suo nomine Syriaco venerat in Latium, quod multis postea seculis usurpantes tam Pœni quam Arabes, suis scriptis protriuērunt. Quod autem Plinius sine spiritu protulit, id librariorum culpa factum esse suspicor, qui inuertentes mutarunt Cassytha in Cassythas. FORM A.

Herbosis fruticibus adnascitur, earum adminiculo fulta: radice nulla, sed velut ab alarū sinu prodeunte cirro capillamētōve miræ longitudinis, statim ab eius ortu sese ramulis conuolvente. Quæ iā veluti clauiculis nixa, sensim proserpens herbarum fastigia scandens, & crebris volutionibus opere topiario per vertices rotata, comas herbarum cōplectitur: tā volubilis illi natura est. Foliis vidua cernitur, Florem fundit album, semine quoque scatet tenui. Cirri dilutiore rutilant purpura, nōnunquam ex rubro rufescunt, fidibus lyrarum crassitie pares.

LOCVS.

Nō in terra, sed in herbis arboribusq; passim nascitur Cassytha, quas tam spisso sæpius irretit cōtexu, vt tentorii modo herbosum cespitē à sole vindicet. Nonnunquam cacuminibus impendens stirpes humi deturbat, propriamque parentem suis laqueis strangulat, aut continuo materni alimenti suctu perducit ad tabem.

TEMPVS.

Æstate, Iulio potissimum & Augusto mēribus,
maxime

PLANTARVM HISTORIAE

maximus illius in Germania prouentus esse solet, hoc enim tempore tanta eius est luxuria, vt mole sua stirpes onerata ferè procumbere videantur.

TEMPERAMENTVM.

In primo calefacientium abscessu seu ordine, & desiccantium secundo statuendum: quandam enim resipit amaritudinem.

VIRE-S.

Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iecinoris impedimenta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit vitia, venas pituitosis atque biliosis exonerat humoribus, pellit vrinam. Regio morbo subuenit, qui iecinoris obstructionibus contrahitur. Febribus iis auxiliatur, quæ pueros malè habent: sed vsu nimio stomachum sua adstrictione grauat: verum noxa tollitur, si Anisi momentum adiiciatur. Natura eius flauam bilem per aluum exigere, sed efficacior cum Absinthio præbet effectum. Hæc quidem ex Pænorū ac Arabum sententia facultates Cassuthæ tribuuntur, qui utique vires illius longè magis gliscere pollicentur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quòd hanc forsitan veteres Græci, quamuis triniaicem, eo nomine subticuerunt, quòd natiuas sue merito parentis dotes adsciuisset, è sinu cuius vernaculum ebibens humorem aleretur. Nam vt testatum iidem Arabicæ facilius medici reliquerunt, si calida insidet herba arborive.

Borive, calidam sortiatur facultatem, & si decus
buerit frigida, vim sibi frigidam vendicabit.

DE CESTRO. CAP. CXXXII.

Betonica betoine, Sylvestris autē duplex
nobis armorie dicitur, tunica & tunici abla-
ta prima syllaba, & o in v corrupta officinis,
altilis autem nobis ocellus eulet dicitur.

NOMINA.

Kίστρον Gracè, Betonica seu Vetonica lati-
nè: in officinis antiquū nomen retinuit, bra-
unbetonick Germanicè (Gallicè, Betoine, ou
de la Betoefne) appellatur. A varietate autem
& copia remediorum, Cestron à Gracis dicta est: Cestron
hac siquidem voce opus interpretum, acūve pictū vnde di-
nominauere. Libri etiam à varietate subiecti, ab
aliquot Gracis hoc titulo inscripti sūt. Plinius quos-
que aliquando Ebur cestrum, id est, picturatum di-
xit. Betonica verò ab inuentoribus Vetonibus, Hi-
spania populis, nominata est. Betonica,

FORMA.

Herba est caulem tenuem obtinens, cubiti alti-
tudine, aut maiorem, quadrangulum. Folia longa,
mollia, quernis similia, per ambitum incisuris diuisa,
odorata, propè radicem maiora. In summo cau-
lium semen veluti Thymbra spicatum inest. Radi-
ces subsunt tenues vt Ellebori.

LOCVS.

Nascitur in pratis, syluis, mōtosis, frigidis et opa-
cia

PLANTARVM HISTORIAE

Ψυχότρο cislocis, ideoque Gracis Ψυχότροπον vocata est.
 φον. TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca in primo ordine completo, aut in medio secundi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia Betonica carpuntur & siccantur plurimos ad vsus. Radices cum hydromelite pota, pituitosam vomitionem eliciunt. Folia dantur ruptis, conuulsis, vulua affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachma vnus pondere cum hydromelite. Ternae in vini sextarijs duobus contra serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatorum morsibus prodest. Aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. Hanc si quis persumpserit, letale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit. Alium subducit. Medetur comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iecinoris & lienis vitiiis drachma pondere cum aceto mulso pota succurrit. Cōcoctionē adiuuat, si quis à cena eā fabae magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vino sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus triū obolorum pondere cum diluti vini cyathovno. Ischiadicis, renum & vesicae doloribus ex aqua. Hydro-picis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite,

dromelite, non febricitantibus cū mulso Regio morbo laborantes recreat. Menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aliū purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem pota. Cū mel le tabidis, purulentis auxiliatur. Folia cum inaruerint trita ad hos effectus fictili vase reponuntur.

EX GALENO.

Vim habet incidendi, vt gustus indicat. Amariuscula enim est, & subacris ipsa herba, id quod et particulatim edita ostendit actio. Nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonem & thoracem & iecur expurgat, abstergitq;. Menses mouet, & comitialibus prodest. Rupta atque conuulsa curat, & omnibus bestiarum morsibus illita vlceri auxiliatur. Acidum ruētantibus & ischiadicis bibita succurrit. EX PLINIO.

Morsibus serpentum imponitur Beticonica præcipuè, cui vis tanta perhibetur, vt inclusa circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarii pondere cū tribus cyathis vini, vel farina drachmis tribus sextario aquæ imponitur. Obolis tribus in aqua, contra purulentas, contrâque cruentas excreationes facit. Faciles præstat vomitiones radix eius Ellebori, modo quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ leuat eiusdem farina ex aqua mulsa. Aluum soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Folia siccantur in farinam plurimos

PLANTARVM HISTORIAE

plurimos ad vsus. Fit vinum ex ea & acetum, stoma-
macho & claritati oculorum. Paralyfin sanare di-
citur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad las-
teris & pectoris dolores farina eius bibitur.

DE BETONICA ALTERA.

CAP. CXXXIII.

NOMINA.

DVas esse Betonica species prater Paulū Aco-
ginetam lib. viij. Plinius etiam lib. xxv. cap.
viij. abundè docet: & in aliquibus Dioscoridis codi-
cibus huius quoque secundæ Betonice mentio fit.

**Herba Tu-
nica.**

Hanc itaque posteriorem, tam officinæ quàm her-
barii medici Tunicā, detractis à Betonica duabus
literis prioribus, nominant. Germanis Graszblo-
men & Negelblumen, quòd flores eius garyo-
phyllorum odorem referant, appellare placuit.

GENERA.

Sylvestris

Duū est generū. Vna siquidē sylvestris est, quā
Germani Vuild Negelblumen, hoc est sylvestrē
Garyophylleam, & Dondernegele, Feldtne-
gele, & Blutsz ropfle (Gallicè Des armoi-
ries.) Altera altilis est, quæ alio nomine Betonica

Altis.

seu Vetonica coronaria, quòd illius in coronis nu-
mius vsus fit, dicitur. Germani heymisch Ne-
gelblumen (Gallicè des euillerz) quasi domo-
natam Garyophylleam appellant.

FORMA.

Specie multum à priore Betonica differt. Radix

cem enim totam rubram, odoratamq; habet. Folia porracea, oblonga, stamine quo medium diuiditur puniceo ac rubente, cum recto calamo triangula, floribus in vertice purpureis. Hæc Dioscoridis delineatio vtrique generi communis est: priuatim tamen syluestris Betonica herba fruticosa est, foliis porri, oblongis, angustis, per extremum mucronatis, cæsis, cōcoloribus calamis, teretibus, geniculatis, cubitalibus, floribus speciosis, simplicibus, qui quinis, senisve folijs constāt, lentè fimbriatis, magna ex parte purpureis, quamuis & interdum niui conspiciuntur. Altilis seu coronaria, foliis est porraceis, oblongis, per extremum mucronatis, concoloratu cæsis, teretibus cauliculis sesquicubitalibus, geniculatis, coeuntibus pyxidatim internodiis, floribus omnium speciosissimis, Garyophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius cocca rutilat, alius saturata nitet purpura, alius candido, alius emaculato blanditur colore, alius versicolore variatur commistū. Omnibus teres longiusculusque calyx spectatur, orbiculo superiorum denticulatus, à quo quina senaue folia prodeunt, lentè quidem fimbriata. Nonnulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminis vtrinque emicantibus stamineis apicibus.

Syluestris.
Betonica.

Altilis seu
coronaria.
Betonica.

LOCVS.

Syluestris in pratis, montibus, nitidisq; locis nascitur. Coronaria vero passim in siccilibus vasis alitur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur, neque facile ades inuenies, ante quas non expositam intuearis. TEMPVS.

In æstate vtriusque magna est copia. Coronaria tamen longiori tempore durat, atque æstiuas, autumnales, hyemalésque struit coronas.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse tum amāritudo, tū odor & alia multa declarant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Animas hominum & corpora custodit. Contra nocturnas peregrinationes, loca insidiosa, & difficiles somnos commēdatur. In totum, ad omnem mendendi rationem celebrata. Recens trita vulneribus capitis indita dolorem finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit, et hoc quotidie efficit, donec persanescat. Dolori capitis medetur, si decocta ea ex aqua caput perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix eiusdem suffiatur.

EX INCERTO,

Farina eius tam aduersus toxica quàm serpentū & scorpionū ictus ex albo vino bibitur. Quartanae reliquarūque febrium horrores discutit. Comitialibus opitulatur sub ipsam accessionem propinata. Eadem per se carcinomatis inspergitur, quæ tamen præstitit herba succo prius abluisse. Estur contra ventris tēnias. Succus pestis arcet cōtagia, atque etiam haustus, si iam morbus inuaserit, liberat. Fit ex flore oleum ad canis rabiosi morsus, ad fistulas

stulas & parotidas, quibus illitu medetur. Visus ac-
ciem exacuit. Ieiuno sumpta dolorem dentium se-
dat, iure decocti colluto ore. Discutit grauedines.
Partum, qui sine febre sit, accelerat. Ncruorū vul-
neribus imponitur. Præsumpta ebrietatem arcet.
Intertriginem in itinere faciundo non sentient, qui
ex vino biberint. Fastidia cū aceto mulso discutit.
Iis qui ex morbis sese recolligunt, aluum ex aqua
calida deiicit. Vomitiones cohibet. Dolores podas-
græ ac inflationes ventris sedat. Venena rabiosi ca-
nis morfu impressa elicit plagæ diutius illigata.

APPENDIX.

Recentiores syluestris Betonica succum mirifi-
cè commendant in atterendo & educendo calcu-
lo, & medendis comitialibus. Altilis autem radi-
cem contra pestis contagia vtilē esse tradunt. Hæc
ob causam ex floribus etiam eiusdem, medicamen-
tum conficiunt, quod Conseruam hodie vocāt, quod
ad eundem vsum adhibent.

DE COLCHICO. CAP. CXXXIIII

Colchicon à necandis canibus nobis tu-
chien. Ephemerum non lethale nobis lilium.
conuallium & grand muguet.

NOMINA.

Kολχικόν, ἢ ἐφίμωρον Græcis: Balbus agre Hermoda-
stis latinis, officinis & herbarijs Hermoda-
stylus. Etylus dicitur. Germanis Zeitlosē (Gallicè Mort Colchicū
au chiē) Colchicum à Colchide veneni ferace, in cur dictū.

PLANTARVM HISTORIAE

Ephemerum.

qua nascitur, nomen desumpsit. Dicitur vero esse Ephemerum, quoniam vno die sumptum interficiat, atque adeo ab altero Ephemero, quod minimè letale est, & de quo suo loco diximus, non solum figura, verum etiam facultatibus differt. Et si verò Ephemerum Colchicum etiam significet, tamen præcipuè id Ephemerum quod veneno caret, hoc nomine intelligitur.

FORMA.

Autumni exitu florem subcandidum, crocino similem profert. Post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen. Caulem palmo altum, rufum ferentem semen. Radicem habentem corticem in nigro rufescentem, quæ cortice suo nudata, alba, tenera, succo plena, et dulcis inuenitur. Habet Bulbus eius in medio rimam fissuramve vnde flos erumpit. Huius descriptionis in vniuersum notæ omnes ita Hermodactylo nostro conueniunt, vt nemo, nisi Tiresiacacior sit, Dioscoridis esse Colchicum ambigere possit. Exitu enim autumnii in pratis florem edit albicantem, croci floribus similem. Posterius, Februario nimirum mense & primo statim vere, folia Bulbi, sed pinguiora. Caulem palmeum ferentem semen rufum. Radicem cortice in nigro, colore rufescente, quæ decorticata cādicat, tenera quæ, succo plena, & dulcis apparet. Bulbus etiam eiusdem diuisionem in medio obtinet, ex qua flos erumpit, vt pictura exquisitè tibi monstrat. His accedit, quod Serapio Arabis

rabs sub nomine Hermodactyli, Dioscoridis Colchicon prorsus depingat. Alium tamen esse à nostro dactylus Hermodactylo illum putamus, quem Actius, Paulus Aegineta lib. vii. & Actuarius peculiariter & Græcorum. priuatim articulorum doloribus conducere scribunt. Paulus enim separatim tanquam diuersorum mentionem fecit, & de Colchico & Ephemero diuersa ab Hermodactylo capita constituit.

LOCVS.

Magnus Colchici in Messenia, & apud Colchos proventus. Nascitur & passim in omnibus pratis Germaniæ nostræ. TEMPVS.

Flores in Autumni exitu, vt diximus, apparent. Folia autem post flores generantur, & primo statim vere è terra erumpunt. Semen in æstate Iunio. potissimum mense producitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccū nonnulli Colchicum in secundo ordine, seu à medio recessu statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius comesta fungorum modo strangulādo enecat. Hanc autē depinximus, ne pro Bulbo deuorata aliquem lateat. Mirū est enim quantum ignaros propter suauitatem inuitet. Hæc Dioscorides. Proinde satis liquet Hermodactyli huius nostri vsum minimè tutum esse: venenum enim est, & vsq; ad sanguinis excretionem per inferna subducit. Eius tamen, radicis potissimum & foliorum, ad ene-

PLANTARVM HISTORIAE

candos ac abigendos pediculos vsus esse potest.

REMEDIA CONTRA COL- CHICVM.

Remedio sunt edētibz quacūque cōtra fungos
opem ferunt. Bubulum etiam lac potum, adeo vt
quoties hoc affuerit, nullum prāterea quārendum
prāsidiū sit. EX PAVLO.

Ephemerō, quod nonnulli Colchicon, eē quōd in
Colchide nascatur, vocant, aut Bulbum agrestem,
epotum protinus totum corpus prurire facit, velut
urtica & scilla tactū irritatumq; interiora erodit,
stomachum vrit cum pōderosa grauitate. Inuale-
scētē autē malo, cruenta strigmētis mista per aluū
egeruntur. Succurrendum, vt Salamādra, vomitio-
nibus & clysterib. Sed antequā vires sibi adsciscat
venenum, dari debet foliorum quercus, aut glādiū,
aut malicorū, aut serpylli decoctum cum lacte bi-
bendū: aut Polygonii succus, aut surculorum vitis,
aut rubi, aut tenerarū ferularū medullae, aut myrti
cum vino. Benefacit etiam castancarū interior tu-
nicula, si cū aliquo ē succis, quos prā diximus, assua-
matur. Origanū quoque cū lixiuā potum, in idem
efficax est. Adeo verō exactum prāsidiū est lac
vaccinum calidum potum, & simul in ore cōten-
tum, vt hoc prāsente nullum aliud desideretur.

DE CLEMATIDE DAPH- NOIDE CAP. CXXXV.

Clematis nobis Peruinca dicitur.

NOMINA.

Kληματὶς δαφνοειδὴς Græcis, Clematis
 Daphnoides latinis, Peruica officinis, Vinca
 peruinca vulgò nominatur. Germ. eò quod semper
 vireat, Yngrun, vel Syngrun, (Gallicè Du Lis Clematis
 feron.) Clematida Græci, quoniam κληματα, vnde di
 hoc est, sarmenta seu viticulas per terram spargat, Et a Daph
 dixerūt. Daphnoida verò à foliorum Lauri, quam noides.
 eius folia habent figura. Plinius lib. xxiiij. cap. xv.
 Clematida Aegyptiam nominat: libro autem xxi.
 cap. xi. Vincam peruinca, aliòque nomine Chamae
 daphnè dici tradit, quòd scilicet humilis videatur Chamae
 Laurus, vt nomen sonat. Non est autē cur eā Cha- daphne.
 madaphnè putes, quæ Romanis Laureola aut Lau
 rago dicta est, hæc enim à Vincaperuinca genere
 & facultatibus diuersa est, & seorsim illam Cha-
 madaphnen depingit Plinius lib. xxiiij. cap. xv. vt
 hinc manifestissimum sit Plinio duplicē esse Cha-
 madaphnen. Vnā quam sic appellant Dioscorides, Plinio du
 Galenus, & alii Græci. Alteram quam priuatim plex Cha-
 Vincamperuinca alio nomine vocat Plinius. Sic madaphne
 autem, quod humi serpat, & se in modum funiculi ne
 porrigat vicina quæq; vinciens, appellat.

FORMA.

Sarmenta oblonga habet, iunceæ crassitudinis.
 Folium exiguum, Lauro figura & colore simile,
 multò tamen minus. Iam si quis imaginem & es
 figiem Clematidis Daphnoidis exquisitiùs explo-

PLANTARVM HISTORIAE

Vincaper ret, ea deprehēdetur esse quæ hodie vulgò *Vinca*
uinca. *peruinca* nominatur. Hæc enī humiles & graciles
 spargit iuncos, foliaq; Lauri figura et colore obtinet,
 multò tamē minora: flore hyacinthino seu in purpu-
 ræcæruleo, inodoro, rotundo, foliis quinq; sed conti-
 nuis distincto. Ea etiam, vt Plinius ait, semper vi-
 ret, in modum lineæ foliis geniculatim circumdata.
 Hybernæ suæ perpetuæ fronde texit coronas.

LOCVS.

Gignitur pingui, vmbroso, lateq; solo, sed inculto,
 in agrum vinearumq; marginibus.

TEMPVS.

Hæc etsi nunquam non virescat, vere tamē dun-
 taxat florescere videtur, Martio potissimum mense
 & Aprili.

TEMPERAMENTVM.

Siccitas in Clematide, Paulo Aegineta teste, cæ-
 teris qualitatibus præualet. Id quod gustus etiam
 ostendit: gustanti enim adstrictionem quandam &
 amarorem habere videtur. Adstringit autem mo-
 dicè, sed fortiter amara est. Siccat itaque, at citra
 mordicationem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius, caules ac folia in vino pota, alui proflu-
 uia & dysenterias finiunt. Vteri dolores cū lacte
 & rosacco, aut cyprino in pessō apposita sanant. Cō-
 manducata dentium dolorem mitigant. Venena-
 torum moribus imposita prosunt. Feruntur & a-
 spidum

spidum morsibus cum aceto pota auxiliari.

EX GALENO.

Clematis daphnoides nequaquam est exulceratoria, neque acris, imò alui profluvii & dysenterii cum vino pota prodest, dentiumque dolores mansa mitigat. Vteri doloribus in pessa admodum vsui est, tantum abest vt vrat aut vlceret.

EX PAVLO.

Clematis quibusdam Daphnoides, aliis Myrsinoides, nonnullis Polygonoides, sarmenta habet præ longa, crassitudine iunci, folium verò Lauri. Siccat di facultate pollet, qua alui fluores, difficultates intestinorum, & dentium dolores finit. Contra venenatorum morsus prodest.

APPENDIX.

Iam commemorata facultates satis ostendunt Clematida daphnoida esse Vincamperuincam: nam codex antiquus manuscriptus, quæ in rebus dubiis lubens cito & sequor, easdem prorsus vires Peruinca tribuit. Sanguinis enim è naribus profluvio mirum in modum prodesse tradit. Item ijs qui sanguinem vomunt aut spuiunt. In summa omnem sanguinis fluxum folia eius sistere asserit, ita vt evidentissimum sit Peruinca officinarum eandem esse cum Clematide hac nostra. Quibus etiam accedit pictura & descriptio eiusdè, quæ utraque adamussim Peruinca nostræ respondent.

B iiij DE

PLANTARVM HISTORIAE

DE CARDAMO. CAP. CXXXVI.

Cardamum id est nasturtium narbonensibus nascitur, à naribus torquendis dicitur nobis cresson alenois.

NOMINA.

Cressio
hortensis.
Cardamū
vnde di-
ctum.

Kαρδαμὸν Græcè, Nasturtium satiuū latinè dicitur. Officinis latinū nomen retinuit. Barbari nostræ ætatis herbarii Cressionē hortensem vocant. Germanicè Gattenkresz (Gallicè Cresson alenoys, ou nasitort) dicitur. Cardamum verò Græcis nonnulli dictum esse arbitrantur, ἀπὸ τοῦ καρδίας, quòd cor foueat, & in syncope illa, quæ Cardiacam nominant, plurimum valeat. Alij diuersa ratione vsi, sic dictum quòd caput edomet, quasi καρπὸν ἀμύνει, putant. Nam arcem mentis obsidens suo ferit acremento, & ignea vi præditum caput tentat. Sunt è Græcis qui καρδὰ τὸ νόος μύειν, id est, quòd pupillas oculorum cœuntibus vnà palpebris abscondat, ita dici censeant. Nam luminibus admotum subinde cogit conuiuere. A quo, vt volūt, euentu καρδαμύττειν verbum declinarūt, quòd conuiuere nostrā lingua dicimus. Nasturtium autem appellatum est, Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quòd odore & seminis acrimonia sternutamenta prouocet.

καρδία.
μύττειν.
Nasturtiū
quare ap-
pellatum.

FORMA.

Nasturtium caulibus assurgit sesquipedalibus, statim à radice minorum foliorum pediculo, floribus

ribus candidis semine per ramorum latera copioso,
firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore.

LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense. Sequenti
tempore semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Nasturtii semē calefacit et desiccāt ordine quār-
to. Herba quoque sicca similem semini facultatem
possidet. Humida autem adhuc & viridis propter
aqueæ humiditatis admistionē multò inferior est,
adeoque sic mordacitas eius moderata est, vt cum
pane ea vti liceat ceu opsonio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium semen calefacit, acre est, & stomacho
inimicum. Aluum turbat. Lumbricos pellit. Lienē
imminuit. Fœtus in vtero enecat. Menses cit. Ve-
nerem excitat. Sinapis & Eruce semini simile est.
Lepras & impetigines abstergit. Lienem illitum
cum melle extenuat & reprimat, & fauos expura-
gat. Sorbitionibus incoctū ea quæ in thorace sunt
educit. Potum serpentibus aduersatur. Suffitu eas-
dem fugat. Capillos deciduos continet, Carbuncu-
los rumpit ad suppurationem ducens. Ischiadicis
cum polenta & aceto illitum confert. Oedemata
& inflamationes discutit. Furunculos cum muria
illitum ad suppurationes ducit. Herba omnia eas-
dem

PLANTARVM HISTORIAE

dem, sed minore effectū, potest.

EX GALENO.

Nasturtii semen adurentis est facultatis par-
ticeps sicut sinapi. Proinde coxendicis & capitis do-
lores, atque adeò quodcumque rubrificationem po-
stulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt. mis-
cetur quoque remediis quæ exhibentur asthmatis
cis, tanquam id quod crassos humores valenter in-
cidere valet, velut et Sinapi. Nam per omnia ei si-
mile est.

EX PLINIO.

Nasturtium Venerem stimulat, animum exa-
cuit, aluum purgat. Detrahit bilem potum in aqua
decem denariorum pondo. Cum lomento strumis illi-
tum, opertumq; Brassica, præclare medetur. Capitis
vitia purgat, visum clarificat. Commotas mentes
sedat ex aceto sumptum. Lienem ex vino potū, vel
cū fico extenuat. Tussim ex melle, si quotidie ieiun-
ni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum an-
imalia expellit, efficacius addito Mentastro. Prodest
& contra suspiria cum Origano & vino dulci. Pe-
toris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos
discutit cum pice, extrahitq; corpori aculeos. Et ma-
culas illitū ex aceto. Cōtra carcinomata adiicitur
ouorū album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infan-
tibus verò ē melle vtilissimè. Sestius adiicit hoc
serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis do-
lores contritum & alopecias emendare addito Sina-
pi: granitatem aurium trito imposito auribus cum
fico.

fico. Dētiā dolores infuso in aures succo. Porrigi-
nem & vlcera capitis cum adipe anserino. Furuncu-
culos concoquit cum fermento. Carbūculos ad sup-
purationem perducit & rumpit. Phagedenas vlce-
rum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis
cum polēta ex aceto illinitur. Item licheni & vn-
guibus scabris: quippe natura eius caustica est.

DE CRINO. CAP. CXXXVII.

Lilium nomē retinet. Est nobis & Lilium
rubrum, vulgò dictum à floris colore in
flauum inclināte, radice bulbosa, sed cro-
cea quod hic croceum vocat.

NOMINA.

Πῖον, ἢ Λείριον Græcis, Lilium siue Iu-
nonis rosa Latinis, Lilium album officinis,
Vueisz Lilgen, oder Gilgen Germanis,
(Gallicè Du lis) dicitur. Veteres Græcorum poete
fingunt è Iunonis lacte respersa terra natū Lilium. *Iunonis*
Nanq; cū Hercules puer, quem ex Alcmenē sustu- *rosa qua-*
lerat Iupiter, Iunonis dormiētis vberibus admotus *re dictum*
esset, & lacte se repleisset, post suctū digressus mā- *Lilium.*
ma lactē copiose profluxit. Quod in cælo à puero
vago & incerto suctu persusum est, lacteam effecit
viam: quod humi sparsum est, Lilium lacteo flore
nitentem creauit, vnde rosa Iunonis dictum.

FORMA.

Lilium caule simplici, rarò duplici, tricubitali, co-
moso, foliis longis, Satyrj effigie, ex herbaceo ni-
tentibus,

PLANTARVM HISTORIAE

tentibus, flore eximij cādorū, folijs foris striatis, & ab angustis in latitudinem se paulatim laxātibus, forma calathi, resupinis per ambitū labris, luteis emicantibus ex fundo calycis apicibus, alterius quā flos odoris, constat. Flos ille languido semper collo est, non sufficiēte capitis oneri. Radix bulbosa. Hæc descriptio planè huic Lilio conuenit, quod hodie cādidum vocamus. Nos alterius etiam generis picturam adiecimus, quod Croceum appellauimus, à flore eius, qui non, vt in priore, candidus, sed croceus est. Folia quoque eius angustiora sunt quā prioris, aliās simile, vt pictura luculenter ostendit.

LOCVS.

Passim apud nos in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret initio mensis Iunij.

TEMPERAMENTVM.

Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtique in gustu amaritudinē habet, partim ex aquea, eaque tēperata. Radix autem & folia primi ordinis sunt exiccantium & abstergentiū. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quā in folijs.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Lirinum
oleum.

Ex Lilij flore vnguentum fit quod ab alijs Lirinum, ab alijs Susinum appellatur, ad emolliendos neruos, priuatimq; vulvarum durities aptum. Folia herbe illita, serpentium moribus subueniunt. Feruefacta

ue facta ambustis profunt. Eadem in aceto condita vulneribus opitulantur. Succus foliorum cum aceto & melle in arco vase coctus, contra vetusta ulcera, & recentia vulnera medicamentum fit. Radix assa, aut cum rosaceo trita ambustis medetur, vuluā emollit, mēstrua ducit, & vlceribus cicatricem inducit. Cum melle subacta nervorū præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, furfuresq; emēdat. Achores abstergit, faciemq; emēdat et erugat. Testiculorū inflammationes trita cum aceto, aut Hyoscyami foliis, & farina triticea demulcet. Semen cōtra serpentium morsus potū valet. Illinitur sacris ignibus semen & folia cum vino trita.

EX GALENO.

Quod ex flore Lilij conficitur oleum & unguentum, citra mordicationem digerendi simulq; emolliendi facultatē obtinet. Vnde fit vt vteri duritiis sit aptissimum. Porrò radix foliaq; per se trita desiccant, & abstergunt, & digerūt moderatē: proinde quoq; ambustis cōpetunt: siquidem hæc quoq; moderatē desiccantem extergentemq; facultatem postulant. Radicem ergo assam tostāmue, ac deinde cum rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix imponūt: quippe cum alioqui & aliorum vlcerum omnium bonum sit inducenda cicatrici remedium. Quinetiam uteros emollit, mensesque pronocat. Folia verò præcoquentes, & ipsa ad obduclam vsque cicatricem imponunt, non

PLANTARVM HISTORIAE

in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque vulneribus. Sed sunt qui aceto ea condientes ad vulnera suo tempore vtantur. Quum alphas, aut pforā, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi mel est. Ceterum si id moderatè illi ac cōuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa quæ valenter exiccari postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus utroq; erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ exiccari postulat absque morfu fuit, ceu vulnera omnia ingentia, & maximè quæ in capitibus musculorum cuciniunt, & quæcunque humida flaccidæ, diuturna & agrè ad cicatricem perducuntur.

EX PLINIO.

Lilij radices multis modis florem suum nobilitauerunt, contra serpentium ictus ex vino potæ, & contra fungorum venena. Propter clauos pedum in vino decoquuntur, triduoq; non soluantur. Cum adipe aut oleo decoctæ pilos adustis reddunt. E mulso potæ inutilem sanguinem cum aluo trahūt. Lienī & ruptis & vulsis prosunt. Et menstruis fœminarum in vino decoctæ. Impositæq; cum melle neruis præcis medentur. Lichenas, lepras & furfures in facie emendant. Erugāt corpora. Folia in aceto cocta vulnera

vulneribus imponuntur. Epiphoris testium in melle cum Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro. Flos & folia ulcerum vetustati imponuntur. Succus qui flore expressus est, ab aliis melle, ab aliis syrium vocatur, ad emolliendas vulvas utilis. Sudores mouet, suppurationes concoquit.

EX SIMEONE SETHI.

Odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vim habet discutiendi, & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnerum sanationem.

DE CUCURBITA SATIVA.

CAP. CXXXVIII.

Cucurbita lata longa & minor quæ nobis lagenosa dicitur, est frequens.

NOMINA.

Ολοκύνθα ἑσώδεις Græcis, Cucurbita
 K Latinis vocatur: Officina latinum nomen retinuerunt. Germanis Kurbisz (Gallicè vne Courge.) Græci ex aduerso vocabulum imposuerunt, καλοκύνθω nominantes, quod scilicet pumili & breuesque sint partus, quos ipsa passim enititur, cum tamen corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Cucurbitam verò Latini à concuruatu hand dubiè dixerunt, quod facile si quid obstitit aut fuerit impedimento quo minus extendatur, incuruescat.

καλοκύνθα quare nomina-
 Cucurbita cur dicitur.

PLANTARVM HISTORIAE

GENERA.

Plinius lib. 19. cap. 5. duo satiuæ Cucurbitæ genera facit. Vnam camerariam vocatam, quæ facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines operit. Alteram plebeiam, quæ scilicet suis flagellis humi repit. Nos ad formâ respicientes tria eiusdem genera fecimus. Vnâ maiorem, alterâ verò minorem. Maiorem vocauimus sic à floribus & fructu, quos maiores habet. Minorem cōtrâ, quæ prædicta minora obtinet. Tertiā longiorem, à fructu oblongiore diximus.

FORMA.

Cucurbita amplexicaulis est, reptantibus flagellis in altum scandens, in ramósque vitis modo se diffundit: tamen ob caulis infirmitatem, humi spargitur, ni propius adsit cui caducus innitatur: folia rotûdo, Personatiæ aut Asari foliis haud dissimili: flore candido, fructu coloris herbacei primum, flauo paulò pòst, pyri forma turbinato, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum cogitur. Cortex recentitener, inueterato durus, quo carne prius exinanito peregrè proficiscentes vrceorum vice frequenter vtuntur in eo vina condentes, quo per iter se à sitis iniuria vindicare possint.

LOCVS.

Amat rigua & aquosa loca Cucurbita, nec nisi sata pronemittit.

TEM

TEMPVS.

Tardius in Germania ob soli frigiditatem fructus Cucurbita maturescit, ideoque vix ante exitum autumnum maturum eius fructum inuenies. Cibus autem quotidianus, donec lignescat, esse potest.

TEMPERAMENTVM,

Cucurbita frigida humidaq; temperatura est, vtraque qualitate secundi ordinis.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Cucurbita cruda trita & illita, edemata, abscessusq; mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam sriasin vocant, in incipite vtiliter illinuntur. Oculorum inflammationes, podagrasque similiter iuuant. Succus è ramentis contusis per se, & cum rosacco instillatus, aurium doloribus auxiliatur. Adustiones cutis inunctus adiuvat. Totius Cucurbitae elixae & expressae succus cum exiguo melle & nitro potus, aluum leniter soluit. Si quis in Cucurbitam crudam excauatam vinum infundat, & sub dio habeat, temperatumq; ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

EX GALENO.

Succus ramentorum Cucurbita ad aurium dolores cum phlegmone inunctos, cum rosacco vtentibus prodest. Sic tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta humida est, & sitim arcet. Cruda cibo insuauis est, stomacho perniciosa,

PLANTARVM HISTORIAE

eiosa, & concoctu planè inexpugnabilis, adeò vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam cōpellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore ventriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euer-
tet, & ad vomitionem concitabit, quæ vna cum ab
vrgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur,
aliaq; ex fugacibus complura, aut mox quàm
elixata est, aut fricta in sartagine, aut assam omnes
homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est,
humidum frigidumq; corpori alimentum prabet,
ac idipsum ea de causa exiguum, sed leniter per aluum
subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob
communem omnium humidorum ciborum rationem,
qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè
infelicitè concoquitur, modò non anteuertat cor-
ruptio. Plura lib. ij. de aliment. facul. Galenus.

EX PLINIO VALERIANO.

Veteres medici de Cucurbita ita senserunt, vt eam
aquam dicerent coagulatam. Galenus humidæ pu-
tat virtutis & frigide, idq; ex eo probat, quòd ipsa
in cibo sumpta stomachum relaxat, bibendi desin-
deria non excitat. Cætera etiam in Cucurbita ta-
lia, vt apertè frigida potestatis exempla demon-
stret. Cruda & trita leniunt omnem tumorem. In
cibo sumpta molliunt ventrem. Succus earum, vt
Galenus ait, ad compescendum velociter auriculæ
dolorem tepesactus infunditur. Idem succus & do-
lorem dentium mitigat, si diutius in ore teneatur.

Sed

Sed & rosaceo mixtus, & vñctioni corporis admo-
tus, febrium restinguit ardores. Cinis aride corticis
efficaciter potest combusta sanare. Eundem cines-
rem didicimus ab expertis. vulnere in veretro iam
in putredinem versa purgare, & ad cicatricem vs-
que perducere. Semini sicco illa vis traditur, vt in
puluerẽ tusum & inspersum impleat vulnere quæ
cauata sunt. Quidam illud in vino bibendum dede-
re, vt solutiones alui fluentis inhiheret. Viticula
quoque Cucurbitæ iam senescentes cum passo &
aceto dysentericis data, miro modo saucia intesti-
na componunt.

EX SIMEONE SETHI.

Concoctus facilis, benignus succi est, & admodum
nutrit. Sitim sedat, vrinam cit, & ventrem mouet.
Calidis & siccis temperaturis prodest, & inflama-
tiones ventris & iecoris sedat. Pituitosos autem la-
dit, colicósque affectus. Si malos humores assequi-
tur, ab iis corrumpitur, & malum succum generat.
Semen genitale minuit, & Veneris appetentia ex-
tinguit. Sanguis ex ea procreatus, consistencia tenuis
est. Thoraci, pulmoni & vesicæ prodest. Succus ra-
mentorum eius cum rosaceo impositus, ad aures in-
flammatione laborantes confert. Integra verò illi-
ta, calidas inflammationes refrigerat.

DE COLOCYNTHIDE.

CAP. CXXXIX.

Colocynthis nomen retinet nobis.

PLANTARVM HISTORIAE NOMINA.

Coloquin-
tida.

KΟΛΟΚΩΘΙς Gracis, sylvestris Cucurbita La-
tinis, Coloquintida barbaris & officinis, ger-
manis Vuilder Kurbisz, vel Coloquint (Gallicè
des Coloquintes) appellatur. Sic autem nomi-

Colocyn-
this unde
dicta.

nata est, quasi parua Cucurbita. Nam si eius frus-
ctum satina contuleris, quantitate longè minor es-
sit, ac pile forma in orbem coactus.

FORMA.

Vitculas foliaq; per terram strata emittit, satia-
uo Cucumeri, ei nimirum què Citrulum hodie offi-
cina vocant, similia, diuisuris scissa, fructum rotū-
dum, mediocri pile similem, vehementer amarum,
fungosa candidaq; intus medulla: flores, quod Dios-
corides omisit, pallescētes ac luteos, Cucumeri iam
nominato similes.

LOCVS.

In Germania sua sponte non nascitur, sata tamen
prouenit, sed rarissime perfectionem attingit, quòd
frigidior sit eius terra quàm quòd in ea fructū pro-
ferre possit. In orientalibus enim & calidioribus
locis nata ad nos defertur.

TEMPVS.

Eius flores in fine ferè astatu, fructus autem ex-
tremo autumnno apparent, qui primum quidem her-
bacei, mox pallidi sunt. Legēdi verò sunt cū cœ-
perint in pallidiorem colorem demutari. Et durat
integris natura & viribus ad quinque annos.

TEMPE-

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Medulla fructus purgandi vim habet, quatuor obolorū pondere cum mulsā aqua sumpta, & cum vitro, myrrha & melle coacta in catapotiu. Arefacta pila trita, vtiliter miscetur clysteribus ischiadicorum, resolutionis nervorum, & colico dolore affectorum, pituitam, bilem & strigmenta, interdū etiam cruenta educentes. Apposita fetus enecant. Dentium dolores, si quis repurget hanc, & luto oblinat, & in aceto nitroq; inferuescat, & ad colluēdos dentes det, tollit. Si verò quis aquam mulsam aut passum in ea decoxerit, & sub dio refrigeratū bibendum dederit, crassos humores & strigmenta purgat. Stomacho supra modum aduersatur. Sedi etiam ex ea balani subiiciuntur, ad excrementa eiicienda. Quinetiam virentis succo, ischiadici vtiliter perfricantur.

EX GALENO.

Colocynthis gustu amara est. Sed quā amarissimo dū potatur adsunt opera medicamēto, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriā facultatem quā validam in se continet, nimirum cum iis quæ expurgat, per aluum & ipsa excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadicis prodest.

EX PLINIO.

Herbacea arefacta per se inanit aluum. Infusa

PLANTARVM HISTORIAE

quoque clysteribus intestinorū omnium vitiis medetur, & renum, & lumborum, & paralyſi ciecto ſemine. Aqua mulſa in ea decoquitur ad dimidias, ſictuſſienti inſunditur obolis quatuor. Prodeſt & ſtomacho, farina arida pilulis cum decocto melle ſumptis. In morbo verò regio vtiliter ſemina eius inſumuntur, & protinus aqua mulſa. Carnes eius cum abſinthio & ſale dentium dolore tollunt. Suc-
cus verò cum aceto calefactus mobiles ſiſtit. Item ſpina & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo ſi inſricetur. Præterea, mirum dictu, ſemina eius ſi fuerint pari numero adalligata febris, ſanare dicuntur quas Græci periodicas vocant.

DE COTONEA MALO.

CAP. CXL.

NOMINA.

Ἰδωνία μῆλεα Græcis, Mâlus Cotonea

K et Cydonia Latinis, officinis Citonia, germanis Kuttenuß (Gallicè Vne Coin

Cydonia gnaciere) nominatur. Cydoniam verò Græci à Cydonæ Cretæ oppido, vnde primum aduecta eſt, dicunt. Cotonea verò à Sidontæ Corinthi vico nominata eſt.

Cotonca. Sunt tamen qui ſic vocatam velint, quòd mûla eius lana quadam tegi videantur, quæ cotton dicitur. Atqui in re non admodum magni momenti, parum refert vtram amplectari ſententiam.

GENERA.

Cotonea arboris mûla Dioſcoride & Galeno auctoribus

toribus duum sunt generum. Alia enim minora, rotunda, odoratioꝛaque sunt, quæ vera Cotonea appellantur. Alia autem maiora, dulciora, ac minus acerba, Galeno in fine libri sexti de tuenda sanitate teste, Struthea nuncupantur.

Struthea.

FORMA.

Arbor notior est quàm vt debeat representari. Mâlo vulgari haud dissimilis est, nisi quod infra magnitudinem illius subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimente ramos, prohibenteque parentem crescere. Folium quoque eius angustius à terra albicat. Poma tenui lanugine pubescunt, & incisuris crispantur, vt pictura affabrè ostendit.

LOCVS.

In cultis & hortis provenit. Locum tamen peculiariter & frigidum & humidum desiderat. Si in calido statuitur assidua irrigatione illi succurri opus est: fert tamen mediocris situs, inter frigoris & caloris naturam, statum. Planis & decliuibus gaudet.

TEMPVS.

Autumno poma eius maturescunt.

TEMPERAMENTVM.

Mâla Cotonea frigido & terrestri temperamento donata sunt, propterq; vincentem adstrictionem minus cæteris mâlis humida existunt. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cotonea stomacho accommodata sunt, vrinam

C iij mouent.

PLANTARVM HISTORIAE

mouent, Tosta mitiora sunt. Celiacis, dysentericis,
 purulenta excreantibus, cholericis prosunt, praeser-
 tim cruda. Maceratorum liquor potus stomachi at-
 que alui fluxionibus opitulatur. Succus crudorum
 assumptus orthopnoicis auxilio est. Decocto eorum
 sedes & vuluae procidentes proluuntur. Quae melle
 condiuntur, urinam ciunt, mel autem naturam eorum
 induit: quippe adstringens & conspissans obstruens ve-
 fit. Quae autem cum melle coquuntur, stomacho vtis-
 lia sunt, & gustu iucunda, minus autem constri-
 gunt. Cruda cataplasmatibus miscentur ad cohiben-
 dam aluum, contraque stomachi subuersionem: &
 ardorem, mammarum inflammationes, lienes indu-
 ratos & condylomata. Fit vinum ex iis tuis & ex-
 pressis, sed quo perduret, sedecim sextariis succi, va-
 nus mellis adiicitur, alioqui acefcit. Prodest autem
 Vnguentum ad omnia quae dicta sunt. Vnguentum etiam ex ipsis
 Melinum. conficitur, quod Melinum appellatur, quo vtimur
 quando adstringenti oleo opus est. Eligi oportet vera,
 quae parua, rotunda & odorata sunt. Struthea autem
 vocata & magna, minus utilia. Flos & viridis &
 siccus cataplasmatibus utilis, iis potissimum quae ad-
 strictionem desiderant conueniens. Inflammationibus
 oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus,
 mensiumque impetui cum vino potus prodest.

EX GALENO.

Eximiū quid Cotonea pra aliis malis possident:
 nam & plus adstringunt, & durabilem succum ha-
 bent,

bēt, si cocta cum melle afferuare quis cupiat. Aliorum succus repositus acescit, utpote frigida humiditate multa redundans. Struthcorum quoque succus perennare potest, ubi recte fuerit preparatus, quemadmodum & Cotoncorum: verum hic minus suavis & iucundus est, maximeque adstringit, ita ut huius quoque aliquando usus sit idoneus ad venteris maiorem in modum dissoluti robur restituendum.

EX PLINIO.

Cotonea cocta suauiora. Cruda tamen duntaxat matura, prosunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholericis, celiacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur & pectori in febris ardoribus, & tum decoquuntur in aqua, ad eadem quae supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decoctaue cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat, cocta in vino, & illita cum cera. Alopeciiis capillum reddunt. Quae ex iis cruda in melle cōdiuntur, urinam mouent. Mellis autē suauitati multum adiiciunt, stomachoque id utilius faciunt. Quae verò in melle cōdiuntur cocta, quidam ad stomachi vitia trita cum rosaceo foliis decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item mammis, condylomatibus, varicibus. Flos & viridis & siccus, inflammationibus oculorum, excreationibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex iis mitis, cum vi-

PLANTARVM HISTORIAE

no dulci tusus, utilis & celiacis. & iecinori. Deco-
cto quoque eorum fouentur, si procidant vulua &
interanea. Fit & oleum ex iis, quod Melinum vo-
cavimus, quoties non fuerint in humidis nata. Mi-
nus utilia Struthea, quamuis cognata.

EX SIMEONE SETHI.

Stomachū adstringunt & corroborant & ante
cibum sumpta ventrē cohibent, urinam prouocāt.
Si ad satietatem edantur, difficulter cōcoquuntur.
Dulcia minus adstringunt, acida verò magis, vomī-
tūque compescunt. Post cibum sumpta ventrem
mouent: sed quibus est imbecilla facultas vētris rea-
tentrix, & excretrix valida, plus cibi accipiant.
Mansa à potu vini vaporem in caput distribui pro-
hibent. Si qua pręgnans, vt fertur, crebrius hæc co-
medat, puerum indistrium & versutum pariet.

DE CASTANEA. CAP. CCLI.

NOMINA.

καστανα, ἢ διὸς βάλανος, ἢ σαρδιάνου

Κ βάλανος, ἢ λόπιμου Græci: Casta-

nea, Sardiana glans, Iouis glans, Nuxq̃;

castanea Latinis appellatur. Germanis nostris Ca-
stani, vel Kesten (Gallicè Chastaignier) vocā-

Castanea tur. Castanea autem à Castano Magnesiæ oppido,
vnde di- vnde primum aduectæ sunt, nominatas esse cōstat.
Etæ. Sardiana verò glandes, quoniam in Sardinia opti-

Sardiana me nascantur.

FORMA.

glandes. Arbor est vulgè cognita, Iuglandi handquaquā
dissimilis,

disimilis, folio tātū venosiore & fimbriato. Nux
quam producit intus solida, & plurimum plana,
triplici tegminis ambitu septa, membrana primum
āmara, mox lento cortice, demum echinato calyce.

LOCVS.

Puram & resolutam terram desiderat, opacoq;
& septentrionali cliuo latatur. Montes & valles
diligat. In plerisque Germaniæ locis copiosissima
provenit.

TEMPVS.

Ineunte vere germinat, seriusq; Vergiliarum oc-
casu fructificat.

TEMPERAMENTVM.

Adstringit & exiccat Castanea haud secus quā
aliæ glādes. Calida verò & sicca est primo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Castanea adstringunt, eademq; quæ glādes pos-
sunt. Potissimum autem quæ inter carnem & cor-
ticem membrana est. Caro his qui Ephemerō, hoc
est, Colchicon, biberunt, accommodata est.

EX GALENO.

Castanea inter omnes glandes principatū tenet,
soleq; sylvestrium fructuum alimentum memora-
bile corporibus præbent.

EX PLINIO.

Castanea vehementer sistunt stomachi & ven-
tris fluxiones, sanguinem excruciantibus prosunt, car-
nes alunt.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO VALERIANO.

Castanea ex omnibus fortissimum quidē cibum corpori præstant, sed qui difficile concoquatur. Coctæ autem in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientib. profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, celiacis, dysentericis, sanguinemq; excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior mēbrana quæ corticem fructumque discernit, ad tertiam partem decocta in aqua & potui oblata, mirè aluū fluentem refrenat, adeò vt Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit, purget.

EX SIMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardè transeunt, & difficiliter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatus efficiunt, ventremq; sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocu-
menti deponunt.

APPENDIX.

Capitis dolores creant. Inflationes pariunt, concoctū difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxa remittunt. Tritæ cum melle & sale rabiosorum canum morsibus imponuntur. Mammarum duritias discutunt, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, iisq; vino maceratis, & cum farina subactis, pessī vice vtuntur ad supprimendos menses.

DE CARYO BASILICO.

CAP. CXLII.

NOMINA.

Kάρυον βασιλικόν Græcis, Regia nux & Persica, Iuglânsg; Latinis: officinis nux simpliciter, Germanis Vuelschnusz (Gallicè Noix) appellatur. Κάρυον autem Græcis à capitis gra- Caryō vne uedine vocatam esse notissimum est. Nam folia ar- de Græci boris huius grauem expirant halitum, viresq; eius appella- in cerebrum penetrant, atque adeò eos sopore ten- rint. tans ledit qui sub arbore decubuerint. Basilicā ve- Basilica et rò, Regiāmve & Persicam, eò quòd è Perside pri Persica mum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse cur dicta. constat. Iuglandem à iuuando & glande nomina- Iuglans. tam existimant.

FORMA.

Arbor est prægrandis, multis prælongisq; nixa radicibus, procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, ad binum ternumve cubito- rum complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, foliis latis, oblongis, è iucundo grauius subolentibus, patulāque iaculā- tibus umbram & insalubrem, per autumnum de- Umbra In ciduis. Verni temporis initio veluti quodā gestiens glādis ar- te foliorum conceptu, panicula prælōga, collo squa- boris insa- matim compactili protracta, ordine nucis pincæ lubris. protuberat, dehiscitque. Flauescens statim quā frondem facere cœpit, nutans caducāque prolabi- tur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur. Tum super ramenti huius pediculum flos erumpit, totidemque calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulisque iis singula includuntur nuces, multis munita inuolucris. primū herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartito digeruntur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus letatur, aquasq; odit. Passim in omnibus ferè Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauonii, non cacumine ut maxima pars arborum, sed lateribus impulsō priore pullulo. Fructificat autumno.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex virium enarratione patebit. Virides verò nuces primo ordine siccae, secundo verò calidae censentur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Nuces inglandes difficiles cōcoctu, stomacho inutilēs, bilem augent, capitis dolorem faciūt, tussientibus inimica. Ad vomitiones ieiunis in cibo utiles. Praesumpta & à cibo comesta cum caricis & ruta letalib. venenis aduersantur. Largius esitata latos lumbricos pellūt. Illinuntur mammariū inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum exiguo melle & ruta. Cum cepa verò, sale & melle, canis hominisque morsui conferunt. Tormina cum putamine suo cre-

mata

mata & vmbilico admotæ sedant. Cortex combu-
stus, tritusq; in vino & oleo, infantibus inunctus ca-
pillis elegantes efficit, alopeciasq; replet. Sistit men-
ses crematum tritumq; cū vino admotum quod in-
tra nuces clauditur. Vetustarum autem nucum nu-
clei illiti, gangrenas, carbunculos, agilopas & alo-
pecias commanducati & impositi celeriter sanant.
Fit etiam ex iis contusis & expressis oleū. Recen-
tes nuces stomacho minus nocent, dulciores enim
sunt. Quam ob causam alliis miscentur, vt acrimo-
niam auferant. Illitu liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

Arbor tum in germinibus, tū in foliis adstrictio-
nem quandam possidet. Caterum euidentē & plu-
rimam in nucis putamine recenti & sicco: proinde
eo fullones quoque vtuntur. At nos ea exprimētes,
succo similiter vt mororum & ruborum decocto in
melle, vt stomatico medicamento vtimur, & ad o-
mnia reliqua ad quæ modo dicti succi conueniunt.
Porro nucis ipsius quod edendo est, oleosum est &
tenuiū partiū, ideoq; etiam facile † exprimitur: &
quo diutius recōditum fuerit, magis tale efficitur. † Aliās
Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere li- ἐκχολοῦ
cet: tunc sanè qdmodum discutiens fit, vt eo nōnulli του, in bi
gangrenas, & carbūculos, & agilopas sanēt: nōnul- lem verti-
li verò etiā ad neruos vulneratos vtitur. Caterum tur.
si recens sit adstringentis nonnihil qualitatis quo-
que obtinet. At quod imperfectū est etiam dum, &
nondum.

PLANTARVM HISTORIAE

nondū siccum, veluti reliqui fructus omnes qui vi-
rides sunt plenum est semicocta humiditatis. Cor-
tex tamē eius vbi inaruit, tenuium partiū & exic-
catorium est medicamentum, morsus expers.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorūque vires, in cerebrū
penetrant, hocque minore momento, sed in cibis nu-
clei faciunt. Sunt autem recentes iucundiores, sica-
e vnguiniosiores, & stomacho inutiles, difficiles cō-
coctu, dolorem capitis inferentes, tussientibus inimi-
cæ, & vomituris ieiunis apta in tenasmo solo: tra-
hunt enim pituitam. Eadē præsumpta venena he-
betant. Item anginam cum ruta & oleo. Item ad-
uersantur cepis, leniuntq; earum saporem. Aurium
inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Itē
cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autē &
sale & melle, canis hominisq; morsui. Putamine nu-
cis iuglandis, dens canis inuritur. Putamen combus-
tum tritumq; in oleo aut vino, infantium capite
peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias sic vtun-
tur. Quo plures quis nuces ederit, hoc facilius ti-
neas pellit. Et quæ peructeres sunt nuces, gangranis
& carbunculis medentur. Item sugillatis. Cortex
iuglandium lichenū vitio & dysentericis prodest.
Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuariis
Mithridatis maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius
inuenit in peculiari commentario ipsius manu com-
positionem antidoti, duabus nucibus siccis, Item fi-
cis

eis totidem, & ruta foliis viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoq; canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati illitiq; præsentem remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux viridis, utpote adhuc aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest denique & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum gero sumptam mollire. Noces autem sicca, dura, cum caricis duabus, & viginti ruta foliis addito salis grano simul conteruntur, nullisq; venenis operiri poterit ea die quisquis ieiunus accepit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero noces statim ut arbori deceptæ sunt, cortice adharere quasi santur: his admiscetur aluminis scissi libra tres, et in nouo fictili vase ponuntur: super hac infunduntur olei boni libra tres, & diligenter in loco neque humido, neque nimium sicco obruuntur, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit.

EX SIMONE SETHI.

Virides ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibum cum sapo comedunt. Facilius etiam quam amygdala concoquuntur, Arida in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores sunt, si cum caricis edantur. Ferunt etiam eum qui noces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit,

PLANTARVM HISTORIAE

non magnopere à venenatis medicamentis ladi. Cōcoquuntur faciliè nuges in frigidis vètriculis, in calidis verò in bilem magis mutantur. Fanciū & capitis dolorem afferunt, & tusses augent. Ante alios cibos sumpta, vomitum adiuuant. Ad satietatē comestas, lumbricos educere scimus. Ad dentium pruritum vtilis sunt.

DE CALTHA. CAP. CXLIII.

Caltha seu calendula nobis Soulie à solsequio dicitur, quòd flos cum solis ortu aperitur, & occasu clauditur.

NOMINA.

Quo nomine Græci plantam hanc appellauerint, fateor ingenuè mihi nondum constare.

Latinis autē dicta videtur Caltha vel Calthula, quam vocem deinde corrumpentes officine, in Calendulam immutarunt. Quanquam verisimile etiam sit, sic nominatam esse, quòd omnium mensium Calēdis fruticare comperiat. Atq; hinc fit quòd nonnulli florem omnium mensium appellant. Germani Ringelblumē (Gallicè soulie) vocant, ab intorto, & in circulum acto semine.

FORMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso, foliis longiusculis, in angustum desinentibus, floribus speciosis croceis luteisve, non ingrati, quantumvis grauius odoris, quā dote in coronamenta venit: semine, cuius vagina scorpionis caudā imitatur: radice simplici,

Calēdula
quare di-
cta.

Flos omniū
mensium.

plici, multo capillitio fibrata. Cur autem hæc herba Caltham esse credã, facit imprimis Plinius, qui lib. xxi. cap. vi. Caltham odore graue esse scribit. Dein Virgilius qui Aegloga secunda sic canit: Mollia luteola pingit vacinia Caltha. Luteolam à luteo florum haud dubiè colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atque vix hortum inuenies in quo copiose nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferè mensium Calendis, vt diximus, flores deprehenditur, Maio incipiens mense: Magis autem autumno eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neque id im- merito, quandoquidem dulcedine modica cū amaritudine coniuncta participet.

VIRE. EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetariis. Flos ex vino potus ciet menses: item herba succus, quo in dentium dolore os presentaneo remedio collinitur. Non parvū etiam eius flos ad flavos reddendos capillos conducit. Idem perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffitibus ad- motus fuerit.

DE CARYOPHYLLATA.

CAP. CXLIIII.

Caryophyllata quodd radii. ficcata Caryo-
D ij phyllum

PLANTARVM HISTORIAE

phyllum oler, nobis Sana munda ab effe-
ctis vocatur, acetariis etiam folio expeti-
ta herba.

NOMINA.

Caryo-
phyllata
non est La-
gopus.

Q Valiter Graecis & antiquis Latinis scripto-
ribus hac herba nominata sit, nondum cō-
pertū habeo. Cur enim Dioscoridis La-
gopus non esse credam, etsi paniculum pedi lepo-
rino prorsus similem habeat, facit quod in manu-
scripto & peruetusto herbario seorsim descriptam
& depictam utranque herbam viderim. Pictura
autem Lagopi longē aliam herbam, quā in segeti-
bus nascitur, quā sit Caryophyllata, exprimit: de
qua suo loco diceamus. Neque desunt qui herbā hāc
de qua agimus, Geum Plinio dictam velint, quorū
certē sentētia periculo vacat, quod eadem facultas
utrisque radicibus sit. Sed ad institutum reuertā-
mur. Herbam quam recentiores Latini Caryophyl-
latam, ab odoris suauitate quam radices de se prae-
bent, nominant, vulgus herbam Benedictā, à diuina
Sanamur na sua efficacia, & Sanamundam appellant. Ger-
mani Benedicte nuurtz. (Gall. l'Herbe be-
noitte.)

GENERA.

Caryo-
phyllata
hortensis.

Duo esse eius herbe genera animaduerti, nō ta-
men multum à se dissidentia. Primum genus Ca-
ryophyllatam hortensem vocauimus, cui ex cultus
ra aliqua teneritas accedit in foliis, floribus & pa-
niculis. Flos huic paulo minor & pallidior quā
sylvestri.

sylvestri.

Sylvestri. Germanicè Gartē, oder heymisch Benedictenuurtz appellari potest. Alterum huius herbe genus *Caryophyllatam* sylvestrem diximus, quod scilicet citra culturam proveniat. Flores eius multo maiores, magisque ad croci colorem accedunt. Germanicè Vuild Benedicten vurtz nominari commodè potest. Differentiam tamē nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

FORMA.

Capulis illi sequicubitalis, geniculatus, angustus, terna è pediculo longo folia articulatim excurrentia, per ambitum serrata, bina etiam prioribus minora, singula genicula cingunt. E medio alarum sinu ramuli funduntur tenues, quib. in summis flos luteus emicat, quo successso caput extuberat circinatis acinulis cumulatè stipatum, quasi rudimentū cluceat nature frugum inchoantis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, *Caryophyllon* olet.

LOCVS.

Primum in hortis plantatum provenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & peruetustus etiā herbarius, calidā & siccam esse in secundo ordine statuunt. Folia sanè in gustu nō mediocrem adstrictionē ostendunt. Radix itidem haud parvam adstrictionē obtinet.

PLANTARVM HISTORIAE VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & sordibus eluta siccatur, et in bre aceti respersa arceas & vestes incundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosque coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates incundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatē habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentum item ex vino decoctionis eius menses ciere. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem praterco roborare, dolorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut flatibus ortum, decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herba decoctū confert. Externa verò ex ea collui debent.

DE CENTAVRIO MINORE.

CAP. CXLV.

Centaurium paruum nomen nobis retinet, Centore.

NOMINA.

Kενταύριον μικρόν, ἢ λιμνήσιον, καὶ λιμνοῖον Græcis, Febrifuga & Felterra Latinis, officinis Centauria minor, Germanis Kleintausendguldkraut, Fieberkraut, Erdgall & Biberkraut, (Gallis Centaure, ou Fiel de terre) appellatur. Centaurium, quòd ea curatus dicitur Chiron Centaurus, cum Herculis excepti ho-

Cētauriū & Biberkraut, (Gallis Centaure, ou Fiel de terre) appellatur. Centaurium, quòd ea curatus dicitur Chiron Centaurus, cum Herculis excepti ho-

Limnesiū. spatio pertractanti arma sagitta excidisset in pedē.

Limnesion

Limnesio & Limnæum, quòd secundum aquarum
scatebras ac paludes, quas Græci λίμνες dicunt,
nascatur. Febrifuga, eo quòd febres fugat, & pro Febrifuga
cul è corpore pellat. Fel terra, ob summā quam ha Fel terra.
bet amaritudinem.

FORMA.

Herba est Hyperico Origanove similis, caulem
habens altitudine supra dodrantem, angulosum.
Flores in puniceo colore subpurpurascētes, ad Lych
nidis flores accedentes. Foliis parvis & oblōgis vè
luti Ruta, Semē tritico simile. Radicem exigam,
inutilem & leuem.

LOCVS.

Propter lacus & rigualoca, Dioscoride autore,
nascitur. Apuleio verò teste in solidis & fortibus
quoque locis prouenit, id quod non rarò in Germa
nia nostra accidere compertum habeo.

TEMPVS.

Floret æstate & autumnno, quo maximè tempo
re, quia semine est prægnans, colligitur.

TEMPERAMENTVM.

In foliis & floribus vincit qualitas amara pan
lulum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmo
di temperamētum admodum exiccatorium est me
dicamentum, expers mordacitatis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adhuc virens tusa & illita vulnera
glutinat. Vlcera vetera purgat, & cicatrice obdu

PLANTARVM HISTORIAE

cit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischia dicis commodè infunditur, sanguinè educens, & à dolore leuans. Succus ad oculorū medicamenta perutilis, cum melle quæ pupillas obte-
nebrant expurgans. In pessa admotus menses ac fœtus educit. Priuatim potus neruorum affectibus succurrit.

EX GALENO.

Centauri minoris radix prorsus inefficax est. Ra-
mi verò & potissimum folia quæ in iis sunt atque
flores, vtiliora. Vlcera magna herba ipsa adhuc res-
cens illita glutinat. Vetera quoque & quæ agrè ad
cicatricem perducì possunt eodem modo vtentibus
cicatrice obducuntur. Arefacta glutinatoriis & de-
siccatoriis miscetur facultatibus, iis videlicet quæ,
sinus & fistulas sanare sunt natæ, & veteres duri-
ties emollire, tum vlcerū maligna sanare. Miscetur
etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur, in
quibus ea medicamenta optima sunt quæ vehemē-
ter desiccantia cum quadam adstrictione nullā ha-
bent mordacitatem. Decoctū herbæ quidā ischia-
dicis infundunt, cum biliosa ac crassa ducens; nam
& talia purgat. Quamquam quum adeò vehemen-
ter operabitur vt cruenta euacuet, tunc magis pro-
derit. Succus porro eius quum adsimilis sit faculta-
tis, hoc est, exiccatoria & absterforia, & reliqua
iam dicta pulchrè efficere potest. Cum melle etiam
oculis illinitur, mensesq; & fœtum appositus in pes-
so.

foeuocat. Sunt qui ipsum praebeant & iis quibus nervi affecti sunt, vt qui euacuet & desiccet innoxie quae impleta sunt. Optimū etiam medicamentum est ad iecinoris obstructions soluēdas. Bonum quoque lieni indurato foris impositum, & nihilo secius si quis bibere sustinuerit.

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in hemina aquae cum exiguo salis & aceti, bilēque detrahit.

DE CYAMO. CAP. CXLVI.

NOMINA.

Kύαμος Græcis, Faba Latinis dicitur. Officinae Latinum nomen retinent. Germanis Bonen, (Gallis Vne Febue) appellatur.

FORMA.

Sola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, siliis carnosio, Portulacæ simili, flore cristato, versicolore, partim albo partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, quas M. Varro lugubres vocat literas: siliqua plerūque semipedali, fructu intus lato humani vnguis effigie, colore nō simplici, sed aut fuluo, aut nigro, iam verò etiā herbaceo & coccineo: radice singulari, lignosa, & capillata fibris. Quae hic à quibusdam, quasi nostra non esset vera Faba, afferuntur argumenta, non tanti momenti sunt vt confutatione indigeant: constat enim nostram, eas quas vetores illi adscripserunt, habere

notas

PLANTARVM HISTORIAE
EX PLINIO VALERIANO.

Castanea ex omnibus fortissimum quidē cibum corpori præstant, sed qui difficilē concoquatur. Coctæ autem in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tuſſientib. profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, coeliacis, dysentericis, sanguinemq; excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior mēbrana quæ corticem fructūque discernit, ad tertiam partem decoctæ in aqua & potui oblata, mirē aliuū fluentem refrenat, adeo vt Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit, purget.

EX SIMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardē transeunt, & difficiliter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatum efficiunt, ventremq; sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocu-
menti deponunt.

APPENDIX.

Capitis dolores creant. Inflationes pariunt, concoctæ difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxæ remittūt. Tritæ cum melle & sale rabioforum canum morsibus imponuntur. Mammarum duritias discutiant, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, iisq; vino maceratis, & cum farina subactis, pessi vice vtuntur ad supprimendos menses.

DE CARYO BASILICO.

CAP. CXLII.

NOMINA.

Kάρυον βασιλικόν Græcis, Regia nux & Persica, Iuglânsq; Latinis: officinis nux simpliciter, Germanis Vuelschnusz (Gallicè Noix) appellatur. Κάρυον autem Græcis à capitis gra- Caryō vna uedine vocatam esse notissimum est. Nam folia ar- de Græci boris huius grauem expirant halitum, viresq; eius appella- in cerebrum penetrant, atque adeò eos sopore ten- rint. tans lædit qui sub arbore decubuerint. Basilicā ve- Basilica et rò, Regiámve & Persicam, eò quòd è Perside pri Persica mum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse cur dicta. constat. Iuglandem à iuuando & glande nomina- Iuglans. tam existimant.

FORMA.

Arbor est prægrandis, multis prælongisque nixa radicibus, procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, ad binum ternumve cubito- rum complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, foliis latis, oblongis, è iucundo grauitèr subolentibus, patulámque iaculã- tibus umbram & insalubrem, per autumnum de- Vmbra In ciduis. Verni temporis initio veluti quodã gestien- glãdis ar- te foliorum conceptu, panicula prælonga, collo squa- boris insa- matim compactili protracta, ordine nucis pineæ lubris. protuberat, dehiscitque. Flauescens statim quàm frondem facere cœpit, nutans caducáque prolabi- tur.

PLANTARVM HISTORIAE

tur. Tum super ramenti huius pediculum flos erumpit, totidémque calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulisque iis singula includuntur nuces, multis munita inuolucris. primū herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartitò digerūtur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus letatur, aquasq; odit. Passim in omnibus ferè Germania hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauoni, non cacumine vt maxima pars arborum, sed lateribus impulso priore pullulo. Fructificat autumno.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex virium enarratione patebit. Virides verò nuces primo ordine siccae, secundo verò calidae censentur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Nuces inglandes difficiles cōcoctu, stomacho inutilis, bilem augent, capitis dolorem faciūt, tussientibus inimica. Ad vomitiones ieiunis in cibo vtilis. Presumpta & à cibo comesta cum caricis & ruta letalib. venenis aduersantur. Largius esitata latos lumbricos pellūt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum exiguo melle & ruta. Cum cepa verò, sale & melle, canis hominisque morsui conferunt. Tormina cum putamine suo cremata

mata & vmbilico admota sedant. Cortex combustus, tritusq; in vino & oleo, infantibus inunctus capillos elegantes efficit, alopeciasq; replet. Sistit mensures crematum tritumq; cū vino admotum quod intra nuces clauditur. Vetusiarum autem nucum nucleis illiti, gangrenas, carbunculos, agilopas & alopecias commanducati & impositi celeriter sanant. Fit etiam ex iis contusis & expressis oleū. Recentiores nuces stomacho minus nocent, dulciores enim sunt. Quam ob causam aliis miscentur, vt acrimoniam auferant. Illitis liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

Arbor tum in germinibus, tū in foliis adstrictionem quandam possidet. Ceterum euidentē & plurimam in nucis putamine recenti & sicco: proinde eo fullones quoque vtuntur. At nos ea exprimētes, succo similiter vt mororum & ruborum decocto in melle, vt stomatiko medicamento vtimur, & ad omnia reliqua ad quae modo dicti succi conueniunt. Porro nucis ipsius quod edendo est, oleosum est & tenuiū partiū, ideoq; etiam facile † exprimitur: & quo diutius recōditum fuerit, magis tale efficitur. † Aliās
ἐνχολοῦ
του, in bi
lem vertis-
tur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere licet: tunc sanē admodum discutiens fit, vt eo nonnulli gangrenas, & carbūculos, & agilopas sanēt: nonnulli verò etiā ad nervos vulneratos vtuntur. Ceterum si recens sit adstringentis nonnihil qualitatis quoque obtinet. At quod imperfectū est etiam dum, & nondum.

PLANTARVM HISTORIAE

nondū siccum, veluti reliqui fructus omnes qui vi-
rides sunt plenum est semicocta humiditatis. Cor-
tex tamē eius ubi inaruit, tenuium partiū & exic-
catorium est medicamentum, morsus expers.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorūque vires, in cerebrū
penetrant, hocque minore momento, sed in cibis nu-
clei faciunt. Sunt autem recentes iucundiores, sica-
e vnguiosiores, & stomacho inutiles, difficiles cō-
coctu, dolorem capitis inferentes, tuſſientibus inimi-
ca, & vomituris ieiunis apta in tenasmo solo: trah-
unt enim pituitam. Eadē præsumpta venena he-
betant. Item anginam cum ruta & oleo. Item ad-
uersantur cepis, leniuntq; earum saporem. Aurium
inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Itē
cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autē &
sale & melle, canis hominisq; morsui. Putamine nu-
cis iuglandis, dens canis inuritur. Putamen combu-
stum tritumq; in oleo aut vino, infantium capite
peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias sic vtun-
tur. Quo plures quis nuces ederit, hoc facilius ti-
neas pellit. Et quæ perueteres sunt nuces, gangranis
& carbunculis medentur. Item sugillatis. Cortex
iuglandium lichenū vitio & dysentericis prodest.
Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuariis
Mithridatis maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius
inuenit in peculiari commentario ipsius manu com-
positionem antidoti, duabus nucibus siccis, Item si-
cis

eis totidem, & ruta foliis viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoq; canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati illitiq; præsentem remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux viridis, utpote adhuc aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest denique & stomacho aliquid vigoris acquirere, & venter cum gero sumpta mollire. Noces autem sicca, dura, cum caricis duabus, & viginti ruta foliis addito salis grano simul conteruntur, nullisq; venenis opprimi poterit ea die quisquis ieiunus accepit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero noces statim ut arbori decepta sunt, cortice adharere quasi santur: his admiscuntur aluminis scissi librae tres, et in nouo fictili vase ponuntur: super hac infunduntur olei boni librae tres, & diligenter in loco neque humido, neque nimium sicco obruuntur, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit.

EX SIMONE SETHI.

Virides ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibum cum sapo comedunt. Facilius etiam quam amygdalæ concoquuntur, Arida in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores sunt, si cum caricis edantur. Ferunt etiam eum qui noces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit,

PLANTARVM HISTORIAE

non magnopere à venenatis medicamentis ladi. Cò
coquantur facìle nuges in frigidis vètriculis, in ca-
lidis verò in bilem magis mutantur. Fauciù & ca-
pitis dolorem afferunt, & tusses augent. Ante alios
cibos sumpta, vomitum adiuvant. Ad satietatē co-
mestas, lumbricos educere scimus. Ad dentium pru-
ritum vtilēs sunt.

DE CALTHA. CAP. CXLIII.

Caltha seu calendula nobis Soulie à sol-
sequio dicitur, quòd flos cum solis ortu
aperitur, & occasu clauditur.

NOMINA.

Quo nomine Græci plantam hanc appellave-
rint, fateor ingenuè mihi nondum constare.

Latinis autē dicta videtur Caltha vel
Calthula, quam vocem deinde corrumpentes offic-
inae, in Calendulam immutarunt. Quanquam ve-
risimile etiam sit, sic nominatam esse, quòd omnib.
mensium Calēdis fruticare comperiatur. Atq; hinc
fit quòd nonnulli florem omnium mensium appels-
lent. Germani Ringelblumē (Gallicè soulie)
vocat, ab intorto, & in circulum acto semine.

Calēdula
quare di-
ctā.

Flos omiū
mensium.

FORMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso, fo-
liis longiusculis, in angustum desinentibus, floribus
speciosis croceis luteisve, non ingrati, quantum gra-
vis odoris, qua dote in coronamenta venit: semine,
cuius vagina scorpionis caudā imitatur: radice sim-
plici,

plici, multo capillitio fibrata. Cur autem hanc herbam Caltham esse credam, facit imprimis Plinius, qui lib. xxi. cap. vi. Caltham odore grauem esse scribit. Dein Virgilius qui Aegloga secunda sic canit: Mollia luteola pingit vacinia Caltha. Luteolam à luteo florum haud dubie colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atque vix hortum inuenies in quo copiose nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferè mensium Calendis, vt diximus, flores deprehenditur, Maio incipiens mense: Magis autem autumno eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neque id immerito, quandoquidem dulcedine modica cum amaritudine coniuncta participet.

VIRE. EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetariis. Flos ex vino potus ciet menses: item herbae succus, quo in dentium dolore os presentaneo remedio colitur. Non parum etiam eius flos ad flavos reddendos capillos conducit. Idem perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffitibus admotus fuerit.

DE CARYOPHYLLATA.

CAP. CXLIII.

Caryophyllata quod radix siccata Caryo.
D ij phyllum

PLANTARVM HISTORIAE

phyllum oler, nobis Sana munda ab effe-
tis vocatur, acetariis etiam folio expeti-
ta herba.

NOMINA.

Caryo-
phyllata
non est La-
gopus.

Q Valiter Graecis & antiquis Latinis scripto-
ribus hac herba nominata sit, nondum cō-
pertū habeo. Cur enim Dioscoridis La-
gopus non esse credam, etsi paniculum pedi lepo-
rino prorsus similem habeat, facit quòd in manu-
scripto & peructusto herbario seorsim descriptam
& depictam utranque herbam viderim. Pictura
autem Lagopi longè aliam herbam, quā in segeti-
bus nascitur, quā sit Caryophyllata, exprimit: de
qua suo loco diceamus. Neque desunt qui herbā hāc
de qua agimus, Geum Plinio dictam velint, quorū
certè sentētia periculo vacat, quòd eadem facultas
utrisque radicibus sit. Sed ad institutum reuertar-
mur. Herbam quam recentiores Latini Caryophyl-
latam, ab odoris suauitate quam radices de se prae-
bent, nominant, vulgus herbam Benedictā, à diui-
Sanamun na sua efficacia, & Sanamundam appellant. Ger-
da. mani Benedicte nuurtz. (Gallè l'Herbe be-
noitte.)

GENERA.

Caryo-
phyllata
hortensis.

Duo esse eius herbae genera animaduerti, nō ta-
men multum à se dissidentia. Primum genus Ca-
ryophyllatam hortensem vocauimus, cui ex cultu-
ra aliqua teneritas accedit in foliis, floribus & pa-
niculis. Flos huic paulò minor & pallidior quā
sylvestri.

Sylvestri. Germanicè Gartē, oder heymisch Benedicte nuurtz appellari potest. Alterum huius herbae genus *Caryophyllatam* sylvestrem diximus, *Caryo-* quod scilicet citrà culturam proueniat. Flores eius *phyllata* multò maiores, magisque ad croci colorem accedunt. *Sylvestri* Germanicè Vuild Benedicte nuurtz nominari commodè potest. Differentiam tamē nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

FORMA.

Caulis illi sequicubitalis, geniculatus, angustus, terna ē pediculo longo folia articulatim excurrentia, per ambitum serrata, bina etiam prioribus minora, singula genicula cingunt. E medio alarum sinu ramuli funduntur tenues, quib. in summis flos luteus emicat, quo successso caput extuberat circinatis acinulis cumulate stipatum, quasi rudimentū cluceat naturae fragum inchoantis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, *Caryophyllon* olet.

LOCVS.

Primum in hortis plantatum prouenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & pernetustus etiā herbarius, calidā & siccam esse in secundo ordine statuunt. Folia sanē in gustu nō mediocrem adstrictionē ostendunt. Radix itidem haud paruam adstrictionē obtinet.

PLANTARVM HISTORIAE VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & sordibus eluta siccatur, et in bre acetii respersa arcas & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiēdas concoctiones, sedandisque coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatē habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentum item ex vino decoctionis eius menses ciere. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem praterca roborare, dolorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut flatibus ortum, decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbe decoctū confert. Externa verò ex ea collui debent.

DE CENTAVRIO MINORE.

CAP. CXLV.

Centaurium paruum nomen nobis retinet, Centore.

NOMINA.

Kενταύριον μικρόν, ἢ λιμνήσιον, καὶ λιμναῖον Græcis, Febrifuga & Fel terra Latinis, officinis Centauria minor, Germanis Klein Tausendguldekraut, Fieberkraut, Erdrgall Cētauwiū & Biberkraut, (Gallis Centaure, ou Fiel de vnde dit terre) appellatur. Centaurium, quòd ea curatus dictum. citur Chiron Centaurus, cum Herculis excepti ho Limnesiū. spatio pertractanti arma sagitta excidisset in pedē.

Limnesion

Limnesio & Limnæum, quod secundum aquarum
scatebras ac paludes, quas Græci λίμνες dicunt,
nascatur. Febrifuga, eo quod febres fugat, & pro Febrifuga
cul è corpore pellat. Fel terra, ob summam quam ha Fel terra.
bet amaritudinem.

FORMA.

Herba est Hyperico Origanove similis, caulem
habens altitudine supra dodrantem, angulosum.
Flores in puniceo colore subpurpurescetes, ad Lych
nidis flores accedentes. Foliis parvis & oblongis ve
luti Ruta, Semē tritico simile. Radicem exigam,
inutilem & leuem.

LOCVS.

Propter lacus & rigualoca, Dioscoride autore,
nascitur. Apuleio vero teste in solidis & fortibus
quoque locis prouenit, id quod non raro in Germa
nia nostra accidere compertum habeo.

TEMPVS.

Floret æstate & autumno, quo maximè tempo
re, quia semine est prægnans, colligitur.

TEMPERAMENTVM.

In foliis & floribus vincit qualitas amara pan
lulum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmo
di temperamētum admodum exiccatorium est me
dicamentum, expers mordacitatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adhuc virens tusa & illita vulnera
glutinat. Ulcera vetera purgat, & cicatrice obdu

PLANTARVM HISTORIAE

cit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischia dicis commodè infunditur, sanguinè educens, & à dolore leuans. Succus ad oculorū medicamenta perutilis, cum melle quæ pupillas obte-
nebrant expurgans. In pessa admotus menses ac fœtus educit. Priuatim potus neruorum affectibus succurrit.

EX GALENO.

Centauri minoris radix prorsus inefficax est. Ra-
mi verò & potissimum folia quæ in iis sunt atque
floræ, vtiliora. Vlcera magna herba ipsa adhuc res-
cens illita glutinat. Vetera quoque & quæ agrè ad
cicatricem perducì possunt eodem modo vtentibus
cicatrice obducuntur. Arefacta glutinatoriis & des-
siccatoriis miscetur facultatibus, iis videlicet quæ,
sinus & fistulas sanare sunt natæ, & veteres duri-
ties emollire, tum vlcerū maligna sanare. Miscetur
etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur, in
quibus ea medicamenta optima sunt quæ vehemē-
ter desiccantia cum quadam adstrictione nullā ha-
bent mordacitatem. Decoctū herbæ quidā Ischia-
dicis infundunt, cen biliosa ac crassa ducens; nam
& talia purgat. Quamquam quum adeò vehemen-
ter operabitur vt cruenta euacuet, tunc magis pro-
derit. Succus porro eius quum adsimilis sit faculta-
tis, hoc est, exiccatoria & absterforia, & reliqua
iam dicta pulchrè efficere potest. Cum melle etiam
oculis illinitur, mensesq; & fœtum appositus in pes-

foeuocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis quibus nervi affecti sunt, vt qui euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Optimū etiam medicamentum est ad iccinoris obstructiones soluēdas. Bonum quoque lieni indurato foris impositum, & nihilo secius si quis bibere sustinuerit.

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis & aceti, bilémque detrahit.

DE CYAMO. CAP. CXLVI.

NOMINA.

Kύαμος Græcis, Faba Latinis dicitur. Officina Latinum nomen retinent. Germanis Bonen, (Gallis Vne Febue) appellatur.

FORMA.

Sola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, folio carnosio, Portulacæ simili, flore cristato, versicolore, partim albo partim purpureo, atris quibusdam maculis notato, quas M. Varro lugubres vocat literas: siliqua plerūque semipedali, fructu intus lato humani vnguis effigie, colore nō simplici, sed aut fuluo, aut nigro, iam verò etiā herbaceo & coccineo: radice singulari, lignosa, & capillata fibris. Quæ hic à quibusdam, quasi nostra non esset vera Faba, afferuntur argumenta, non tanti momenti sunt vt confutatione indigeant: constat enim nostram, eas quas veteres illi adscripserunt, habere

notas

PLANTARVM HISTORIAE

notas & facultates. Non tamen negamus in diuersis terris maiorem aut minorem produci posse.

LOCVS.

Passim in hortis sata prouenit. Latatur loco pinguisimo & stercorato.

TEMPVS.

Floret estate.

TEMPERAMENTVM.

Faba in refrigerando & exiccando ad mediam temperaturam propinquisimè accedit. Est itaque frigida & sicca in primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Spirituosa, inflans, concoctu pertinax, insomnia tumultuosa faciens. Tussi tamen confert, carnesque generat. Decocta in posca, & cum cortice comesta, dysenterias & coeliacas fluxiones sistit. Vtilis contra vomitiones in cibo sumpta. Minus inflat priore aqua in decoctione effusa. Viridis magis stomacho nocet, plusq; inflat. Farina eius per se & cum polenta illita, ex plaga inflammationes mitigat, & cicatrices ad reliqui corporis colorem reducit. Mammis in quibus lac in grumos cogitur, & inflammatione laborantibus auxiliatur, lacq; extinguit. Cum melle & fienigraci farina furunculos, parotidas, ac sugillata oculorum discutit. Cum rosa, thure, & oui albo, proci dentes oculos, staphylomata & oedemata cõpescit. Macerata in vino suffusiones & ictus oculorũ sanat. Ad sistendas fluxiones sine cortice cõmandus

catata fronti imponitur: testium inflammationses in vino decocta sanat. Puerorum pubi illita diu impubes seruat. Alphos exterit. Euulsos pilos ut non nutriantur & graciles fiant, cortices illiti efficiunt. Cum polenta, alumine & oleo veteri illiti strumas discutunt. Decoctum illorum lanas tingit. Factas ab hirundinibus sanguinis eruptiones, cortice ablato, Faba qua parte cohaeret diuisa, si dimidia apponatur, compefcit. EX GALENO.

Caro Faba paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum polenta decoctam dysentericis, celiacis & vomentibus exhibuerunt. Porro ut edulium flatulenta est, & coctum difficilis, ut si quid aliud. Excreationibus quidem ex thorace & pulmone idonea. Ut medicamentum vero foris imposita sine molestia exiccat. In podagricis ea saepe numero usi sumus ex aqua decocta, deinceps adipe suillum admiscentes. Ad nervorum tum cōtusiones, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos qui ex ictu iam phlegmone occupabantur, cum polenta. Sed & testium & mammarum bonum est cataplasma. Nam haec partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maxime cum mamma ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiatur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Manifeste

PLANTARVM HISTORIAE

manifestè fabacea farina cutis sordes detergere cōspicitur, quod intelligentes mangones, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac vtuntur. Illinunt præterea & hac faciem quemadmodum ptisana: nam quæ in summa cute eminent lentes exterrit, & maculas velut ex sole cōtractas. EX PLINIO.

Faba hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Solida fricta, feruensque in acri aceto coniecta, torminibus medetur. In cibo fressa, & cum alio cocta, contra deploratas tusses suppurationesque pectorum, quotidiano cibo sumitur: & commanducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosve imponitur, & vino decocta ad testium tumores & genitalium. Lomento quoque ex aceto decocto, tumores maturat atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci etiam prodesse, autor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis, ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum.

DE CONSOLIDAMEDIA.

CAP. cxlvii.

Quam hic dat Consolidam mediā vulneribus glutinandis aptissimam, nouimus à media nobis dicta diuersissimam.

NOMINA.

Inter multas alias herbas quibus vulnera glutinandi facultas inest, & hæc cuius picturam da-

mus connumeratur. Hinc est quod vulgus herba Consolida-
riorum illam Consolidam mediam nominet. Qua media,
etiā appellatione nos uti volumus quod nobis, quo
nomine veteribus græcis aut latinis appellata sit,
nondum constaret. Rectius tamen Solidago diceretur.
Germanis Gulde guntzel nuncupatur.

FORMA.

Caulcm habet quadrangulum, lanuginosum, ex
quo per internalla folia bina ex singulis geniculis
in extremitatibus laciniata, Mentha similia emis-
cant. A medio caulis ad fastigium vsque ex singula
lis foliorum alis, flores sex aut septem in purpureo
cœrulei exeunt. Radix illi subest lignosa, qua mul-
tas à se exiguas radices capillamentorum instar per
terram late serpentes propagat.

LOCVS.

Pasim in pratis nascitur.

TEMPVS.

Floret copiosè Maio mense.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit & amara est, ut calidam &
siccam esse nemo dubitare possit.

VIRE S.

Vulnera glutinat. Sanguinis grumos ex casu, vel
cōtusionibus coactos in corpore dissicit et dissoluit.
Præsens remedium est aphthis & vlceribus in ore
serpentibus. Decoctum eius tumoribus illitum eos
dissipat. Vsus etiam eius ad intertrignes, vlcera
pudens

PLANTARVM HISTORIAE

pudendorum, & intestinorū exulcerationes prodest.

DE CANNABE. CAP. cXLVIII.

NOMINA.

Kάνναβις Græcis, Cannabis Latinis, Barbaris
& vulgò Canapus dicitur, Germanis autem
Hanff (Gallis Du Chanure.)

GENERA.

σχοινός
σποσος.

Cannabis duo sunt genera. Vna enim sativa est,
quam Græci σχοινός σποσος, quòd magni in vita
vsus sit ad robustissimos funes texēdos. Germa. Za-
mer hanff dicitur. Altera sylvestris, quam Latini
Terminalem vocant, Germani Vuilden hanff.

Sativa

FORMA.

Cānabis.

Sylvestris

Sativa Cānabis folia fert fraxino similia, gra-
vis odoris, caules longos, inanesq; semen rotundum.
Sylvestris verò virgas fundit Altheæ similes, nigrio-
res, asperiores & minores, cubitali altitudine. Folia
sativæ similia, asperiora & nigriora. Flores subru-
beos, Lychnidi similes. Semen & radicem Altheæ
similia. Eius effigiem videre nobis nondum licuit.

LOCVS.

Sativa in locis cultis sata prouenit. Sylvestris in
syluis & asperis locis, Apuleiòque teste, iuxta semi-
tas & sepes nascitur.

TEMPVS

Herba ad vsus medicos carpitur dum maximè
viret. Semen autem eius, Plinio auctore, cū matu-
rū est, id quod prope autūni æquinoctiū accidit.

T E M A

TEMPERAMENTVM.

Admodum calefacit & exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Satiā maiori copia sumptum genituram extinguit. Ex viridi autem succus expressus, contra aurium dolores vtiliter instillatur. Sylvestris radix decocta illitaq; inflammationes mitigat. Tumores discutit, & callos disiecit. Huius cortex texendis funibus vtilis est. EX GALENO.

Cannabis semen flatus extinguit, adeoque desiccatur, ut si plusculum edatur genituram exiccet. Sūt qui ex viridi succū exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi videtur, natos vtuntur. Semen etiam Cannabinū difficulter concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauosque humores creat. Admodum excalfacit, ideoq; caput aestuoso ac medicamentoso halitu sursum misso tentat.

EX PLINIO.

Semen Cannabis extinguere genituram virorū dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium, & quodcūque animal intrauerit, eiicit, sed cum dolore capitis. Tantaq; vis ei est, ut aquae infusa, coagulare dicatur, et ideo iumentorū aluo succurrit pota in aqua. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sepius mutatur priusquam arefcat.

EX SIMEONE SETHI.

Semē Cānabis comestum idem nocumentū quod
Corian-

PLANTARVM HISTORIAE

Coriandrū affert: immodicè enim si estur, vt illud, deliriū facit. Folia verò arida pota, veluti farina, aut magis pro potione hac farina exiccata, ebrietas quandam hospitalē facit, & quæ ab hauriente non sentiatur. Apud Arabas enim pinsitur, subigitur ve pro vino, & inebriat. Desiccatur verò semē genitale vt Caphura. APPENDIX.

Quum ex iam dictis constet Cannabinū semen caput facile tentare, atque adeo laddere, imprudenter faciunt, qui vulgi errorem sequentes, in morbis, iisq; maximis, capitis ex hoc semine confecta iussula egrotantibus magno eorum malo exhibent.

DE CARDIACA. CAP. cxlix.

Cardiaca nobis Agria palma, haud scio quâ ratione dicitur, nisi fortè à rudi foliorum fissura tanquā in digitos, à qua sed perfectiore ricinus, vulgò etiam Palma Christi nuncupatur: Amara sorba in hortis sponte sua passim luxurians.

NOMINA.

Quo nomine herba hæc veteribus sit appellata, nondum nobis constat. Nostri tamen temporis herbarii Cardiacam vocant. Germani Hertzgsper, oder Hertzgsper. Cardiacæ verò haud dubiè à recentioribus nominata Cardiaca est, quòd cordis palpitatiōni, quā illi perperam cur dicta. $\chi\alpha\rho\delta\iota\alpha\chi\eta\nu$ appellant, mirificè conferre videatur. Alia est hæc à Ballote, de qua suo loco diximus:

FORMA.

Cardiaca caulem ex se mittit quadrangulū, geniculatū, nigrum: folia laciniata, nigra, per intervalla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores in candido purpureos, orbiculato ambitu caules circumiacentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam. LOCVS.

Paſſim in ruderibus & circa ſepes naſcitur.

TEMPVS.

Iulio menſe floribus abundat.

TEMPERAMENTVM.

Amara admodū exiſtit, vt hoc nomine calidum eſſe in ſecundo ordine, & ſiccā in tertio conſtet.

VIREs.

Recentiores rectè contra cordis palpitatiōē, conuulſionem, & reſolutionem conducere tradunt: poſteſt enim quum amara ſit herba, ſua caliditate & ſiccitate craſſos humores qui in venis & aliis partibus, neruoſis potiſſimum, ſunt, incidere, extenuare, & diſcutere. Hac etiam ratione morbo comitiali, confert, vrinas mouet, & menſtrua educit, aliāſque facultates quas Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. amaris tribuit, obtinet.

DE CARO. CAP. CL.

NOMINA.

Kαρὸς Græcis, Caron vel Carcum latinis, offici-
cinis Carui nominatur. Germani Mateku- Carui.
mich, oder Vuyſenkumel (Gallis Des Carot-

E res)

PLANTARVM HISTORIAE

Carcū vn tes) dicitur. A Caria fortè regione, in qua lauda-
de dictū. tiffinum nascitur, appellationem accepit.

FORMA.

Caules emittit quadrangulos ab vna radice mul-
tos, folia Staphylini, flores candidos, & in caulium
summo semen angulosum ac copiosum, radicem ob-
longam & luteam.

LOCVS.

Passim in pratis Germa. nostra prouenit. Opti-
mū tamen est quod in Caria, vt diximus, nascitur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Cari semen calfacit, & exiccat tertio quodāmo-
do ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Cari calfacit, vrinam cit. Stomacho & ca-
ri gratū accōmodumq;. Concoctiones adiuvant. Anti-
dotis & oxyporis vtiliter miscetur, Aniso propor-
tione respondens. Radix elixa Pastinaca sylvestris
modo edendo est. EX GALENO.

Flatus extinguit & vrinas ciet, non semen tan-
tum, sed & planta.

DE CARYO PONTICO, CAR. cli.

NOMINA.

Auellana. **K**άρυα ποντική, ή λεω Γκαρύφα. Græcis: A-
uellana nuces, & Prænestina Latinis, Ha-
lousz Germa. (Gallis Noysette, ou Aueline)

nomina.

nominatur. Pontica autem vocantur, quod in Asia Pontica
Græciámque è Ponto venerunt. Parua, quod In- quare vos=
glandibus minores sint. GENERA. cata.

Duo eius sunt fastigia. Vna enim est sylvestris,
quam priuatim Germani nostri Haselnusz nomi-
nant. Altera verò urbana seu domestica, quam iis-
dem Rotnusz, oder Rurnusz appellant.

FORMA.

Corylus arbor in qua Auellana nux prouenit, cau-
dice est multis infernè stolonibus fruticante, super-
nè ramis brachiato, virgis breuibus, sine alarum si-
nu enodibus, crassisq; nonnullis, foliis ab vna parte
nigris, altera verò subalbis, per ambitum serratis,
materia admodum lenta, cortice summo tenui, pin-
gui, maculis albis vario, medulla tenui & flaua.
Non floret, sed floris vice quidã in eo peculiare cõ-
pactili callo racematim coherentes, & veluti præ-
longi vermes singulari pediculo pēsiles iuli erupūt,
qui incūte vere dehiscunt ac defluunt cū folia pro-
siliūt, ac tum calyculacea tegumenta totidem sum-
matim fimbriata, quot iuli supra pediculū exeunt,
eorumq; singulis nuces singulae insunt. Domestica
nō differt à sylvestri, nisi quod eius foliū maius, & ca.
caudex procerior, melior fructus, rubra membrana
inclusus.

LOCVS.

Gaudet argillofis & viginosis locis: nascitur ita-
que in plano. Nemora etiam & mōtes Corylis vea-
stuntur.

Ej

TEM

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanae nuces.

TEMPERAMENTVM.

Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti austerior quàm Iuglans apparet, plus itaque habet essentiae terrestris & frigida. Simeon Sethi calidas & humidas esse Auellanas asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduersantur Auellanae. Trita in aqua mulsa, & pota veterem tussim sanant. Tosta vero & cum exiguo pipere comesta destillationem maturant. Tota cremata, trita cum axungia aut seuo ursino & inuncta, alopecias explent. Ferunt alicui vsta earum putamina, & in puluerem redacta cum oleo castorum oculorum pupillas infantibus denigrare, per fuso syncipite.

EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quàm Iuglandes: nam densior strictiorq; his est substantia, ac minus oleosa. Cetera magna nuci similia sunt.

EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nuncupatur, quod in Euxino poto frequens sit, praeter quod frigidior. austerior, terrestriorq; est, in reliquis Iuglandi assimilatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

EX SIMEONE SETHI.

Magis nutrit quàm Iuglandes nuces, difficiliorq; concoquuntur. Inflationes faciunt, & ut quidam

dam aiunt, ieiunum intestinum ledunt. Facilius autem concoquuntur, minusq; ventrem sistunt, si interior earum cortex abiiciatur. Dicitur quod si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neque morsus, neque venena officere illo die posse, et scorpiones ab ipso fugere. Sumptæ cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore exiccatam omnino confert.

DE CENTVM MORBIA. CAP. clii

An hæc Centummorbia sit vulgò dictum & putatum gramen Parnasi explora.

NOMINA.

HVicherba, vt aliis multis, nomen aliud imponere nō licuit, quā, quo vulgò hodie appellari solet, Centummorbia. Sic autem haud dubiè à chirurgis, qui illa quotidie vtuntur, à mirifica sua quam in plurimis vlceribus medendis obtinet facultate, dicta est. Sunt qui à foliorum similitudine, quæ nummi speciem referunt, Nummulariam vocant. A nonnullis Hirundinaria, quòd passim terræ hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec desunt qui Serpentariam appellent, quòd comperitum sit serpentes hac herba si vulnerentur sibi mederi. Germanicè Egelkraut, oder Klein Naterzung, oder Pfennigkraut nominatur.

FORMA.

Serpit per terram, exiguisq; radiculis è coliculis

E iij latiss

PLANTARVM HISTORIAE

latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroque
caulis latere rotunda, pinguiusque: flores luteos.

LOCVS.

Prouenit in locis humidis, potissimum verò circa
fluenta.

TEMPVS.

Maior mense apparet, Iulio autem floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu admodum adstringit, ut hinc constet secun-
di aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.

VIREs.

Huius flores & folia trita adeò desiccant adstrin-
guntq; ut quauis vlcera glutinare valeant. Ideoq; po-
ta cum vino dysenterias, ventris imbecillitates flu-
xusque ac humiditates sanant. Cataplasmatibus ri-
tu illita vlcerum putredinosa iuuant. Prosumt etiã
ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, &
ad omnia interanea vulnera & vlcera potissimũ
pulmonis. Externis etiam vlceribus summè cõfert,
si vino in quo herba hæc decocta est, lauentur at-
que abstergantur.

DE COCCIMELEA. CAP. CLIII.

NOMINA.

ΟΧΥΜΗΛΙς Græcis, Prunus Latinis & of-
ficinis, Germanis eius arboris fructus Pflau-
men, oder Prumen, (Gallis Vn pru-
nier) dicuntur.

GENERA.

Sativa
Pruna. Duo sanè prunorum habentur genera. Vnum sa-
tivarum, in quo genere sunt nigra, cãdicantia, ver-
sicoloria,

ficoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pal-
lescētia, purpurea, Damascena, & si qua sunt alia.
Alterum sylvestrium, quæ Galeno lib ij. de alimen-
torum facultatibus ἀγριοκοκκιμήλα, & in Asia
Πρόμυρα. Pruneola siue Prunula vulgò nominan-
tur, Germanicè Schlehen. Cave eorum amplexa-
ris sententiam, qui Poteriam esse putant: neque eo-
nim facultates, neque notæ Prunulis respondent.

Pruneola.

FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite vagā-
tibus paucis, caudice subrecto, scabro, multis bra-
chiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per
ras minutim serrato, flore candido, foliato, pomo,
carne, cuteq; vestito, osse intus duro in quo nucleus
includitur.

LOCVS.

Sativa Prunus in hortis nascitur. Damascena in
Damasco Syriæ, à quo cognominata sunt. Sylvestris
autem passim in sepibus reperitur.

TEMPVS.

Sativa in æstate poma sua profert, sylvestris au-
tem autumnò.

TEMPERAMENTVM,

Sativæ pruni fructus mediocriter humectāt &
refrigerant. Sylvestris adstringunt, vt fusius ex co-
rundem facultatibus innotescet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen adversatur.

PLANTARVM HISTORIAE

Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & praesertim in Damasco genita, exiccata stomacho utilia sunt, & aluum cohibent. Folia in vino decocta & garagarissata columellum, gingivas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Praestant idem & sylvestrium prunorum fructus cum maturuerunt siccati. Cum sapa decocti stomacho utiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorum glutinat. Potum in vino calculos conterit. Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.

EX GALENO.

Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus verò minus. Ceterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen iis quae importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt: at quae Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsae arbores fructibus proportionem respondent: minus enim astringunt quae in Iberia nascuntur, magis verò quae Damasci. Porro ut in summa dicam, quarum in foliis aut germinebus adstrictio quaedam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Sylvestrium fructus euidenter adstrictioris est, venterque sistit. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto verò puerorum sanare impetigines. Ac si id praestat, clarum est incidendi tenuia.

aliq; illi facultatem inesse. Raro fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturitatem fuerit assecutus. Priusquam enim eo perueniat, nullus est ferme qui non acorem, aut acerbitatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter vëtre statuemus, utilis erit: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porro aquæ ac sicubus concessum est, ut vel exiccata vtilia permaneant. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima iis quæ in Iberia & Hispania pueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cū mediocri adstrictione magna laxaq; sunt, at parua, dura, acerbq; & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè vëtre molliunt, etiã si sola comedantur, & multò magis si melicratum ipsum subforbeatur.

EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, vna prosunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt. Syluestrium quidem Prunorum bacce, vel è radice cortex, in vino austero si decoquatur, ita ut triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in iis & satius Prunis est limus arborum.

PLANTARVM HISTORIAE

borum, quem Graeci Lichena appellant, rhagadiis
& condylomatis mirè utilis.

DE CONIO. CAP. CLIII.

Cicuta nobis est maior, cuius caule cauo
quoddam bibant rustici, bibeul dicitur: Gall.
Cigue. Alia est minor, odore non ingrato,
tenera mulcum. Cætera priori similis quæ
arborescit terra pingui.

NOMINA.

KΩVEOV Græcè, Cicuta Latinis & officinis,
Germanis Vutzerling, Vundtscherling
Schirling, oder Vüterich, (Gallicè Cigue)
quasi tyrannus dicitur, quod scilicet hominem interficiat:
si intra corpus sumatur. Hinc est quod Athenienses
eius succo in interimedio sapientissimo philosopho
Socrate, quæ falsa Anytus & Melitus quasi
parum rectè de Diis sentiret, accusarunt, vsi sunt.

FORMA.

Caulem profert geniculatū Fœniculi modo, magnum.
Folia ferula, vel, ut Plinius ait, Coriandro
similia, angustiora tamen & graucolentia. In
cuminibus adnascens ramulos & umbellâ. Flo-
rem subalbum, semen Aniso simile, albidius tamen.
Radicem concavam nec profundam.

LOCVS.

Passim in pratis, locis incultis, & umbrosis nascitur.

TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

amertod

TE Ma

TEMPERAMENTVM.

Summam habet refrigerandi vim Cicuta, atque adeo venenum est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Inter letalia cōnumeratur Cicuta, sua frigiditate enecans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus cōtusis, priusquam semen & coma areseat, expressusq; in sole desatur. Multus aridi ad medendi rationem vsus est. Miscetur vtiliter collyriis, quæ leuādi doloris gratia adhibetur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languidaq; reddit. Lac extinguit, mammias in virginitate increfcere prohibet. Puerorum testiculos tabescere facit.

EX PLINIO.

Cicuta venenum est, publica Atheniensium poena inuisa, ad multa tamen vsus nō omittēdi. Semini & foliis refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipiūt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquā perueniat ad vitalia, vini natura ex-calfactoria. Sed in vino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis floribusq; tūc enim maximè tēpestius est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat sanguinē spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum macule in corporibus apparent. Ad dissoluenda
medica=

re, à miliaria summa deriuatum.

FORMA.

Frumenti genus stipula cubito altiore, geniculata, folio arundinaceo, semine in iuba tereti & pendulo, folliculo concluso, radice numerosa, capillata, ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in aruis prouenit. In frigido & aquoso solo prius serendum, postea in calido precipiunt. Gaudet solo limoso vliginosoq.

TEMPVS.

Augusto mense demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Milium primo ordine refrigerat, exiccat autem tertio exoluto, aut certè secundo intenso. Paululum etiam tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Minus ceteris frugibus alit. In panes autem coactum, aut tanquam puls confectum alium sistit, urinam autem mouet. Tostum verò saccis inditum & fomenti loco appositum, torminibus & aliis doloribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium vt ferculū comestū inter omnia frumēta tacea edulia minimum nutrimenti confert. Sed & ventrem desiccāt. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentū iis quæ citra morsum exicari postulant. Cataplasmatibus etiam modo illitum,
exiccare.

PLANTARVM HISTORIAE

Panis ex
milio.

exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus vsus. Panis ex milio exigui est alimenti & refrigerantis. Constat insuper præaridum & instar arenulae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus glutinoso pingui: iure itaque aluum humentem desiccatur. Milium tamen ad omnia panico præstantius, nam & suauius editur, facilius concoquitur, ventremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam esitant, veluti triticeam agricolae: clarumque est id edulj tanto quam illa quae per se sola sumuntur melius esse, quanto lac milij natura ad boni succi procreationem, aliisque omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem ac voluptatem.

EX PLINIO.

Milio sistitur aluus, discutiuntur tormina, in quibus vsus torretur antè. Nervorum doloribus & aliis feruens in sacco ponitur, neque aliud utilius, quoniam leuissimum molliissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida serpentium & multipeda plagis imponitur.

EX SIMEONE SETHI.

Difficulter concoquitur, ventrem sistit parumque nutrit. Inuat eos qui refrigeratione & exiccatione ventriculi

ventriculi indigent. Sumpsum cum lacte, vel amygdala thasia facilius concoquitur, & humidius fit.

DE CRAMBE SATIVA.

CAP. CLVIII.

Brassica nobis à caule insigni & arboreo caulis dicitur. Ea nobis multiplex magis est quàm quæ hîc scribitur & pingitur.

NOMINA.

KΡΑΜΒΗ ἢ ἡμύρος græcè, Brassica sativa latine, officinæ & vulgò Caulis, Germanicè Kol (Gallicè Des Chauls) appellatur. Crâbe græcis dicta cêsetur quasi κροάμβλη, quod pupillas oculorum, quas Græci κροάς vocât, obtundat, hebetetq;. In qua certè sententia fuisse Columellam hoc eius de cultu hortorum carmen testatur:

Nûc veniat quâuis oculis inimica Corâble. Attici integro nomine κροάμβλω protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi κροῶ ἀμβλῖν, vel rectius αὐτῶν, id est, crapula satietatiq; contraveniat. Nā vino aduersatur, ut inimica vitibus. Antecedēs in cibis ebrietatem arcet, & postea sumpta crapulam discutit.

GENERA.

Et si plurima sint Brassicæ genera, ut ex veteribus rei rustica scriptoribus liquet, quatuor tamen dūtaxat, quæ hodie vsitate sunt, producemus: quarum vna Græcis λεῖα, hoc est, leuîs nominatur, Brassica grandibus & latis foliis, caule magno: Germanis leuis.

PLANTARVM HISTORIAE

- Apiana.** breiter oder grosser kol vocatur. Altera crispas; que à similitudine apij $\sigma\epsilon\lambda\iota\nu\omicron\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$, id est, Apianæ nuncupatur. Vulgò crispus caulis, Germanicè krauser kol. Tertia propriè vocatur Cräbe, minoribus caulibus, & tenuioribus foliis, flore luteo, Germanicè kleiner kol, ut ab aliis discernatur, nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione kol. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vulgus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quoniam in capitis formam extuberant. Folia enim horum in orbem glomerantur, exterius callosa & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora cōplectentibus. Huc alludentes Germani Cappsizkraut vocāt. Nōnulli à candore foliorum Brassicam albam, & caules albos, appellare maluerunt. Hoc genere Brassica in plerisque Germaniæ partibus, Boioaria potissimum, per integrum anni curriculum quotidie victitant, quod illic eius prouentus sit vberimus.

FORMA.

FORMA.

Caulis est Brassica leuiter rubete, crasso folio prægrandi, carnosio, ex cæsis candicante, in latus utrinque diffuso prominulis venarum toris fruticæte, cyma patula, floret tum luteo, tum albo, semine in siliquis.

LOCVS. In hortis hodie passim proueniunt Brassicae.

In hortis hodie passim proueniunt Brassicae. Frigidis verò & pluuiis regionibus positio earumdem optima.

TEM

TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semina etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brassica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca verò & calida primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Brassica satina aluo est idonea, si leuiter feruesceta edatur. Percoccta verò aluum sistit, & multo magis bis coccta, & in lixiuio decocta. Aestiuu stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Obscuritate visus laborantibus & tremulis comesta auxiliatur. A cibo sumpta ex crapula & vino noxas restituit. Cyma eius stomacho utilior, sed acrior, & ad ciendam vrinam validior. Cōdita sale stomacho inimica est, aluumque conturbat. Crudus eius succus cum iride & nitro deuoratus aluum mollit. Cum vino potus viperarum morsibus succurrit. Cum Foenigraci farina, podagricis & articularum doloribus correptis, ulceribusque sordidis & vetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menses ducit cum loliacea farina indutus. Folia per se aut cum polenta trita, oībus inflammationibus & adematibus cōferūt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medetur. Cū sale carbūculos rūpūt. Capillorū in capite defluxū retinent. Coccta autē & melli mixta gāgranarū pascentibus malis opitulantur. Cruda ex aceto comesta

PLANTARVM HISTORIAE

lienosis prosunt. Mansa verò deuorato succo vocem amissam restituumt. Decoctum eius potum, aluum & menses mouet. Flos post conceptionem in pectore subditus sterilitatem facit. Semen eius praesertim quæ in Aegypto nascitur, potum lumbricos pellit. In antidota celiacorum additur. Faciem lentiginēsque expurgat. Cauliculi virides cū radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diurnos laterum dolores impositi mitigant.

EX GALENO.

Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodū acrē. Alioqui & ulcera glutinat, & maligna ulcera sanat. Præterea phlegmonas iam induratas, ac egrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadē facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiā in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime Brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amara qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamēta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quæcūque alia modicam abstersionem postulāt, adiunat. Caules Brassicæ combusti, cineres efficiunt admodū desiccantes, ut videlicet iam & adurentē vim participēt. Hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis,

neris, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brassica quoque succus purgandi quandam vim obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quàm incitare deiectionem potest. Proinde quum expellere alui excrementa propositum erit, aheni in quo elixa una cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, vasculoque in quo paratur, oleum cum garo iniicere oportebit. At humentem aluum siccare volentes, quum mediocriter bullisse videbitur, priore aqua effusa repente aliam calentem iniicimus, ac ita rursus in ea discoquimus usque dum tenera flaccidaque euaserit.

EX PLINIO.

Cato crispam maximè probat, dein leuam grandibus folijs, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caligini, scintillationibusq; vel stomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula, sumptam acetabulis duobus matutino. Tantamq; esse vim, ut qui terant hæc validiores fieri se sentiant. Ergo vel cum vino tritam, sorbendam, vel ex olei intinctu sumendam. Podagræ autem, morbisq; articulariis illini cum ruta, coriandri & salis mica, hordei farina. Aqua quoque eius decocta, nervos articulosq; mirè iuuari. Si foueantur vulnera & recentia & vetera, etiã carcinomata, quæ nullis alijs medicamentis sanari possunt. Foveri prius aqua calida iubet, & bis die tri-

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanae nuces.

TEMPERAMENTVM.

Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti
austerior quàm Inglands apparet, plus itaque ha-
bet essentiae terrestri & frigida. Simeon Sethi cas-
lidas & humidus esse Auellanas asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduersantur Auellanae. Trita in aqua
mulsa, & pota veterem tussim sanant. Tosta ve-
rò & cum exiguo pipere comesta destillationem
maturant. Totae crematae, tritae cum axungia aut
seuo visino & inunctae, alopecias explent. Ferunt a-
liqui vsta carum putamina, & in puluerem reda-
cta cum oleo castorum oculorum pupillas infantis
tibus denigrare, per fuso syncipite.

EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quàm Inglandes: nã
densior strictiorq; his est substantia, ac minus oleo-
sa. Cetera magna nuci similia sunt.

EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nũcupatur, quòd
in Euxino pòto frequens sit, prater quod frigidior.
austerior, terrestriorq; est, in reliquis Inglandi assi-
milatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

EX SIMEONE SETHI.

Magis nutrit quàm Inglandes nuces, difficilis
limq; còcoquuntur. Inflationes faciunt, & vt qui-
dam

dam aiunt, ieiunum intestinum ledunt. Facilius autem cohocquantur, minusq; ventrem sistunt, si interior earum cortex abiiciatur. Dicitur quod si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neque morsus, neque venena officere illo die posse, et scorpiones ab ipso fugere. Sumptæ cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore exiccatam omnino confert.

DE CENTVM MORBIA. CAP. clii

An hæc Centummorbia sit vulgò dictum & putatum gramen Parnasi explora.

NOMINA.

HVicherba, vt aliis multis, nomen aliud imponere nō licuit, quā, quo vulgò hodie ap- Centum-
pellari solet, Centummorbia. Sic autem haud du- morbia
biè à chirurgis, qui illa quotidie vtuntur, à miris- vnde di-
ca sua quam in plurimis vlceribus medendis obti- cta.
net facultate, dicta est. Sunt qui à foliorum simili-
tudine, quæ nummi speciem referunt, Nummular- Nummu-
riam vocant. A nonnullis Hirundinaria, quòd pas- laria.
sim terra hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec
desunt qui Serpentariam appellent, quòd comper-
tum sit serpentes hac herba si vulnerentur sibi me-
deri. Germanicè Egelkraut, oder Klein Nater-
zung, oder Pfennigkraut nominatur.

FORMA.

Serpit per terram, exiguisq; radiculis è coliculis

E iij latis

PLANTARVM HISTORIAE

latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroque
caulis latere rotunda, pinguique: flores luteos.

LOCVS.

Prouenit in locis humidis, potissimum verò cir-
ca fluenta.

TEMPVS.

Maior mense apparet, Iulio autem floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu admodum adstringit, ut hinc constet secun-
di aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.

VIRES.

Huius flores & folia trita adeò desiccant adstrin-
guntque, ut quævis vlcera glutinare valeant. Ideoque po-
ta cum vino dysenterias, ventris imbecillitates flu-
xusque ac humiditates sanant. Cataplasmatibus ris-
tu illita vlcerum putredinosa iuuant. Prosumt etiã
ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, &
ad omnia interanea vulnera & vlcera potissimũ
pulmonis. Externis etiam vlceribus summè cõfert,
si vino in quo herba hæc decocta est, lauentur at-
que abstergantur.

DE COCCIMELEA. CAP. CLIII.

NOMINA.

ΟΚΚΙΜΗΛΙΑ Græcis, Prunus Latinis & of-
ficinis, Germanis eius arboris fructus Pflau-
men, oder Prumen, (Gallis Vn pru-
nier) dicuntur.

GENERA.

Sativa
Pruna.

Duo sanè prunorum habentur genera. Vnum sa-
tivarum, in quo genere sunt nigra, cãdicantia, ver-
sicoloria,

ficoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pal-
lescētia, purpurea, Damascena, & si qua sunt alia.
Alterum sylvestrium, quæ Galeno lib ij. de aliment-
torum facultatibus ἀγριοκοκκιμήλα, & in Asia
Πρῶμνα. Pruneola siue Prunula vulgò nominan- Pruneola.
tur, Germanicè Schlehen. Caue eorum amplexa-
ris sententiam, qui Poterion esse putant: neque eo-
nim facultates, neque notæ Prunulis respondent.

FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite vagā-
tibus paucis, candice subrecto, scabro, multis bra-
chiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per o-
ras minutim serrato, flore candido, foliato, pomo,
carne, cuteq; vestito, osse intus duro in quo nucleus
includitur.

LOCVS.

Sativa Prunus in hortis nascitur. Damascena in
Damasco Syriæ, à quo cognominata sunt. Sylvestris
autem passim in sepibus reperitur.

TEMPVS.

Sativa in estate poma sua profert, sylvestris au-
tem autumnò.

TEMPERAMENTVM.

Sativæ pruni fructus mediocriter humectāt &
refrigerant. Sylvestris adstringunt, ut fusius ex co-
rundem facultatibus innotescet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen adversatur.

PLANTARVM HISTORIAE

Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & praesertim in Damasco genita, exiccata stomacho utilia sunt, & aluum cohibent. Folia in vino decocta & gargarissata columellam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Praestant idem & Syluestrium Prunorum fructus cum maturuerunt siccati. Cum sapa decocti stomacho utiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorum glutinat. Potum in vino calculos conterit. Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.

EX GALENO.

Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus, aridus vero minus. Caterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen iis quae importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt: at quae Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsa arbores fructibus proportionem respondent: minus enim astringunt quae in Iberia nascuntur, magis vero quae Damasci. Porro ut in summa dicam, quarum in foliis aut germi- nibus adstrictio quaedam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Syluestrium fructus euidenter adstrictorius est, ventremque sistit. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto vero puerorum sanare impetigines. Ac si id praestat, clarum est incidendi tenuia

diq;

aliq; illi facultatem inesse. Rarò fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturitatem fuerit assecutus. Priusquam enim eo perueniat, nullus est ferme qui non acorem, aut acerbitatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verùm quum humectare & refrigerare mediocriter vèrem statuemus, utilis erit: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunus porò aquè ac sicubus concessum est, ut vel exiccata utilia permaneant. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima iis quæ in Iberia & Hispania pueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cū mediocri adstrictione magna laxaq; sunt, at parua, dura, acerbaq; & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè vèrem molliūt, etiā si sola comedātur, & multò magis si melicratum ipsum suborbeat.

EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, vna profunt in vino decocta, & subinde ore collato. Ipsa Pruna aluum molliunt. Syluestrium quidem Prunorum bacca, vel è radice cortex, in vino austero si decoquatur, ita ut triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in iis & satiuus Prunis est limbus arborum.

PLANTARVM HISTORIAE

borum, quem Græci Lichena appellant, rhagadiis
& condylomatis mirè utilis.

DE CONIO. CAP. CLIII.

Cicuta nobis est maior, cuius caule cauo
quoddam bibant rustici, bibeul dicitur: Gall.
Cigue. Alia est minor, odore non ingrato,
tenera multum. Cætera priori similis quæ
arborescit terra pingui.

NOMINA.

KΩVΕΙΟΥ Græcè, Cicuta. Latinis & officinis,
Germanis Vutzerling, Vundtscherling
Schirling, oder Vuterich, (Gallicè Cigue)
quasi tyrannus dicitur, quod scilicet hominem interficiat:
si intra corpus sumatur. Hinc est quod Athenienses
eius succo in interimendo sapientissimo philosopho
Socrate, quæ falsè Anytus & Melytus quasi
parum rectè de Diis sentiret, accusarunt, vsi sunt.

FORMA.

Caulis profert geniculatū Fœniculi modo, magnum.
Folia ferula, vel, ut Plinius ait, Coriandro
similia, angustiora tamen & graucolentia. In
cuminibus adnascens ramulos & umbellâ. Flo-
rem subalbum, semen Aniso simile, albidius tamen.
Radicem concavam nec profundam.

LOCVS.

Passim in pratis, locis incultis, & umbrosis nascitur.

TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

TEMA

TEMPERAMENTVM.

Summam habet refrigerandi vim Cicuta, atque adeò venenum est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Inter letalia cōnumeratur Cicuta, sua frigiditas te enecans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus cōtufis, priusquam semen & coma areseat, expressusq; in sole dēfatur. Multus aridi ad medendi rationem vsus est. Miscetur vtiliter collyriis, quæ leuādi doloris gratia adhibētur. Herpetas & crysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languidaq; reddit. Lac extinguit, mammæ in virginitate increfcere prohibet. Puerorum testiculos tabescere facit.

EX PLINIO.

Cicuta venenum est, publica Atheniensium poena iniussa, ad multa tamen vsus nō omittēdi. Semini & foliis refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipiūt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquā perueniat ad vitalia, vini natura excafactoria. Sed in vino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis floribusq;: tūc enim maximè tēpestivus est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat sanguinē spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum macule in corporibus apparent. Ad dissoluenda
medica=

PLANTARVM HISTORIAE

medicamenta vtuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum malagma. Precipuum tamen est ad cohibendas epiphoras aestivas, oculorumq; dolores sedandos circumlitus. Miscetur collyriis, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant. Anaxilaus autor est, mammam à virginitate illitam, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mām is imposita extinguit, veneremque testibus circa pubertatem illita.

DE CYNOGLOSSO OFFICINARVM. CAP. CLV.

NOMINA.

Lingua
canina.

KΥΝΟΓΛΩΣΣΟΝ Gracè, Latine lingua canina: officinae Gracam appellationem retinuerunt, Germanicè Hundszung (Gallicè Langue de Chien) appellatur. Animaduertendum tamen nos non temerè adiecisse officinarum: neque enim Dios

Dioscoridis scoridis damus Caninam linguam, quae vidua caule est, & viribus etiam ab hac nostra diuersa.

FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longior, hispidum, surculosum: folia angusta, praelonga & lanuginosa, non venosa, molliq;: florem primum purpureum, dein caeruleum, stamina habentem purpurea: radicem oblongam, & profundè terram penetrantem.

LOCVS.

Pass. m

Paſſim circa itinera provenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio menſibus floret.

TEMPERAMENTVM.

*Recentiores herbarij frigidam & ſiccam eſſe ſta-
tuunt in ordine ſecundo.*

VIRE S.

*Oris & aliis maleficis vlceribus medetur. Dyſ-
enteria etiam prodeſt. Debet itaque illius herba
vſus eſſe in omnibus vlceribus, vulneribus, ſcabiæ
Hiſpanica, & ſimilibus morbis. Auxiliatur etiam
gonorrhœæ & deſtillationibus: atque hinc eſt quòd
catapotiorum compoſitioni, quorum nomenclatura
eſt ad omnes morbos catarrhi, aut de Cynogloſſo, Catapo-
admiſceatur.*

DE CNICO. CAP. CLVI.

*Catapo-
tia de Cynogloſſo.*

NOMINA.

K *Νίκος Græcè, Cnicus & Cnecus Latine no-
minatur. Officinæ Cartamum & Crocū hor Cartam-
tenſem appellant. Germani Vuilden gartenſaff= Crocus
ran (Gallicè Safran ſauuage) ad differentiam hortenſis.
Atractylidis, de qua ſuprà dictum eſt.*

FORMA.

*Folia habet oblonga, inciſuris diuiſa, aſpera, acu-
leata. Caules cubitales, in quibus capita oliuæ ma-
gnitudine. Florem ſimilem Croco, ſemen candidum
& ruſum, oblongum, anguloſum.*

LOCVS.

Nāſcitur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascitur in hortis & agris satius.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac (ubinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalefacientium eius semen, si quis foris eo uti volet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius flore vtuntur in opsoniis. Semen tunditur & ex eo exprimitur succus, qui cū hydromelite aut gallinaceo iure datus aluum purgat. Stomacho tamen aduersatur. Fiunt etiam placentæ quæ aluum emolliunt, si succus eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto misceatur. Oportet autem ante cenam in partes quatuor diuisas Iuglandis nucis quātitate duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostiarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendum aluum efficacius efficit.

EX GALENO.

Cnici semine duntaxat ad purgationes vtimur.

DE CENCHRO. CAP. CLVII.

NOMINA.

ΕΨΧΕΟΣ Græcis, Milium Latinis & officinis, Germanis Hirsz (Gallicè du Mil, ou du Millet) appellatur. Nomen, Festo autore, à

Miliū vn- K
de dictū.

re, à

re, à miliaria summa derivatum.

FORMA.

Frumenti genus stipula cubito altiore, genicula-
ta, folio arundinaceo, semine in iuba tereti & pen-
dulo, folliculo concluso, radice numerosa, capillata,
ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in arvis prouenit. In frigido & aquoso so-
lo prius ferendum, postea in calido precipiunt. Gau-
det solo limoso vliginosoq.

TEMPVS.

Augusto mense demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Milium primo ordine refrigerat, exiccat autem
tertio exoluto, aut certè secundo intenso. Paululum
etiam tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Minus ceteris frugibus alit. In panes autem co-
actum, aut tanquam puls confectum aluum sistit,
vrinam autem mouet. Tostum verò saccis inditum
& fomenti loco appositum, torminibus & aliis do-
loribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium vt ferculū comestū inter omnia frumē-
tacea edulia minimum nutrimenti confert. Sed &
ventrem desiccāt. Porrò foris impositum in saccu-
lis idoneum est fomentū iis quæ citra morsum exica-
cari postulant. Cataplasmatibus etiam modo illitum
exiccare.

PLANTARVM HISTORIAE

Panis ex
milio.

exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus vsus. Panis ex milio exigui est alimenti & refrigerantis. Constat insuper præaridum & instar arenulae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus glutinoso pingui: iure itaque aluum humentem desiccatur. Milium tamen ad omnia panico præstantius, nam & suauius editur, facilius concoquitur, ventremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam esitant, veluti triticeam agricola: clarumque est id edulj tanto quam illa quæ per se sola sumuntur melius esse, quanto lac milij natura ad boni succi procreationem, aliâque omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, ventris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem ac voluptatem.

EX PLINIO.

Milio sistitur aluus, discutiantur tormina, in quæ vsus torretur antè. Nervorum doloribus & aliis feruens in sacco ponitur, neque aliud utilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida serpentium & multipeda plagis imponitur.

EX SIMEONE SETHI.

Difficulter concoquitur, ventrem sistit parumque nutrit. Inuat eos qui refrigeratione & exiccatione ventriculi

ventriculi indigent. Sumpsum cum lacte, vel amygdala thasia facilius cōcoquitur, & humidius sit.

DE CRAMBE SATIVA.

CAP. CLVIII.

Brassica nobis à caule insigni & arboreo caulis dicitur. Ea nobis multiplex magis est quàm quæ hîc scribitur & pingitur.

NOMINA.

Kράμβη ἡ ἡμδρος græcè, Brassica sativa latine, officinâ & vulgò Caulis, Germanicè Kol (Gallicè Des Chauls) appellatur. Cræbe græcis dicta cēsetur quasi κροάμβλη, quòd pupillas oculorum, quas Græci χροαs vocât, obtundat, hebetetq; In qua certè sententia fuisse Columellam hoc eius de cultu hortorum carmen testatur:

Nûc veniat quâuis oculis inimica Corâble. Attici integro nomine κροάμβλω protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi κροῶ ἄμβλῃ, vel rectius αὐτέβῃ, id est, crapulæ satietatiq; contraneiat. Nā vino aduersatur, ut inimica vitibus. Antecedēs in cibis ebrietatem arcet, & postea sumpta crapulam discutit.

GENERA.

Etsi plurima sint Brassicæ genera, ut ex veteribus rei rusticæ scriptoribus liquet, quatuor tamen dūtata, quæ hodie vsitata sunt, producemur: quarum una Græcis λεῖα, hoc est, lævis nominatur, Brassicæ grandibus & latis foliis, caule magno Germanis lævis.

F

breiter.

PLANTARVM HISTORIAE

- Apiana.** breiter oder grosser kol vocatur. Altera crispa; que à similitudine apij *σελινοειδής*, id est, Apiana nuncupatur. Vulgò crispus caulis, Germanicè krauser kol. Tertia propriè vocatur Cräbe, minutioribus caulibus, & tenuioribus foliis, flore luteo, Germanicè kleiner kol, vt ab aliis discernatur, nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione kol. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vulgus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quoniam in capitis formā extuberant. Folia enim horum in orbem glomerantur, exterius callosa & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora cōplectentibus. Huc alludentes Germani Cappiszkraut vocāt. Nōnulli à candore foliorū Brassicam albam, & caules albos, appellare maluerunt. Hoc genere Brassica in plerisque Germaniæ partibus, Boioaria potissimum, per integrum anni curriculum quotidie victitant, quòd illic eius prouentus sit vberimus.

FORMA.

Caule est Brassica leuiter rubēte, crasso folio prægrandi, carnosio, ex caesio candicante, in latus vtrumque diffuso prominulis venarū toris fruticāte, cyma patula, flore tum luteo, tum albo, semine in siliquis.

L. O. C. V. S.

In hortis hodie passim proferunt Brassicae. Frigidis verò & pluujs regionibus positio earumdem optima.

T E M

TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen etiam proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Brassica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca verò & calida primo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Brassica satina aluo est idonea, si leuiter feruesca et aedatur. Percocta verò aluum sistit, & multo magis bis cocta, & in lixiuio decocta. Aestua stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter amaritudinem non estur. Obscuritate visus laborantibus & tremulis comesta auxiliatur. A cibo sumpta ex crapula & vino noxas restiguit. Cyma eius stomacho vtilior, sed acrior, & ad ciendam vrinam validior. Cōdita sale stomacho inimica est, aluumque conturbat. Crudus eius succus cum iride & nitro deuoratus aluum mollit. Cum vino potus viperarum morsibus succurrit. Cum Foenigræci farina, podagricis & articularum doloribus correptis, viceribusq; sordidis & vetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menses ducit cum liacea farina inditus. Folia per se aut cum polenta trita, oībus inflammationibus & ædematis cōferūt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medetur. Cū sale carbūculos rūpūt. Capillorū in capite defluxū retinent. Cocta autē & melli mixta gāgranarū pascētibus malis opitulantur. Cruda ex aceto comesta

F ij licnōsis

PLANTARVM HISTORIAE

lienosis profunt. Mansa verò deuorato succo vocem amissam restitunt. Decoctum eius potum, aluum & menses mouet. Flos post conceptionem in pello subditus sterilitatem facit. Semen eius praesertim quæ in Aegypto nascitur, potum lumbricos pellit. In antidota celiacorum additur. Faciem lentiginēsque expurgat. Cauliculi virides cū radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diurnos laterum dolores impositi mitigant.

EX GALENO.

Brassica esculentæ desiccandi vim habet tum esæ, tum foris imposita, non tamen etiam admodū acrē. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat. Præterea phlegmonas iam induratas, ac egrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadē facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiā in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè Brassicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamēta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quæcūque alia modicam abstersionem postulāt, adiuuat. Caules Brassicæ combusti, cineres efficiunt admodū desiccantes, vt videlicet iam & adurentē vim participēt. Hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis,

neris, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brassica quoque succus purgandi quandam vim obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quam incitare deiectionem potest. Proinde quum expellere alui excrementa propositum erit, aheni in quo elixa una cum aqua fuit, propius admoto, ipsam eximere confestim, vasculoque in quo paratur, oleum cum garo iniicere oportebit. At humentem aluum siccare volentes, quum medicriter bullisse videbitur, priore aqua effusa repente aliam calentem iniicimus, ac ita rursus in ea discoquimus vsque dum tenera flaccidaque euaserit.

EX PLINIO.

Cato crispam maximè probat, dein leuem grandibus foliis, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caligini, scintillationibusq; vel stomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laseris radícula, sumptam acetabulis duobus matutino. Tantamq; esse vim, ut qui terant hæc validiores fieri se sentiant. Ergo vel cum vino tritam, sorbendam, vel ex olei intinctu sumenda. Podagræ autem, morbisq; articulariis illini cum ruta, coriandri & salis mica, hordei farina. Aqua quoque eius decocta, nervos articulosq; mirè iuuari. Si foueantur vulnera & recentia & vetera, etiã carcinomata, quæ nullis aliis medicamentis sanari possunt. Foveri prius aqua calida iubet, & bis die tri-

PLANTARVM HISTORIAE

tā imponi. Sic etiam fistulas eluxatas, & tumores
renocari, quæq; discuti opus sit. Insomnia etiā, vigi-
liasq; tollere decoctam, si ieiuni edant quampluri-
mam ex oleo & sale. Tormina, si decocta iterum
decoquatur addito oleo & sale cumino, polenta. Si
ita sumatur sine pane, magis profuturam. Inter re-
liqua bilem detrahit per vinum nigrū pota. Quin
& vrinam eius qui Brassicā esitauerit, asseruari
iubet, calefactūque nervis remedio esse. Auribus
quodque ex vino succum Brassicæ tepidum instillari
suadet. Idq; etiam tarditati audientium prodesse
assuerat. Et impetigines eadem sanari sine vlcere.
Græci biles detrahère non percoctam putant. Item
aluum soluere, eandemq; bis coctam sistere. Vino
aduersari, vt inimicam vitibus. Antecedente in ci-
bis caneri ebrietatem. Postea sumpta crapulā discuti.
Hūc cibum & oculorum claritati conferre mul-
tum, succo verò crude angulis vel tantum tactis
cum Attico melle, plurimum, Hippocrates cæliacis
dysentericis bis coctam cum sale dari iubet. Itē ad
tenasmon, & renum causas. Lactis quoque vberta-
tem puerperis hoc cibo fieri indicans, & purgatio-
nem fæminis. Crudus quidem caulis si edatur. Par-
tus quoq; emortuos pelli. Inuenio & à podagra li-
beratos edēdo eam, decoctāq; ius bibendo. Hoc &
cardiacis datum & comitialibus morbis addito sa-
le. Itē spleneticis in vino albo per dies quadraginta.
Cōtra verò singultus coriādro, & anetho, & mel-
le, ac

le, ac pipere, & aceto. Illitā quoque prodesse infla-
tionibus stomachi. Item serpentū ictibus, & sordis-
dis vlceribus & vetustis, vel ipsam aquam cū hor-
deacea farina. Succū ex aceto, vel cū Fœnograeco.
Sic aliqui & articulis, podagræq; imponūt. Epiny-
etidas ac quicquid aliud serpit in corpore, imposita
leuat. Item repentinas caligines: has & si mādatur
ex aceto. Sugillata verò & alios liuores pura illis-
ta. Lepras & psoras cū alumine rotundo, ex aceto.
Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus testinū
& genitalium malis hanc vtilissimè imponi asse-
rit. Efficacius eandē cum faba trita. Item cōuulsis
cū rutā. Et muris aranei morsus, foliorū aridorū fa-
rina alterutra parte exinanit. Stirpiū Brassicæ aris-
dorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxēdis
cum dolores cū adipe peructusio. Plura de Brassicæ
viribus vide apud Catonē de re rustica, cap. clviij.

EX SIMEONE SETHI.

Malum & melancholicum succum procreat. Vie-
sum hebetat, & somnum per cōtraria insomnia in-
terturbat. Succus eius aliquatenus purgat: cor-
pus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quib-
us humectam aliuū exiccare volumus, ipsam mor-
dicè decoquētes, aquamq; primam abiiciētes, confec-
stim alteri aqua feruenti indimus: nihil enim ne-
que aeris, neq; frigida aqua quod bis coquitur, tan-
gere debet. Aestiuā Brassicā peioris succi est quā
hyberna. Cit verò vrinam, lumbricos interficit, &

PLANTARVM HISTORIAE

his qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem quod ab humiditate ortam hebetudinem sanat. Cocta cum pingi carne, plurimum noxae atque vitij amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit, utero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem ledit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arceret. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnifice defectiones vocis inuict. Vulneribus imposita, ea conglutinat, & malefica vlcera, & induratas inflammationes sanat.

DE CRUCIATA. CAP. CLIX.

Cruciatam habemus aliam à foliorum quatuor situ, in crucis formam, flore pallido, denso, enterocelis efficacem.

NOMINA.

Quo nomine veteres hanc herbam appellauerint, nondum compertum habeo. Neque enim Isatis est, quam vulgus Saponariam vocat, ut suo loco docebimus, ideoque nomen quo illam nominaremus fingendum fuit. Ad imitationem au-

tem Germanice nomenclaturæ Cruciatam diximus, cur dicta. quod eius radix in modum crucis transfossa sit. Ut hoc etiam nomine Græcè *σάπωνος* dici posset. Germanicè Creutzuurtz, Sperenstich, & Madergeer (Gallicè La Cruciate) nuncupatur.

FORMA.

Caulis rotundum obtinet, dodrantalem, in summo

summo rubentem, alas multas habentem, è quibus singulis bina folia crassa, angusta & oblonga, floresque orbiculatim purpurei è siliquis coloris herbacei prodeunt. Radicem albam, longam, crucis instar ab utroque latere perforatam, à qua illi nomen inditum est.

LOCVS.

Nascitur locis incultis.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Admodum amara est, vnde facile colligere licet calidam & siccam esse.

VIREs.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentie venena vsum tradunt. Item quòd ea quæ in thorace sunt educere valeat. Quæ sanè singula præstare posse, amarus sapor qui illi inest abundè docet. Abstergunt enim expurgantque amara, & quæ in venis est crassitiem incidunt, Galeno libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus capite decimoseptimo, autore. Quamobrem menses etiam mouet, comitali morbo competit, & alia quæ amarum ab eodem tribuuntur, præstare potest. Vulneribus etiam glutinandis mirifice conducit.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

- Ἰόςος** Gracè, *Hedera* Latine *Epheu*
K Germanicè (Gallicè du Lierre) dicitur.
 Athenienses *Bacchum* appellarunt *Citton*,
Cissos cur quo nomine rigens *Hedera* quæ sine adminiculo
 nominata stat, sola omnium generum ob id vocata est *cissos*:
 è diuerso nunquam nisi repens humi *Chamacissos*.
Dionysia. Sic *Dionysia*, hoc est, *Bacchica* nominata est à *Bac*
cho, qui primus ex indis in Graciam *Hederam*
 apportauit: vel quòd in tutela eius fuerit. Nam ut
 ille iuuenis semper, ita hæc viret. Nec secus omnia,
Hedera sicut ille mentes hominum, illigat. *Hedera* verò di-
 unde ap. Eta est, quòd vetustis parietibus hæreat: vel potius
 pellata. quia edita petat, & altè diuagetur: vel quia id cui
 adhæserit, cedat atque corrumpat.
GENERA.
 Plurimas, *Dioscoride* autore, sigillatim habet
Candida. species, sed maximè generales tantum tres. *Candida*
 enim quedam dicitur, eo quòd candidum fert fru-
 ctum: hæc femina à *Plinio* vocatur. Germanis
Nigra. *Vueissler Epheu* nominari commodè potest. Al-
 tera nigra, quæ nigrum producit fructum: hæc *Pli-*
nio mas nominatur. Germanis *schwartzer E-*
pheu. Hæc etiam parietibus obrepit, murisque
 pertinacius hæret quàm ut possit abire, hinc *Mau-*
repheu Germanis vocatur, & *Baumepheu*,
 quòd scilicet arbores suo complexu strangulet. Ter-
Helix. tia pruinatim *Helix*, id est, clauicula, & *hedtrula*
 nūcupa.

nūcupatur. Germanis klein Epheuu, oder Erdepheuu.

FORMA.

Nigra, quæ in Germania nostra provenit, arbores & parietes radicosis amplectitur brachiis, in totum fruticosa, folia primum cum pubescit angulosa, complurimum in triangulam faciem excuntia habens. Vetusiori rotundantur, pingua, dura, immortali virore: flore exili, vitigineo, non inodoro: baccis primum herbaceis, mox atris, & nonnūquā croceis, longiori pediculo in vna modum dependentibus, sparsioribus racemis non in globum candidæ modo coeuntibus, sed in acinos discretis. Radice numerosa, densa, flexuosa, contorta, ac surculosa, nec admodum profunda. Candida inter media folia mittit brachia, quibus arbores complectitur, maxime ramosa & robusta, corymbis, hoc est, racemis in orbem circumactis, aut folio albicat. Helix quæ tumuis diu viuat, Theophrasto autore, nunquam fert fructū, adeoq; sterilitate à cæteris distat. Parua tenuiave huic folia, angulosa & rubra, viticulaq; tenues sine corymbis.

LOCVS.

Hedera aquis gaudet. Nigra passim circa muros crescit. Helix verò in syluis humi serpit.

TEMPVS.

Nusquam non viret Hedera.

TEMPERAMENTVM.

Hedera ex cōtrariis composita est facultatibus:
habet

PLANTARVM HISTORIAE

habet enim quiddam adstringentis substantia, quæ terrena & frigida est. Habet etiam nonnihil acris, quæ calida est. Nec deest tertia, aqueam namq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viridus sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetque quæ terrea est & frigida adstringensq; & ea quæ calida & acris.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hedera omnis acris & adstringens est. Nervos tentat. Flores triū digitorū carptu, in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti prosunt. Tenera folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū & corymborum succus cum irino vnguento, melle, aut nitro naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores, valet, atque eo perfunditur caput cū aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cū oleo medetur. Nigræ hederae succus, aut poti corymbi imbecillitatē pariūt, mentemq; turbant largius sumpti. Pilula quinque corymborū trita calefactæq; in malicorio cum rosaceo si instillantur in contrariam aurē, dolorē dentiū mitigant. Denigrāt capillum illiti corymbi, Folia in vino decocta, omnium vlcera generi, etiam si cacoethe sint, illinantur. Vicia cutis in facie & ambusta, vti iam diximus decocta, sanant. Mouēt menses triti & subditi corymbi. Eadem poti post purgationes feminarum drachmæ pondere sterilitatem faciunt. Pediculus folio-

riū melle irrigatus, ac vulua inditus, menstrua & fœtus extrahit. Succus instillatus in naribus, graueolentiam & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculosq; illita necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit. EX GALENO.

Viridis, foliis eius in vino decoctis, vlcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt, ad sanitatē reducit. Igne etiā factas exulcerationes cicatrice includit. Cū aceto decocta folia lienosis prosunt. Flores autem quodammodo validiores sunt, vt ad leuorem redacta cum cerato ambustis conueniant. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum capiti purgando idoneum existit. Vetus tæ aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat aut rosaceo, aut dulci oleo misceatur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsque adeo calida potestatis vt obscure adurat.

EX PLINIO.

Natura omniū Hederarum in medicina anceps. Mentem turbat & caput purgat largius pota. Nervis intus nocet. Iisdē nervis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ & aceto, ei est. Omnia genera eius refrigerant. Vrinam ciunt potu, capitis dolorem sedant præcipuè cerebro: continentiq; cerebrū membranæ vtiliter mollibus foliis impositis, cū aceto & rosaceo tritis et decoctis, addito postea rosaceo oleo.

Illinum

PLANTARVM HISTORIAE

Illinuntur autem fronti, & decocto eorum fouetur os, caputq; perungitur. Lienī & pota & illita prosunt. Decoquuntur & contra horrores febrium, eruptionesq; pituita, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant: iecinora autem illiti. Trahuunt & menses appositi. Succus Hederae tedia narium graecolentiamq; emendat, praecipue albae satinae. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur etiam purus lentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior alba est, ferro calefactus: satisq; est acinos sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto mulso poti, tineas pellunt: in qua curatione vetrici quoque imposuisse eos vtile est. Hedera quam chrysocarpon appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita vt terni cyathi potentur, aqua qua cutem subierit, per urinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinque tritos in rosaceo oleo, calefactosq; in cortice punici, instillauit dentium dolori à contraria aure. Acini, qui croci succum habent, praesumpti potu, à crapula tutos praestant. Item sanguinem excreantes, aut torminibus laborantes. Hedera nigra candidiores corymbi poti steriles etiam viros faciunt. Illinitur decocta in vino omnium vlcerum generi, etiamsi cacorthe sint. Lachryma Hederae psilothrum est, phthiriasimq; tollit. Flos cuiuscunque generis tritus digitorum

digitorum carptu, dysentericos & aluum citam
emendat, in vino austero bis die potus. Et ambustis
illinitur vtiliter cum cera. Denigrant capillum co-
rymbi. Radicis succus in aceto potus, contra pha-
langia prodest. Huius quoque ligni vase splenetis
cos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, mœx-
que comburunt, & ita illinunt ambusta, prius per-
fusa aqua calida. Sunt qui & incidunt suoci gra-
tia, cœque vtantur ad dentes erosos, frangique tra-
dunt, proximis cera munitis ne ledantur. Gummi
etiam in Hedera quærūt, quod ex aceto vtilissimū
dentibus promittunt.

DE CERASO. CAP. clxi.

NOMINA.

Kερατος Græcis, Cerasus Latinis, Germanis
Kirschenbaum (Gallis vng Cerisier) di-
ciunt. Cerasum autem arborem, vt Athenæus re- Cerasus
fert li. ij. Dipnosoph. à Cerasunte Pontica ciuitate, vnde dis-
primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mi- Et a.
thrulate. Ille idem est qui etiam fructum cognos-
mine ciuitatis appellauit Cerasum.

GENERA.

Multa Cerasiorū sunt genera, in Germania tamē
tria, quòd sciam, duritaxat proueniunt. Primi enim Primum.
generis sunt retunda, ac maximè rubent, suaq; voce
illis dicuntur Amarellen. Alterius generis, quòd Secundū.
ad figuram attinet, prioribus similia sunt, disse-
runt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit.

Vocantur

PLANTARVM HISTORIAE

Tertium. Vocantur autem horum lingua. Vueichsel. Tertij generis predictis minora sunt ac longiora, partimq; rubent, partim nigricant: à nōnullis priuatim Kirschen vel Kerischen appellantur. Nos vna icone omnia tria complexi sumus. Quae in utroque genere nigra sunt, ea vescentium manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororum instar inficiunt.

FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, et in ambitu serrato constat, cortice leno, in candido nigricante, flore albo racematim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabae.

LOCVS.

Frequens est in omnibus hortis Cerasus. Quae tamen posterioris generis Cerasia profert, in syluis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus,

TEMPVS.

Iunio ac Iulio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim vere apparent. **TEMPERAMENTVM.**

Cerasorum non vnum idemq; est temperamentū, quod ex eorundem facultatibus perspicuum sit. Simeon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cerasia quidem ipsa si viridia sumantur, ventri utilia sunt. Eadē siccata aluum sistunt. Gummi Cerasorum cū vino diluto sumptū, vetustae tussi medetur,

detur. Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex vino potum calculosis auxilio est. EX GALENO.

Cerasus arbor fructum fert non paris adstrictio-
nis in omnibus particulatim plantis participē. Nam
& in horum, sicut etiam malorum granatorum, &
malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdā
verò dulcis, in nonnullis autem acida exuperat.
Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondū conco-
cta sunt ac matura, quædā admodū acerba sunt,
quædam similiter moris acida. Sed in moris imma-
turis acida qualitas acerbam exuperat, in Cerasis
non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in in-
testinis sunt, subducunt, sed minus apta stomacho
sunt. Contrā austera. Quæcunque verò acida sunt
ea pituitosis excrementosisq; stomachis conueniunt.
Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil et-
iam incidunt. Porro ipsius arboris gummi commu-
nē omnibus viscosus & mordacitatem expertis me-
dicamentis facultatem obtinet, quæ ad arterias ex-
asperatas accommodata est. Propriè autem (si quidē
verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos
cum vino potum adiuvat. Nam sic illi tenuiū par-
tium quædam facultas inest.

EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho utilia. Ea-
dē siccata aluum sistunt, urinam ciunt. Inuenio apud
autores, si quis matutino roscida deuoret cum

PLANTARVM HISTORIAE

fuis nucleis, in tantum leuari aluum, vt pedes morbo liberentur.

EX SIMEONE SETHI.

Cerasia mali succi sunt, ventrem subducant, humidum ventriculū ladūt, praesertim cū nō sunt matura. Profunt autem calidis & siccis ventriculis ac temperaturis. Gummi verò arboris cum vino sumptum calculosis auxiliatur.

APPENDIX.

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destillat veteri tussi mederi, exq; vino sumptum, gutturis lenire asperitates, fastidia discutere, & ciborū appetentiam moliri. Colorem curis facere gratiorem, & oculis afferre claritatem. Lichenes infantium ex aceto sanare.

DE CYANO. CAP. CLXII.

Cyanus vt Græcis dicitur, à colore floris, sic nobis Bleuet & percele, cut verò Gal. Aubifoin, velut ab albo fœno dicatur, non video, nisi fortè quòd in eo genere quædā flore sunt etiā albo, & qui purpurei sunt in ferra ligati, & aquæ inferna parte immissi tandem albescent.

NOMINA.

Baptise-
cula. **K**ύανος Græcis, Plinio & Latinis aliis Cyanus appellatur. Nonnullis Baptisecula, quòd secantibus & metentibus officiat, reusa in eius cursu falce. Nam & seculam veteres falcem dixerunt.

runt. Rectius tamen Blaptisecula vocaretur, quòd
 βλάπτειν Græcis nocere significet. Nostri florem Flos frum-
 tumetorū, Ger. autē Blau kornblumen, (Calli mentorū.
 Blaucolē, ou Aubifoin, ou Bluet, ou Bleuēt)
 nomināt, quòd scilicet in frumētario nascatur agro.
 Cyanos verò dicta est hæc planta, ob florem quem Cyanos
 profert cæruleum, aut quòd honorem nomenq; dede cur dicta-
 rit cæruleo colori. Hinc est quòd pueri in hodiernū
 usque diem barbula calycibus erutas, ex candido
 oui liquore terant, quo in pingendis grandioribus li-
 teris cærulei nitorem mentiantur.

FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblon-
 ga, calyces rosarum, sed squarosi atque tristes, quos
 plurimæ cæruleæ stipant Barbula. Radix oblonga,
 lignosa, fibris quibusdam capillata.

LOCVS.

Trivialis flos est, passim in frumentis nascens.

TEMPVS.

Iunio potissimum mense floret, nec parum gratiæ
 suo cæruleo colore frumentis adfert. Hinc est quòd
 rusticorum etiam coronis inferatur, quanquam in-
 odoratus prorsus sit.

TEMPERAMENTVM.

Frigida est temperatura atque ad cōrepellentē,
 id quod gustus etiam facillè indicat, viscositatem
 manifestam, & nullum prorsus caloris indicium
 præ se ferens. VIRES.

G ij Recen-

PLANTARVM HISTORIAE

Recentiores rectè tradunt huic herbae facultatē inesse, qua oculis alijsq; partibus inflammatione laborantibus profit. *De Crommyo.*

DE CROMMYO. CAP. clxiii.

NOMINA.

K ρόμμυον Græcis, Cēpa, & in neutro Cepe, Latinis dicitur. Officina genuinum nomē retinuerunt. Germanis Zuibel (Gallis Oignon) appellatur: quod sanè vocabulum à Gallico detortum esse videtur: quandoquidem Galli sua lingua

Crommyon Cepam vocent Siboulam. Crommyon autē, Aristotele in problematis autore, dictum est, quod oculi pupillam comprimi cogat. Nam oculos vellicando expressis subinde lachrymis contrahi pupillas certū est. Itidem libro ix. Diosoph. testatur Athenæus.

Cēpa quā Cēpa verò à capitis magnitudine.
re vocata.

FORMA.

Folia habet ferè porracea, intus concava: caulem teretem rotundumq; per cuius fastigium flores primum candidi, ac subinde semen, in orbem sparguntur: radicem capitatā pluribus compactā tunicis, quæ summatim præternuibus rufisq; vestitur membranis, vertice nigricantem, à quo fibræ capillitis modo fruticant. **LOCVS.**

Terram Cēpa amat pinguem, vehementer subactam & irriguam, passimque hodie in omnibus plantantur hortis.

TEMPVS.

Floret

Floret Iulio potissimum mense, & deinceps semē profert, quòd non antè legendum, quàm cum nigrū colorem prae se feret. Siquidem eo colore perfectiorem fatetur, nigritiaq; maturitatis index est.

TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine excalescientium, essentiaēque eius crassarum est partium. Si succum eius exprimas, quod reliquum est admodum terreae substantiae est, eiusque calida: at succus aquea acriaq; caliditatis.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Cepa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm cādida, sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordicat, flatus gignunt, appetentiam inuitant, extenuat, sitim excitant, fastidium pariunt & expurgant. Alio vtilis sunt. Detractis tunicis inq; oleum coniecta, ac pro glandibus subdita hemorrhoidas, reliquasq; excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq; laboratibus. Suppressos mēses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis morsibus cum sale, ruta et melle illinitur. Cū aceto autem in sole inūctus alphas sanat. Cum pari spodio, scabra, lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe vtilis est. Alii fluoribus prodest. Aurium gravitati ac sonitui confert. Ad

PLANTARVM HISTORIAE

purulentas aures, & eliciendam aquam in iis in-
terceptam valet. Alopeciae earũ succo vtiliter per-
fricantur: celerius enim quàm Alcyonium pilos e-
uocat. Largior Ceparum cibus capitis dolores ciet.
Cocta vehementius vrinam pellit. In morbis, cocta
etiam, copiosius comesta, lethargum efficit. Cũ pas-
sis vuis, & sico illita, tubercula concoquit & rûpit.

EX GALENO.

Hemorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum
aceto inuncta. In sole alphas abstergit, & alope-
cui attrita pilos Alcyonio citius restituit. Porro
succus eius iis qui suffusione oculorum laborant, aut
aciem oculorum obtusam præ crassitudine humo-
rum obtinent, inunctus predest. Tota Cepa mandu-
cata flatuosa est. Itaque quæ temperatura sunt sic-
ciorẽ, minus flatuum generant. Crassos corporis
humores extenuat, glutinososq; incidit. Bũ tamen
aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quã-
quam ne sic quidem vim perdit extenuandi: ve-
rum facultatem quandam obscurissimam alendi
corporis exinde acquirit, cuius antea quàm deco-
queretur, nihil prorsus obtinebat.

EX PLINIO.

Cepæ olfactu ipso & delachrymationi, & cali-
gini medentur, magis verò succi inunctione. Somnũ
etiam facere traduntur, & ulcera oris sanare, com-
manducata cum pane. Et canis morsus virides ex
aceto illitæ, aut sicca cum melle & vino, ita vt post
dicm

diem tertium soluantur. Sic & tritu sanāt. Tostam
 in cinere epiphoris multi imposuere cū farina hor-
 deacea, & genitaliū vlceribus. Succo & cicatrices
 oculorum, & albugines, & argemas inunxere, &
 serpentium morsus, & omnia vlcera cū melle. Item
 auricularum cum lacte mulierum, & in iisdem so-
 nitum ac gravitatem emendantes, cum adipe anse-
 rino, aut cum melle stillauere. Et ex aqua bibēdum
 dederunt repente obmutescētibz. In dolore quoq;
 ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiariū
 omnium, priuatim scorpionum: Alopecias fricūere
 & psoras tufis cepis. Coctas dysentericis vescēdas
 dederē, & contra lumborum dolores. Purgamenta
 quoque earum cremata in cinerem, illinentes ex a-
 ceto serpentium morsibus, inter ipsas quoque mula-
 tipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuer-
 sitas. Proximi inutilia esse præcordiis & cōcoctio-
 ni, inflationemq; & sitim facere dixerūt. Aselepias
 dis schola ad validum quoque colorem profici hoc
 cibo. Et si succum ieiunii quotidie edant, firmitatem
 valetudinis custodiri, stomacho utilia esse, ac spiri-
 tus agitationi, ventrem mollire, hæmorrhoidas pel-
 lere subditas pro balanis, succum cum succo fœnia-
 culi contra incipientes hydropyses mirè proficere.
 Item cōtra anginas, ruta & melle. Excitari eisdem
 lethargicos.

EX SIMEONE SETHI.

Cepa lotium cit, & semen genitale gignit. Cibi

G iiij appetentiam

PLANTARVM HISTORIAE

appetentiã excitat. Capitis dolores facit, & stomacho officit. Rationem etiam, vt aliqui ferũt, lãdit. Si verò coquatur, plurimum malignitatis deponit, & utilis fit ad thoracis asperitates, & tusses. Hæmorrhoidas imposita aperit, & cum aceto inunctum alphas extergit. Etsi autem crassarũ partium substantiam habeat, humores tamen crassos & lentos extenuat. Vêtriculum verò inflat. Si crebrius quis ea vtatur, in lienis vitia incidit.

DE CAMPANVLA. CAP.

CLXIII.

Campanula huius videtur nobis Gante-lée, & Gan nostre Dame à dactylothece in floribus forma.

NOMINA.

QUum nobis non constet quo nomine veteribus appellata sit hæc herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui Campanam planè referunt, nominare. Germanis Halizkraut, hoc est Cernicaria, (Gallis des gãs nostre Dame, ou des ganteletz) dicitur, quòd scilicet ad oris & cernicis fauciumq; mala mirifice conferat.

FORMA.

Caulem profert quadrangularem, hirsutum, rubescẽtem, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vrticam proximè accedẽtia, flores purpureos campana aut calathos similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarcescens

Campanu
la vnde
dicta.
Cernica-
ria.

emarcescentibus in rotundis capitulis semen prouenit. Radicem multifariam intortam, & cādidam.

LOCVS.

Gignitur in pratis siccis, in quibus dumeta plurima existūt. Propemodum enim nunquam nisi in dumetis reperiri potest.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Gustu astringit, vt hinc exiccandi illi vim esse quisque conicere queat.

VIRE S.

Adstringendi habet facultatem, ideoq; decoctum illius vnice ad oris exulcerationes, aliaq; eiusdem mala quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiā haud dubiè ad alia quænis vlcera, ob insignē quam obtinet in exiccando facultatem.

DE CALAMINTHA.

CAP. CLXV.

Quenam herbæ Calaminthis genera apud Dioscoridem & Galenum explicant, hodie parum constat, vt Musæ Ruellius repugnet, ob historiæ Dioscoridis & Galeni obscuram breuitatem.

NOMINA.

Kαλαμίνθη Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur. Germanicas Calaminthæ appellationes paulò post indicabimus. Calamintha tha quare verò dicta.

PLANTARVM HISTORIAE

verò dicitur quasi vel bona, vel utilis mentha: nã que nidore suo serpētes fugat. Quod testatur etiam Aristophanes iis verbis: σὺ δὲ ὄζεις καὶ χαμίνους, ὄφεις ἐλασινῶ. Nisi quis existimet à καλὰς, hoc est, ligno, quasi lignosam appellari mentham.

GENERA.

- Primum.** Calamintha Dioscorides tria facit genera. Primum amat mōtes, ideo huius generis Calamintha montana vocatur. Germanis Stein oder Katzen mūtz (Gallis Calamēt, ou Poliot sauuage, ou herbe au Chat) dicitur. Alterum Latini propriè Nepetam, vulgus eò quòd Pulegio simile sit, sylvestre Pulegium nominat. Germani etiam vulgi opinionē sequentes, Vuilden Poley & Kornmūtz vocant. Officinæ pro Calamento hoc solo genere vutuntur. Tertium Mentastru simile est, Germanicè Geelmuntz commodè appellatur.
- Secūdum.**
- Pulegium sylvestre.**

FORMA.

Primum Calaminthæ genus folia Ocymō similia habet, subalba, ramulos angulosos, florem purpureum. Alterum Pulegio simile est, maius tamen: propter quod quidam, ut dictum est, sylvestre Pulegium nominant, quoniam & odorem illius emulatur. Tertium mentastri similitudine est, longioribus foliis, caule & ramis prædictis maius, sed minus efficax: flore luteo.

LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus & aspe-

ris gignitur, vnde & montana dicta est. Alterius
in campestribus & agris. Tertiū in aquosis locis.

TEMPVS.

Florescunt Iunio, potissimum verò Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calamintha essentia est tenui & calida, siccaq;
in tertio quodāmodo ordine. Horū manifesta sunt
indicia, partim gustu apparentia, partim experien
tia cognita. Gustu quidem acris & palām calida
est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.

VIRĒS. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia gustu feruentia admodū & acria.
Radix inutilis. Pota aut illita demorsis à serpente
opitulatur. Decoctum eius potum vrinas & men
ses expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnoeā, tormini
bus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Presumpta in
vino venenis resistit. Regium morbum expurgat.
Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota,
enecat. Nec secus cocta crudaq; si teratur. Elephā
ticos esitata adiuvat, si postea serum lactis bibatur.
Folia trita & apposita menses ducunt, & foetus in
terimūt. Accēsa aut substrata serpētes fugant. Ni
gris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta
& illita. Sugillata tollunt. Ischiadicis imponitur,
vt humorem ex alto euocet, meatusq; transmutet,
summam cutem exurens. Vermes necat succus au
ribus instillatus.

EX GALENO.

Pericli-

here. Caterum quæ illi inest amaritudo, planè exigua est, verum ad quædam ita efficaciter agit, ut quæ valentissima est, nimirum quum coniuncta sit vehementi calori cū tenui essentia. Quare & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa, aut implicata quæ putredine tētetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptū seu pota, seu admota interimit & eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergendi verò propter unicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ob omnia antedicta prodest. Ictericis verò potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia & expurgantia in iccinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

EX PLINIO.

Decocta in aqua ad tertias discutit frigora. Mulierum menstruis prodest. Aestate sedat calores. Vires quoque contra serpentes habet. Fumum ex ea nidoremq; fugiūt, quàm & substernere in metu obdormituris utile est. Tusa agilopis imponitur, & capitis doloribus recens, cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius instillatus naribus supinis, profluvium sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine in passo tepido gargarizata, anginis modetur.

PLANTARVM HISTORIAE

DE CRITHE. CAP. CLXVI.

Hordeum Polystichon seu hexastichon à disticho Picardis distinguitur, Parisiensibus confunditur.

NOMINA.

Kριθή Græci, Hordeum Latinis & officinis dicitur. Germanis Gerst en, (Gallis Orge.)

Polenta. Ex eo polenta, quam Græci ἄλφιτον nomināt, & Prisana, medicamenta veteribus v̄sitatissima, conficiuntur.

GENERA.

Hordeum Rustici duo esse Hordei genera tradunt. Vnū **Polystichū** polystichum, quod sic dictum est, quia in multos versus spicatur. Sunt enim ex hoc genere quæ spicam tribus, interdum quatuor, nunc sex, nūc octo versibus distinctam proferūt. Germanis Groß Gerst, **Distichū.** hoc est. Hordeum magnum vocatur. Alterum Distichum nominatur, quod scilicet in duos duntaxat versus spicetur. Germani Klein Gersten, id est, Hordeum exiguum appellant.

FORMA.

Culmum habet tritici, fragiliorem tamen minoremq; quinque, sex, & interdum pluribusgeniculatum articulis, simplici in stipula folio, & eo quidem scabro ac lato. Grana ferè nuda, longiore capillamento, mordacique arista. In versus spicatur, radice frequenti, capillis fibrata.

LŒCVS.

Hordeum pinguisimum amat agrum.

TEM.

TEMPVS.

Erumpit à primo satū die septimo, & caput alterum grani in radicem exit, alterum in herbam. Metitur Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Hordeum primi sunt ordinis in exiccando & refrigerando.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hordeum optimum est candidum, purumq̃. Minus quàm triticū nutrit. Ptisana tamen ob cremorem in elixatione redditum, plus alimenti prabet quàm polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atque faucium scabritias, exulcerationesq̃; pollet, quibus etiam triticea ptisana praesidio est, sed plus alit, magisq̃; urinā mouet. Lac abunde suppeditat, si cum Foeniculi semine decocta sorbeatur. Abstergit, urinā ciet, inflat, stomacho aduersatur, & edemata concoquit. Farina hordeacea cum fico in multa aqua decocta, edemata & inflammationes discutit. Duritias cum pice, resina & fimo columbino cooquit. Cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, fenograceo & ruta illinitur. Strumias cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit. Cum myrto autem, aut vino, aut syluestribus pyris, aut rubo, aut malicorio, alui profluvia sistit. Podagricis inflammationibus cum cotoneis,

aut.

PLANTARVM HISTORIAE

aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liguata eadem cum aqua, atque cum pice & olco decocta, pus excitat. Cum aceto autem liguata, & cum pice decocta, contra articulorū fluxiones prodest. Farina ex iis aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

EX GALENO.

Hordea paucillum etiam abstersionis habent. Paulo etiam plus desiccant quàm farina fabacea, cui non insint cortices. Cetera verò similia sunt foris videntibus. In cibo autē hoc præstant fabis, quòd flatuosam naturam exuant: fabis quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentiae quàm hordea, quamobrem iis plus etiā nutriunt. Quoniam verò ambo paulum à medio recesserunt, multo sunt vsui. Nam talia medicamenta multis aliis miscentur cum materia quædam: itaque etiam cera & oleum paucis medicamentis coniunguntur. Polenta verò multo plus hordeo desiccet. Plura de hordeo ptisana & polenta apud Galenū libro primo de alimentorum facultatibus offendes.

EX PLINIO.

Farina ex hordeo et cruda & decocta, collectiones impetusq; discutit, lenit & concoquit. Decoquitur aliàs in mulsæ aqua, aut fico sicca. Ad iccinoris dolores eam in posca positam cōcoqui opus est, aut cum vino. Cum verò inter coquendum discutien-

dumq;

dumq; cura est, tunc in aceto melius, aut in facie acet-
ti, aut cotoneis pyrisve decoctis. Ad multipedum mor-
sus cum melle, ad serpentium in aceto & contra
suppuratiam ad extrahendas suppurationes ex posca,
addita resina & galla. Ad coctiones vero & ul-
cera vetera cum resina. Ad duritias cum simo co-
lumbino, aut fico sicca, aut cinere. Ad nervorum infla-
mationes, aut intestinorum, vel laterum, vel viri-
lium dolores, cum papauere aut meliloto, & quo-
ties ab ossibus caro recedit. Ad strumas cum pice
& impubis pueri vrina. Cum oleo & fenograceo
contra tumores precordiorum, vel in febribus cum
melle, vel adipe vetusto. Suppuratis triticea farina
multo lenior. Nervis cum Hyoscyami succo illini-
tur. Ex aceto & melle lentigini.

DE CROCO CAP. CLXVII.

NOMINA.

KΡΟΚΟΣ Græcis, Crocus Latinis appellatur.
Officina antiquum nomen retinuerunt. Ger-
mani Saffran (Galli Safran) vocant simpliciter,
aut cum adiectione, zamer saffran. Sic vero vo- Crocus vn-
catus à Croco iuvene, qui propter amorem Smila- de dictus.
cis virginis, in florem sui nominis versus est: quod
Ouidius testatur, qui sic scriptum reliquit:

Et Crocum in paruos versum cum Smilace flores.

FORMA.

Crocus folio est angusto adusque capillamenti pe-
nè exilitatem: flore purpureo Colchici floribus non
M. admodum

PLANTARVM HISTORIAE

admodum dissimili, in quo flammæ Croci staminis: radice bulbosa, copiosaq; ac vinaci.

LOCVS.

Nascitur in Coryco monte Cilicia optimus. Proxima nobilitas ei qui in Olympo Lycia mōte provenit. Dein ei qui ex Aegis Aetolia urbe affertur. Nunc in plerisque Germaniæ locis plantari cœpit haud infelicitè, quod viribus è locis iam commemoratis allatis haud cedit.

TEMPVS.

Florem ante folium ædit: per autumnum nanque Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spacium flores durant. Postquam autem hi decidunt, statim folia angusta & oblonga prodeunt, virentq; tota hyeme.

TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adstringens obtinet, quod terreum frigidumque est: sed superat in eo calefaciens & qualitas & facultas, ut tota essentia secundi sit ordinis excalefacientium, & primi exiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Crocus emollit, cōcoquit, leniter alstringit, vris nam cit, & coloris bonitatem efficit. Arcet crapulā cū passo potus. Fluxiones oculorum cū lacte muliebri inunctus sistit. Potionibus quæ pro interaneis parantur, utiliter misceatur: item iis quæ vuluæ sediq; subiiciuntur & illinuntur. Venerem stimulat.

Inflam

Inflammationes erysipelatosas inunctus lenit. Aurium remediis vtilissimus est. Letalem sanè dicunt hunc si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur. Radix eius cum passo pota vrinam cit.

EX GALENO.

Crocus concoquendi vim quandam habet, ad instantem scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum excalesciant, paucula adest adstrictio, ea parem facultatem habent essentiis emplasticis nominatis, quas cum inunctas caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse constat.

EX PLINIO.

Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorum maximè ex ovo illitum. Vulvarum quoque strangulatus. Stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iecinorū, pulmonum, vesicarumq; peculiatim inflammationi earum vehemèter vtile. Item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus. Vrinam cit. Qui Crocū prius biberint, crapulā nō sentiēt. Ebrietati eo resistūt. Corona quoq; ex eo mulcent ebrietas. Somnū facit. Caput leniter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cū Creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonus est, ciborumq; concoctionem efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica vitia inuat. Discutiēdi quoque vim obtinet &

H ij visce.

PLANTARVM HISTORIAE

visceribus utilis est, ad spiritusq; difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter utatur, bonum colorem habebit: sin verò citra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus ubi dolèt, summopere prodest, superpositis Beta foliis.

DE CYNOCRAMBE.

CAP. CLXVIII.

Hęc brassica canina licet mercurialis mas dicatur ob eius similitudinē, tamen Dioscoridi diuersæ sunt plantæ.

NOMINA.

Υνοκράμβη, ἢ κυνία ἢ λινοῦωσις ἄγρια
 K ἄγγελω Græcis, Canina Brassica, Cynia, &
 sylvestris Mercurialis mas Latinis, Vuild
 Bingelkraut das mennle, Hundszkol Germanis appellatur.

FORMA.

Caulē ex se mittit dodrantalē, tenerum & subalbidū. Folia Mercuriali similia, albescentia ex certis internallis. Semen prope folia paruum, rotundū. Ex qua quidē delineatione sole meridiano clarius est, herbam cuius picturā damus esse Cynocrāben. Sis quidem ea caulem binūm palmorū altitudine habet, mollem & subcandidum. Folia Mercuriali similia admodū, certis interstitiis, subalbida. Semen item iuxta folia exigū, rotundum, geminorū instar testicu

testiculorum cōnexum: & in summa, nihil est quod non in ea descriptioni adamussim respondeat.

LOCVS.

In syluis copiosè prouenit.

TEMPVS.

Semen veris initio, nempe Aprili mense, profert, maturescit autem Maio.

TEMPERAMENTVM.

Quum gustu nihil à satina Mercuriali distet Cynocrambe, colligitur hinc idem quod illa, obtinet re temperamentum.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Caulis & folia pota, & olerum modo comesta aluum crient. Ius verò decoctorum bilem & aquosa detrahit.

APPENDIX.

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, ea cuius mentionem facit Galenus, Paulus & alij, adde etiam Dioscorides, verum sub nomine Apocyni: quod lectorem, ne diuersas herbas vnā esse putaret, monere volui.

DE COLVTEA. CAP. CLXIX.

Colutea nobis Baguenaudier, cuius folia & folliculos sene loco non sine viribus substituunt pauperes.

NOMINA.

Kολυτῆα Græcis, Colytea & Colutea Latinis (Gallicè Baguenaudier) dicitur: à nullo

PLANTARVM HISTORIAE

tamen, quod sciam veterum, quàm à Theophrasto
lib. iij. de plant. hist. cap. xviij. celebrata.

GENERA.

Colutea. Duo eius sunt genera. Vnũ quod priuatim *Colutea* vocatur, officinis incognitũ. Germani *Vuelch Linsen* appellat. Alterum officinis cognitũ & frequenti vsu à medicis vsurpatũ, Mauritano sermone *Sena* nominatur. Germani ad eam alludẽtes appellationem, *Senet* nuncupant. Differunt autem inter se magnitudine: siquidẽ primũ genus maius est altero, vtpote quod quadriennio, Theophrasto loco paulò antè citato teste, se in arbore efferat. Siliquæ etiam illius magis turgido spiritu distenduntur, *Sena* verò siliquas profert lunatas, nec ita prætumidas. Semen denique *Coluteæ* rotundum, lentis obtinens similitudinem, *Senæ* autem oblongum, cordisq; humani instar acuminatum.

FORMA.

Colutea Frutex est ramis exilibus, folio fanigræci, flore
descriptio genistæ aut pisi lutco, membraneo folliculo, pellucente, prætumido, & veluti quodam spiritu distendente turgido, ita vt digitis si prematur, crepitans disiliat, in quo semen atrum, durum, latum, lentis magnitudine, pisi gustu, in ordinemque digestum clauditur.

LOCVS.

Sæpius vtrunque in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret

Floret Colutea Maio & Iunio mensibus, ac sub
inde in siliquis oblongis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Arabes calidam in principio secundi, & siccam
in primo ordine statuunt.

VIRES. EX ACTVARIO.

Sene siliquosus quidam fructus à barbaris appel
latur, qui citra noxam drachma pōdusculo potus,
pituitā & bilem deicit: post hos reliquos humores
modestissimè purgat, retorridam atramq; bilem, et
iūsq; suffusiones ex gallinacco iure depellit. Vetu
sto capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini
succurrit. Sed feruefacti ius potius quàm triti fari
na propinatur. Interaneorum obstructions tollit.

APPENDIX.

Quum non forma tantum, imò etiam sapore duo
hæc Colutea genera sibi similia sint, facile etiā hîc
colligitur facultate inter se minimè differre. Quare
vtrumque citra molestiā atram bilem retorridamq;
educit, caputq; ac cerebrum, & instrumenta sensuū
à noxiis purgat humoribus. Quid multa? aduersus
omnia vitia ab atra bile nata valet.

APPENDIX ALTERA.

Dum hosce commentarios conscriberemus non eo
rat ad manum Græcus Theophrastus: quare cū La
tino tantum vtendum esset exēplari Theophrasti,
non satis conicere potuimus, an per γ aut per ο
vox ipsa scriberetur, cū nō raro Latini eas voces

PLANTARVM HISTORIAE

in quibus Græcè v est, per v efferant. Quare Latine dici hanc herbã Coluteam & Colyteam putauimus. Sed nacti tandem Græco Theophrasti com-
 dice, statim deprehendimus κολυτέα à κολυτέα
 differt à diuersam esse: id ipsum enim Theophrastus manifes-
 Colytea. ste innuit. In Latina verò Theodori versione per-
 peram pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras offudit.

DE CORONOPO. CAP. CLXX.

Coronopum, id est, pedem cornicis pingit quam nos merito cornu cerui vocamus, quod adulta eius folia cornu ceruini effigie ramosa sint. Coronopus nobis alius est in syluis frequens folio infernè violam nigram aut geranium referente, superno exiguo in pedis cornicis formam planè diuiso, cui flos supereminet luteus paruus.

NOMINA.

Pes Cornicis.	K	Ο κορυόπους, ή άσπριον Græcis, Pes Cornicis & Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis incognita herba. Germanis comode
Coronopus vnde dicta.		Kraen oder Rappenfusz (Gallicè Capriole, ou sanguinater, ou dent au Chien) appellari
Sanguinaria.		potest. Coronopus enim non alia ratione dici cœpit, quàm quod Cornicis pedem effigie representet. Sã
Herba stella.		guinaria autem Sanguinalisve vocata est, quod sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui herbam
		Stella

Stella nominant, alludētes haud dubiè ad Gracam appellationem astrion. Nonnulli quòd folium eius multipartitò cōsectum in ceruini cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu vocarunt.

FORMA.

Herbula est oblonga, per terram strata, foliis fissis, radice gracili & adstringēte. Ex qua quidē descriptione, etsi concisa admodum, satis liquet, herbā hanc cuius picturam damus esse Coronopum. Herbula enim est foliis oblongis & scissis, ac in multas partes laciniatis, atque adeò cornicis pedem effigie referentibus, humi quoque semper sparsa proserpit: radice denique tenui admodū & adstringente praedita. Quibus omnibus id quoque accedit, quòd Dioscorides Psyllium folia Coronopo similia habere scribit: quod si verum esse ex vtriusque herbae collatione experiri volueris, senties Coronopi huius nostri folia planè Psyllij foliis similima esse, potissimum vbi primum è terra erumpunt: imò quòd ad folia, flore & semina attinet, omnia in vtrisque sibi similia deprehendes, in eoq; solo distare cōperies, quòd Psyllium folia non fissa habeat, & in altum surgat, singulāque iam ducta maiora producat: contra Coronopus humi repat, minoraq; omnia profert. Vtraque igitur herba luteos obtinet flores, & semina in capitulis pulicibus similia. Capitula verò in Coronopo sunt multo quàm in Psyllio tenuiora ac longiora, id quod pictura graphice monstrabit.

PLANTARVM HISTORIAE

bit. Ex iis quoque manifestū sit errare illos toto cælo, qui gramen aculeatum & Coronopum vnam & eādem herbam esse contendunt, cū tamen forma non parum distare videantur. Atque hinc est quod omnes veteres tã Græci quàm Latini utrāq; herbam seorsim, & in diuersis locis descripserint. Plinius siquidem lib. 24. cap. 19. aculeatum gramen in cacumine aculeos plurimum quinos habere, atque adè Dactylon vocatum esse hoc nomine, quod scilicet digitorum speciem referat, scribit. Coronopus verò neq; quinos, neque in cacumine aculeos obtinet, sed tātum folia fissa, vel si aculeos placet appellare has fissuras, non in cacumine, sed in ambitu passim foliorum eas reperies: vt certum sit Coronopum non esse aculeatum gramen.

LOCVS.

Dioscorides in incultis, semitis, & iuxta domicilia nasci tradit. In Germania tamen, quod sciam, nusquam nisi sata prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio mēse, ac subinde in oblongis capitulis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ex adstrictione ipsa satis constat radicem ipsam siccandi vi præditam esse.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba cocta estur olerū modo. Radicē habet in cibo adstringentem, quæ celiacis conducatur.

EX GA

EX GALENO.

Coronopodis radix comesta celiacis prodesse creditur.

EX PLINIO.

Scrivitur interim Coronopus, quoniam radix celiacis præclare facit in cinere tosta.

DE CYCLAMINO. CAP. CLXXI.

Cyclaminus frequens in luco Aurelianensi. in hortis etiam nostris prouenit.

NOMINA.

Kυκλᾶμινος, ἢ ἰχθυόθηρον Græcis, Rapum et tuber umbilicusq; terra Latinis, Cyclamen officinis mutata voce, Panis porcinus & terra, atque Arthanita à nostra ætatis herbariis, Germanis Erduurtz oder Apffel, Schuuein oder Seuubrot (Gallicè Pain de Porceau) dicitur. Cyclamino Græci nomen fecerunt, circumacta in nus unde orbē eius circinationē cōtemplati, ἀπὸ τοῦ κύκλου, dicta. quasi ab orbe Cyclaminon, hoc est, orbicularē dixērunt. Fuitq; hæc prior & antiquior planta huius theron. appellatio. Ichthyotheron verò iidem, quòd pisces Rapum terra necantur, nominauerūt. Romani Rapum terra, ra. quoniam eius radix in terra velut Rapum ex tube Tuber terrat. Qua sanè ratione terra tuber, quèd in molem, ra. quādam intumescat: aut umbilicum terra, quoniam Umbilis ut umbilicus circinata forma emergit, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellauerunt. Panis por Pancem Porcinū haud dubiè primū vocarūt subulci, cinus.

PLANTARVM HISTORIAE

qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Ceteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, quod saepius radicem in orbem circumactam intuerentur, quae non in globum intumescens, sed veluti pressa sese in latitudinem explicaret, qua forma quotidiano vsu panes visuntur, terra panem cœperunt appellare.

FORMA.

Folia Hederae habet, purpurea, varia, supra infraque; albicantibus maculis. Caulis longitudine quatuor digitorum, nudum, foliisque; carentem, in quo flores rosarum effigie purpurei. Radicem nigram, rastro similem, in latitudinem se pandentem.

LOCVS.

Nascitur in vmbrosis & vepribus, maximè sub arboribus.

TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augusti folia sua quae per integrum retinuit annum, amittit, & subinde noua emittit, atque statim inter ea flores ostendit, qui integro durant autumno.

TEMPERAMENTVM.

Clarum est ex particularibus operationibus, quas statim subiiciemus, Cyclaminum esse calidam & siccam in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitam, aquamque; per inferna trahit. Menses pota & apposita

apposita cit. Tradunt si pragnans mulier radicem
 transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa ac-
 celerat. Bibitur & in vino cōtra letalia, præsertim
 leporem marinū. Illita contra serpentium ictus re-
 medio est. Immistā vino ebrietatem facit. Regium
 morbum sistit tribus drachmis pot. & cum passo, aut
 diluta mulsā. Sed oportet eū qui bibit cubiculo ca-
 lido reclinare, multis vestibis cōtectum, quō sudet.
 Eiectus verō sudor felleus colore inuenitur. Succus
 eius ad purgandum caput, naribus instillatur. Sedi
 etiam ad deiciēda excrementa in lana subiicitur.
 Umbilico, imo ventri & coxæ illitus succus alium
 mollit, verū abortum efficit. Suffusus & hebetis-
 bus oculis inunctus cum melle succus prodest. Me-
 dicamentis abortum inferentibus admiscetur. Sedē
 precedentem cum aceto inunctus succus compefcit.
 Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassiti-
 tudinem decoquitur. Radix cutem extergit. Exan-
 themata reprimit. Vulneribus per se ex aceto aut
 melle medetur. Allita lienem minuit. Vitia cutis in
 facie à sefe & alopecias emendat. Decocto eius lus-
 xata, podagra, & capitis vlenscula, pernionesque
 utiliter fouentur. Ipsaq; in vetere oleo feruesacta,
 ad cicatricem perducit quæ oleo illo inuncta fue-
 rint. Canata radix oleo expletur, & cineri feruens-
 ti imponitur, adiecto interdum thyrrhenica cera
 modico, vt strigmenti crassitudinem contrahat vni-
 guetum, cum primis vtile pernionibus. Radix Scila-
 le

PLANTARVM HISTORIAE

la modo concisa reponitur. Narrant ad amatoriam assumi contusam, & in pastillos conformatam.

EX GALENO.

Cyclaminus varias vires obtinet, nã et extergit, & incidit, & ora venarũ aperit, et attrahit, & discutit. Clarũ verò id est ex particularib. operibus. Nã succus eius hamorrhoidas reserat, violenterq; ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasq; durities discutietibus commiscetur, ac suffusis cũ melle illitus cõpetit: ad hæc quoque per nares expurgat. Addeò est vehemens eius facultas, vt abdomine illito ventrẽ subducatur, & foetum interimat. Nã & alioqui validũ interimendo conceptui medicamen est, in pessa addita. Tota verò radix succo imbecilior est, quãquam & ipsa vehemens sit. Nã & menses siue epota, siue apposita euocat, & regio morbo prodest. nō modo ipsum viscus expurgans, sed etiã quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens. Proinde à potione omnibus modis sudoris adiuvanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem extergit cùm in aliis, tum quòd alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curet. Lienẽ quoque induratum iuuat illita, tum recēs, tum arida. Sũt qui radicem siccam asthmaticis exhibeãt.

EX PLINIO.

Cyclamini radix cõtra serpentes omnes bibitur.

In omnibus ferenda domibus, si verum est, ubi sata sit, nihil nocere mala medicamenta: amuletum vocant: narrantq; ea ebrietatem representari, addita in vinum radice. Et siccata Scilla modo cōcisa reponitur, decoquiturq; eadem ad crassitudinem mellis. Suum tamen venenum inest ei, traduntque se prægnans radicem eam transgrediatur, abortū fieri. Radix denique tribus drachmis bibitur in loco calido, & perfrictionibus tuto: sudores enim fellicos mouet.

DE CYPERO. CAP. CLXXII.

Cyperus nobis Souchet, fortè à radice quam Galli souche vocant, cuius vis & usus est præcipuus.

NOMINA.

Kύπερος ἢ κύπερος Græcis, Cyperus & Cypirus Latinis dicitur. Quñ enim Græci quādoq; diphthongo, vt Theophrastus, quandoque vocali breui, quemadmodum Dioscorides, Galenus et alij quidam, penultimam scribant, sit vt aliqui, c, alij verò i retineant. Poetæ qui e ex diphthongo retinuerūt, meritò penultimam in Cypero producūt. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Germanis Vuilder Galgan (Gallicè Souchet) vocatur.

FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, gracilior & solidiora. Caulē cub: talem, & nonnunquā altiore, angulosum, schæno similem, in cuius cacumine

PLANTARVM HISTORIAE

eumine minorum foliorum ac seminis productio est. Radices illi subsunt, quarum usus est, oblonga, oliuarum modo sibi inuicem commissa, aut rotunda, nigra, suauiter olentes, & amara: vel, ut Theophrastus delineauit, inaequales, partim crassae, carnosaeq; partim graciles atq; surculosa. Ex qua descriptione omnib. esse perspicuum arbitramur, stirpem cuius nunc picturam damus esse Cyperum. Si quidem folia fert porracea, longiora, exilioraq; caulem altitudine cubiti, aut altiore, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quae semen residet. Radices huic sunt oblongae, oliuarum modo inter se connexae ac inuicem implexae, aut rotundae, nigrae, iucundè spirantes, gustu amarae. Praeterea magna inaequalitate notantur, quod pars quaedam crassa carnosaque, quaedam gracilis atque ligerosi sit. Nemo enim non videt radicis tenuitatem surculosam protinus in oliuaria tubercula verticillari. Nascitur quoque è latere huius radícula, quod Theophrastus etiam notauit, unde cauliculus erumpit alius, ut pictura affabre monstrat.

LOCVS.

Nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania certè non nisi cultus in hortis prouenit.

TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit.

TEMPERAMENTVM.

Cyper.

*Cyper*i radices maximè vsui sunt, ex calfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radici *Cyper*i calefaciendi vis inest, vrinamq; mouendi. Calculosis & aqua inter cutem correptis pota succurrit. Aduersus scorpionum ictus remedio est. Refrigerationibus vuluæ & præclusionibus fortis auxiliatur. Pellit menses. Arida trita oris vlceribus, etiam si depascent, prodest. Malagmatis calefacientibus miscetur, & vnguentorum spissamentis accommodatur.

EX GAIENO.

*Cyper*i radices maximè vsui sunt, ex calfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem. Itaque vlceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirificè prosunt: habet enim quiddam etiam adstringens, quapropter vlceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi vim quam illis inesse testificandum, quæ & calculo vexatis congruunt, & vrinam mensesq; mouent.

EX PLINIO.

Cypero vis in medicina psithyræ. Illinitur pterygiis, vlceribusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlceribus. Radix aduersus serpentium ictus & scorpionum præsertim remedio est. Vuluas aperit pota. Largiori tanta vis, expellit eas. Vrinam ciet & calculos: ob id utilissima hydropicis. Illinitur & vlceribus quæ serpunt, sed

PLANTARVM HISTORIAE

his præcipuè quæ i stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Iunci radix in tribus heminis aquæ decocta ad tertias tussi medetur. Semen tostum & in aqua potū, sistit aluum & feminarum mense, capitūq; dolores facit.

DE LATHYRI. CAP. CLXXIII.

Lathyris nobis à purgandi violentia Espurge dicitur.

NOMINA.

Cataputia minor, quod in pilulis quibusdā, sen-
 Catapue
 tia minor
 quare di-
 sta.
 taputia minor, quod in pilulis quibusdā, sen-
 potius catapotiis, semē ferat, aut, quod verisimilius
 est, quia granis eius ad aluum subducendam pro ca-
 tapotiis utantur. Germani Springkraut, Spring-
 korn oder Treibkorn (Gallicè Espurge)
 appellant, quod semen scilicet nisi in tempore aufe-
 ratur, sua sponte ex loculamentis saliendo excidat.

FORMA.

Caulē præfert cubitalem, vacuum, digiti cras-
 situdine: in eius cacumine sunt alæ. Folia in cau-
 le oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen
 & leniora. Quæ vero in summis sunt ramulis,
 minora, Aristolochia aut oblongæ Hederae figu-
 ra. Fructum fert in summis ramis tribus locu-
 lamenti distinctum, rotundum cœu Capparinæ,
 in quo ternæ sunt semina putaminibus inuicem di-
 scereta, rotunda, maiora, cruis quæ quum corticia
 bus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Ra-

dix

dix illi tenuis & inutilis. Totus autē frutex lacteo liquore, Tithymali modo, plenus est. Hęc certē de Cataputia scriptiōē, si singula cōparare velis, ita Cataputia tiam minor minori quadrare inuenies, vt nulla prorsus sit nota quam nō pictura referat. Nā hęc caulem cubitali emittit longitudine, & digitali crassitudine. Gignūtur in fastigio alae, & folia in caule oblonga, amygdale proxima, latiora & leniora. Quae autem in summis emicant ramulis, minora iis quae caule ambiant conspiciuntur, Aristolochiae aut longioris Hederae figura. In cacuminibus fructum gerit triplicem cellula conceptaculo ve distinctū, cū Capparin rotundum, in cuius ventriculis grana tria intercursantibus membranis diuisa continentur, cruus maiora, rotunda, quae corticibus exuta alba spectantur, gustatu dulcia.

LOCVS.

Nascitur locis cultis & sabulosis.

TEMPVS.

Carpitur autumnō dum fructu pragnans est, seminaq; eximitur dum tunicula quibus includitur, inaruerunt.

TEMPERAMENTVM.

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Purgant aluum grana eius sex vel septem sumpta in catapotio, aut comesta, aut cum caricis aut palmulis deuorata, frigida superpota aqua. Ducunt

PLANTARVM HISTORIAE

autem pituitam & bilem, & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum praestat. Folia cum gallinaceo aut oleribus decoquuntur ad eodem effectus.

EX GALENO.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali esse speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, vniuersaq; illis facultate similis sit, nisi quod semē gustantibus videatur dulce: quod sanē etiā maxime purgatoriā vim obtinet.

EX PLINIO.

Grana vicena in aqua pura aut mulsa pota, hydropicos sanant. Trahunt & bilem. Qui vehementius purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stomachum ledunt: itaque inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacei sumerentur.

DE LEVCOIO DIOSCORIDIS.

CAP. CLXXIII.

Leucoia nobis à caryophylli in floris figura, & acrimonia Gyroflée dicuntur, & vñ genus luteū officinis cum Mauris Keiri.

NOMINA.

Viola alba.

Cheiri.

Lευκόιον Græcis, Viola alba, vel Viola simpliciter Latinis, officinis Mauritana voce Cheiri vel Keirim appellatur, Germanis Veiel (Gallicè Gyroflée,) Non autem temere adiectum est Dioscoridis: hac enim voce à leucoio Theophrasti, de quo suo loco dicemus, segregare volumus.

G E N E R A.

Etsi Leucoij nomine Viola significetur c  dida, tamen & pro lutea, & c  rulea, & purpurea solet vsurpari. Quatuor itaq; Viola huius sunt genera, qu   sola florum diuersitate inter se differunt. Alia Viola pur enim candida, alia lutea, alia purpurea. Non est ta purca dumen qu  d per purpure   h  c intelligas c   qu   Gra plex. cis   op, & Latinis propri   Viola dicitur: nam eius alia ab ea de qua h  c agimus familia est, huicque tum qualitate t   facultate, adde eti   forma, c  traaria. Ea enim qu     op Gr  cis vocatur, humilis est, ob id    n  nullis Sessilis dicta, & latiore folio. Contra nostra illa, vt mox dicemus, cubitali est altit  dine, & minim   sessilis. Idem de candida dict   pu Viola can tes, n   ea quoque duplex est: vna de qua h  c fit ser dida duo mo, alia sessilis, de qua in pr  sentia nihil dicemus. plex. Nos tria d  taxat genera picta damus: c  ruleas enim videre n   licuit. Quare supposititi   hoc verb   in Dioscoride puto, maxim   cum Plin. lib. xxi. vbi de satiuis Violis loquitur, purpurea scilicet lutea & alba, nullam de c  rulea mentionem fecerit.

F O R M A.

Cubitali altitudine profiliunt, ramosa, caule Brassica exiliore, folio longo, molli, canescente, flore quadrifolio, Viola syluestris odorem referente, non vnus coloris, nam al   candidi, al   lutei, al   purpurei. Semen foliaceum tenuibus quidem, sed quincuncialibus, siliquis continetur.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Vbiq̃ue ferè in hortis & cultis reperiuntur. Nō enim nascuntur magna ex parte nisi sata fuerint.

TEMPVS.

Primo vere & Maij potissimum mense, inter flores emicat Leucoion. Hoc itaque tempore flores capendi. Semen inter æstatis initia profert.

TEMPERAMENTVM.

Leucoion abstergentem facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno autore, proinde vt calidum sit necesse est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lutea in medicina præcipui vsus est Huius flores aridi efferuefacti in desectionibus, contra vuluæ inflammationes valent, & menstrua educunt. Cetrato excepti rimas sedis sanant: cum melle oris vlcera. Semen eius duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle appositum, menses, secundas & fetus educit. Radices cum aceto illitæ, reprimunt lienem, & podagricos iuuant.

EX GALENO.

Leucoii frutex vniuersus extergentem facultatem obtinet, ac tenuium partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciores magis etiā quā virides, aded vt & oculorum crassas cicatrices extenuent. Tum menses quoque decoctum eorum mouet, & secundas, fetumq; emortuum elicit, & si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum

ut si quod aliud amarū. Quod si quis viriū eius ve-
hemētiā multa aqua a lniſta mitiget, aut certē id
genus aliquo, habebit & ad phlegmonas bonū me-
dicamentum. Sic decoctum eius si non merū fuerit,
uteri phlegmonas identidem perſuſum ſanat, potifſi-
mum quæ diutino tempore ad ſcirri modū indu-
rūere. Sic cum cerato vlcera egrē ad cicatricē per-
uenientia curat. Sunt verò etiā qui cum melle ad
oris vlcera adhibeant. Semen quum eiusdem ſit fa-
cultatis, aptiſimū eſt duarum drachmarum menſu-
ra potum, tum menſibus ciēdis cū melle appoſitum
conuenire creditur, ſæctumq; vinētem interficere ac
mortuum eijcere. Radices ſimilis quoque facultas-
tis, niſi quatenus craſſioris ſunt eſſentiæ, & magis
terrenæ, cum aceto lienes induratos ſanant. Nōn-
li verò & phlegmonas induratas iis curant.

EX PLINIO.

Extenuant, menſtrua & vrinam ciunt. Minor vi-
eſt recentibus, ideoq; aridis poſt annum vtendū. Lu-
tea dimidio cyatho in aqua tribus, menſes trahit.
Radices eius cum aceto illitæ ſedant lienem. Item
podagram, oculorum inflammationes, cum myrrha
& croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera,
cum cera rimas ſedis, & quæ in humidis ſunt. Ex
aceto verò collectiones ſanant.

DE LAPATHO. CAP. clxxv.

Oxylapaton à lapato, vulgus Lapatiēce &
Parelle. Secundū genus Lapatum, rotun-

PLANTARVM HISTORIAE

dum vulgò dictum videtur, aut ei affine rhabarbarum cartusianorum. Tertium genus est oxalis, Turonice nobis dicta. Quartum oxalis vulgaris, nomen Parisiis oxale retinens.

NOMINA.

Lapathii **Λαπάθιον** Græci, Rumicem Latini, barbari
v. de di- **Λ**apathium vocant. Lapathum autem ab effe-
ctum. ctu nomen accepit, quòd scilicet exinaniat: etenim
Λαπάθιον vacuare vel exinanire Græcis est: om-
Λαπάθιον nium siquidem generum foliis decoctis alius mola-
Λαπάθιον litur.

GENERA.

Primum. Huius quatuor genera facit Dioscorides. Primum
Lapathii oxylapathon Græcis & Latinis dicitur. Officinæ
acutum. Lapathium acutū, Germ. Mengeluurtz Grind-
uurtz, Streyffuurtz, Zitteruurtz, Vuildamp-
ffer (Gallicè De la parelle, ou de Lapacièce)
nominant. Oxylapathum, quamvis anceps in acidū
saporem vel acutam figuram videatur significatio,
tamen nomē hoc à foliis quæ in mucronem desinūt
Secundū. accepisse videtur. Secundum genus hortense prio-
ri dissimile, non quidem in vniuersum, sed dunta-
taxat in foliis, quæ Serapione teste, multò sunt latio-
ra. Hoc genus haud dubiè est Rhabarbarum mona-
chorum, quod passim hodie in hortis plantatur: Ox-
ylapathum enim per omnia ferè simile est, folia ta-
men latiora obtinet, & ob cultum paulò tenerius
est. Cum autem primū erumpunt folia, purpurea
ferè sunt, dein quotidie viridiora fiunt, v. pictura
ipsa

ipsa monstrat. Tertium sylvestre, paruum, plantagi Tertium.
 ni simile, molle & humile est, quod vulgato nomi-
 ne bonus Herichus, Germanicè guter Heinrich
 dicitur, id quod ex forma primum colligitur: folia
 enim eius oxalidi, nisi quòd ampliora sunt, atque
 adeo ad plantaginis nonnihil accedunt folia, simi-
 lia sunt. Flores autem eius & semen sic Oxylapa-
 thum referunt, ut vix ab invicem discerni queant.
 Dein vires etiam conveniunt: vulneraria enim her-
 ba est Bonus Heinrichus, ac mirificè ad sordida pur-
 ganda, ac glutinanda ulcera confert, sic ut appensa
 etiam, ac trita vulneribus imposita, vermes qui in
 iis nati sunt excidere faciat. Quartum genus Græ-
 ci ὄξυλιθόν, Latini Oxalidem, officinæ Acetosam, Quartum
 Germani Saur Ampffer nominant. Oxalis autem Acetosa.
 ideo dicta est, quòd in gustu acorem planè respiciat,
 unde etiam vulgus Acetosam vocavit. Hanc pro-
 priè Romani appellarunt Rumicem, forsitan quòd Rumex
 ab ea succus non aliter atque mamma, quam Ru- unde di-
 men veteres dixerunt, sitientibus exungi soleat. Ga- eta.
 lenus tria tantum genera Lapathi facit, Oxalidè,
 Oxylapathon & Hippolapathon, quòd sic Græci
 quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisque Hippo-
 rebus hippo præponere soliti, ab equo excellētis am-
 plitudinis animali magnitudinem mutuantes.

FORMA.

Oxylapathum foliis duris & in cacumine acu- Oxylapa-
 tis, semine herbaceo acuminato ex minutissimis thi.
 peidis

PLANTARVM HISTORIAE

pediculis dependente, radice longa & lutea vel potius crocea. Secundū genus Oxylapatho perquam simile est, foliis tamen latioribus ac tenerioribus constat, caule bicubitali interdum, striato, floribus exiguis, luteis, semine vt Oxylapathō triangulari, radice longa & lutea seu crocea. Tertium genus, quod vulgus hodie Bonum Henrichum vocat, folium Oxalidi, latius tamen, aut Aro, vel vt Dios-

Oxalidis. scorides inquit, plantaginī ve simile obtinet. Aliqua enim Ari, aliqua autem plantaginis folia referunt. Caulem prioribus duobus humiliorem, in quo flores & semina racematim multa dependent. Radicem verò longam & subsluam. Oxalis autem folia sylvestri & paruo humili ve Rumici similia habet. Caulis eius non adeò grandis est, sesquicubitus altus. Semen acuminatum, rubrum, quod foliaceo vestitur involucrio, sapore acri, quod in caule & ad nascentibus coliculis nascitur.

LOCVS.

Oxylapathon in palustrib. & circa fossas potissimum nascitur. Secundum genus hodie in multorum hortis cōsūtum prouenit. Tertium passim in arboribus, sepibus & circa itinera crescit. Oxalis in omnibus pratis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Aestate antequam prata demetantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recens

Recentiores Acetosam statuunt esse frigidam & siccam in secundo. Atqui quale huius & reliquarum Rumicum sit temperamentum, ex facultatibus earundem, quas mox dicemus, facile deprehendent studiosi. Secundi generis Rumex in foliis manifestissimam aciditatem ostendit, ut hinc etiam conicere liceat esse Rumicem, utcumque monachi & cum iis multi quoque medici, Rhabarbarum esse contendunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium Rumicum olus decoctum alium molli-
lit. Crudum illitum cum rosaceo aut croco melice-
rides discutit. Semē sylvestris & Oxylapathi et Ox-
alidis cum aqua aut vino utiliter contra dysente-
rias, cœliacos affectus, stomachi fastidia, scorpio-
numq; ictus bibitur. Si quis etiā in potu presumat,
nihil ictus patietur. Radices ipsarū ex aceto et cru-
da illite, lepras, impetigines, scabrososq; ungues sa-
nant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfric-
candus est. Pruritus decoctū earum sedat, si eo fo-
ueantur. Coctæ in vino si cum iure colluantur, au-
rium dentiumq; dolorem mulcent. Strumas paroti-
dasq; discutunt si cum vino decoctæ illinantur. Lie-
nes autem cum aceto. Aliqui utuntur radicibus cō-
tra strumas, vinculo collo eas appendentes. Tritæ
& appositæ fieminarum fluxiones sistunt. Deco-
ctæ cum vino & potæ regio morbo correptos emē-
dant. Calculos vesicæ comminuant. Menses cient.
Scorpionum

PLANTARVM HISTORIAE

Scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon easdē ante dictis Rumicū generibus vires obtinet.

EX GALENO.

Lapathum moderatē digerentem facultatem habet, oxylapathum verò mistam: nam simul cum eo quod digerit, nonnihil quoque reprimendi facultate participat. Semen eorum manifestam quandam adstrictionem obtinet, ad eō ut & dysenterias, & alui profluvia sanet, potissimum autem oxylapathi. Hippolapathon easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

EX PLINIO.

Sylvestria Lapatha scorpionum ictibus medentur, & ferire prohibent habentes. Radix aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur: si verò bibatur, morbo regio. Semen stomachi inextricabilia vitia sanat. Hippolapathi radices priuatim vngues scabrosos detrahunt. Dysentericos semen duabus drachmis in vino potum, liberat. Oxylapathi semen lotum in aqua cœlesti, sanguinem reiicientibus, adiecta acacia lētis magnitudine, prodest. Præstantissimos pastillos faciūt ex foliis & radice, addito nitro & iure exiguo. In vsu aceto diluunt. Sed satinum in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice melicerias & lepras curant. In vino verò decocta, strumas & parotidas & calculos. Poto vino & lienes, cœliacos aquē & dysentericos & tenasmos. Ad eadēq; omnia efficacius ius Lapathi.

& ructus facit, & vrinam ciet, & oculorum caliginem discutit. Item pruritū corporis, in folia balnearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & commanducata dentes. Eadem decocta cum vino, sistit aluum. Folia solum adiecto sale.

APPENDIX.

Alterius generis Rumicis, qui Rhabarbarū mos Rhabarnachorum vocatur, radix purgandi etiam vim obbarimona tinct, si in puluerem redacta drachmæ pondere suffocorū factatur. Neque id mirum admodum, cum etiā Dioscorides ipse omnium Rumicum olus decoctum aluum mollire, atque decoctas eorundem radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimium per inferna educationem, testetur.

DE LIMONIO. CAP. clxxvi.

Limonium nobis frequens officinis nomen non habet.

NOMINA.

Λεμόνιον Græcis, Limonion, Beta sylvestris & Tintinabulum terra Latinis, vulgo Pyrola, Germanis Vwintergrun, Holzmangoldt, Vualdmangoldt, oder Vualdikol (Gallis Limonia, ou Bette de pre, ou bette sauvage,) apud nostros vnpellatur. Beta autem sylvestris hæc herba dicta est, de dicta. quod in syluis & locis muscosis, hortensi Beta primum erumpenti haud dissimilis, proueniat. Tintinabulum, à floribus eius tintinabulo similibus. Pyrola, quod eius folia arboris pyri folio similia sint. Pyrola.

FOR-

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Folia Betae similia habet, tenuiora tamen & minora, decem, aut plura. Caulcm tenuem, rectum, lilio aequalcm, semine rubro, gustuq; adstringente plenum. Ex qua siquidem descriptione abunde liquet, herbam quam vulgus Pyrolam vocat esse Limonium. Foliis enim Betae similis est, verum tenuioribus & minoribus (legendum enim in Dioscoride μικρότερον & non μακρότερον, Plinio lib. vigesimo, capite octauo, teste) decem, interim pluribus. Caulc tenui, recto, lilio simili, pleno seminis rubri, quod gustu adstringit. Quibus accedit quod germanice Vualdmangolt, id est, Beta sylvestris nominatur. Neque vires discrepant: adstringit enim, vulnerariaq; herba est Pyrola, haud secus atque Limonium. Flores denique tintinabulo similes sunt, ut citra vllum discrimen Pyrolam Dioscoridis esse Limonium assencrare liceat.

LOCVS.

In vmbrosis & sylvestribus prouenit locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu vehementer adstringunt, ita in tertio ordine siccitatis illud recte recentiores collocent.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen tritum in vino potum acetabuli mensura, dysenteria

CAPVT CLXXVII. 256

dysentericis ac celiacis auxiliatur. Rubrum fecm-
inarum profluvium sistit.

EX GALENO.

Limonii semen vipote austrum, celiacis, dysen-
tericis & sanguine spuentibus cum vino exhibent.
Inuat & profluvium muliebre. Satis autem est a-
cetabuli mensura.

EX PLINIO.

Huius folia ambustis viilia, guttantia adstrin-
gunt. Semē acetabuli mensura dysentericis prodest.
Aque è radice cocta maculas vestium eluere di-
cuntur, itémque membranarum.

EX RECENTIORIBVS.

Pyrolæ decoctum interna & externa vulnera
potum sanat. Item sifulus ac aliis malignis vlceri-
bus medetur.

DE LAMIO. CAP. CLXXVII.

Lamiū vrtica alba à flore vulgo dicitur.

NOMINA.

L Amium Plinio lib. xxi. cap. xv. & lib. xxij.
cap. xiiij. vocatur. Vulgo vrtica iners & mor- Archange-
tua. Sunt qui albam Vrticam nominant, & Ar- lica.
changelicam. Officinis inusitatum, Germa. Todt Vrtica
nessel, oder Taubnessel (Gallicè Ortie mor- mortua
te, ou ortie blanche) dicitur. Iners & mortua quare di-
cognominata, quòd foliis non mordentibus sit, & Ela.
mitissima.

GENERA.

Vrtica.

PLANTARVM HISTORIAE

Vrtica mortuae tria inueniuntur genera. Vnum albis, quod propriè *Lamium* dicitur: alterum luteis, & tertium purpureis floribus constat. Nos, quia solis floribus differunt, nec in eorum foliis aliquod discrimen apparet, vna iconè omnia tria complexi sumus genera. FORM A.

Foliis constat *Vrtica* pungentis, minoribus, simbratis, candidioribus, lanugine nequaquam mordaci, caule quadrangulo, flore albo, luteo, aut purpureo, radice ex interuallu cincinnis capillata. Graui odore tota fragrat. Innoxia est & morfu caret. Semen in caulibus per interualla copiosum & nigrum profert. LOCVS.

Pasim circa semitas & sepes nascuntur.

TEMPVS.

Vere primo, Maio potissimum mense, floribus abundat, & tota ferè estate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est *Lamium*, veluti etiam alia *Vrtica* genera, id quod ex gustu, eiusq; facultatibus deprehenditur.

VIRES. EX PLINIO.

Medetur cum mica salis contusis incussisq; inustis et strumis, tumoribus, pedagris, vulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis *Vrtica* radice alligata in tertianis, ita vt agri nuncupentur cum eruitur ea radix, & dicatur

dicatur qua, & cui, & quorum filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quarantanas pollere. Iidem radice vrticæ addito sale, infusa corpori extrahi. Foliis cū axungia strumas discutiti, vel si suppurauerint, erodi compleriq̃.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inerti Vrtica vtuntur sistendo ruentis è naribus sanguinis impetu, imæ cervici vel scapulis alligando, inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlceribus denique, putredinibus & fistulis mirificè conferre, ac medicari tradunt.

DE LINO. CAP. CLXXVIII.

NOMINA.

Lίνον Græcis, Linum latinis & officinis, Germanis Lein, oder Flachsz (Ga. Du Lin) appellatur.

FORMA.

Herba est tenui caule, foliis angustis, oblongis, et in summo acuminatis, floribus cæruleis, speciosis, quibus deciditibus folliculus enascitur in quo semina continentur fulua.

LOCVS.

Gaudet pingui solo & modicè humido. Agri autem noxiū est, deteriores enim eos facit, id quod in carminibus in Georgicis significauit Virgilius:

Vrit enim lini campum seges, vrit auena,

Vrunt letheo persusa papauera somno.

Linum
agris no-
xium.

K TEM

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Vellitur astate vbi maturitatem consecutum fuerit, quæ sane duobus argumentis intelligitur, intumescente semine, vel flauescente colore.

TEMPERAMENTVM.

Est in primo ordine calidum, ac humiditatis & siccitatis quodammodo in medio situm.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen Lini eandem Fænograce facultatem obtinet. Omnem intus foriꝑ; inflammationem discutit & emollit, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie crudum, varosque cum nitro & fici illitum. Cū lixiuia autem parotidas, duritiesque discutit. Herpetas in vino decoctum, & fauos purgat. Vngues scabros cum pari modo Nasturtii & mellis eximit. Cum melle vice eclogmatis sumptū, ea quæ in thorace sunt educit. Tussim lenit. Venæ rem stimulat si cum melle & pipere mixtum pro placenta largius sumatur. Huius decoctum intestinorum vteriꝑ; erosionibus iniectum medetur, adq; excrementorum eductionem prodest. Ad vuluæ inflammationes in defæctionibus haud aliter quàm Fænigræci perquam vtile est.

EX GALENO.

Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeò sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus tamen quæ circa hypochondria sunt, vt
si quid

si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar opsonii non secus ac factitio sale cum garo utuntur. In usu est & melle conspersum. Inserunt nonnulli panibus quoque. Stomacho & concoctioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec vituperandum, perexiguam tamen vim mouende vrinae tenet, quae in tosto efficacior est. Idem quoque aluum magis sistit. Rustici saepenumero torrefacto adiecta portione mellis utuntur.

EX PLINIO.

Lini semen cum aliis quidem in usu est. Et per se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorum acie succo adiunat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha. Cum vino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomachi solutiones inspersum polenta modo. Anginas in aqua et oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur ut aluum sistat. Celiacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecinoris dolores estur cum vna passa et ad phthisim utilissime. Semine sunt & ecligmata. Musculorum, nervorum, articulorum, ceruicium duritias, cerebri membranas mitigat farina seminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit ac maturat. Cum radice vero cucumeris syluestris extrahit quaecumque corpori inhaerent. Sic et fracta ossa. Serpere ulcus in vino decocta prohibet. Eruptiones pituita cum melle emendat. Ungues scabros

PLANTARVM HISTORIAE

cam pari modo Nasturtii, & testium vitia, & ra-
mices cum resina & myrrha, & gangranas ex a-
qua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextariis
vtrisque decoctis in aqua mulsa. Intestinorū et tho-
racis pernicioſa vitia, clyſtere in oleo & melle.

DE LICHENE. CAP. clxxix.

NOMINA.

Hepatica
Lichen
quare di-
cta.

Hepatica
quare.

Λειχην Græcis, Lichē latinis, officinis & her-
bariis Hepatica, Germ. Stein, oder Brunn-
nenleberbraut dicitur. Lichenā autem Græci &
latini nominauerunt, quod contra Lichenas omni-
bus remediis anteponatur; aut à re ipsa nomen de-
derunt; quoniam saxa quibus hæret linguae modo
lambat. Hepaticam verò recentiores vocarunt,
quod iecinorum fibris similis conspiciatur.

FORMA.

Folio succi pleno, crasso & oblongo constat, roru-
lentis petris adherente, sub quo cauliculi, pedicula-
rum forma, capitula stellata habentes, exeunt.

LOCVS.

Nascitur in roscidis & grauitè olentibus saxis.

TEMPVS.

Iulio mense ea qua picta est forma decerpitur.

TEMPERAMENTVM.

Abstergentem ac modicè refrigerantem faculta-
tem, vtrunque verò resiccantem habet. Abstergentem
quidem atque exiccantem à petra, refrigeran-
tem autem ab aqueo humore.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Lichen illitus sanguinis eruptiones sistit, et inflammationes compescit. Impetigines sanat. Inunctus cum melle regio morbo affectis prodest. Oris & lingua defluxiones arcet.

EX GALENO.

Lichen qui in petris nascitur, est veluti muscus quidam, sed recte ex plantarum genere censi potest. Sic nominatus videtur, quod lichenas seu impetigines curet. Extergentem & mediocriter frigidam facultatem obtinet. Porro quod ex talibus substantiis componitur, aduersum esse inflammationi nihil mirum est. An vero sanguinis eruptiones sistat, ut Dioscorides ait, id nequaquam dicere queo.

EX PLINIO.

Sanguinem sistit vulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle sanat ore illito & lingua. Stigmata etiam delet.

DE LINOZOSTE. CAP. CLXXX.

Λινόζωσις, ἢ ἑρμού βοτάνιον, ἢ πῶα Graecis, Mercurialis latinis & officinis dicitur. Mercurialis. Germanis Bingelkraut, Mercuriuskraut, oder Kuurtz, (Gallis Mercurialle) Mercurialis dicta est, quod à Mercurio inuenta sit. Mercurialis cur dicta.

GENERA.

Duo eius genera, mas & femina, quae facile ex eorundem descriptionibus discerni poterunt. Folia vero maribus nigriora, feminis candidiora.

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Mercurialis folia Ocimo similia habet, ad Helixines foliorum figuram accedentia, minora tamen. Ramulos geniculatos, alarum caua multa & densa habētes. Foemina semen fert racemosum & multum. Mas verò iuxta folia exiguum rotundum, geminorum testicularum modo connexum. Totus frutex dodrantalis, & nonnunquam maior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus cultis, vinetisq; aliquibus locis tam copiosa & efficax, vt sapore suo vena etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat.

TEMPVS.

Augusto mense semine pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam in primo ordine esse asserūt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraque aluum mouet olerum modo comesta. Cocta in aqua & epota aqua, bilem & aquosa ducit. Creduntur praterea foeminae folia trita & pota, aut post purgationem pudendis apposita, vt foeminae concipiantur efficere. Mascula verò similiter adhibita, mares progenerare.

EX GALENO.

Mercuriali omnes duntaxat ad ventris purgationes vtuntur. Verum enim verò si quis eius facere periculum volet in cataplasmate, sanè digerentis admodum facultatis esse exspectetur.

EX PLINIO.

Mirum est quod de utroque eorum genere proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut feminae illam. Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturve folia decocta ex oleo et sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fictili cum heliotropio, & duabus aut tribus speciebus, donec decoquatur. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo altero die purgationis mulieribus per triduum, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu prædicauit illas. Easque ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas vulua cum melle, vel rosaceo, vel irino, vel lirino admonit. Item ad ciendos menses, secundasque. Hoc idem præstare potu. fortiusque dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Alio folia imposuit, epiphoris, stranguria & vesica. Decoctum eius dedit cum myrrha & thure. Alio quidem soluenda, vel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aquae ad dimidias, bibitur sale & melle admixto: necnon cum uingula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui utranque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum ledunt.

DE LIBANOTIDE CORONARIA
CAP. CLXXXI.

K iij Rosma

PLANTARVM HISTORIAE

Rosmarinum coronariam tantum pingit,
quod passim luxuriet.

NOMINA.

Rosmari- **Λ**ιβανωτῖς, Græcis, Rosmarinus latinis &
nus. officinis, Germanis Rosmarin, (Gallis Ros
Libano- mario) appellatur. Libanotis verò dicta est, quod
tis cur di- odorem thuris reddat. Libanotida autem non eam
Eta. quæ simpliciter sic nominatur à Græcis intellige,
Libanotis appellatur. **FORMA.**

coronaria. Rosmarinus qua nectentes coronas utuntur, vir-
gas habet tenues, circa quas sunt folia tenuia, cre-
bra, oblonga & gracilia, intus candidatiora, exterio-
re autem parte viridia, grauiter odorata. Florem,
quod Dioscorides omisit, in candido cœruleum, ra-
dicem nigram, multis fibris capillatam.

LOCVS.

Hodie passim in hortis & scitilibus vasis plāta-
tur. In Narbonensi autem Gallia sua sponte proue-
nit tam copiosè, ut eius incolæ aliud lignum non
vrant. **TEMPVS.**

Carpitur Maio mense & deinde vsque ad Sep-
tembris medium. Florétque bis annuatim, vere
& autumnno.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gustu & viribus
conicere quisque poterit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calo

Calfacit. Regium morbum sanat, si quis eam in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendam dederit, dein post exercitia lauerit, & vino potauerit. Miscetur etiam acopis, & musto oleo.

EX GALENO.

Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quæ Romani Rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis sunt participes.

APPENDIX.

Recentiores Rosmarinum suffitu tuſſim & distillationem sedare tradunt. Et quod in primis nobile, tutam præstare in pestilentia domum crematam, nidore improbam aeris diluentem perniciem. Adiiciunt & alias facultates, eas nempe: Rosmarinus corroborat cerebrum, sensus interiores, memoriã & cor. Succurrit tremori, resolutioni q; partium. Loquelam amissam reparat, & alia multa potest, quæ commemorare superuacaneum est.

DE LIGVSTRO. CAP. CLXXXII.

Ligustrum tronia officinis dicitur.

NOMINA.

Ligustrum Plinio aliisque latinis nominatur. Officinis inusitatum, Germanis Beinholtzlin, Mundtholtz, Rein oder Schuluueidem, (Gallis Du Troesne) dicitur. Quo autem nomine Græcis appellatum sit, nondum certo nobis constat:

PLANTARVM HISTORIAE

Ligustrū stat: neque enim vt fere omnes hodie putant Cy-
 nō est Cy- pros est, quæ Plinio lib. xij. teste, semen habet Co-
 pros. riandri, peregrināque existit arbor. At Ligustrum
 semen non Coriandro simile, quod rotundū ac sub-
 flauum est, sed potius atrum, & altera parte latius
 modicēque concanum in racemis profert. Nec ar-
 bor est peregrina, sed sponte in sepibus & senticetis
Phillyrea ubique prouenit. Mea tamen sententia Phillyrea
 videtur potius apud Dioscoridem erit, quod hæc Cypro cō-
 esse Ligu- gener ac similis sit, easdēque quas Ligustrum fa-
 strum. cultates habeat. Iudicium tamen penes prudentem
 lectorem esse volumus.

FORMA.

Ligustrum arbor est parua, foliis Olea similibus,
 floribus paruulis, candidis & odoratis, racematim
 florentibus, fructibus initio virentibus, processu tē-
 poris nigris, vuarum more congestis.

LOCVS.

Nihil frequentius Ligustro in vepribus occu-
 rit, nihilq; crebrius in dumetis inuenitur, ita vt hoc
 nomine contemptui habeatur. Quapropter huc re-
 spiciens Virgilius in Bucolico carmine, eius flores
 negligi à pastorib. ac inutiliter perire canit, dicēs:
 Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur.

TEMPVS.

Maiο mense floret, autumnο autem cum matu-
 ris baccis nigrescit.

TEMPERAMENTVM.

Est

Et si forma nonnihil à Cypro distet Ligustrum, temperamento tamen eodem est præditum. Eius enim folia & surculi mixta qualitate constant: discutiens enim quiddam cum aquea substantia, modo dicè calida, & quiddam etiã adstrictoriũ ex terrena substantia frigida, & sine morfu sic cãte, obtinent.

VIRES. EX PLINIO.

Succus eius nervis, articulis, algoribus, folia vbi que veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationibus profunt. Acini contra phthiriasim, itẽ contra intertrigines, foliã ve. Sanat & Gallinaceorum pituitas acini.

APPENDIX.

Recetiores Ligustri succũ vlcera oris, veretri que sanare tradunt. Idem etiam posse folia in vino decocta adiiciunt: vt hinc euidentissimũ sit, foliis Ligustri, haud secus atque Cypri aut Phillyreae, adstrictoriam inesse vim, propter quã cõmanducata & decocta, oris potissimum vlceribus opitulantur.

DE LVNARIA MINORE.

CAP. clxxxiii.

Lunaria minor inuentu hic rara, quam nomen herbariis prope omnibus in ore est frequens, tum eius, tum etiam maioris.

NOMINA.

DIu multumq; de huius herba nomenclatura fuimus solliciti, at utcũq; multos itterrogauerimus,

PLANTARVM HISTORIAE

Lunaria
minor.

rimus, tamen aliud nomen quàm idipsum quo nunc appellamus expiscari haud potuimus. Vocetur itaq; Lunaria minor donec certiozem appellationem habere contigerit. Germanicè Klein Monkraut, vt sit ad Latinam nomenclaturam allusio quadã, nuncupetur.

FORMA.

Rotundo est caule, cui folia vtrinq; septē annexa, cordis ferè humani formam habētia: in summitate caulis semen Betæ simile profert.

LOCVS.

Nascitur in montibus. Copiosissimè autem Tunbingæ in pede mōtis Austriaci prouenit. Prope hãc nunquam non Ophris, de qua suo dicemus loco, inuenitur.

TEMPVS.

In fine Maij & Iunio mense inuenitur, dein statim euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustata, atque parum adstringit, vt hinc mediocriter frigidam & siccam esse verisimile sit.

VIRE S.

Vis foliorum eius haud dubiè vulneribus efficax, glutinadi nanque facultate prædita est. Chymicorum nugæ, quibus eius herba vsus frequentissimus est, lubens prætereo. Constat autem experientia, ad suppressendos menses, & album muliebri profluum, mirificè conferre hanc herbam.

DE LEPIDIO. CAP. CLXXXIIII.

Lepidium iam in hortis frequens, tritum
olet sinapi, & illius ac piperis est acrimo-
nia. NOMINA.

Lεπίδιον Græcis, Lepidium Latinis appella-
tur. Vulgus herbariorū Piperitim nominat. *Piperitis*
Quam denominationem sequentes Germani nostri
Pfefferkraut, (Gallorum vulgus Pisse rage) vo-
cant. Nomen verò hoc à pipere traxit, cuius acri-
moniam herba hæc gustata refert. Diverſa est ve-
rò, ut obiter parum attentos moneam, ab ea planta
quam Plinius Piperitim nuncupat, de qua ſuo loco
dicemus copioſè. Sūt qui Lepidiū alio nomine Ra-
phanum nominent, quod non alia ſit ratione, quàm *Rapha-*
quòd herba hæc quòd ad folia attinet, Raphano ſyl-
ueſtri, què Amoraciam alio nomine dicunt, admo-
dum ſimilis ſit. Lepidium verò appellatum, quòd *nus cur di-*
Λεπίδας, hoc eſt, ſquamas & maculas in facie *catur Lea-*
deleat & repurget. *pidium.*
Lepidium
vnde di-
ctum.

FORMA.

Fruticoſum eſt, in cubitalē altitudinem ſurgēs,
foliis laurinis, ſed mollibus, & maioribus. Sic quidē
Lepidion depingit Plinius & Paulus. Vnde ſole cla-
rius ſit, herbam cuius picturā damus eſſe Lepidion:
cubitalis enim & interdum bicubitalis eſt, canle ſo-
lido & rotundo, foliis oblongis & laurinis, maiori-
bus tamen & mollioribus, guſtu piper referentibus
& acribus, magnopereq; linguam vellicatibus, flo-
ribus

PLANTARVM HISTORIAE

ribus candidis, exiguis admodum, semine paruo, radice oblonga. In summa, forma totius herbae Raphano, vt diximus, syluestri similis est.

LOCVS.

In hortis potissimum prouenit, in quibus viuacitatem suam vsque ad multos annos prorogat.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, deinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

In ordine quarto calefacit, vt Nasturtium, exicat autem ipso minus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Salgamorum more, sale cum lacte conditur. Foriorum vis acris & exulceratrix est. Quapropter ischiadicis presenti remedio illinitur, tritum cum radice Inule, & quarta vnus hora parte impositum. Similiter & lienosis prodest. Lepras idē pellet. Radix collo adalligata, dentium dolorem lenare creditur.

EX GALENO.

Facultate Nasturtio simile est.

EX PLINIO.

In facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo facile sanetur. Sic lepras & psoras tollit semper facile, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium adalligatum brachio qua doceat, compescere dolorem.

APPENDIX.

Lepidion

Lepidion crassos & glutinosos cibos & humores extenuare, & incidere valet: ideoq; culinaria est herba, & salsamentis idonea.

DE LEVCOIO. THEOPHRA-
STI. CAP. CLXXXV.

Leucoion Theophrasti à Massario in lib. ix. Plinii deprehensum est, quod nobis circa natalē Christianum etiam summis frigorib. floret passim in syluis, & nūc quoque in hortis quibusdam.

NOMINA.

Λευκόιον Theophrasti hoc loco describimus, quod planè diuersum est à Leucoio Dioscoridis, quod suprà depinximus, id quod tamen plerique etiam docti viri non animaduertunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè Vucisz Hor Viole, nungszblumē, oder Mertzzenblumē (Gallicè ba. Violette, ou Giroflée.) Non autem ab re Viola alba dici cœpit: flos enim huius herbae colorem alba cur dibum, & Violarum odorem refert. Ita.

FORMA.

Folia habet Porro similia, tenuiora tamē & molliora, ex radice bulbosa prodeuntia. Pediculū etiā profert dodrantalem, tenuem ac ferè iuncum, in quo candidus flos est, in medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decidente, capitula Nucis auellanae quantitate erūpunt, in quibus semen Sinapi haud dissimile continetur. Quod si ad

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

si ad hanc descriptionē adhibeas ea quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto, & septimo de stirpium historia tradit, certè sole manifestius erit herbam hanc cuius picturam damus esse eam, quam

Theophrasti alba viola. Λευκὸν ὄπ Theophrastus vocat. Nā hæc prima florum se ostendit. Emicat ubi cælum clementius, statim, etiam non hyeme exacta: ubi verò immitius,

postea. Celeriter quoque enanescit. Radicem denique bulbosam & florē odoratum obtinet. Quæ singula etiam de hac nostra herba verè dici possunt.

Flos Februarij vocatus. Πρῶτη Prima siquidem florum, hyeme etiam nondū exacta, Februario nimirum mense, & die diuo Valentino sacro, ubi cælum clementius fuerit, apparet. In Aprili, ubi appropinquare iam cæperit Maius, enanescit. Flos item eius, Violarum purpurearum prorsus odorem refert. Radix etiam ad Bulbi similitudinem orbiculata existit, vt hoc nomine nemini dubium esse debeat, quin sit Viola alba Theophrasti.

L O C V S.

Prouenit in vmbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò suprâ & infra monasterium Bebenhusum vocatum, ubi copiosissimè nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis.

T E M P V S.

In Februario statim hæc erumpit, vt diximus, herba, & inter initia Martij ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis, vt in altera pictura vides.

T E M P

TEMPERAMENTVM.

Folia ferè qualitatis omnis expertia: radix autem dulcis & glutinosa est, vt hoc nomine adstringat & exiccet, vt reliqui bulbi.

VIRE S.

Digerentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos, habere ex iis quæ commemorauimus satis constat. Tamē nunc nullus, quòd sciam, eius stirpis vsus est.

DE LITHOSPERMO.

CAP. CLXXXVI.

NOMINA.

Λιθοσπέρμον Græcis, Lithospermū Latinis, officinis & medicis hodie omnibus Miliū s= Miliū s= lis appellatur. Germanis Meerhirs, oder Stein= lis. fomen (Gallicè du Gremil.) Nomē à lapidea seminis duritia accepit: neque enim Lithospermon Lithosper aliud sonat. Græcis, quàm lapideum semen. Quum mon vnde itaque semina tanquam calculos ferat, candore & dictum. rotunditate margaritarum, duritia verò lapidea, commodissima voce Lithospermon dictum est. Miliū verò solis recentioribus nominatū puto, quòd semen eius candore solis & lucis splendore fulgeat.

FORMA.

Folia habet Oleæ similia, longiora tamē & la-
tiora, & quæ in ima parte sunt, humi iacent. Ra-
mulus verò rectos, tenues, crassitudine Iunci acuti,
solidos, lignososq;. In quorum cacumine bifidi diuisi

L

ricatiq;

PLANTARVM HISTORIAE

ricatiq; exortus, cauliculorum speciem exhibēt longa habentes folia, inter quae semen lapideum, rotundum, paruum, cruo aequale. Plinius graphiēē cādore & rotunditate margaritas referre dixit. Nostrū autem Lithospermon multo minus quā̄m Dioscorides & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit. Radix etiam Lithospermi, quod adiiciendum esse arbitror, exteriori sui parte rubore perfunditur.

LOCVS.

Lithospermō asperis & sublimibus locis gaudet. Satum etiam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, eoque tempore semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maximē vsus est, calidum & siccum esse faciliē ex eiusdem facultatibus coniicitur. Omnia siquidem vrinā cientia, Galeno libro v. de simpl. medicam. facult. cap. xij. teste, calida & sicca sunt.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Semen cum vino albo potum, calculos frāgit, & vrinam ducit.

EX PAVLO.

Semen cum vino albo potū, calculos conterit, & urinas pellit.

EX PLINIO.

Lapillis

Lapillis eius drachma pōdere potis vino albo cal-
culos frangi pelliq; constat, & stranguriā discuti.

DE LYSIMACHIA. CAP.

CLXXXVII.

Lyfimachia officinis nomen non habet.

NOMINA.

υσιμαχιον Græcè, Lyfimachia Latine,

A vulgò Salicaria, Germanicè Vueider-
rich (Gall. Cornelle, ou soucy deauce

ou Pellebousse) nominatur. Lyfimachia verò ab Lyfima-
chius inuentore Lyfimacho appellata, aut quia vis chia vnde
tanta herba, vt iumentis discordantibus imposita dicta
iugo, asperitatem cohibeat. Quare à dissoluēda dis-
sidētium pugna, non ineptè Lyfimachia videbitur
nominata. Salicaria verò quòd folia salicis, aut Salicaria
quòd inter salices nascatur, dicta est.

GENERA.

Lyfimachia duo esse genera ex Dioscoride & Pli-
nio satis liquet. Plinij enim purpureum florem ha-
bet, hinc nos illam purpuream appellauimus. Ger-
manicè braun Vueiderich. Dioscoridis verò ru-
fos, hoc est, aureos, vt ipsemet interpretatur, flores
obtinet, ideoq; luteam nominauimus, Germanicè
geel Vueiderich. Et hac quidē altera magis ad-
stringit, inq; vsu medico hoc nomine eidē præfere-
nda.

FORMA.

Caules profert cubitales, aut etiam maiores, ter-
mines, fruticosos, quorū à geniculis folia exeunt grā-

PLANTARVM HISTORIAE

cilia, salici similia, gustu adstringentia, flores rufos, aut ad auri colorem declinantes. Ex qua pictura nulli non notum sit, plantas quas pictas damus esse *Lysimachias*. Canles enim emittunt cubitales, & multo quoq; longiores, tenues & fruticosos. Folia etiam habent salicis cum lentore quodam adstringentia. Flores haec rufos, illa autem purpureos habet, ut non contemnendus autor est Plinius. His accedit locus natalis, & alia quae referre non attinet.

LOCVS.

Nascuntur palustribus locis, & prope aquas, potissimum ubi salices proueniunt.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in siliquis oblongis semen producit, lutea vero decidentibus floribus, semen exiguum, Coriandro haud dissimile profert, quod gustum non secus atq; folia adstringit.

TEMPERAMENTVM.

Superantem adstrictoriam qualitatem, adeoque exiccatoriam vim obtinent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius, cui adstringendi facultas est, ad sanguinis excreationes, & dysenterias potus & infusus confert. Sistit & mulierum fluxum appositus. Contra erumpentem enarib. sanguinem herba ipsa vtiliter inseritur. Vulneraria etiam est, & sanguinem compescit. Incensa acerrimum habet fumum, ut serpentes

Serpentes quidem abigat, & muscas enecet.

EX GALENO.

Vulnera glutinat, erumpentemq; ex narib. sanguinem emplastri modo illita sistit: quin & reliquas sanguinis eruptiones compescere tum ipsa, tum succus eius multò magis potest. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebrem fluxum sanat.

EX PLINIO.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota vel illita, vel naribus indita, sanguinis profluvium sistit. Vulneribus iis priuatim quæ calceamento facta sunt, contrita & arida infricata efficax est.

DE LAGOPO. CAP. CLXXXVIII.

Lagopus in tritico messibus frequens hic inuenitur.

NOMINA.

Lαγώπῳς Græcis, Leporinus pes Latinis, Trifolium humile & Trinitas à tribus foliis herbariis dicitur. Officinis nostris ignota est herba. Germanis Hasenfusz, oder Katzenklee, oder Katzle (Gallicè Pied de Lieure) nominatur. Sic verò Græci atque Latini hanc herbam appellarunt, Lagopus quòd Leporino pedi similem paniculam habeat. cur dicta.

FORMA.

A nullo, quòd sciam, Lagopus describitur. Herba autè quæ pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia Loto trifolia quæ in pratis gignitur

L iij similia,

PLANTARVM HISTORIAE

similia, semen in paniculis muscosis lanuginosisq; teporino pedi similibus admodū adstringētis gustus.

LOCVS.

In segetibus, Plinio etiam authore, & in hortorum arcis, vt testatur Dioscorides, gignitur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet.

TEMPERAMENTVM.

Exiccandi facultatem obtinet, Galeno teste, Lagopus.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Lagopus herba sistendi aluum cum vino pota. Febrietibus autem cum aqua dāda. Alligatur eadem contra inguinum inflammationes.

EX GALENO.

Fluxus alui probè exiccat.

EX PLINIO.

Lagopus sistit aluum è vino pota, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adalligatur in tumore.

APPENDIX.

Ex iis omnibus abūdè constat, herbam eā quam depictam damus esse Lagopum, siquidem & nomē & forma illi aptissimè respondent. Locus etiā conuenit: nascitur enim copiosissimè in segetibus. Nec temperamentum abhorret, quod illi est adstrictorium & exiccans. His omnib. accedunt vires, vulgò enim omnes hac planta in dysenteria, & alui profluvio vtuntur.

DE LARICE. CAP. CLXXXIX.

Larix in alpihus delphinum frequens, folia eius in nostrate manna sunt plurima, quòd ex hac arbore ferè decutiatur.

NOMINA.

Ἀρίξ græcis, Larix & Larex latinis, officinæ Larix seu
 Λ nis & vulgò Larga, Germanis Lorch- Larex.
 baum (Gallicè Vn arbre retirant a vn
 Pin, ou Sapin) appellatur.

FORMA.

Larix arbor est magna, Piceæ similis, crassior,
 leuioriq; cortice, folio villoso pectinum modo, pin-
 gui & denso, molliq; flexu, materia præstanti, ru-
 bente odore, acri. Hinc erumpit nonnihil liquoris
 melleo, Dioscoride ac Plinio testibus, colore atque
 lento, nunquam durescentis. Est autem resina quam Resina la-
 Larignam, aut certè Laricinam vel Lariceam vo- vicina ho-
 cant, qua hodie omnes ferè officinæ pro terebinthi- die pro te-
 na, non sine errore vtuntur. Terebinthina enim cā rebinthi-
 dida est, pellucida, & in modum coloris vitri cæ- na vtūtur
 rulea & odorata. Lignum eius propemodum ignis officinæ.
 bus inuictum, neque flagrat, neque in carbones re-
 cidit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm sa-
 xum in fornace ad calcem coquendam adhibitum,
 quod quidem nec flammam recipit, nec carbonem
 remittit, sed longo spacio tardè comburitur. E ramis
 eius panicularū modo nucamenta dependent, quod
 pictura affabrè ostendit.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Larix, vt autor est Vitruuius, circa ripam fluminis Padi, & litora maris Adriatici nascitur. Copiosissimè autem in Silesia prouenit, vnde illustrissimus GEOR= mus Princeps GEORGIVS Marchio Brandenburgensis, dominus meus clementissimus, plus Marchio res arbores Onolxbachium transferre curauit, à Brandenburg quo sanè hanc etiam cuius hìc damus picturam adburgensis. me Tubingam transmisit. In Silesia ex eius arboris ligno hypocausta construuntur, tantus illius ibidem prouentus est.

TEMPVS.

Larix nullo exhilaratur flore, sed turgens tantùm edit germina.

TEMPERAMENTVM.

Minimum in eius temperamento ignis & aeris, humoris autè terreni plurimum. Hinc cum nò habeat spacia foraminum quà possit ignis penetrare, sit vt eius vim, què admodum paulò ante diximus, reiiciat, nec patiatur ab eo citò ladi. Adstrictorià itaque facultatem, haud secus atque picea, eius folia & cortices, vt statim dicemus, obtinent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cortex eius adstringit, ac intertriginibus tritus & illitus prodest, & vlceribus summam cutem occupantibus ambustisq; cum lithargyro & malthuris. Vlcera in teneris corporibus cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum atra-

mento

mento sutorio, serpentia cohibet. Fœtus & secundas
 suffitu eiicit. Potus aluum sistit, & vrinam mouet.
 Folia eius trita illitaq; inflammationes leniunt, &
 vulnera ab inflammatione vindicant. Trita verò
 & in aceto cocta, calida collutione dentium dolo-
 rem mulcent. Resina eius vt omnes alia, emollit,
 calefacit, discutit, expurgat. Tussientibus ac tabi-
 dis in ecligmate per se aut cū melle conuenit. Tho-
 racis vitia expurgat. Vrinam etiam cit, maturat,
 & aluum mollit. Pilos in palpebris glutinat. Cōtra
 lepras cum erugine, atramento sutorio, & nitro in-
 ungitur. Auribus sanicm stillantibus cum melle &
 oleo, & in genitalium pruritu. Miscetur etiam em-
 plastris, malagmatis & acopis. Lateris doloribus
 per se inuncta & imposita auxiliatur.

EX GALENO.

Cortex eius vincentem habet adstrictoriam fa-
 cultatem vsque adeò, vt & intertrigines bellissimè
 sanet, & ventrem potus sistat. Sed & ambustis ci-
 catricem inducit. In foliis arboris, vt quæ multo
 sunt cortice humidiora, vis inest vulnerum glutina-
 toria. Resina eius desiccat & calefacit.

EX PLINIO.

Laricis folia trita & decocta in aceto, dētū do-
 lori profunt. Cinis corticum intertrigini & ambu-
 stis medetur. Potus aluum sistit. Vrinā mouet. Suf-
 fitu vuluas corrigit. Resina larigna tussi efficax
 habetur, polletq; contra viscerum vlcera.

PLANTARVM HISTORIAE DE MELISSOPHYLLO.

CAP. CXC.

Vulgari Melissophyllo affricant apiaria
rustici, vt illuc apes alliciant, nec infœli-
citer.

NOMINA.

- Melissa** . **M**ελισσόφυλλον, ἢ μελίφυλλον Græcis, A-
piastrū sine Citrargo latinis, officinis Melisse
sa dicitur. Germanis Melissen, Melissenkraut,
Melisso- Honigblum (Gallicè de la Melisse.) **Melisso-**
phyllum phyllum non alio nomine appellatum est, nisi quòd
vnde di- apes eius folio magnopere delectentur: neque enim
ctum. μελισσόφυλλον aliud quàm apum folium significa-
cat. Meliphyllon verò, qua voce Nicander vsus
est, mellis folium indicat. Sic itaque nominari cœ-
pit, quod hinc apes mellis materiam colligant. Pari
Apiastrū. ratione Latini Apiastrum haud dubiè dixerunt,
quòd ea herba apes plurimū letētur, adeò vt si ea
aluearia cōfricentur perunganturve, detētū in eis
Citrargo. examen non fugiat. Citraginem autē ab odore Ci-
tri: naves enim si consulantur Citrium malū olebit.

GENERA.

Duo sunt ex vulgariū herbariorum sententia
Melissophylli genera. Vnum verum, alterum adul-
terinum, quod Germani Vuanzenkraut nomi-
nant, vt paulò pòst dicemus.

FORMA.

Folia & cauliculi veri Melissophylli, Balloti seu
Marru

Marrubio nigro similia sunt, maiora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, citri mâli odore. Perperam hodie officina pro vera **Melissa** vtütur herba passim in hortis proueniente, quam Germani, vt diximus, quia cimices olere videtur, **Vuantzenkraut** nominât. Fædus itaque cùm huius herbe odor sit, non est cur apes ea delectentur, neque ei florenti insident, sed eam potius fugiunt. Contrâ illa quam pro vera pictam damus vnicè oblectantur, quòd illius tam gratus odor sit, vt in adibus strata, eas gratissimo odore compleat.

LOCVS.

Nascitur in syluis verum, adulterinum autem in hortis.

TEMPVS.

Carpitur æstate, Iunio potissimum mense, quo floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Melissophyllon ex secundo ordine calefacientiũ censetur, desiccat verò non aquè, sed ipsum quispiã in hoc primi ordinis esse posuerit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum vino pota aut illita, contra scorpionũ phalangiorum, canumq; morsus prosunt. Decoctum eorundem, si eo perfundantur, idem potest. In infussionibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis iniectum prodest. Fungorum strangulationibus, folia cum

nitro

PLANTARVM HISTORIAE

nitro pota succurrūt. Torminibus auxiliantur. Datur in eclegmate orthopnoici. Illita cum sale strumas discutunt. Vlcera purgant. Articularios dolores illita mitigant.

EX GALENO.

Melissophyllon Marrubio facultate simile est, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec utitur illo quispiam. Superuacaneum siquidem foret praesente Marrubio, cuius tantus est vbique terrarū pro uetus, velle uti Melissophyllo. Caterū si cui fortē ad manum quandoque Marrubium non fuerit, illo ad quaecunque uti licebit, modò quāto ab hoc exuperetur cognitum habuerit.

EX PLINIO.

Melissophyllo siue Melittana si perungantur aluaria, non fugient apes: nullo enim magis gaudent flore. Copia istius examina facilius continentur. Idem praesentissimum est contra ictus earū vesparumq; & arancorum, item scorpionum, remedium. Item contra vuluarū strangulationes addito nitro. Contra tormina ē vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitis cum sale decocta. Succus faeminas purgat, & inflationes discutit, & vlcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq; morsus. Prodest dysentericis veteribus, & coeliaci, orthopnoicis, leuibus, vlceribus thoracis. Caligines oculorum succo cum mellē iungi eximium habetur.

EX SIMEONE SETHI.

Ad stomachi ex frigidityte morsus, & à nigra bile tristitias & timores qui sine ratione ex illa fiunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicum ac pituitosum humorem prodest. Fertur quòd industriam afferat, & quòd ante somnum sumptū, bona somnia faciat, cōtraria ratione cum Brassica, quæ mala insomnia affert. Bubones lædit.

DE MARATHRO. CAP. CXCI.

NOMINA.

Mαριθρον Græcè. Fœniculum Latinè, offi- Marathrum cur
cinæ antiquum & Latinū nomen retinuerunt, Germanicè Fenchel (Gallicè du Fenouil) appellatū.
dicitur. Marathrum Græcis dictum putant à mar-
cescendo, quòd ad condienda plurima cum inarues-
cit commendatissimum sit. Fœniculum autem dici Fœnicu-
existimant, quòd satum magno cum fœnore se- lum.
men reddat.

FORMA.

Fœniculum ferulacci generis est, hominisq; ple-
rumq; proceritatem superat, caule geniculato, sum-
mosa intus medulla, leui exterius cortice & herbas-
ceo, folio Abrotoni, sed longiore mollioriq; iucundo
odore, umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem ra-
diatim circinato, in qua semen nudum dependet,
radice candida, longa & odorata.

LOCVS.

Pasim in hortis satum prouenit. Sua etiam spō-
te interdum seu Anethum nascitur.

TEM-

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPVS.

Colligitur caule turgescente. Floret Iunio & Iulio mensibus. **TEMPERAMENTVM.**

Feniculum tam valēter excafacit, vt ex tertio ordine excafacientium censi possit. Exiccat vero non aequē, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod, si admodum desiccaret, non sanē efficeret.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Feniculi herba comesta manimas lacte replet. Idem potest semen potū, aut decoctū cum ptisana. Coma decoctū subditum impositūve, renum & vesicae vitiis vtile: quippe quod urinā ciere potest. Cōtra serpentium ictus in vino potum prodest. Menses ducit. In febribus nauseam, & stomachi ardorē ex aqua frigida potum, sedat. Radices contrita & cum melle illita, morsibus canum medetur. Succus caulibus & foliis expressis in sole siccatus, medicamentis quae ad excitandam oculorum aciem consciuntur, vtiliter adiicitur. Extrahitur etiam succus ex semine viridi, foliis, ramulisq; ad eadē utilis. Radix in prima germinatione exprimitur. In occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulem medium dum herba floret incola demunt, igniq; admouent, quo facilius vi caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

EX GALENO.

Feniculum lae procreat. Suffusus auxiliatur. Vri-
nas mensesq; cit. In condimentis assiduis Anethi
vsu, Feniculi verò & in opsoniis. Apud nos in hoc
reponunt, nō secus ac Pyrethrum & Terebinthum
condientes, vt in totum annum vsui sit, quemadmo-
dum & cepas & rapas, & alia huiusmodi quædā
in sola aceto, alia in oxalme asseruantes.

EX PLINIO.

Ad scorpionum ictus & serpentium, semine in
vino poto valet. Succus & auribus instillatur, vero
miculōsque in his necat. Id ipsum condimentis pro-
pè omnibus inseritur. Oxyporis etiam aptissimè.
Quin & crustis subditur panis. Semen stomachum
dissolutum adstringit. Nauseam ex aqua tritū sco-
dat. Pulmonibus & iccinoribus laudatissimum.
Ventremsistit cum modicè sumitur, vrinam exci-
tat, & tormina mitigat decoctum, lactisq; defectu
potum mammas replet. Radix cum ptisana pota-
renes purgat, siue decocto succo, siue semine sum-
pto. Prodest & hydropicis radix ex vino cocta: itē
conuulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus
ex aceto. Calculos vesicæ pellunt. Geniturae abun-
dantiam quoquo modo haustum facit. Vercudis a-
micissimum, siue ad fouendum radice cum vino co-
cta, siue contrita in oleo illitum. Multi tumoribus
& sugillatis cum cera illinunt. Et radice in succo
vel cum melle contra canis morsum vtuntur. Et cō-
tra multipedem ex vino.

EX SI-

ratas est quarta, quæ syluestris Nigella dicitur, quòd scilicet suæ sponte in aruis nascatur. Germanis Vuild schuuartz er Coriander nominatur. Videtur autem esse potius tertium genus Cumini syluestris.

FORMA.

Melanthion frutex est pusillus, ramulis tenuibus, altitudine palmorum duorum vel amplior, foliis paruis, Senetionis herbae similibus, multo tamè exilioribus, capitulo in cacumine exiguo cœu Papaueris, oblongo, intercurstantibus internè distinctionibus loculosis quinque aut sex, in summitate extrinsecus corniculatis, quibus semen nigrum, acre, odoratum includitur. Syluestre alteri hortensi ferè simile est, folia siquidem anethi habet, flores primo similes, nisi quòd colore sint elegantiores. Capitulum planè Aquileiæ respondet, atque in se semina nigra & odorata continet.

LOCVS.

Melanthion domesticum non nisi in hortis satum provenit. Syluestre autem, vt dictum est, in agris sua sponte provenit.

TEMPVS.

Melanthion floret Iunio mense, Iulio autem & Augusto semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Melanthiū excalefacit atq; desiccatur tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Capitis doloribus illitum fronti Melanthium, &

M:

incipiens

PLANTARVM HISTORIAE

incipientibus suffusionibus cum irino tritum & naribus infusum prodest. Tollit lentigines, lepras, ædemata vetusta duritiesq; cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum vetere vino impositum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctum, si eo colluantur, succurrit. Rotundos ventris lumbricos expellit, ex aqua umbilico illitum. Tritum autem & in linteo colligatū & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. Pluribus diebus positum, urinam, menses & lac pronocat. Difficultatem spirandi cum vino potum finit. Phalangiorum moribus drachmæ pondere cum aqua haustū auxiliatur. Suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

EX GALENO.

Tenuium est partiū Melanthium, vnde destillationes sanat calidū in linteo admotū, atque assiduò olfactū. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit. Hinc constat essentie ipsam esse tenuis, & ad vnguē à caliditate elaboratæ. Propterea sanè etiā amarum est. Itaq; mirum non est si lūbricos interimat non esum modò, sed etiam foris impositū. Neque sanè etiā mirandum si lepras, clauos, myrmecias eiiciat. Sic verò etiam orthopnceam inuat, & menses prouocat, qui ob crassitiem aut viscedinem retenti fuerint. in summa, vbi incisione, extersione, desiccatione, excalefactione est opus, præstantissimum id remedium est.

EX PLINIO.

Melanthion medetur serpentium plagis & scor-
pionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensq;
serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos.
Destillationem narium discutit tusum in lintcolo ol-
factum. Capitis dolores illitum ex aceto, & insu-
sum naribus mitigat. Cum irino oculorum epipho-
ras & tumores lenit. Dentium dolores coctum cum
aceto. Ulcera oris tritum & commanducatum. Le-
pras & lentigines ex aceto tritum emendat. Diffi-
cultates spirandi addito vino potum. Duritias tu-
more & veteres & suppurationes illitū. Lac mu-
lierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur
succus vt Hyoscyami. Oculos purgat, vrinam &
menstrua ciet. Similiter largius venenum est, quod
miremur, cum semen gratisimè panes etiam con-
diat. Quinimo linteolo alligatis tantum granis tri-
ginta, secundas trahi reperio. Aium & clavis in pe-
dibus mederi tritum in vrina. Culices suffitu nece-
re: item muscas.

EX SIMEONE SETHI.

Est tenuiū partium, lubricos in ventre necat, fla-
tus discutit, pituitamq; incidit. Ad orthopneas &
defluxus capitis facit odoratū, praesertim postquam
calefactum fuerit. Dicitur verò quòd si teratur, &
cum aceto ventri imponatur, etiam sic lumbricos
necare. Et si cum melle fermentetur, & calida a-
qua hauriatur, calculos in renib. & vesica minuit,

M ij vrinam

PLANTARVM HISTORIAE

urinam cit, menses ducit, & veluti remedium contra venena est, si quis ipsum ieiunus assumat.

DE MALACHE. CAP.

CXCIII.

NOMINA.

Malua **M**αλάχη Græcè, Malua Latinè, Officinis latinum nomē retinuit, Germanicè Pappel, (Gallicè Maulue) dicitur. Malua autem Græcis ab emollienda aluo nomē traxit: μολάττειν enim mollire significat. Quinetiam Latinis Varro Maluā quasi moluam, quod aluū molliat, dictam esse contendit. Antiqui enim ea utebantur in acetariis cū Lactuca ad subducendam aluum. Vnde Martialis libro decimo ait:

Exoneraturas ventrem mihi villica maluas
Attulit, & varias quas habet hortus opes.

GENERA.

Maluarum genera esse duo Dioscorides & Gale-
Hortensis nus tradunt. Vna enim hortensis, altera sylvestris
Malua. Malua dicitur. Hortensis, quæ in hortis sata proue-
nit, Germanis Römische Pappel, vel Erntosz, quod scilicet messis tēpore floreat, vel Herbstrosz nominatur. Huius iterum varia sunt genera: alia siquidem rosas purpureas, & has vel simplici vel multiplici foliorum textura constantes, vt pictura mōstrat: alia candidas & iterum foliorum texturā differentes producit. Nos vna pictura quatuor
Sylvestris hac hortensis Malua genera complexi sumus. Syl-
vestris

ueſtris non quæ in ſyluis, aut aſperis locis, ſed quæ in incultis locis ſua ſponte naſcitur, intelligi debet: id quod Græca vox $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\iota\alpha$, qua Dioſcorides vtitur, maximè docet. Hæc enim Græcis incultâ & inelaboratam terram ſignificat, qualis in ſemitis, pratis, aliisq; huiusmodi ruris & agri partibus eſt. Erratica hæc ſeu ſylueſtris Malua itidē in duas diſtribuitur ſpecies: quædā enim pumila eſt, & humi Pumila. ſerpēs, hanc Germani Genſzpappel, Raſz oder Haſenpappel vocāt. Quædā altius attollitur, & ferè arboreſcit, hanc Germanicè Roſzpappel nominant. Arboreſcens.

FORMA.

Hortenſis Malua grandæſcit in arborem, cuiusq; ſcapus tanta magnitudine proſcit, vt baculi uſum præbeat. Folia huic ampla, circinata rotunditatis, multis in ambitu ſegmentis. Caudex ſimplex, luxurioſæ proceritatis attollitur, à medio ferè ad verticē pulcherrimis floribus decoratus, breui admodū pediculo dependentibus, qui venuſtate roſis non cedunt, & ſi ſuppeteret odor, de principatu certarēt. Colore conſtant purpureo, vermiculatōve & cādido. Capitula quædam breuibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem ſaſtigiata primū è caule proſiliunt, iisq; paulatim intumeſcentibus, prægnantia florū inuolucra fatiſcunt, in quibus dehifcentes roſæ ſeſe pādunt, & explicantur in folia quinque, interdum ſtructurili quædā ſeric, vt diximus, numeroſa, calycibus apices paucos complexis, qui lutei mediis M ij emicant,

PLANTARVM HISTORIAE

emigrant, quibus decidentibus erumpunt purpurea
stamina. His factus succrescit multipliciter tunica-
tus, atq; in umbilici formam numerofo semine co-
gmetatus, in quib. cum decussa sunt folia, reliqua-

Sylvestris rum Maluarum modo semina recluduntur. *Sylvea*
pumila. *stis pumila* & humi repens, folio rotundo, pingui,

& in ambitu serrato constat: caule magno, floribus

Sylvestris ex candido purpurascens, radice cādida. *Syl-*
proccrior. *vestris altior* folio magis laciniato nascitur, floribus
ex cœruleo purpureis, radice candida.

LOCVS.

Hortensis in hortis sata provenit. *Sylvestris* autē
locis incultis, pinguibus potissimum, & humidis.

TEMPVS.

Hortensis floret Iulio & Augusto præsertim mē-
sibus: neque enim flos is vt rosa fugax est, sed diu
vigor vitaq; durat. *Sylvestris pumila* per totā aesta-
tem, & in maximam autumnū partem durat. *Ar-*
borens autem Iunio & Iulio mensibus, floribus
quam maximè abundat.

TEMPERAMENTVM.

Malua *sylvestris* digerentis paululū, & emollien-
tis leniter est facultatis. *Hortensis* verò quāto plus
habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecil-
lior est. Fructus eius tāto validior est, quāto et sic-
cior. Inter Lactucā, Betam, & Maluā id est discris-

Sylvestria minis, nempe quòd sicciora sint *sylvestria*, satina hu-
satiuis sic midiora. Permissum est Ma'ua sicco aliquid glutin-
ciora.

nosum,

nosum, quo Lactuca caret. A refrigerandi facultate manifestè abest, vt ante sumptionē cernere licet, si ex ambobus particulatim oleribus, quemadmodum factitare homines consueverunt, cataplasma ad calidum quempiam affectum, qualis est erysipelas, componas, molliuscula folia diligēter tundens donec ad leuorem redacta sint exactissimum. Tum nanq; cognosces Lactucam manifestè refrigerare, Maluam verò modicum, et quasi tepidum quendam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidū est, sed etiam quia glutinosum. Si horum trium olerū succos inter se compares, tenuis & absterforius Betae, crassior glutinosiorq; Maluae, in vtriusque medio Lactucæ statuetur. Hæc Galenus lib. ij. de Alimentorum facultatibus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Esi aptior hortensis multò quàm syluestris. Stomacho noxia, aluum bonam efficit, præsertim caules, intestinis & vesicæ vtilis. Folia cruda illita, & cum modico sale addito melle commāducata, ægialopas sanant. Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale vtendum est. Contra apum vesparumq; ictus illita prodest. Et si cruda tritaq; cum oleo antea se inunxerit aliquis, non feritur. Achoras, furfurēsq; cum vrina illita sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaq; vtiliter cum oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in fessione mollit. Prodest erosionibus intestinorum, vuluæ sedisque clystere

PLANTARVM HISTORIAE

infusum. Ius decocta cum radice sua omnib. letalibus venenis auxiliatur, si continuo à bibentib. resomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac prurit. Semen eius admixto Loti sylvestris semine potum cum vino vesicae dolores lenit.

EX PLINIO.

Malua contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, praecipue scorpionum, vesparum similiumq; & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet carum peruncti ante, vel habentes eas non feriuntur. Folium impositum scorpionibus torporem affert. Valent contra venena. Aculeos omnes extrahunt illita cruda, aut cum † anetho pota. Decocta vero cum radice sua, leporis marini venena restringunt: & ut quidam dicunt, si vomatur. De eisdem mira & alia traduntur, sed maxime, si quotidie quis succi ex qualibet carum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Ulcera manantia in capite sanant, in urina putrefacta lichenas, & ulcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & detum mobilitates. Eius quae unum caulem habet, radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas et parotidas panosq; addita hominis salina, purgat citra vulnus. Semen in vino nigro potum, à pituitis & nauseis liberat. Radix mammarii vitiis occurrat, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emedat. Stomacho inutiles Sextus Niger dicit. Olympias Thebana,

† alias
aceto.

Thebana, abortiuas esse cum adipe anseris. Aliqui purgari feminas, foliis earum manus plena mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique constat parturientes substratis foliis celerius solui, protinus à partu renocanda, ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque ea Veneri nāscuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali, foeminarum auaritates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas, tenasmo & dysentericis vtilissimè infundi. Item sedis vitiis, vel si foucantur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & insanientibus quaternis. Decocta comitialibus hemina succi. Hic & calculosis, et inflatione, & torminibus, aut episthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus & ambustis decocta in oleum folia imponuntur, & ad vulnorum impetus cruda cum pane. Succus decocta nervis prodest, & vesica, & intestinorum rofionibus. Vuluas & cibo & infusione mollit i oleo. Succus decocta pori meatus suaves facit.

EX SIMEONE SETHI.

Ventriculum facile subit, non solum propter humiditatem, verumetiam glutinositatem, atque impri-
mis si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur
tempore irrorata. Vesicam, thoracem, pulmonemque
innuat,

PLANTARVM HISTORIAE

inuat, & raucam vocem lenit. Syluestris malua, vt ferunt, comesta, dolores ex vesparum morsu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo Maluæ, præsertim syluestris, perungatur, confestim dolore lenatur. Dicitur etiam quòd huius decoctum potum, lapides conterit, somnum conciliat, facilemque partum præstat, si mulier ea crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, eaque quæ indurata sunt emollit. Illud Maluæ peculiare est, vt imposita ictibus vesparum & apum, dolores leuet.

DE MYRICE. CAP.

CXCIIII.

Tamarix in Gallia Narbonensi luxuriat, nunc etiam in hortis reglis quos fons bellæ aquæ irrigat, & in hortis Reuerēdi Belaij Parisiensis episcopi & Cardinalis, Posterorum memoria, & nostra omnium veneratione dignissimi, vt qui nullis parcit sumptibus, quo partem medicinæ plantariam reddat illustriorem & certiore.

NOMINA.

Tamariscus.

Mυρίκη Græcis Myrice & Tamarix Latinis, officinis Tamariscus, Germa. Tamarisck. & Porst (Gallis Bruyere) nominatur.

GENERA.

Dioscorides duo Tamaricis genera facit. Vna enim syluestris est, qualis est ea quæ in plerisque Germaniæ locis prouenit, quamque hic pictam damus.

Altera

Altera sativa, quæ priori in cæteris similis est, nisi quod fructifera est, & minimè, ut illa, sterilis.

FORMA.

Sylvestris arbutum frutèxve humilis est, ramis ex herbaceo fuluòq; colore variegatis, foliis Sabinae aut Ericæ, flore muscoso, qui demum in pappos euolat. Sativa cætera similis est sylvestri, fructum tamen gallæ non dissimilem profert, qui gustu inæqualiter adstringit.

LOCVS.

Proxime paludes, resides stagnantesq; aquas nascitur, Sylvestrisq; copiosa in Germania ad Rhenũ & Isarum, insignes fluuios, provenit. Sativa in Syria & Aegypto, ubi procerissimas equat arbores, gignitur.

TEMPVS.

Perpetua coma frondet.

TEMPERAMENTVM.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiã adstrictionem nonnullam. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita est adstrictionem, adeò ut gallæ omphacitidi seu immatura proxima sint, nisi quod acerbitas euidentis est in galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immista est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi, quod sanè gallæ hand inest. Porro Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoriae facultatis,

PLANTARVM HISTORIAE

facultatis est, plurimam abstergendi facultatē habens, pauxillam adstringendi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fructu vice gallae in oris oculorumq; medicamentis vtuntur. Cruentis sputis in potu, cæliacis, fœminarum fluxionibus, morbo regio, & phalangiorum morsibus prodest. Oedemata illitus reprimat. Cortex eadem quæ fructus potest. Decoctum foliorum cum vino potum lienem minuit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare est, & mulierum fluxionibus in desessionibus. Aptè his in quibus pediculi & lendes abundant circumfunditur. Cinis lignorum eius appositus profluum ex utero suppressit. E trunco eius nonnulli potorios calices fabricant. E cant, quibus in lienosis pro poculo vtuntur, quò datur trunco tantus in iis potus proficiat.

Calices
potorij ex
cant,
quibus
in lienosis
pro poculo
vtuntur,
quò datur
trunco
tantus
in iis
potus
proficiat.

EX GALENO.

Myrice prodest admodum lieni indurato, decoctis cum aceto aut vino radicibus, siue foliis, siue extremis ramulis. Sanat verò etiam dentium dolores.

EX PLINIO.

Lenæus sanari ea carcinomata in vino decocta tritaque cum melle dicit. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solū hoc viscerum faciunt, vt affirmant, si ex ea alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et idè homini quoque splenetico cibum potumq; dant in vasis ex ea factis.

Etis. Lignum & flos & folia & cortex in eisdem
 vsus adhibentur, quanquam remissiora. Datur san-
 guinem reicientibus cortex tritus, & cōtra proflu-
 uia fœminarum, cœliacis quoque. Idem tusus im-
 positusque collectiones omnes inhibet. Folii exprimi-
 tur succus. Ad hæc eadem & in vino decoquuntur:
 ipsa verò adiecto melle gangranis illinuntur. De-
 coctum eorum in vino potum, vel impositum cum
 rosaceo & cera sedat. Sic & epinyctidas sanât. Ad-
 dentium dolorem auriūque decoctum eorum sa-
 lutare est. Radix ad eadem, similiter & folia. Hæc
 amplius ad ea quæ serpunt, imponuntur cum polen-
 ta. Semen drachmæ pondere aduersus phalangia
 & arancos bibitur. Cum altilium verò pingui su-
 runculis imponitur. Efficax & contra serpentium
 ictus, præterquam aspidum. Necnon morbo regio,
 phthiriasi, lendibūsque decoctum infusum prodest,
 abundantiamque mulierum sistit. Cinis arboris ad
 omnia eadem prodest.

DE MEONE RHODE.

CAPVT CXC.V.

NOMINA.

Mήκων ποίος Græcis, Papauer rhœas, hoc
 est, fluidum aut erraticum Latinis, Papa-
 uer rubrum officinis & herbariis Germanis à stre Papauer
 pitu quem ludentes pueri harum foliis concauo pu rubrum.
 gno impositis, altera palma incussa adunt, Klap-
 perrosen, quasi dicas crepitaculares rosas, &
 Glitschen,

PLANTARVM HISTORIAE

Glitschē, & vuild Maen, ac Kornrosen, (Gal.

Rhœas Coquelicoc, ou Ponceau) appellāt. Rhœas autem à flore, qui ei protinus decidit, dictum est.

FORMA.

Folia Erucae, aut Cichorio similia, & incisa habet, longiora tamen & aspera. Caulem † lanuginosum, rectum, asperum, cubitalem. Florem puniceū, & aliquando cādidum, similem syluestris Anemones flori. Caput oblongum, minus tamen quā Anemones. Semen rufum. Radicem oblongam, subalbā, minoris digiti crassitudine, amaram. Ex qua delineatione omnibus perspicuum sit, herbam quā Papauer rubecum hodie vulgò nominant, esse Rhœada, quòd sit folio Erucae, laciniato, scabro & longiore: caule lanuginoso, recto, aspero, cubitali: flore syluestris Anemones puniceo, nonnunquam albo, oblongo capite: semine rufo, radice longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Errant itaque qui Anemonem esse arbitrantur, quòd folia eius, quæ Coriandri sunt, euidentissimè reclamant. Nos Rhœadis vtriusque picturas damus. Vnius atque ad eòdè primi, quod Erucae folia habet, alterius quod Cichori.

Papauer
rubeū non
est Ane-
mone.

LOCVS.

Nascitur in aruis & segetibus passim.

TEMPVS.

Vere & æstate dum frumenta messem appetiūt, floret: quo etiam tempore decerpitur.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, vt alia genera Papaueris.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius Papaueris quinque sexve capita cum tribus vini ciathis decocta donec ad duas reducatur, potui dabis quibus somnum accersere volueris. Semen acetabuli mēsurā cum aqua mulsa potum, aluum leniter emollit. Ad idem præstandum mellitis & dulciariis immiscetur. Folia cum calycibus illis inflammaciones sanant. Eorundem perfusione & fotu somnus allicitur.

EX GALENO.

Papauer quoddā Rheas nuncupatur, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Huius semen valisdius refrigerat, ita vt nequaquam eo quis innoxie solo uti possit, veluti satiuo melli admiscens. Admodum verò ita sumptum somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt iis quæ ex melle conficiuntur bellariis, placentis & panibus.

EX PLINIO.

Aluum exinaniunt capita quinque decocta in vini tribus heminis: pota somnum faciunt.

EX RECENTIORIBVS.

Sacro igni medetur. Mulierum menstrua profluvia compescit. Sanguinem è naribus fluentem iecori impositū sistit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudēdorum tumores detumescere facit. Tēporibus illitum, phreneticis somnum conciliat.

PLANTARVM HISTORIAE

conciliat. Calidos oculorum dolores linteo impositis mitigat. Vnde rursus omnibus liquet, Papauer hoc rubrum non esse Anemonem, quod scilicet haec ipsa contrarias plane facultates obtineat.

DE MEONE SATIVO.

CAP. CXCVI.

NOMINA.

Mήκων ήμβρος graece, Papauer sativum latine dicitur. Officinae antiquum nomen retinuerunt. Germanice Magsomen oder Man, (Gallice Du Pavot) vocatur. Dictum autem Graecis μήκων à μη γινέιν, hoc est, non ministrando, quod suis fungi muniis vescentes non patiantur.

Meco qua
re appelle
tur.

GENERA.

Sativi Papaveris duplex genus, album videlicet cuius flos & semen candidum: & nigrum, quod semine nigro constat. Nos utrumque genus una pictura complexi sumus.

FORMA.

Foliis constat longis, per ambitum serratis, nulloque pediculo cauli adherentibus: floribus vel candidis, vel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum vel candidum.

LOCVS.

Passim in hortis satum provenit.

TEMPVS.

Aestate floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat,

Refrigerat, sicut omnia alia Papaueris genera,
in quarto ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Communis ipsis refrigerandi vis est: proinde fo-
lia & capita in aqua decocta fotu somnum accer-
sunt. Bibitur & decoctum contra vigilias. Capita
trita & cum polenta cataplasmatibus mixta, igni-
bus sacris & inflammationibus prosunt. Oportet
autem viridia ipsa tundere, & in pastillos confor-
mare, siccatosque reponere ac vti. Capita per se e-
tiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cū
melle dum humor densetur crassescātque decocta,
eclegma medicamentum efficiunt, dolorem mitigās
in tussi, fluxionibus arteria, & celiacis affectio-
nibus. Efficacius redditur adiecto Hypocistidis suc-
co & Acacia. Papaueris nigri semen tritum cum
vino bibitur contra fluxiones alui & feminarum
profluua. In peruiigiis fronti temporibusque cum
aqua illinitur. Eiusdem liquor plus refrigerat, in-
spissat, siccātque. Erui quantitate sumptus dolorem
leuat, somnum conciliat & concoquit. Tussi atque
celiacis affectibus auxiliatur. Maiori autem copia
haustus nocet, lethargicos efficiens, & interimit.
Ad dolores capitis cum rosacco persusus facit. Au-
res dolentibus cum amygdalino, myrrha & croco
instillatur. In oculorum inflammationibus cum to-
sto oui luteo & croco. Igni sacro & vulneribus
cum aceto, podagris cum lacte mulicris & croco,

PLANTARVM HISTORIAE

fedi pro balano subditus, somnum allicit.

EX GALENO.

Sativi Papaveris semen panibus utiliter ceu dulciarium inspergitur, nō secus ac Sesamum. Candidius nigriore præstat, vimq; refrigerandi habet, ideoq; somnificum est. Si verò liberalius sumatur, soporem etiam inducet, acreq; concoquetur. Tussim præterea ex thorace & pulmone compescit. Cōfert aduersus tenuēs ex capite destillationes. Corpori nullum notatus dignum exhibet nutrimentum.

EX PLINIO.

Cādidi semen tostum in secunda mensa cū melle apud antiquos edebatur. Calyx ipse teritur & bibitur somni causa. Semen elephātis medetur. E nigro Papauere lacteus succus scapo inciso exprimitur, qui dēsat, & in pastilles tritus in umbra siccat, non vi soporifera modò, verū si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion vocant. Semine eius trito in pastillos, è lacte vtuntur ad somnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum his aurium dolori instillatum. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & foliis ipsis vtuntur ad sacros ignes. Item vulnera cū aceto. Ego tamen damnauerim, collyriis addi, multoq; magis quas vocant lexyphretas, quasq; pepticas & cœliacas. Nigrum tamen cœliacis in vino datur.

EX SIMEONE SETHI.

Melius est albū quàm nigrum. Somnificam vim habet,

*habet, & difficilis est cōcoctionis, parumq; nutrit. Si autem cū melle edatur, semini genitali adiicit. Prodest & thoraci, & asperæ arteriæ, ac tussi. Vē-
trem sistit, etsi quidā falso putauerunt ipsum moue-
re, cū contrariam habeat vim. Lædit caput, si co-
piosius sumatur, itemq; aggrauat. Sunt qui ipsum
conterunt, & vigilantium fronti imponunt, in hoc
vt somnum conciliet. Caterum nigrum Papauer fri-
gidius est, & magis somniferum, adeò vt si quis co-
immodicè vtatur, somno profundo similiter lethar-
gicis capiatur. Cum rosaceo impositum capiti eius-
dem dolores à calore ortos sanat. Dicitur etiā quòd
illitum cum lacte muliebri & croco, podagricos iu-
uet. Huius lachryma venenum est. Nigri autem
succus est vocatum opium.*

DE MECONE CERATITE.

CAP. CXC VII.

*In Papauere corniculato mirum cur Dio-
scorides omiserit rictum, ceu colubri in
summa filiqua conspicuum, notam pla-
nè illustrem.*

NOMINA.

MΗΚΩΝ ΚΩΡΑΤΙΤΙΣ Græcis, Papauer cornicu-
latum Latinis, officinis Papauer cornutum, Papauer
Germanis Gelbolmagen appellatur. Cornicula-
tum à fructu quem producit, cornu modo inflexo,
nominatum est.

FORMA.

N. ij.

Folia:

PLANTARVM HISTORIAE

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, per ambitū Papaueris sylvestris modo serrata: caulem etiam similem, florem luteum pallidum ve, fructum paruum ut cornu inflexum, fœnigraci corniculo similem, unde & nomen inuenit. Semen pusillum, nigrum quale Papaueris. Radicem in superficie terræ hærentem, nigram, crassam.

LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis provenire ait. In Germania tamen nostra non nisi satum fuerit, nascitur.

TEMPVS.

Iunio floret mense: Semen autem circa messes legitur.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse facultates eius, & in gustu nitrositas, satis ostendunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischiadas, & iecinoris affectus sanare potest. His etiam qui crassas & araneosas faciunt vrinas prodest. Semen acetabuli mensura cū aqua multa positum, aluum leniter purgat. Folia præterea floresq; cum oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta iumentorum argema ac nubeculas emendant.

EX GALENO.

Papauer corniculatum nominatum quidem est à fructu leuem inuersionem habente, veluti & fœnigracum,

numgræcum, vt bouis cornu simile esse videatur. Vm habet incidendi & abstergendi. Proinde radix herba in aqua decocta ad dimidium, iecinoris affectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodum & maligna vlcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet vlceribus iam purgatis: adeo enim abstergere valent, vt & puræ quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc facultatum robore non sordes duntaxat, sed & crustam vlceribus detrahit.

EX PLINIO.

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo, argemas iumentorum sanant. Radix acetabuli mensura cocta in duobus sextariis ad dimidias, datur ad lumborum vitia & iecinoris. Carbunculis medentur ex melle folia.

DE MORO. CAP. CXCVIII.

NOMINA.

Mορεα, ἢ συραμνέα Græcis, Morus Latinis, officinis & vulgaribus herbariis Morus celsi, Germanis Maulberbaum, (Gallis Vn celsi. Meurier) appellatur.

FORMA.

Morus arbor notior est quam vt describi desideret. Folia autem rotunda ferè habet, nisi quod in summo sint acuminata, & extremitatibus serrata, et ad Mēthæ hortensis primi & secundi generis folia accedentia. Flores lanugineos, fructum statim ab ortu candidum, cum pubescit rubrum, ubi maturuit

PLANTARVM HISTORIAE

atrū. Non est certè silentio transeundū, quòd Mori
 foliis quadraginta ferè diebus à Vergiliarum exor
 Seres verè tu vsq; ad solstitium pasti vermiculi, qui τῆρες græ
 miculi vn̄ cis, latinis bombyces ac Seres nominantur, sericeum
 d: nutriā= vellus, quo turget vterus, pedibus explicantes cōfi
 tur, & eo= ciunt: nulla enim in re alia natura sagacior depre
 rūdem mi hēditur, nec ars aliquid ab iis accepisse videbitur,
 rāda me- in quo ingeniosius laborauit, si tam multas dū id
 tamor= vellus perficitur naturæ mutationes, & artis dū ad
 phosis. vite vsum disponitur, labores aestimemus. Appeten
 te siquidem vere ova, pisciū ouis haud dissimilia,
 linteolo chartæne adhescentia, quæ proximo au
 tumno produxerunt, radiis solis exponuntur, aut ca
 lido in loco. hypocausto nimirum, seruātur. Quo fit
 vt vermiculi excludantur exigui, qui mox Mori fo
 liis nutriuntur, quoad grandiores facti fuerint: tum
 statim penulæ cuiq; chartacea, vel potius inuolu
 cra conficiuntur, quibus inclusi mirabili naturæ ope
 re lanitio sese inuoluunt, ac congesto glomeri se cō
 dentes, postquam suū nendi obierūt munus emoriū
 tur, adeò vt semestris tantum illis apud nos vita
 sit. Mortuis testacea subinde tunica inducitur,
 qua aliquot diebus obducti reuiuiscunt, ac ascitis
 sibi alis in volucres papiliones degenerant, qui as
 siduè inuicem incidentes cocuntēsq; tandem re
 lictis ouis milū forma & colore, quibus sua rediui
 ua proles sequente anno renascitur, iterum moriun
 tur, atque adeò cū nullius præterea sint v̄sus abii
 ciuntur.

ciuntur. Oua autem ad veris vsque initia seruatur. Hanc mirificam metamorphosin quàm non raro summa cum admiratione ac delectatione sum contemplatus, non potui non commemorare, quò stua diosis vermiculorum istorũ qui Mori foliis pascuntur natura prorsus perspecta esset.

LOCVS.

Nascitur in hortis quibusdam. Amat autem in primis loca calida sabulosaq;. Gaudet fossione & stercore.

TEMPVS.

Novissima vrbanaŕum germinat, nec nisi exacto Morus frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Proinde sapientissimũ hanc germinare viderimus, frigus minime timenda arborum.

TEMPERAMENTVM.

Immaturus Mori fructus vbi exaruerit admodũ adstringit. Maturus autẽ mediocriter adstringit. Cortex radicis arboris amaritudinis cuiusdã et purgantis facultatis particeps est. Folia & germis na quodammodo media temperie inter adstrictiõnem & purgatoriam facultatem sunt prædita.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Mori fructus aluum soluit. Facile corrumpitur. Stomacho inimicus est. Præstat hoc idem eius succus. Decoctus autẽ æreo vase, aut isolatus, magni adstringit. Admixto mellis exiguo. ad fluxiones, nomas & tõsillarũ inflãmationes facit. Augetur vis eius adiecto scissili alumine, galla, croco & myrrha, itẽ

Niij tama

PLANTARVM HISTORIAE

tamaricis semine, iride & thure. Mora verò immatura sicca tusaq; Rhois vice opsoniis miscentur, & coeliacos iuuant. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit. Latos ventris lumbricos expellit: iis quoq; auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita & cū oleo illita, ambustis igne medentur. Decocta in aqua celesti cum vitis & nigrae fici foliis capillos tingunt. Succus foliorum cyathi mensura potus, phalangiorum morsibus auxiliatur. Corticis & foliorum decocto colluuntur vtiliter in dolore dentes. Colligitur per messem succus, circumfossa & secta radice arboris: inuenitur enim postri die concretus, qui in dolore dentium vtilis est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

EX GALENO.

Mori fructus maturus ventrem quidem subducit: immaturus arefactus medicamentum fit satis constringens, aded vt ad dysenterias & coeliacos affectus, aliosq; omnes qui ex fluxionū sunt genere efficax sit. Cōtunditur autem & opsoniis miscetur, veluti Rhois fructus: aut si cui ita videatur, ex aqua aut vino bibitur. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit vtilis, propter eam videlicet quae inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia cōplura particularia, quae medicamentum poscunt adstrictionem, cōpetit. At immatura præter acerbitalatem aciditate etiam participant. Tota quoque arbor in omnibus suis partibus

mistam

mistam aliquam obtinere facultatem ex constringente & purgante compositam videtur. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo, vt & latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus constringens vincit. In foliis tamen & germinibus media quodammodo cōprimētis & subducentis facultas est. Cæterum mora vbi in ventriculum purum, & primā fuerint ingesta, citissimè per intestina transcunt, et aliis cibis suo veluti ductu viam struunt. Verum secundo loco assumpta, aut prauum in ventre humorem inuenientia, celerrimè aliis vnà cum cibis corumpuntur, extraneam quandam atque inexplicabilem corruptelam inducētia similiter Cucurbitis. Tametsi enim fugacibus hæc omnia sint esculentis innocētiora, corruptione tamen nisi velociter deorsum concedant, non secus ac Pepones, vitiantur. Porro quando ventriculi os squalidum calidumq; erit, tum sicut peponibus, ita & moris vtendum. Tale nāque iecur etiam tunc esse necesse est. Immatura Mora ab arbore decerpta, siccataq; in hyemen reponunt, vt sibi medicamen ex ijs parent, vtile ad dysenteriam, aluiq; diuturnum florem persanandum. Quod quidem facile descendant fortè eis vsuuenit sola substantiæ humiditate & lubricitate, fortè etiā admistione acrioris facultatis, quæ stimulanda ad excretionē aluo sit satis. Nam adstringens qualitas adeo nihil ad deiectionem opitulatur, vt etiā reprimere

PLANTARVM HISTORIAE

reprimere stipareq; sit nata. Proinde Moris exigua
quandam eius facultatis portiunculam inesse cōi-
cio, cuius permagna in purgantibus medicamentis
habetur: quæ facit non solum vt facile deiciantur,
verumetiam vt diutius morata in ventre corrup-
pantur. Quod si corruptionē effugiant, omnino qui-
dem humectant, sed non planē refrigerant, nisi fri-
gida accipiantur. Parcissimē corpus alunt, simili-
ter vt Pepones, haud tamen vomitum cient, nec
stomacho vt illi aduersantur.

DE MYRRHIDE CAP. cxcix.

Myrrhis etiam in segetibus nobis frequēs.

NOMINA.

Cicutaria **M**ύρρη, ἢ μύρρα Græcis, Myrrhis latinis,
vulgaribus herbariis Cicutaria, quod scili-
Error de cet caule & foliis Cicutæ similima sit. Hac simili-
duplici tudine quidā decepti, veram esse Cicutam putave-
Cicutæ. rūt, cum tamē ab eā, viribus potissimum, diversissi-
ma sit. Germanis Vuilderkorffel appellatur.

FORMA.

Cicutæ caule & foliis similis est, radicē obtinet
longam, teneram, rotundam, odoratam, in cibo non
insuauem. Hæc tota Dioscoridū delineatio, nulla
prorsus reclamante nota, herbe cuius effigiem de-
mus pictam suffragatur. Siquidem caule striato, fo-
liis & flore Cicutæ similima est, adeo vt eam non
nulli à Cicutā discernere nesciāt. Radicem etiā ha-
bet longam, teneram, rotundam, cibo inmundam &
odoratam.

LOCVS.

Passim in hortis & pratis nonnullis prouenit.

TEMPVS.

Maio mense loca in quibus nascitur huius floribus quasi candicant.

TEMPERAMENTVM.

Ex secundo est ordine excalfacientium, adiuncta partium tenuitate.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Phalangiorum morsibus radix Myrrhidis succurrit cum vino pota. Menses purgat & secundas educit. Cocta in sorbitione tabidis vtiliter datur. Ferunt praterea aliqui eam bis terte die potam ex vino in pestilentialibus constitutionibus, à morbo seruare incolumes.

EX GALENO.

Radix eius menses mouet, quæq; in thorace & pulmone sunt expurgat.

EX PLINIO.

Cit menstrua & partus cum vino. Aiunt quoq; eandem potam in pestilentia salutarem esse. Subuenit et phthysicis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorum morsus restringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus eius in aqua triduo macerata sanat. DE MELILOTO. CAP. CC.

Ab utraque tua Meliloto nostra est diuersa, & odoris gratia nobis iucundissima, ut etiam cubacula præsertim dum recens est,

aug

PLANTARVM HISTORIAE

aut etiam dum cœlum sit æstate pluuium,
odore grato repleat.

NOMINA.

Mελίλωτος Græci, Melilotus, Sertula campe-
pana, & Corona regia latinis dicitur. Meli-
Sertula loti nomen officinæ retinuerunt. Sertulam verò di-
cur dicta. xerunt, quod flos eius coronamentis dicatus sit, &
quia ex ea antiquitus corona & sertâ factitata
Corona sint. Coronam autem regiam, quoniam luteis flori-
regia. bus supernè coronetur.

GENERA.

Vulgaris Tria Meliloti hodie faciunt genera. Primū vul-
Melilo- garem, statim à radice fruticosam, cubitalem folio
tus. fœnigræci minuto ac lentè fimbriato, flosculo lu-
teo, odoris suauis, tereti per ramos diffusio semine.
Primum Hoc quanquam tertio generi, quod nos verum esse
genus non putamus, foliis & floribus simile sit, tamen cū nul-
est vera lam gustu præ se ferat adstrictionem, quàm summè
Melilotus. requirunt Dioscorides, Galenus, & alii veteres me-
dici, & præter amaritudinem haud exiguan acri-
moniam habeat, sit vt inter Melilotos, meo quidem
iudicio, rectè cōnumerari non possit. Hinc est quòd
nos infra, hanc alio nōmine dignati sumus, Saxifra-
gamq; luteam appellauerimus. Alterum aspectu ca-
no, Croci flore, foliis Trifolii, minutissimis, vt paulò
Germani- pòst fusius dicemus. Hoc sanè genus nos Melilotum
ca Melilo germanicam vocauimus, quòd illa, & non prior in
tus. Germania nostra pro vera Meliloto sit vsurpanda,

ob adstrictionē illā manifestam quam gustu præfert. Accedūt folia quæ pinguia sunt, & flores Croci colorem referentes, quos Dioscorides requirit. Sētentiam nostram cōfirmat antiquus manuscriptus herbarius, qui hanc pro Meliloto pingit. Neq; obstat quòd hæc herba non admodum odorata sit: fatemur enim non esse laudatissimam Melilotum, sed eam quam Germania nostra profert. Nam quum Plinio lib. xxi. cap. xi. teste, Melilotus vbique nascatur, suam quauis habeat ferè regio necesse est. Nichil igitur mirum si huic herbæ non adsint singule notæ, quas illi veteres græci & latini attribuūt. Satis autem est ei mistam quandam, nempe adstringentem & digerentem inesse facultatem, haud secus quàm optimæ. Germani hanc herbā nominant *Vafer frauuen schuchlin*, vel *Vuilden klee* (*Galli Du Melilot.*) Tertium genus nos optimam & legitimam esse arbitramur Melilotū, quā nos maioris discriminis causa Italica nuncupauimus, quòd mos sit patrius Germaniæ nostræ omnia Melilotos ferè peregrina vocare Italica. Germa. itaque haud ineptè *Vuellicher Steinklee* nominabitur.

FORMA.

Vulgaris Meliloti descriptionem inuenies suo loco. Germanica, herba est humilis, palmi altitudine, folio pratensis Trifolii, pingui & cano, flore pisi, minore tamē, luteo, semine in siliquis, radice rufa. Italica, quam è Campania allatam in Germaniā arbitror,

PLANTARVM HISTORIAE

bitror, caulem habet subrusum, rotundum, foliū fœ
nigraci, in ambitu serratum, flore lutco, odorato, se
mine in siliqua lunata, vt pictura luculenter osten
dit. Tota etiam herba odorata est, vt hinc etiā con
sicere liceat veram esse Melilotum.

LOCVS.

Germanica passim in pratis Germania, monto
sis potissimum, nascitur. Italica in Germania, nisi
sata fuerit, non provenit. In Campania verò circa
Nolam, Dioscoride testē, copiose nascitur.

TEMPVS.

Floret ferè per integram æstatem vtrumque ge
nus. Siliquas tamen in fine Iulii & Augusto mens
se proferunt.

TEMPERAMENTVM.

Mixta est facultatis: habet enim quiddam ad
stringens, sed & discutit & maturat: copiosior co
nim in ea est substantia calida quàm frigida.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Melilotus adstringendi facultatem obtinet. Mol
lit omnes inflammationes, præcipuè autem oculo
rum, vteri sedis & testium in passo decocta &
illita. Aliquando autè addito oui lutco affato, aut
fœnigraci farina, aut lini semine, aut polline mola
rio, aut capitulis Papaneris, aut Intybo recentes
meliceridas per se cum aqua, & achoras cū cre
ta Chia, et vino aut galla illita sanat. Stomachi do
lorem cum vino cocta, & cruda cum antedictis le
uat.

uat. Aurium etiam dolores cruda expressus succus,
 & cum passo instillatus sedat. Capitis dolorem le-
 nit, cum aceto & rosaceo inspersa.

EX PLINIO.

Melilotos oculis medetur cū lacte, aut cum lini
 semine. Maxillarū quoq; dolores lenit, et capitis cū
 rosaceo: itē aurii ē passo, quæq; in manibus intumes-
 cunt vel crumpunt. Stomachi dolores in vino de-
 cocta, vel cruda tritaq; Idē effectus est ad vulnas.
 Testes verò & sedē prociua, quæq; ibi sunt vitia,
 recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosa-
 ceo illinuntur ad carcinomata. Deferuescit in vino
 dulci. Peculiariter & cōtra meliceridas efficax.

DE MANDRAGORA. CAP. CCI.

NOMINA.

Mανδραγόρας, ἢ κερκίρα Græcis, ἀνθρω-
 πώμορφος Pythagoræ, Latinis canina aut
 terrestris mālus, officinis Mandragora Germanis Circea
 Alraun (Gal. Mandragore) dicitur. Qui Circe quare di-
 ceā vocarunt, nomen illi à Circe fecerūt, quoniā ēta Man-
 creditur radix eius ad amatoria cōducere. Pythago dragora.
 ras haud dubiè ab humana forma, quā radix ex Anthro-
 pus referre videtur, Anthropomorphon appellauit. morphos
 Hinc sumpta occasione, agyrtæ & impostores illi cur nomi-
 circūforanei radices humana effigie insignitas circe nata.
 cūferunt, quas Mādragoras esse testatur, cū tamē Agyrtarū
 cōstet eas esse fictitias, & manu factas ex cānarū cōmētum.
 radicibus humana specie sculptis, postea plātatis
 Nascuntur

PLANTARVM HISTORIAE

Nascuntur autem subinde radícula parua, quæ res præsentant capillos, herbâ, pectinis pilos, & ex terra cum acquirunt colorem, ut radices esse appareant. Sunt & alia multa quæ nebulones illi fabulantur, ut pecuniam ab imperitis extorqueant, quæ commemorare in præsentia nihil attinet. Terrestrè mâlum Romani dixerunt, quod mâla proferat, nec in altum ut reliquæ arbores surgat.

Terre-
stris mâ-
lus.

GENERA.

Mas.

Duo Dioscoridi & Plinio Mandragora sunt genera. Mas candida est, μάστρον Græci vocant. Huius hic effigiem, citra tamen poma, quæ habere non potuimus, damus. Fœmina nigra, Græcis ἡριδία.

Fœmina.

ἡριδία à similitudine foliorum appellata. Theophras-

Locus

stus tamen li. vi. de historia plantarum, ca. i. tertium

Theophras quoddam genus Mandragora constituere videtur:

ἴσθι explis cuius fructus sit μέλας, καὶ ἄκνους, καὶ οἰκώ-
tu diffici- δὴς τῷ χυμῷ, hoc est, niger, acinosus, & sapore
lis. vinosus. Et nisi hoc genus à prioribus diuersum esse

statuas, discrepare inter se non leniter Theophrastus

& Dioscoridem necesse est fatearis. Nam Dioscori-

des palam asserit poma priorum duorum generum

vitellis oiorum esse similia, & pallida: contra Theo-

phrastus nigra, acinosa, ut diximus, & sapore vino-

sa esse tradit. Accedit quod idem Theophrastus eos

dem loco Mandragoræ caulem tribuat, perinde at-

que Plinius, quem Dioscorides penitus aufert: ut

hoc nomine necesse sit hæc omnia ad tertium hoc

genus

genus *Mandragora* referre, quod nos tamen infra inter *Solanigenera* recensebimus, ubi etiam eius proprietatem offendes.

FORMA.

Fœmina angustioribus & minoribus quam *Lam. Fœmina*.
 Eluca foliis est, grauiter odoratis & virosis, per terram sparsis, iuxtaq; folia pomis vitellis oui similib. pallidis, odoratis, in quibus semen quale pyri, radicibus magnis, binis ternisve, sibi inuicem implicitis, in superficie nigris, intus candidis & crassi corticis. Caulē verò nō fert. Maris folia sunt magna, candida, lata, læuia vt *Beta*. Māla duplo maiora quam fœminæ, croci colore, cū aliqua grauitate odorata, quæ comedētes pastores quadantenus soporantur. Radix supradicta similis, maior tamen candidiorq;. Orbata & hæc est caule.

LOCVS.

Prouenit in syluis & vmbrosis locis. Nunc in hortis etiā plātatur.

TEMPERAMENTVM.

Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, aded vt tertii sit ordinis refrigerantiū. Veruntamen nonnihil etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Radicis cortex non tantum refrigerat, sed & desiccatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus colligitur è cortice recentis radicis tuso & prælis subiecto, quem insolutum cū iam concreuerit,

PLANTARVM HISTORIAE

rit, in sicili vase reponere oportet. Colligitur itidē
 ē pomis succus, ignavio tamen. Delibratur radice
 cortex, & traiectus lino ad vsum suspēditur. Quo
 dam Mandragorae radices in vino ad tertius deco
 quant, & traiectum per colum ius servant, vete
 cyathi vnius mensura in perugiliis, & dolorib. &
 in his quos sine doloris sensu secare aut vrere volue
 rint. Potus obolorū duorum pondere cum mulsā a
 qua Mandragora liquor, pituitam, nigramq; bilem
 peratri modo purgat. Verū maiore copia potus vi
 tam adimit. M sectur medicamētis ocularibus, &
 iis quae dolores finiunt, pessis quoq; emolliētibus. Per
 se semioboli pondere appositus, menses & satius tra
 hit. Sedi pro balano subditus somnum facit. Radix
 ebur emoll. re fertur, si senis horis cū eo decocta sit,
 & in quā voluerit aliquis formam fingi & forma
 vi facilem reddere. Folia recent a, oculorū & quas
 vlcera excitarunt inflāmationibus cum polenta il
 lita profunt. Disentiunt eadem omnem duritiē, abs
 cessus, strumas, tuberculaq; quinq; aut sex diebus
 leniter confricata. Stigmata sine vlceratione de
 lent. Folia condita sale servantur in eosdē vsus. Ra
 dix autē trita ex aceto ignibus sacris, & serpentini
 ictibus ex melle aut olco medetur. Strumas atque
 tubercula ex aqua discit. Articulorum dolores cū
 polenta sedat. Cōficitur citra coctionem vini ē cor
 tice radice. Terna mina in vini dulcis metretam
 consiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, iis qui sca
 cari

eari, aut vri debent, ut ante dictum est. Siquidē nullo tunc afficiuntur dolore, eò quod somno quodam pressi torpescant. Māla olfactu, & comesta soporē afferunt. Potest idem & eorum succus. Nimiū tamen eorundē vsus obmutescere facit. Semen malo-
rū potū vterum purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto rubra feminarum profluvia sistit. Colligitur ex radice liquor, ea scarificata multifariā, & eo quod erūpit, in canū vas recepto. Est autē liquor succo efficacior. Sed nō ferunt omnibus locis liquorem radices, idq; experientia ostendit.

EX GALENO.

Soporem conciliandi vim habent Mandragora poma. Radicis cortex valentissimus est, reliquum quod intus est imbecillum existit.

EX PLINIO.

Succus fit & è mā'is et è cau'e, deciso cacumine, et radice pūctis aperta aut decocta. utilis hæc vel surculo. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Succus non vbique inuenitur, sed vbi potest, circa vinlemias queritur. Odor grauis ciui, sed radicis & māli grauior. Māla matura in sole siccantur. Succus ex iis sole densatur: item radices trusa, vel in vino nigro ad tertias decocta. Folia seruatur in muris eff. caciū, alās recētū succus pesty est: sic quoque vires noxiæ. Grauedinem afferūt etiam olfactu, quanquam mā'a in aliis terris mandantur nimio tamen odore obmutescunt ignari. Potu quidē

PLANTARVM HISTORIAE

largiore etiam moriuntur. Vt somnifica pro viribus
bibentium. Media potio cyathi vnius. Bibitur &
contra serpentes, & ante sectiones punctionesq; ne
sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnum odo-
re quassisse. Bibitur et pro Elleboro duobus obolis in
mulso. Ad strumas radix Mandragora ex aqua bi-
bitur. Articulis prosunt folia cū polenta, vel radix
recens tusa cum cucumere sylvestri, vel decocta in
aqua. Cum cerato apostemata & vlcera tetra, fo-
lia Mandragora recentia sanant. Radix vulnera
cum melle aut oleo.

DE MALIS INSANIS.

CAP. CCII.

Poma amoris etiam hodie vulgò dicuntur,
mala hæc insana.

NOMINA.

QUæ mala insana hodie appellatur, et à Nea-
politani Melāxana, ab aliis amoris poma,
à Germanis verò Melanzan (Gallie
Pomes d'amours) num veteribus cognita fuerint
assensere non ausim. Non latet tamen Hermolaū
in Corollario suo in ea esse sententia; vt putet esse
tertiam Mandragoræ speciem, quā Morion vocat.

Mala insana quam tamen sententia cur non probe, facit impri-
na nō sunt mus Theophrastus qui lib. vi. de historia stirpium
tertia Mā ca. ij. eius fructum esse nigrum, acinosumq; scribit,
dragore qualia mala insana non sunt. Dein quod Morij fru-
species. ctus letalis sit, mala verò insana minimè, vt pauld

pòst dicemus. Mala autem insana dicta sunt, non Mâla in-
quòd letalia sint, sed quòd difficulter concoquâtur. sana cur
Amoris autem poma, quòd propter elegantiam & dicta.
pulchritudinem digna sint quæ amentur. Amoris

GENERA. poma qua
Duo sunt malorum insanorum genera. Aliqua e- re vocata.
nim purpurea ferè tota, aliqua verò lutea, aut can-
dorem aliquem præ se ferentia. Primi generis poma

Germanicè braun Melantz an, alterius autem,
geel Melantz an vocantur.

FORMA.

Mala insana in frutice nascuntur, qui Personatiâ
propemodum caule & foliis refert. Differunt autē
huius folia à Personatiâ, quòd longiora, magniq; la-
ciniata sint. Flores habet purpureos, speciosos, sex fo-
liis è calatho stellatim radiatis, fructus oblôgi ma-
li forma & magnitudine, in quibus semen siliqua-
stro non dissimile. Radicem multis capillatam si-
bris luteâmq;.

LOCVS.

In hortis apud nos seruntur, sed frequenter in fi-
etilibus & pensilibus fenestrarum hortis. Et eodē
cultu quo cucumeres & melones gaudent.

TEMPVS.

Floret Augusto & Septembre mensibus, ac sub-
indē fructum profert.

TEMPERAMENTVM.

In his malis haud dubiè vt in cucumere esculen-
to aut fungo, frigida & humida temperies superat.

PIANTARVM HISTORIAE

VIREs.

Nullū, quōd scia, in medicina vsū habent. Edis-
tur autē à nonnullis ex oleo, sale & pipere fungorū
modo cocta. Alii vbi paululū inferbuerūt igni, in or-
biculos vel taleolas digerunt, & in acetariis ex o-
leo, vel pipere & aceto comedunt. Salsamariū in
muria acida seruant, cibo per hycmē & verori gra-
to, sed tamen qui acrius cōcoquatur. Quid multa?
delicatorū & omnia digustare volentiū cibis est
malū insanū. Quare qui sanitatis studio aliquis te-
nētur, ij statim nomine ipso terriū, vsū illorū cui-
tabunt. DE NYMPHAEAE. CAP. cccii.

NOMINA.

Nymphaea Gracis, Nymphaea latinis, officio
Nenu-
phar. nis Nenuphar barbara voce nominatur. Ger-
Nym- manis Seeblum, Vuassermahen (Gallicē Blāc
phaea cur men sibi vendicasse videtur, quōd aquosa amet lo-
dicta. ca: vel, vt ex veterib. aliqui fabulati sunt, à Nym-
pha, quae zelotypia Herculis intabuit & mortua
est, inq; palustrem hanc plantam mutata.

GENERA.

Duo eius genera. Vna enim à flore candido, Lilij
Candida. simili, candida appellatur. Germa. Vucisz See-
blumen. Altera itidem à floribus, qui lutei sunt, lu-
lutea. tea nominatur, Germanicē geel Seeblumen. Pos-
sent etiam radicibus discerni, cum prior nigra, alte-
ra verò candida constet, adēd vť hoc nomine prima
candi-

candida, altera autem nigra diceretur. Multò vero consultius est à floribus, quàm radice discrimen sumere, quòd illi nunquam non oculis expositi sint, radices autem non nisi effossa intueri possint.

FORMA.

Prima, folia Ciborio similia habet, minora tamē & longiora, quadantenus super aquam eminetia, aliqua tamen etiam sub aquis, plura ab vna radice prodeuntia. Flos candidus, Lilio similis, in medio quòd crocē sit obtinēs. Hic cū defloruerit rotūdus, & malo circūferentia, aut Papaueris capiti similis, colore niger sit. In quo sanē semen clauditur nigri, latū, densum, gustu glutinosum. Caulis illi leuius, minimē crassus, niger, Aegyptiæ fabæ similis. Radix nigra, aspera, clauæ persimilis. Ha singula notæ alteri Nenuphari vocato quadrāt. Folia enim conspiciuntur orbiculato, laui, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante: flore candido, Lilio simili, in medio croceum habente, & cū defloruerit capite Papaueris, in quo semen latum, amarū, pingue. Caulis gracilis est et leuis. Radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam rebræsentans. Altera folia antedicta similia habet, sed radicē albam & asperam: florē luteū, splendētem, rose similem. Quæ itidem notæ in vniuersum omnes alteri Nenuphari, quæ luteis est floribus, respondent.

LOCVS.

Nascitur in paludibus, & aquis stagnantibus.

PLANTARVM HISTORIAE
TEMPVS.

Flores in fine Maij & Iunio mense colliguntur,
Radices autem in autumnno effodiuntur.

TEMPERAMENTVM.

Nymphaea tum radix, tum semen refrigerandi
& citra morsum desiccandi vim obtinet.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Radix prioris sicca cum vino pota, coeliacis &
dysentericis prodest. Lienem absumit. Stomachi ven-
sicaq; doloribus illinitur. Alphas ex aqua exterit. Alo-
pecias cum pice imposita sanat. Eadē contra Ve-
neris insomnia bibitar, siquidem ea comescit. Pau-
cis diebus, si quis cōtinuō bibat, genitale infirmat.
Idem semen potum efficit. Alterius quae lutea dici-
tur, radix & semen contra muliebria profluvia ex
vino nigro bibuntur.

EX GALENO.

Nymphaea radix & semen, vētris profluvia cohi-
bēt, semenq; genitale sine per somnia, sine alio pacto
immodicē profluens retinent. Iuuant dysentericos.
Ceterum Nymphaea quae candidā radicem habet,
potentioris est facultatis, vt & muliebri profluvio
medeatur. Verum & haec, & ea quoque quae atrā
habet radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro
nonnullā etiā abstergerendi vim obtinent, ita vt al-
phos & alopecias sanēt. Ad alphas verō maceratur
aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad haec aptior
est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

EX

EX THEOPHRASTO.

Nymphæa trita plagæ imposita sanguinem sistere traditur. Vtilis et ad difficultates intestinorū pota.

EX PLINIO.

Venerē in totū adimit Nymphæa, semel in qua draginta dies pota. Insomnia quoq; Veneris à ieiunio pota, et in cibo sumpta. Illita quoque radix genitibus, inhibet non solū Venerē, sed effluentia genitura: ob id corpus alere, vocemq; dicitur. Semen cum vino potū dysentericis auxilio est. Tenesmo radix eiusdem ex vino bibitur. In vino quoque pota lienem consumit. Dolores vesicæ sedat ex vino. Manantia sanat vlcera. Maculas omnes emēdat. Trita plagis imponitur. Vlceribus, priuatim iis quæ calcamento facta sunt, prodest arida infricata.

DE NAPY. CAP. CCIIII.

NOMINA.

Nάπυ, ἢ σίνησις Gracè, Sinapis & Sinapi Latine vocatur. Officina nomē retinuerunt. Officina
rū error.
Perperam tamē faciunt, quòd altero genere pro Eurica, quam suo loco depinximus, vtuntur. Germanicè Zam oder Gartenfenff (Gallicè Seneue) nominatur. Sinapis autem nomen è Gracia venit in Latium, censetq; dictum Athenæus libro nono vnde di-
Dygnosoph. σινάπιν, ὅτι σίνετο τῆς ὀσμῆς ἐν ἑτα-
τῇ ὀδμῇ, hoc est, quòd olfactum luminibus offi-
ciat. Pleraque Gracia Napy nominat, quasi Na vocatum.
phy, vt idem eodem in loco interpretatur, quoniam

PLANTARVM HISTORIAE

non sine natura sit, sed acri & proinde incommoda donetur. Alii Napy per priuationem videlicet *υπέρτιον*, quasi immitte dici volunt, quoniam acrimoniae vehementis particeps sit.

GENERA.

Sinapis duo inueniuntur genera, foliis, floribus & semine distantia. Primum siquidem genus rapiam frondem exprimit, floremque luteū obtinet, ac semen album profert. Nos à floribus luteis Germanicè *geelē Gartē* enss nominauimus. Alterum in *truce* folium laciniatur, floreque albicante, & semine vesco pulloque constat. Nos genus hoc ab albicantibus floribus *Vueissen Gartensens* appellauimus, ut esset huius aliqua ab *truce* nomenclatura diuersitas, quam Germani simpliciter *Vueissen Sens* vocant.

FORMA.

Primum caulem habet hirsutum, longum, ramosum, folia rapi, minora tamen & asperiora, flores luteos, siliquas rotundas ac hirsutas, plenas semine candicante. Alterū genus itidem hirsuto caule praeditum est, minore tamen, foliū *Erucae*, maioribus tamen ac latioribus, laciniatis, floribus albicantibus, crucisq; effigiem referentibus, siliquis teretibus & oblongis, semine pullo rufescente ve refertis.

LOCVS.

Utrumque in hortis satum pronenit. Et quamuis nullo cultu plerumque germinet, tetrā tamē arā

nam & congestitiam magis amat.

TEMPVS.

Floret vtrūque Iunio ac Iulio mensibus, eodēque tempore semen in siliquis suis profert.

TEMPERAMENTVM.

Sinapi calefacit & desiccat quarto ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calfaciendi, extenuandi & extrahendi vim habet. Commanducatum capitis pruritum elicit. Succus eius hydromeliti mixtus contra tonsillarū praeduros tumores, ac veterem callosamq; arteria scabritiem conuenienter gargarizatur. Tritum nariibus admotū, sternutamenta ciet. Comitialibus quoque auxiliatur. Faeminas vuluae stragulatū oppressas excitat. Lethargicis, deraſo capite, illinitur. Fioeis ammiſtum & impositum donec rubescat locus, ad coxendicum cruciatus, lienes, & omnis generis diuturnos dolores confert, cum permutandae passionis causa ex alto in cutis superficie aliquid trahere voluerimus. Alopecius illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cum melle, aut adipe, aut cerato delet. Ex aceto contra lepras, & feras impetigines perungitur. Aridum contra februm circuitus bibitur, aut potui polenta modo inspersum. Extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus vtiliter ammiscetur. Grauitati aurium & sonitui, tritum cum sico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum & palpebrarum scabritiem illinitur.

Expria

PLANTARVM HISTORIAE

Exprimitur autem ex viridi adhuc semine succus,
& in sole siccatur.

EX PLINIO.

Synapi Pythagoras principatum habere ex his,
quorum sublime vis feratur, iudicauit: quoniā non
aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad ser-
pentium ictus & scorpionum tritum cum aceto il-
linitur. Fungorum venena discutit. Contra pitui-
tam tenetur in ore donec liquecat, aut gargariza-
tur cum aqua mulsa. Ad dentium dolorem mandi-
tur. Ad vnam gargarizatur cum aceto & melle.
Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmo-
nibusque. Excreationes faciles facit in cibo sum-
ptum. Datur & suspiriosis. Item comitialibus tepi-
dum cum succo cucumerum. Sensus atque sternus
tamenta capitis purgat, aluum mollit, menstrua &
vrinam ciet, & hydropicis imponitur. Cum fico &
cumino tusum ternis partibus comitiali morbo. Et
vuluarum conuersionem suffitum excitat odore ac-
eto mixto. Item lethargicos: & si vehemētor som-
nus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti
illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thora-
cis, lumborum, coxædicum, humerorum, & in qua-
cūque parte corporis ex alto vitia extrahēda sunt,
illitum caustica vi emendat pustulas faciendo. At
in magna duritia sine fico impositum: vel si vehē-
mentior vrigo timeatur, per duplices pannos. Vtū-
tur ad alopecias cum rubrica, pforas, lepras, phthi-
riases,

riases, tetanicos, opisthotonicos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Succusq; tribus modis exprimitur in scitili, calefcitque in eo in sole modice. Exit & e cauliculo succus lacteus, qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix cum immaduere masto, contemruntur, manusque plena mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput sensuq; omnes. Mulierum etiam lassitudines, saluberrimo medicina genere. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Illinitur & linoribus sugillatisq; cu melle & adipe anserino, aut cera Cypria. Fit & oleu ex semine madefacto in oleo expressoque, quo vtuntur ad neruorum rigores, lumborumque & coxedicum perfrictiones.

EX SIMEONE SETHI.

Sinapi vim habet dissoluendi & discutiendi humiditates que in capite & stomacho sunt. Confert etia lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbi, qui ex adusta pituita contracti sunt: ad hac & podagris a pituita factis. Officit vero visui, & calido capiti, ac iccori. Adiuvat concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuit que in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris, eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate grauatas siccat. Si cum melle sumatur, tusses resoluit. Cum caricis vero ischiadicis illitum, & lienosis vtile est: trahit enim
que

PLANTARVM HISTORIAE

quae intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum
verò & incensum, serpentes fugat.

DE NERIO. CAP. CCV.

NOMINA.

Nήριον, ἢ ῥοδόδαφνι, ἢ ῥοδόδενδρον gra-
eci, Nericon & Rhododendron latinis, offi-
cinarum, Oleader. cinis & barbaris Oleaster, Germanis Olander,
Rhododa (Gallis Rosage, ou Rosagine) dicitur. Rhododa
phne cur phnen autem Graeci dixerūt à rose floribus & lau-
dicta. di foliis, quae fruticis huius praecipue sunt nota. Nec
refert quòd Dioscorides amygdala foliis eius folia
comparauerit, lauro enim & amygdala non dissimilis
magnopere foliorum figura est. Fecit idem ro-
Rhododēsa flos & arbor, ut eadem gens Rhododendrum no-
dros quae minauerit.

re.

FORMA.

Notus frutex, amygdala longiora & crassiora
folia habens, florem rosarum figura, fructum amy-
gdala similem, veluti cornu, qui dehiscens lanca na-
tura plenus est, pappis acanthinis simili. Radix illi
est acuminata, longa, lignosa, gustanti salsa.

LOCVS.

Nascitur in hortis, maritimis, & secundum
omnes locis.

TEMPVS.

Quo mense floribus & fructu praegnant sit Ne-
rion, non satis constat: neque enim vel flores vel fru-
ctus eius nobis videre licuit. Hinc est quòd etiam
pictura

pietura quam exhibemus iisdem careat.

TEMPERAMENTVM.

Nerium Arabes calefacere in principio tertij ordinis, & in secundo siccare tradunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Flores & folia canes, asinos, mulos & quadrupes pedes plurimos enecant: hominum verò cum vino pota contra venenatorum morsus prasidia salutaria sunt, prasertim si ruta cõmiscueris. Infirmitiora verò animantia, vt oves, caprae q; , si aquam biberint in qua folia eius maduerint, moriuntur.

EX GALENO.

Nerium aut Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem illitus discutiendi vini obtinet. Intrò autẽ in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus, verumetiam plebisque pecudibus.

EX PLINIO.

Rhododendros ne nomen quidem apud nos inuenit Latinum: Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Mirum, folia eius quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes prasidium, ruta addita, & è vino pota. Pecus etiã & caprae si aquã biberint in qua folia ea maduerint, mori dicuntur.

DE OXYACANTHA. CAP. CCVI.

NOMINA.

O Ξυδάκωνθα Græcis, Oxycantha Latinis, Officinis Berberis, Germanis Paisselocer, Berberis. Saurich,

PLANTARVM HISTORIAE

Saurich, Erbsel, Versich, (Gallis Espine vine-
te, ou du Berberis) vocatur. Haud dubiè Græci

Oxyacan- à spinarum acuminatis cuspidibus Oxyacantham
tha vnde dixerunt.

dicta.

FORMA.

Sylvestri pyro similis arbor est, sed minor & ni-
mis spinosa. Fructum fert Myrto similem, plenum
cōfertūve, rubētē, facili, intus nucleos
habentem. Radicem multifidam & altam. Huius
delineationis nota, nulla prorsus reclamante, arbori
quam vulgò Berberim barbara voce nomināt, ad-
amūsim respondent. Nanque arbuscula est pyri
sylvestris aspectu, sed humilior, ramis ex intervallo
spinosis, folio lentè per ambitum aculeato, acinis
rubentibus, in pediculo iuxta & racemo pendulis,
gustū acido & subaustero, duobus intus granis, ra-
dice numerosa.

LOCVS.

Multis nascitur locis, sylvis nempe, frutetis, cam-
pestribus, montanis, siccis & aquosis.

TEMPVS.

Germinat ineunte vere, ab occasu autem Vergi-
liarum fructifera. Per Septēbrem itaq; ac Octobrē
menses carpitur, campos sylvasq; exornans.

TEMPERAMENTVM.

Oxyacantha astringit & desiccāt, atque adeo
quorundam sententia frigida & sicca in secundo
est ordine. Fructus tamen tenuium est partium, &
paululum

paululum quiddam incisuum habet.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius fructus potus & comestus, alui profluuiū,
& muliebrē fluxū sistit. Radix trita & illina acu-
leos & spicula extrahit. Abortum facere tradūt, si
sensum venter ter radice feriatut aut perungatur.

EX GALENO.

Oxyacanthus arbor vt pyro sylvestri similem ha-
bet speciem, ita & facultates minime dissimiles.
Quin & ipsi fructus Pyri quidē sylvestris prorsum
atque absolute austerus est, Oxyacāthes autem te-
nuium partiū est, & modicē incidit. Porro arboris
huius fructus, pyri sylvestris similis nō est, sed Myr-
ti potius fructui, rubēs scilicet & rarus. Habet ve-
rō & nucleos. Caterū nō tantū esus, sed & bibitus
omnes fluxionum affectus cohibet atque sistit.

EX RECENTIORIBVS.

E baccis vinum exprimitur eodem fere vsu, quo
vinum ex mālō punico. Condiuntur itē acini vel
melle vel saccharo ad restringendam sitim, depellē-
damq; febricitātium malaciam, quorum morosum
nimis palatum cibum ferre quemcūque respuit. E-
lāguescēs appetentiā grato huius acore recreatur.

DE OSYRIDE. CAP. CCVII.

NOMINA.

Oξύς Græcis, Osyris Latinis, officinis Lina-
ria, nonnullis herba vrinālis appellatur. Ger-
manicē Fläschzkraut, Lynkraut, Harokraut,

+ ad pōs
videtur le-
gēdum, vt
est apud
Dioscori.

PLANTARVM HISTORIAE

Unser trauuen flachsz, Vuikl flachsz, kro-
Linaria tenflachsz, Nabelkraut. *Linariam* autem di-
 quare di- xerunt recentiores à foliis quæ lini faciem referre
 etia. videntur.

FORMA.

Virgultum samentumve nigrum est. Oſyris, tes-
 nus virgas lentasque habet. In quibus foliola sunt
 ternâ, & quaterna, modò quina, interm & semâ,
 cœu Lini nigra initio, dein colore mutato subrube-
 scentia. Iam si rem diligenter expendas, nullam
 delineationis notâ Oſyridi traditam, in *Linaria* di-
 etia hodie deesse reperies. Siquidem hæc cauliculis
 fruticat nigricantibus, & qui ob suum lentore haur
 facile franguntur, tenuibus, atris quoque foliis, Li-
 ni facie. Concolori denique semine tantisper dum
 maturascit, postquam ematuruit rubescente. Senes-
 centes quoque ramuli nigritiâ in ruborem vertût.
 His accedit antiqui & manuscripti herbarij testi-
 monium, qui *Linariam* eam esse herbâ tradit, quæ
 Dioscoridi Oſyris dicitur, floremq; habere luteu in-
 quit. Respondet etiam per omnia pictura.

LOCVS.

Pasim in campestribus prouenit.

TEMPVS.

Floret æstate tota & autumno.

TEMPERAMENTVM.

Oſyridi amara inest qualitas, & obstructions
 aperienti, adeoque vt calida sit necesse est. Amara
 nanque,

nāque, Galeno lib. iij. cap. x. de simpl. medicamen-
to. facult. teste, qualitate prędicta, omnia calida sūt.
Sic etiam eodem authore lib. v. cap. xi. eiusdem tra-
ctationis, singula quę poros & meatus expurgant,
ab infractūq; liberant medicamēta, calida sunt &
tenuium partium. Vehementer itaque errant, qui
Linariam frigidam & humidam esse asserunt. Et Linaria
certē pręter ea quę iam dicta sunt, vel hoc vno ar-
gumento erroneam illorum sententiam confutare nō est fri-
gidā.
gumentō erroneam illorum sententiam confutare
omnium maximē licebit. Cū etenim Linaria vri-
nam mouendi facultatem inesse scribant vulgares
etiam herbarij, colligitur illam nō esse frigidam &
humidā, quando Galeno libro iam citato cap. xij.
attestante, omnia quę urinam ducunt ex acriū atq;
quę ad eō calidorum & siccorum sint genere.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius decoctū potū morbo regio affectos inuat.

EX GALENO.

Osyridi, ex qua medicamenta ad exterēdam le-
uigandamq; cutem, Gręci $\chi\rho\sigma\iota\mu\alpha\tau\alpha$ vocant fieri
solent, amara inest qualitas, & obstructions expe-
diendi facultas. quare & in iecinore consistētes ob-
structions adiuvat.

$\chi\rho\sigma\iota\mu\alpha$ & enim non solum scopas, vt qui Additio.
dam arbitratur, verumetiam $\chi\rho\sigma\mu\eta\tau\alpha$, Sui-
da & Phaporino testibus, hoc est, com-
ptoria & venustantia faciem medicamenta

P ij Gręci

PLANTARVM HISTORIAE

Græci dixerunt : è quorum sanè numero Olyris est, quæ cum amara sit, extergere etiam quæ sunt in corpore, facie potissimum, maculas potest. Hinc reà è Plinius ex eius foliis mulieribus, utpote quæ plus aliis comere & venustare faciem solent, smegmata fieri tradit.

EX AETIO.

Olyris est herba subfruticosa, tenuibus virgulis, fractioni venientibus, foliis Lino similibus, nigris primo, postea subrubescens, gustu amarus, unde regio morbo conferunt.

EX PLINIO.

Smegmata mulieribus ex Olyridis foliis faciunt. Radicum decoctum potum, sanat arguatos. Eadem priusquam maturescit semen concisa, & sole siccata, alui sistunt. Post maturitatem verò collecta, & in sorbitione decocta, rheumatismis ventris medentur, & per se trita ex aqua celesti bibuntur.

DE OCIMO. CAP. CCVIII.

NOMINA.

Oυζον Græcis, Ocimum Latinis, recentioribus Græcis βασιλικόν, id est, regium appellatur, quod nomen apud omnes nostræ ætatis herbarios & officinas usurpatur. Sunt tamen quibus Ocimum gariophyllatum nominetur. Germanicè Basilien, vel Basilgram, (Gallie du Basilic) dicitur. Ocimum autem quibusdam à nascendi celeritate

celeritate dictum est, siquidem à sutu tertio statim die emicat. Quod verius Ocimo videtur cōuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatum ab ὄκμς Græca dictione, quæ citò significat. Proinde sunt qui significantius per x. scribendum ducant Oximū, ab ὄζω, quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimum spiret odorem. Ab eodem odore, quod basilicā & regia domo dignum sit, Basilicum hodie nuncupatur.

Oximum
cur dictū.

Basilicū.

GENERA.

Sunt qui duo Ocimi cōminiscātur genera: vnum latiora folia habens, quod priuatim Basilicum: alterum angustiora, quod Ocimum gariophyllatum appellant. Nos tria tibi exhibemus ex vno promiscuè semine nobis nata. Primū maioris discriminis ratione Ocimum exiguum, Germanicè Klein Basilien, nominauimus. Alterum mediocrè, Germanicè Mittel Basilien. Tertium magnum, Germanicè grosz Basilien vocauimus. Neq; enim nisi foliis solis distare videntur, quæ in primo genere exigua admodum sunt, in altero verò paulò latiora, in tertio primi respectu latissima. Odor autē omnibus tribus vnus idemq; est.

FORMA.

Ocimum pedali altitudine profilit, surculosum, ramulis rotundis, folio Mercurialis, diluti viroris. Floret particulatim, primò parte inferiore, demum superiore: flosculo candido, semine pullo nigrove,

PLANTARVM HISTORIAE

cui cortex obducitur. Radix vna descendit in altitudinem, crassior & lignosa, cetera à lateribus funduntur exiles ac proluxa.

LOCVS.

Passim in figulinis vasis mulieres extra fenestras adium fouent Ocimum. In hortis etiam satū prouenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēsb. floret, de in semē producit.

TEMPERAMENTVM.

Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, cum excrementitia quadam humiditate.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Copiosi comestum oculorum aciem hebetat, anum emollit, flatu mouet, vrinam cit, lac euocat, egregiè in ventre mutatur. Allitum cum polenta farina, rosacco & aceto, inflammationibus, mariniq; draconis & scorpionis ictibus auxilio est. Per se autem cum vino Chio oculorum doloribus. Oculorum caligines succus eiusdem absterget, eorundemque fluxiones exiecat. Semen potum quibus atra bilis gignitur, difficultati vrina, inflatisque conuenit. Olfactu per nares attractum, copiosa sternutamenta mouet. Quod idem herba efficit. Porro instante sternutamento oculos comprimere oportet. Sūt qui Ocimum cauent minimeq; comedūt, quandoquidē manducatum, & in sole positū vermes gignat. Libyes autem adiecerunt, quod si feriantur à scorpione qui Ocimum ederint, nullo dolore conflictari.

EX GALENO.

Ocimum excrementiam humiditatem habet, proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Caterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum utile est. Plerique hoc etiam ut opsonio utuntur, ex oleo & garo offerentes. Vitiosioris autem succi est. Admentiuuntur ob hoc quidam dicentes, si tritum fictili nouo indatur, celerrime intra paucos dies scorpiones gignere, praesertim ubi quis quotidie ollam soli expositam caesecerit. Sed hoc sane à vero abest. Id porro verè de eo dixeris, prauum succi, stomacho inimicum, & concoctu pertinax olus esse.

EX PLINIO.

Ocimum Chrysippus grauiter increpuit, inutile esse dicens stomacho, vrinae, oculorum quoque claritati. Praeterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia, ideoque capras id aspernari hominibus quoque fugiendum censet. Adiciunt quidam, tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commendatum, & in sole positum, vermes afferre. Alij verò, si eo die feriatur quispiam à scorpione, qui ediderit Ocimum, sanari non posse. Quinimò tradunt aliqui, manipulo Ocimi cum cancri decem marinis vel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum scorpiones à proximo omnes. Diodotus in empirick, etiam peliculos facere Ocimi cibum. Secuta etas alacriter defendit, nam id esse capras, nec minus quam

PLANTARVM HISTORIAE

metham & rutham scorpionū terrestrium icibus,
marinorumque venenis mederi cū vino, addito ace-
to exiguo. Vsu quoque compertum, deficiētibz ex
aceto odoratum salutare esse. Item lethargicis, et
inflammatis refrigerationi. Illitum capitis dolori-
bus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculo-
rum epiphoris impositum ex vino. Stomacho quoq;
esse utile, inflationes & ructum ex aceto dissolvere
sumptum. Aluum sistere impositum. Vriam ciere.
Sic & morbo regis & hydropicis prodesse. Choles-
ras eo & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiā
coliaci, Philistio dedit, & coctum dysentericis &
colicis Plistonici. Aliqui & in tenasmo, & san-
guinem excreantibus, in vino. Contra duritiā prae-
cordiorum illinitur mammis. Exrigit quoq; lactis
prouentum. Auribus vtilissimum infancium. prae-
cipue cum adipe anserino. Semen tritum & huius-
modi naribus, sternutamenta mouet, & destillationes
capiti quoque illitū. Vulvas purgat in cibo ex
aceto. Verrucas mixto atramento sutorio tollit. Ven-
erem stimulat.

EX SIMEONE SETHI.

Basilica ocima olfacta cor & caput inuans. Si
aqua irrigantur, humidiora sunt, & somnum con-
ciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succur-
rit. Animi maerorem ex atra bile ortam, in hilarita-
tem & letitiam mutat.

APPENDIX.

Vides

Vides in referendis Ocimi facultatibus non parum inter se dissentire Dioscoridem, Galenū & Plinium, ita vt vix pugnantes illorum sententias conciliare possis. Quare consultum erit vt hic, quem ad nodum in aliis etiam, Galeni amplectaris opinionem, qui quodammodo inter hos medius interiectus, commendat exteriorem eius usum in iis quæ σύμμεσις, καὶ διαφόρησις, id est, concoctionē & discussionem desiderant: damnat verò internū ob excrementitium humorem quo grauat & ledit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, plerasque alias Dioscoridis & Plinij contradictiones tollere poteris.

DE ORIGANO. CAP. CCIX.

NOMINA.

Oρίγανος Græcis, Origanus vel Origanū Latinis, officinis nomen suum retinuit, Germanis Vuolgemut, Dosten, Braūdostē, vel bergmuntz, (Gallis Mariole in e d'angleterre) nominatur. Origanum verò quòd montibus gaudeat. Origanū appellationē apud Græcos inuenit, ὀρεῖον τὸ ὄρεον, vnde dicitur id est, monte, & χαρῆς, gaudio. Herodianus quòd etiam visum ex acuat nomē duxisse testatur, ἀπὸ τοῦ εἶναι ὀρεῖον, & γὰρ clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus nomen ex aduerso datū putat, ἀπὸ τοῦ ὀρεῖον, quod est algeo, fieri ὀρίγανον, quasi rigens, censet, & tandem ascita litera principis, ο, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu.

PLANTARVM HISTORIAE

sensu, quòd minimè refrigeret.

GENERA.

Heracleoticum.

Origani genera seu rebus cognomina quatuor esse constat. Est enim Heracleoticum, Onitis, Tragoriganum, & sylvestre. Primū ab Heraclea Pontici dictum, cetera à pecoribus cognomina desumpsit. Onitis, quòd ab asinis impeteretur, ac in cibo gratum esset. Tragoriganum, quasi hircinum ganum. Origanum, non alia forsitan ratione quàm quòd

Onitis.

Tragoriganum.

Sylvestre.

cuius pabuli voluptate animal hoc carperetur. Sylvestre, quòd sine cultura, & sua sponte proueniat, cognominatum fuit. Ceterum quum in tanta cum nomenclationum, tum historiae ambiguitate varietatē sit quicquam in solidum de his statuere, satis sit unum genus, sylvestre nimirum & vulgare, pro omnibus pictum exhibere, quòd, ut Paulus ait, ut cūque nominibus distinguantur, una tamen omniū sit facultas, adeoq; irre admodum incerta, multū opera aut laboris temere insumere minimè necessarium putari.

FORMA.

Vulgare.

Origani vulgare fruticulus est, tam foliis quàm ramis Serpyllo sylvestri similis, com ante supra caecumen umbella, in qua flores haud secus quàm in Serpyllo in albo purpurei, odore incundo praediti micant. Ex qua sane delineatione sursum liquet, Origani hoc vulgare, Tragorigani, vel saltem eiusdē speciem

speciē quandā esse, quod hoc ut Dioscorides refert, foliis & ramulis syluestri Serpyllo simile existat.

LOCVS.

Montibus cliuosisq; locis gaudet Origanum nostrum, passimq; in his propter sepes nascitur.

TEMPVS.

Floret Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Omnes Origani species, Galeno & Paulo testibus, calefaciunt & exiccant in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Heracleoticū excalfacit, vnde decoctum eius cū vino potum venenatorum morsibus prodest: cum passo autem iis qui cicutam, aut meconium: cum oxymelite iis qui gypsum aut ephemerum hauerūt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura potum cum aqua mulsā, atros humores per aluum ducit, mensesque cict. Linctum ex melle tussibus medetur. Prurigines itidem, scabies, regiūque morbum, decoctum eius cū in balnea descensum est, inuat. Succus eiusdem adhuc virentis, tonsillas, columellas, orisque vlcera sanat. Per nares cum oleo irino infusus trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & cepis, & rhubarbopsoniorum vomitorium camentum, omnibus iis in ære Cyprio sub Canis ardenti astu per quadraginta dies insolatis. Herba verò substrata serpentes fugat. Onitis
eadem

PLANTARVM HISTORIAE

eadem qua Heracleoticum Origanum praestat, non
tamen eadem efficacia. Sylvestre prina-
tim foliis et
floribus cum vino potis, venenatorum moribus auxi-
liatur. Omnia autem Tragorigani genera calefa-
ciunt, urinam mouent, bonam faciunt aluum, si de-
coctum eius bibatur: biliosa enim deiciunt. Lienor-
sis cum aceto pota utilia: cum vino autem his qui
Ixiā hauerunt. Menses ducunt. Tussientibus, pe-
ripneumonici, ex melle in eclegmate dantur. Est et
efficax potio, quare cibum fastidientibus, & stoma-
cho male affectis, & acida ructantibus datur. Item
† aliis re- iis quibus † à maris iactatione nausea, & hypo-
† pletione. chondriorum calor excitatur. Oedemata cum polem-
† ra illita discutunt.

EX GALENO.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide.
Sylvestris verò utraque valentior. Omnes autē in-
cidendi, extenuandi & calfaciendi facultatem ob-
tinent. Tragoriganus quippiam etiam adstrictio-
nis assumpsit.

EX PLINIO.

Origani prina-
tim vsus contra tor-
siones stomachi
in tepida aqua, & cruditates. Contra araneos scor-
pionēque in vino albo. Luxata & contusa in aceto
& oleo & lana. Tragoriganum urinam ciet, tumo-
res discutit, contra viscum potum viperarū: ictum
efficacissimum, stomachoque acida ructanti & pra-
cordiis. Tussientibus quoque cum melle datur, &
pleuritici,

pleuriticis, & peripneumonicis. Heraclium serpen-
tes fugat. Percussis esui datur decoctum. Potu vri-
nam ciet. Ruptis, conuulsis medetur cū Panacis ra-
dice. Hydropicis cum fico, aut cum hyssopo, aceta-
buli mensuris decoctum ad sextam. Item scabiem,
pruriginem, psoras, in descensione balnearum Suc-
cus auribus infunditur cum lacte mulieris. Tonsil-
lis quoque & vuis medetur. Capitis vlceribus. Ve-
nena opii & gypsi extinguit decoctum, si cū cinere
& vino bibatur. Aluum mollit acetabuli mensura.
Sugillatis illinitur. Item dentium dolori, quibus e-
tiam & candorem facit cum melle & nitro. San-
guinem narium sistit. Ad parotidas decoquitur cū
hordeacea farina. Ad arterias asperas cū gallo &
melle teritur. Ad lichem folia cum melle & sale.
Crassiores pituitas & nigras externuat coctū cum
aceto & sale sumptum paulatim. Regio morbo tri-
tum cum oleo in nares infunditur. Lasi perungun-
tur ex eo, ita vt ne venter attingatur. Epinyctidas
cum pice sanat. Furunculos aperit cum fico trita.
Strumas cum oleo & aceto & farina hordeacea.
Lateris dolores cum fico illiti. Fluxiones sangui-
nis in genitalibus tusum ex aceto illitū. Reliquias
purgationum à partu.

DE ORCHI. CAP. CCX.

NOMINA.

Oρχις ἢ κυνὸς ὄρχις Græcis, Orchis et Cynos Testiculus
Orchis Latinis, testiculus canis officinis, Ger-
manis

PLANTARVM HISTORIAE

Orchis manis Knabenkraut, (Gallis Du Satyrium) vocatur dicta. Orchis dicta hæc herba est, quod radices si-
Cynosor- bi inuicē haud secus atque duo testiculi cohererēt.
chis. Cynosarchis verò, quòd canum testiculis similem radicem habeat.

GENERA.

Orcheos duo esse genera animaduertimus, marem nimirum & feminam. Mas in vniuersum maior quàm femina proceriorque est, ut pictura ipsa pulchrè declarat: Estq; duorum generum. Vnum latioribus foliis & candicantibus ferè floribus, quod Orchin marem latifoliam vocauimus. Alterum quod angustioribus foliis, & maculosismagis, floribusque purpureis constat. Nos maioris discriminis rationem habentes, Orchin marem angustifoliam nūcupauimus. Femina itidem duorum est generum: vna enim maior, altera minor est, ut pictura satis demonstrat.

FORMA.

Folia habet circa caulem & ima eius parte per terram strata, oleæ molli similia, angustiora tamē, leuia & longiora. Caulēمودراتا! altitudine, in quo purpurei flores. Radicem bulbo similem, oblongam, duplicem, in modū olivæ angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem mollem ac rugosam, illam verò plenam.

LOCVS.

Nascitur locis, Dioscoride autore, petrosis et arenosis.

noſſis. In Germania certè noſtra in hortis & praiſis,
locuſq; ſabuloſis copioſe pronenit.

TEMPVS.

In Maio & Iunij principio carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius maior calida & humida eſt, guſtan-
tibuſq; dulcior eſſe apparet. Minor admodum ela-
borata eſt, ad calidius ſicciorq; tendit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix editur vt bulbua cocta. Fertur de ea, ſi
maiorem edat viri, mares generari: minore vero ſe-
mine, feminas. Addunt etiam in Theſſalia mulie-
res parnam cum caprino lacte bibendam dare, vt ad
venerca excitent: aridam vero ad inhibenda atque
diſſipanda. Alterum etiam alterius potu reſolui.

EX GALENO.

Radix maior Orchioſ multam videtur habere
humiditatem excrementitiam & flatuoſam: qua
propter pota Venerem excitat. Altera vero, minor
videl: cet, contra non modo non ſtimulat ad coitum,
ſed planè cohibet ac reprimis. Eduntur bulborum
more aſſe.

EX PLINIO.

Tumores & vitia partiũ earum crumpetia, cum
polenta illita radix ſedat, vel per ſe trita. Eadẽ ex
lacte ouillo nervos intendit, & ex aqua remittit.

DE ORCHI SERAPIADE.

CAP. CCXI.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Oρχις ὀρχιδῆας, ἢ τριόρχας, Paulo & Aetio testib. Graecis dicitur. Orchis siue testiculus Serapias Latinis. Officinae eius cognitionē non habet. Germanicē Raguurtz, (Gallice Espece de Satyrium qui a trois racines bulbes)

Serapias dicitur. Serapias autem ab Andrea medico ob multosradicis vsus, vt inquit Dioscorides, appellata est. **quare dicta.** Sunt qui à Sarapi Alexandrinorum deo nominata tam velint, propter lasciuia impudentem, qua is deus Canopi, vbi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur: de quo Strabo in xviij.

Triorchis suae geographiae libro. Triorchis verò, manifeste ex **cur dicatur.** ea appellatione argumēto, quod non duabus, sed tribus testiculatis radicib. in terra nitatur. Quae una quidē re facile à priorib. discriminatur Orchibus.

GENERA.

Duo esse Orchis Serapiadis seu Triorchis genera, res ipsa satis monstrat. Etsi enim in foliis ac radicibus nihil aut parum discriminis habeant, tamen

Triorchis mas. in floribus manifestè differre videntur. Nam alterum genus, quod nos marem vocauimus, florib. constat purpureis, & parumper albicantibus. Alterum

Triorchis femina. verò, quod nos vt certius à priori discernetur, sceminam nominauimus, flores obtinet diuersis coloribus distinctos, purpureo videlicet, candido, viridi ac nigricantē, inferioreq; parte fuci planè effigiem exhibent.

FORMA.

Folia habet Porro similia, oblonga, latiora & pingua in alarum cauis inflexa. Cauliculos dodrantales, subpurpureos flores. Radicem minimis testiculis similem.

LOCVS.

Prouenit in pratis & campestribus.

TEMPVS.

In fine Maii mensis & initio Iunii hac genus apparet, deincepsquam inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

Valentius quam primo ordine exiccat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix illita tumores disiciendi vim obtinet, atque; vlcera expurgat. Herpetas cohibet. Fistulas abolet, inflammatione laborantia illita mitigat. Sicca non mas compescit, vlceraque; putrescentia & maligna oris sanat. Cum vino pota aluum sistit. Feruntur de hac etiam quaecunque de Cynosorche dicta sunt.

EX GALENO.

Orchis Serapias ad Venerem non similiter accommodus est. Oedemata illitus discutit, & vlcera sordida purgat, & herpetes sanat. Siccatus multo magis desiccatur, adeo ut & putrescentia contumaciaque; vlcera sanet. Habet etiam quippiam subadstringens, ac proinde ventrem in vino potus sistit.

EX PLINIO.

Eius radices sanant oris vlcera, thoracis pituitas, aluum sistunt & vino pota.

PLANTARVM HISTORIAE
DE OENANTHE. CAP. CCXII.
NOMINA.

Saxifra- **O** ωνάθη, ή λένανθη Græcis, Oenanthe La-
ga rubea, tinis, Filipendula officinis, & Saxifraga ru-
Oenāthe bea, Germanis Rot Steimbrech nominatur. Qu-
quare di- nanthe autem dicta haud dubiè est, quod cum vino
fla. floreat, Leucanthemum verò à florum quos producit
Filipendia candore. Filipendulam à numerosis illis & rotun-
la. dis in radice capitibus tuberibusve, quæ quasi ex si-
lo quodā pendere videntur, appellatam esse cōstat.

FORMA.

Folia Pastinaca sylvestris habet flores candidos,
caulem crassum, dodrantalem, semen Atriplicis,
radicem magnam, multa habentem capita rotun-
da. Ex qua descriptione palam apparet, Oenan-
them eam esse herbam, quam ætas nostra Filipen-
dulam vocat, quod nulla prorsus sit nota quæ illi
non conveniat. Foliis enim Pastinacæ erratica est,
quæ planè eius herba quæ vulgò Petroselinon ho-
die appellatur foliis similia sunt. Hinc est quod in
vulgaribus herbariis scribatur folia Petroselino si-
milia habere: quamvis Scaphylino legendum esse
putem. Manuscriptus etiam herbarius Filipendu-
lam folia Dauci agrestis habere tradit. Flores de-
nique illi albi, caulis crassus, dodrantalis, Atripli-
cis semen. Radices quoque multa, quinque interdū
aut sex, nunquam etiam plura capita rotunda,
tanquam à filo pendentia, ut ait antiquus herba-
rius,

rius, habentes: ita vt hinc esse Oenanthen abundè constet. Sed demus non esse, nihil tamen inde periculi erit, quòd scilicet Oenanthæ easdem quas Filipendula, sicut ex paulò pòst dicendis patebit, facultates obtineat.

LOCVS.

Nascitur in petris & montibus asperis. Tubinga certè in monte Austriaco nominato copiosissimè provenit, & in sylua non procul ab arce eius oppidi distante.

TEMPVS.

Iunio mense floret, quo sanè tempore, quia facile ex floribus agnoscitur, carpi potest. Radices tamen inter autumnii initia colligendæ erunt.

TEMPERAMENTVM.

Amara ad nodum est Filipendula, ita vt non temerè hanc recentiores calidam & siccam in tertio ordine statuunt.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Oenanthes semen, caulis & folia cum mulso ad secundas euicendas bibuntur. Radix cum vino contra stranguriam conuenit.

EX PAULO.

Oenanthæ secundas euicit, vrinæ stillicidio, morboque regio medetur.

EX PLINIO.

Caulis eius & folia cum melle ac vino nigro pota, facilitatem pariendo præstant, secundasque pur-

gant.

PLANTARVM HISTORIAE

gant. Tussim è melle tollunt. Vrinam cient. Radix vesicae vitiis medetur.

EX RECENTIORIBVS.

Filipendula in lotij stillicidio & vrina remoratur, neque non renum doloribus, atque lapide corundem, couenit. Eadem stomachi inflationes discutit, medetur & suspiriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida concitauit. Farinam eiusdem cibus comitialium inspergunt.

DE OXY. CAP. CCXIII.

NOMINA.

Trifoliū acetosum. Oξίς Græcè, Oxis Plinio & Latinis, Trifoliū acetosum & Alleluya officinis, vulgò Panis cuculi, vel quòd cuculus auis eo vescatur, vel quia hoc erumpete, cuculus vocem suam adere incipiat Germanis Saurei klee, Buchklee, Buchäpffer, Buchbror, Gauchklee, Guckgauchklee et Hasenklee (Gallis Pain à coquu) appellatur. Oxys verò ab acido sapore dicta est.

FORMA.

Humilis herba est, longis tantum pediculis, tria summatim folia perinde atque Trifoliū proferens, exigua, & in cacumine laciniata, sapore acido. Florem habet candidum, in simplici stylo inter folia profolientem: rufum in lunatis siliquis semen. Radicem in transversum longam, geniculatā ac rufam. Antiquus et manuscriptus herbarius putat hanc herbam esse Lotū satiuam, cuius certè sententiā, quòd à Dio-

à Dioscoride nō describatur Lotus, neque probo neque improbo. . . ur tamē non sequar, facit quōd herba quam Alleluya barbari vocant, non sit satina, sed passim in syluis & aliis locis vmbrosis nascatur futura tempestatis prænuncia. Siquidem appropinquante aliqua tempestate, arrigitur contrā tanquā tempestati colluctatura.

LOCVS.

Multis locis prouenit: nā in syluis circa petrosa et aquea loca nascentē cōspeximus. Nullibi autem copiosiore quā Tubingæ in primo statim cōscensu mōtū Austriaci ad dextram prouenire vidimus.

TEMPVS.

Aprili atque interdum Maiomense floret, dum scilicet cuculi vox primū exauditur, atque hinc Cuculi panem dictam esse puto, vt dictum est antea. Obseruatum autem est à nobis, atque adeo multorum aliorum experiētia cognitum, quōd eius herba copiosi flores, crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes cetō portendant: pauci contrā siccitatem.

TEMPERAMENTVM.

Quum acidū in gustu saporem præ se ferat, idē cum Oxalide habere temperamentum, frigidum nempe & siccum, euidentissimum est.

VIRE. EX PLINIO.

Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocælen habent.

PLANTARVM HISTORIAE
EX RECENTIORIBVS.

Vlceribus, vulneribus & fistulis, potissimum autem oris, medetur. Sitim arcet, & ut summatim dicam, easdē quas Oxalis, acetosam nostri nominant, facultates obtinet.

DE OPHRI. CAP. CCXIII.

Ophris vulgò Elleborus alb^o dicitur, prae-
tēsis herba quæ præcedū, aut nobis sunt,
aut nomen retinent, ob id à nobis omis-
se.

NOMINA.

Ophrin hanc herbam nominare placuit, quod
inuenirim plantam binis dumtaxat foliis cō-
stantem hac appellatione insigniri. Germanicum
nomen nullum extorquere potuimus: neque enim
ea est quæ Durchuuachs, hoc est, Perfoliata vo-
catur, idēque hanc à geminis foliis Zuueyblatz
nominauimus.

FORMA.

Caulē à radice singularem ac rotundū emittit,
per binā quæ tantūm habet folia penetrantē, à cu-
ius medio ad summū vsque calyculi multi sunt, &
in his veluti linguae dissectæ nutantes flosculi. Ra-
dix verò illi subest tenuis, adnascētes sibi radicu-
las multas, obliquas & odoratas obtinens.

LOCVS.

Nascitur in montibus, & nullibi maiori copia quā
Tubingæ in pede montis Austriaci prouenit.

TEMPVS.

Maiō

Maio & Iunio mensibus floret, dein statim euas-
cescit. Quapropter hoc potissimū tempore colligen-
da. **TEMPERAMENTVM.**

Gustari glutinosa esse apparet, & quodammodo
dulcis, ideoq; calidā & siccam esse conicere licebit.

VIRE S.

Iuxta dictarum qualitatum missionem contra-
hendi & constringēdi facultate præditam esse ne-
mini non constat. Hinc est quod ad rupta, & vul-
nera conglutinanda hac herba commodè vtantur
recentiores.

DE ORMINO. CAP. CCXV.

Orminū oruale quod aurū valet, & toute
bonne ab insigni virtute Gallis dicitur.

NOMINA.

Oppuivop Græcis, Orminum & Geminalis La-
tinis, Gallitricū officinis, Germanis Schar- Gallitricū
lach (Gallicè Asperge fauluaige, ou Oruale)
appellatur. Orminon autem Græcis haud dubiè di- Orminon
ctum est, quia Venerem extimulat. cur dictū.

GENERA.

Ormini duo sunt genera. Vnum satium, quod
Gallitricum simpliciter nominant, & Germanicè
Scharlach. Alterum sylvestre, quod alio nomine Salvia syl-
Saluiam Sylvestrē herbarij vocāt. Germani Vuil- uestris.
den Scharlach, oder Vuilde Salbey.

FORMA.

Orminum satium herba est foliis Marrubio si Orminon

PLANTARVM HISTORIAE

milis, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem
 eminentia siliquis similes prodeunt, ad radicē ver-
 sus nutantes, in quibus semen est. Ex qua delinea-
 tione abunde liquet herbam quam hodie Gallitri-
 cum vocāt, esse Orminum satium: hac enim foliis
 Marrubio similis est, nisi quod sunt maiora & mi-
 rificē odorata: caule semicubitali, quadrangulo, ab-
 imo rufescente, calyculus circa caulem siliquarum
 effigie prominētibus, & ad radicē deorsum spectā-
 tibus, in quibus semen nigrum & oblongum inclu-
 ditur: flosculis in candido purpureis, aut in dilutum

Sylvestre. ruborem inclinatis. Sylvestre priori non admodum
 dissimile est, foliis satis ad Saluiam accedentibus,
 rugosaq; asperitate praeclatis: caule sesquipedali, le-
 niter hirsuto, in quadrangulum striato: floribus è cœ-
 ruleo in purpureum vergentibus, ad aquilini rostri
 effigiem falcatis, calyculis pluribus in terram incli-
 natis, in quibus ad summum quatuor semina, para-
 ua, rotunda & fuscescentia reperimur.

LOCVS.

Satium nusquam non in hortis satum provenit.
 Sylvestre autem passim omnia prata exornat, suaq;
 sponte in iis nascitur.

TEMPVS.

Vtrunque Iunio mense floribus & semine præ-
 gnans est.

TEMPERAMENTVM.

Orminū calidū & mediocriter siccū est, id quod
 amaritudo

amaritudo atque adstrictio in gustu satis monstrat.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Creditur semen satini cum vino potum Venerē stimulare. Cum melle argema & oculorum albugines purgat. Illitum cum aqua oedemata discutit. Surculos extrahit. Herba ipsa illita eadem potest. Sylvestre vehementiorem facultatem habet, quare vnguentis miscetur.

EX PAVLO.

Orminum Venerem stimulat, oculorū crassities cum melle repurgat, oedemata discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est valentius.

EX PLINIO.

Semen ad Venerem stimulandam, & ad oculorū argema & albugines valet. Vtroque genere tusso extrahuntur aculei ex corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto imposita, panos per se vel cum melle discutunt. Item furunculos, priusquam capita faciant, omnesq; acrimonias.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores etiam easdem facultates suo Gallico tribuunt: potissimum autem conferre ad albugines & oculorum caliginem tradunt, vt hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminō esse Dioscoridis.

DE OROBO. CAP. CCXVI.

Eruum prius semine in cunei modum figurato, cicercula magis videtur.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Opeos Græcis, Erum Latinis dicitur. Officina Græcam appellationem retinuerit: Germanis Eruen (Gallis noer Vesse, ou. des eis) ad imitationem Latini nominis, appellari possunt.

GENERA.

Duo sunt genera Erui: unum enim candidum, alterum autem rufum inuenitur. Nec inter se nisi floribus & radicibus differunt, quemadmodum pictura affabre monstrat. Rufum verò sylvestre est, suamque sponte in aruis, & inter dumeta provenit.

FORMA.

Exiguus frutex est, tenuis, angustis foliis, floribus vel candidis, vel in candido cæruleis aut puniceis, seminibus in siliquis sine septo cylindraccis, quæ admodum pisa, se inuicem tangentibus.

LOCVS.

Latatur loco macro, non humido, quia plerumque luxuria corrumpitur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, in eisdemque semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat quidem Erum excessu secundo intenso, calefacit verò primo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Capitis gravitatem facit Erum, ventrem turbat, sanguinemque per urinam ducit si comedatur. Cœli tamen

tamen appositum boues saginat. Farina eius bonam facit aluum, urinam cit, corporis colorem commendat. Frequentior in esu aut potu sanguinem cum torminibus per aluum & vesicam ducit. Vlcera cum melle purgat, & lentigines, & aspredinem cutis in facie, eiusdemque maculas & reliquum corpus. Nomas, gangrenasq; cohibet, & mammarum duritias emollit. Fera vlcera, carbunculos, fauosq; rumpit. In vino macerata canum, hominum, viperarūq; morsus illita sanat. Cum aceto autem difficultates urinae, tormina & tenesmos lenit. Prodest etiam iis qui cibo non nutriuntur, nucis magnitudine fricta & cum melle sumpta. Decoctum eius fouendo per-
niones, & in corpore pruritus sanat.

EX GALENO.

Orobis quatenus amaritudinis est particeps, ea-
tenus inclidit, extergit, atque obstructions expe-
dit. Caterum si sumatur copiose, sanguinem per
urinas euocat. Hominum cibus prorsus hoc semen
damnatur: est enim & insuauissimū & prauī su-
ci. Eruo autem instar lupini preparato ex melle
utimur, ut medicamēto crassos pulmonis thoracisq;
humores expurgante. Candidum minus est medi-
camentosum, quā id quod ad flauum aut palli-
dum colorem tendit.

DE OROSELINO.

CAP. CCXVII.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

προσίλιον, ἢ πωτροσίλιον ἄχιον Græcis. Sylvestre Petroselinum, & Apium montanum latinis, officinis & barbaram sectantibus medicinā Petroselinum dicitur. Id quod hinc

Petroselinum accidisse puto, quod linguae Græcæ inscitia, Oreoselinum officinarum dictionem in Petroselinum mutauerint: vel quia simpliciter enunciauerint quod cum ad Petroselinum refectione nominandum erat Petroselinum sylvestre, ad differentiam nimirum Macedonici, quod verè est Petroselinum veterum. Germani Peterfilgen vocāt. Nos teutsch Feterfilgen, oder Peterlin (Galli du Persil des montaignes) nominamus, ut discerneretur à Macedonico, de quo suo dicemus loco. **FORMA.**

Caulē habet vnum dodrantalem à radice tenui exeuntem, circa quem ramuli & capitula Cicuta similia, multò tamen tenuiora. In his semina oblongum, acre, tenue, odoratum, Cumino simile. Ex qua sanè descriptione sole clarius apparet, Petroselinum officinarum esse Oreoselinum veterum: caule enim vno prouenit dodrantali ex radice perenni, qui per ambitum ramulos spargit capitulis Cicuta, tamen multò tenuioribus: in iis semina, acrimoniam gustu præferens, odoratum, tenue, Cumino proximum. Neque obstat quod in plerisque exemplaribus Dioscoridis capitulorum Papaueris emendatur sit mentio: error enim haud exiguus subest, quod scilicet

Dioscoridis locus emendatur

scilicet non $\mu\eta\chi\omega\nu\iota\omega\ \tau\omega\alpha\rho\epsilon\mu\phi\epsilon\rho\eta$, hoc est, Papatueri similia, sed $\kappa\omega\upsilon\epsilon\iota\omega$, id est, Cicutæ legendum sit. Id quod in primis confirmant ea quæ scribit Plinius libro decimonono capite octauo, in hunc modum: Oreoselinum est Cicutæ foliis, radice tenui, semine Anethi, minutiore tamen. Quod si tamē hæc sententia minus arriserit, nihil moror quin dicas Petroselinum germanicum, cum forma parum admodum à vero Petroselino distet, ut palam sit utriusque picturas intuenti,

LOCVS.

Nascitur in locis petrosis & montanis, unde etiā nomen accepit. In Germania verò nostra in hortis passim plantatur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēse floribus & semine prægnas est. TEMPERAMENTVM.

Calidū est in secundo gradu extenso, siccum verò in medio tertii.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix in vino pota vrinam cient. Mēses etiam ducunt. Miscetur antidotis, necnon medicamentis vrinam cientibus & excalfaciētibus. Nō hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in petris provenit: aliud enim ab hoc est Petroselinum.

APPENDIX.

Vtunque autem diligenter hoc monuerit Dioscorides,

PLANTARVM HISTORIAE

scorides, tamen cauere non potuit quin posteritas medicorum Oreoselinum esse Petroselinum certo crediderit.

EX GALENO.

Oreoselini similis Apio vis est.

EX PLINIO.

Oreoselinum vrinae & mensstruis efficax. Eo etiam purgantur faeminae à vino.

DE OIS. CAP. CCXVIII.

NOMINA.

Sorbus. **O**R Græcis, Sorbus Latinis, est arbor cuius fructus Græcis ὄζα καὶ κύβα, Gale. teste, Latinis verò Sorba appellantur. Officina Latinam nomē claturam retinuerunt. Germanis Speierling, vel Sporopffel corrupta puto voce pro Sorbopffel (Gallis Vng Cormier) nominatur. Vel sic ab austeritate vocata sunt, quasi mālā austera.

GENERA.

Sorborum duo genera tradit Theophrastus lib. iiij. de historia stirpium, cap. xvj. feminam fructiferam, & masculā sterilem. Differre quoque fructibus idem scribit, quod aliæ orbiculatum, aliæ ouatum ferant. Fructus autem orbiculati dulciores sentiuntur, ouati saepenumero acidi, minusq; odorati. Plin. lib. xv. ca. xxi. in Sorbo quatuor differentias Latinos nosse memoriæ prodidit: alii enim corū ait, quatuor rotunditas mālī est, aliis turbinatio pyri, aliis ouata

ta species ceu mälorum. Quartum genus tormina differens
le appellant. Nos picturā eius generis damus, quod tias Sor-
turbinatum pyri instar fructum edit, qui Germa- borum po-
nis Sporbirn corrupta voce pro Sorbirn aut nit.
quasi austerum pyrum dicitur.

F O R M A.

Sorbus arbor est procera, recto caudice, cortice le-
ui, pinguiusculo, colore ad flauū albicāte, cuius fo-
lia pediculo singulari prolixo, nervaceoq; in versus
condita, ala modo à lateribus exeuntia, tanquam
ex omnibus vnum fiat, ad neruū vsque laciniatū,
verum ampliussculo intervallo distantia. Omnibus
ramulis in extremo pediculi folium impar promi-
net, cuius accessione impar numerus efficitur. Figu-
ra laurum tenuifoliam imitantur, verū ambitu
ferrata, breuioraq; sunt, nec in extremum acutum
mucronata, sed in rotundius orbiculata. Flos race-
matim singulari petiolo, è multis minutis & candi-
dis constans. Fructus vel orbiculatus, vt dictū est,
vel ouatus, vel pyri instar turbinatus. Radices
haud multas, nec altè descendentes, validas tamen
& crassas & incorruptibiles agit.

L O C V S.

Loca amat humida, montana & frigida, eodem
Theophrasto autore.

T E M P V S.

Autumno fructus suos Sorbus ostentat.

T E M P E R A M E N T V M.

Adstrins

PLANTARVM HISTORIAE

Adstringentem obtinet qualitatem Sorbus, sed multo imbecilliorē quā Mespilus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sorba malorum colorem referentia, necdum maturēscētia, dissecta & in sole siccata, cū māduntur alium fiunt. Farina eorum cum mola teritur, polenta loco in eundem vsum sumitur. Potest idem & decoctum eorum.

EX GALENO.

Sorba quidem adstringunt, sed multo fortius Mespila quā Sorba. Quamobrem alio fluenti in cibo accommodatissimē exhibentur. Sorba maiori cū voluptate sumuntur: prorsus enim initio nihil acerbū vti Mespila habent, sed succus eorum citra acerbūtatē duntaxat: austerus est. Illud porrō neminē puto latere, hac omnia parē, non largē vt ficus, vnaq; esse comedenda. Nequaquam enim eis vt cibis, sed magis vt medicamentis egemus.

DE OPHIOGLOSSO. CAP. CCXIX.

NOMINA.

ὄφι^ο
γλωσσ^ο
ον κυ^ρ
δι^κτα.

HErba hac appositissima voce Græcè ὄφιό-
γλωσσον appellari potest, non quod sic eam
veteres aut recentiores Græci nominauerint, sed
quod cū Germanica nomenclatura optimē qua-
dret. Neque enim certō constat a Græcis, & sub
quo nomine herba illa cognita fuerit. Quapropter
vt nouam ei inderemus appellationem necessum e-
rat: meliorem verō hac ipsa quam retulimus, inue-
nire

nire haud potuimus. Latine Ophioglossum, aut lin Lingua
 gua serpentina dici potest: Germanice enim Na^a serpentina.
 terzunglin (Gallice Langue de Serpent) voca
 tur, à forma & figura quam refert. Et singulis nani
 que foliis singulari pediculo prodit, quod ligulam
 serpentis forma sua referre videtur, vt pictura af
 fabre monstrat. **FORMA.**

Folium vnicum obtinet pingue, digiti longitudine
 Plantagini aquatica vocata haud dissimile, è cui
 ius sinu inferiore pediculus exit, cui quippiam her
 bacei coloris insidet, quod serpentina lingua voca
 ti lapilli similitudinem refert.

LOCVS.

Copiose in monte prope Tubingam Austriaco no
 minato provenit. Amat & alia prata in montanis
 sita.

TEMPVS.

Maior mense reperitur, subinde autem euanescit,
 ac nusquam apparet.

TEMPERAMENTVM.

Citra caliditatem insignem exiccat, id quod gu
 stus satis docet. **VIREs.**

Vulneraria est herba, maligna siquidem & cū
 ratu difficilia vulnera sanat. Tumores etiam dis
 cutit, & ferè Symphyti facultates obtinet.

DE XANTHIO. CAP. CCXX.

Xanthium ad portam Antoninam fre
 quens, cancerorum ardori extinguendo
 efficax.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Lappa
in uersa.
Xanthion
unde di-
ctum.

Eάνθιον, ή φάσγανον Græcè, Xanthium La-
tine nominatur. Ab herbariis nostræ tēpestatis
Lappa minor et Lappa inuersa vocatur. Germa-
nicè Bettlersleutz, oder Bubenleutz. Xanthion
dictū, quod φανός, hoc est, flavos capillos faciat.

FORMA.

Caulem habet cubitalem, pinguem, angulosum,
& in ipso alas multas. Folia Atriplici similia, in-
cisuras habentia, odore Nasturtii. Fructum rotun-
dum cum grādem oliuam, aculeatum ut Platani
pila, contactu vestibus adherentem. Ex qua quidē
delincatione nemo non videt herbam cuius pictu-
ram damus esse Xanthion, quod illi omnes notæ ad
amissim respondeant. Caule enim est cubitali, pin-
gui, anguloso, crebras fundente alas, foliis Atriplici-
cis incisuras habentibus, Nasturtiū manifestissimè
olentibus, fructu magna oliuæ modo, rotundo, ut
Platani pila spinoso, contactu vestes apprehenden-
te. Nucleus qui in echinata pilula clauditur à pue-
ris estur dulci & grato cibo.

LOCVS.

Nascitur latis & pinguibus locis, & lacubus pa-
ludibusve exiccatis.

TEMPVS.

Fructus autumnō maturascit, quo sanè tempore
colligi debet.

TEMPERAMENTVM.

Cum

Cum discutiendi vires habeat, facile colligitur temperamento esse calido & sicco praditum, id quod ex sapore etiam, qui est amarus & subacris, deprehendi potest.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Potest fructus antequam penitus inarescat collectus, tusus, & in fictili vase reconditus, capillos flauos reddere, si quis cum vsus exigit, trybliū pondus ex eo sumens, tepidāque aqua madefaciens, nitro prius capite preparato illinat. Alij cum vino tusum ipsum reponunt. Fructus etiam commodè tumoribus illinitur.

EX GALENO.

Xanthion vocatur etiam Phasganion. Fructus discutiendi facultatem obtinet.

DE XYLO. CAP. CCXXI.

NOMINA.

Xylon & Gossipium Plinio & alijs Latinis dicitur. Gossipion. Greci, quod sciam, eius nusquam meminerunt. Barbaris ac Arabibus Cotum & Bō- Cotum. bax seu Bombasum, Germanis Baumuuoll (Gal-
lis Plante cotonier) appellatur. Linum eius co-
tonium vulgò vocatur, sicut lanugo ipsa cottonum. Cotonii.
Ab huius generis planta vestes xyline, & lina xy- Cotonii.
lina nominata sunt. Iurisconsulti lanam hanc li- Xyline
gneam nuncupant. vestes.

FORMA.

Lana li-

Frutex est exiguus, folio vitii, sed minore, flori- gnea.

R. ij

bus

PLANTARVM HISTORIAE

bus luteis in medio purpurascens, fructu barbata nuci simili, lanugine pleno, quae necitur in linum candidissimum, molliissimumque. Nux autem ipsa cum hiascens fatiscit, lanuginis globos repraesentat.

LOCVS.

Superior pars Aegypti in Arabiam vergens, Plinio lib. xix. capite primo teste, fruticem hunc genuit. In Creta etiam nascitur, & in Apulia, ac Malatha prope Siciliam insula. Nunc in Germania nostra hortis plantatur, ut plurima alia peregrina, nobis antea prorsus incognita.

TEMPVS.

Tam fertilis hic frutex est, ut simulatque adoleuit, quod duorum mensium spacio accidit, nunquam desinat florem & fructum proferre, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur.

TEMPERAMENTVM.

Arabes, ut annotauit Serapion, fruticis huius lanuginem calidam & humidam esse statuunt.

VIRE. EX ARABIBVS.

Foliorum succus medetur infantium alui profusio atque torminibus. Semen tussi & thoracis vitis. Oleo seminis emaculantur lentigines & facies pustulae. Semen etiam eius genitale semine procreat.

DE PARTHENIO. CAP. CCXXII.

NOMINA.

Παρθένιον, ἀμάραντον, χαμολίμηλον Graecis: Parthenium, Amaracum, Solis oculus, Millefolium

Millefolium Latinis: *Thuscis* *Canta*, officinis & *Canta*.
herbariis *Cotula foetida* dicitur. Germanis *Krotte* *Cotula*
dill, *Hundsblum*, *Vuild Chamillen* (Gallicè *foetida*.
Espergoutte, ou *Matricaire*.) Caterum cogita-
bunt hoc loco studiosi, *Amaracum* de quo nunc agi-
mus diuersum esse ab eo què alio nomine *Sampsy-*
chon Græci vocant, vt suo loco fusius dicemus.

FORMA.

Folia *Coriandro* similia habet tenuia. Flores per
ambitum candidos, in medio luteos, odore grani &
subuiroso, gustuq; amaro. Hæc *Dioscoridis* descri-
ptio pulchrè et per omnia herbae illi quæ hodie vul-
gò *Cotula foetida* nominatur, respondet. Siquidem
ea foliis est *Coriandri* tenuibus, flore per ambitum
albo, intus luteo, odore grani, & sapore amaro. Fo-
liis autem *Coriandri*, non quidem iam erumpentis
& paulò antè enati, necdum maturescens, quæ
sunt quadantenus lata & subrotunda, atque in ex-
tremitatibus incisa: sed maturi, cuius quidem in al-
to folia ad *Chamameli* aut *Fœniculi* foliorum for-
mam accedunt, capillataq; sunt, constare scias. Sic
enim vtriusque folia similia sunt, vt *Coriandrum*
Parthenij, & rursus *Parthenium* *Coriandri* pro-
fus referre folia videatur. Quod vt discretè innueret
Diosco. $\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$ $\lambda\epsilon\omega\tau\alpha$, id est, folia tenuia dixit,
vt scilicet hac voce latiora, quæ in infima sunt *Co-*
riandri parte, secluderet. Quod autè de ijs foliis *Dio-*
scorides locutus sit, ex tractandi ordine abundè li-

R iij quet.

PLANTARVM HISTORIAE

quet. De tribus siquidē herbis, Chamæmelo, Parthenio & Buphthalamo, quæ sanè inter se congenere
res, atque foliis admodum similes sunt, ordine agit,
quod nunquam fecisset, si nulla inter has similitu-
do intercederet foliorum, adde etiam florum. Buph-
thalmum tamen foliis ad Fœniculi formam pro-
pius quàm reliquæ duæ accedit. Sententiam hanc
nostram confirmat, quòd aliqui Parthenium, ob
similitudinem quam habet cum Anthemide, Cha-
mæmclon dixerint. Tam similis enim est Chamæ-
melo, ut frequenter etiam ab imperitis pro illa capi-
patur. His accedit & hoc, quòd ob foliorum tenui-
tatem nonnullis Millefolium appellatū sit Parthes-
nium, quod fieri minimè potuisset si ad latiora Co-
riandri folia Dioscorides respexisset. Præterea esse

Cotula Parthenium Cotulam, nomen quod illi Thufei in-
vox unde diderunt satis declarat: Cautam enim appellaues
deducta. runt, unde diminutivum Cautula deductum est,

& tandem corrupta voce Cotula. Fœtidam autem
esse, gravis odor qui in ea omniū maximè sentitur,
evidèter declarat. Nequaquàm itaque ea esse herba

Parthes- potest, quam Matricariam vulgò vocant, ut Hero-
nium non molauit, & alii nostri docti viri hunc sequētes putant:
est Matricaria quòd huius folia latiora sint, quàm ut cū Chamæ-
cavia. meli, Buphthalmi aut Coriandri tenuibus foliis cō-

pavari queant, tātūm abest ut similia sint. Huc ac-
cedit, quòd omnium maximè enervere videtur ad-
versariorum sententiam: nemo unquam ex recentioribus

tioribus Matricaria herba bilis & pituita per inferna tractricem facultatem tribuit, quam tamen Parthenio Dioscorides, Paulus, & alij veteres assignant, vt etiam hoc nomine Parthenium nō possit esse Matricaria herba dicta vulgò.

LOCVS.

Nascitur inter segetes & iuxta semitas, intermixta ferè semper Chamæmelo. In hortorū etiam sepibus, Plinio teste, prouenit.

TEMPVS.

Primo statim vere, Maio potissimum mense, erūpit, ac totam æstatem durat.

TEMPERAMENTVM.

Haud instrenuè, Galeno autore qui Amaracū vocat, calefacit, nō autē vehemēter desiccāt. Itaq; in caliditate tertij est ordinis, in siccitate verò secūdi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sicca cum oxymelite, aut sale pota, non secus atque Epithymum bilem atram & pituitam per inferna ducit. Asthmaticis & melancholicis prodest. Herba ipsa floribus dēptis à calculosis & asthmaticis vtiliter bibitur. Decoctum eius ad incidēdum prodest in vuluæ duritia & inflammatione. Illinitur cum floribus sacris ignibus, & inflammationi.

EX PAVLO.

Parthenium aridum in potu sumptum atram bilem per inferna deducit.

EX PLINIO.

PLANTARVM HISTORIAE

Siccatum cum melle & aceto potum, bilem tra-
hit atram. Ob hoc contra vertigines vtilis & cal-
culosis. Ad insidendum decoctum in duntia vulne-
rum & inflammationibus. Illinitur & sacro igni,
item strumis cum axungia inueterata. Magi con-
tra tertianas sinistra manu uelli eam inbent, di-
cisque cuius causa vellatur, nec respicere: dein eius
folium agri lingua subicere. ut mox in cyatho
qua deuoretur.

DE POLYGONATO.

CAP. CCXXIII.

NOMINA.

POLΥΓΩΝΑΙΟΝ Græci, Polygonatum Latinis
dicitur. Officinis, item herbariis & vulgo.
Sigillū Sa sigillū Salomonis, Germanis Vuciszuuritz, (Gabo-
lonis. lis Signet de Salomon) hoc est, radix alba nomi-
Polygonatur. Polygonatum autem à radice geniculorum
nim cur frequentibus nodis ex intervallis tumente appella-
dictum. lauerunt.

GENERA.

Duo eius genera datus. Vnum verum, latiori-
bus foliis: alterum multo angustioribus, quemad-
modum pictura graphicè ostendit. A foliis utriusque
nomina sunt indita.

FORMA.

Frutex est cubito altior, folia lauro similia ha-
bēs, latiora tamen & leuiora, sapore mali cotonea
aut punicea: gustatum enim adstrictionem quan-
dam

dam resipit. Per singulos foliorum exortus cādidos flores promit numero maiore quàm folia, supputa-
 tione à radice facta. Radicem habet candidam,
 mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueo-
 lentem digiti crassitudinem obtinentem. Iam si sine
 gulas Salomonij sigilli notas libeat prosequi, Sigillum
Salomonij.
 mnes, ne vna quidem reclamante, adesse cōperies.
 Nanque in montibus gignitur, frutice cubito pro-
 ceriore, foliis lauri latioribus, & lenioribus, quæ gu-
 stata quendam mālī cotoneæ aut punicæ saporem
 referant cum aliqua adstrictione. Flores per singu-
 las foliorum eruptiones exiliunt candidi, qui folia
 numero longè superent, à radice ad cacumen suppu-
 tata. Siquidem bini, terni, aut plures ab vnoquoque
 foliorum sinu procedunt. Radix illa candida, mol-
 lis, longa, crebris nodis articulata, densa, grauiter
 olens, digitali crassitudine. Floribus excussis bacca
 pisti ferè magnitudine dependent, ex viridi nigri-
 cantes, & in quendam ordinem digestæ.

LOCVS.

Nascitur in montibus.

TEMPVS.

Maior mense floret, quo etiā tempore carpi debet.

TEMPERAMENTVM.

Polygonatum mistam habet qualitatem. Est co-
 nim in eo adstrictionis pariter & acrimonia quipa-
 piam, necnon fastidiosa cuiusdam amaritatis ex-
 plicatu difficilis.

PLANTARVM HISTORIAE
VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix illita vulneribus auxiliatur. Quinetiam
vultus maculas delet & auferit.

EX GALENO.

Radicem Polygonati quidam vulneribus illinūt.
Sunt etiam qui illo nauios maculāsque in facie de-
tergant.

APPENDIX.

Hodie quoque mulieres sigillo Salomonis sibi faciē
extergūt & fucant, vt planē nullū subfit dubium,
quoniam Polygonatum esse constanter credamus.

DE POLYPODIO. CAP.

CCXXIIII.

NOMINA.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium, Filicula
Latine, officina Græcam appellationem re-
tinerunt, Germanicè Engelsfutz, Baumffarr,
Dropffuurtz, (Gallicè du Polypode) vocatur.
Polypodia nomen à radice quæ polyperum modo habens
cirros obtinet, inditū est. Filiculam autem Latini à
similitudine foliorum cum Filice nuncupauerunt.

Polypo-
dium vnde
dictum.
Filicula.

FORMA.

Herba est palmi altitudine, Filici similis, subhir-
suta, incisuris diuisa, non tamen adeo tenuibus. Ra-
dix illi est hirsuta, cirros polyperum modo habens,
minimi digiti crassitudine. Derasa hæc intus viri-
dis est, acerba, gustu subdulcis. Parte auersa folia
fuluis maculis notata, sine semine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis petris, & in agrestibus quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augusti carpenda.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Purgandi vim obtinet. Coquitur autem cū galina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua ad purgationem. Arida aquae mulsae inspersa, bilem & pituitam ducit. Radix trita & illita luxatis cōfert, & ad fissuras quae inter digitos sunt.

EX PAVLO.

Polypodium exiccat admodum citra morsum, & potum per inferna purgat.

EX PLINIO.

Radix in vsu. Exprimitur succus aqua madescacta, & ipsa concisa inspergitur oleri, & Beta, & Maluae, vel salsamento, vel cum pulicula coquitur ad alium leniter soluendam vel in febrī. Detrahit bilem & pituitam. Stomachum offendit. Arida farina indita naribus Polypum consumit. Illita luxatis medetur.

DE PRASIO.

CAP.

CCXXV.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Marrubium **Passium.** Πάριον Græci, Marrubium Latinis, Prasfium officinis vocatur. Germanis Andorn das vuciblin, Vucisz Andorn, Marobel, Gottfzuergez. (Gallis du Marrubium.)

FORMA.

Frutex est ab una radice ramosus, subhirsutus, albicans, virgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amarū. Semen per intervalla in caulibus est. Flores asperi verticillorum figura. Hæc delineatio adamussim

Marrubium Marrubio hodie dicto respondet. Siquidem singulari radice, angulosi ramulis fruticat, lanuginosum: foliis ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, verticillato cinctu caulem ex intervallo amplectente, cui succrescit teres & asperum semen.

LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & iter rudera

TEMPVS.

Colligitur herba in æstate, Iulio potissimū mense, dum semine est prægnans.

TEMPERAMENTVM.

Marrubium in caliditate quidem secundi ordinis iam completi est, in siccitate verò tertij medijs, aut completi.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius folia arida cum semine decocta in aqua,

aut

aut viridium expressus succus, datur cum melle asthmaticis, tussientibus & tabidis. Crassa è thorace cum iride sicca ducunt. Datur mulieribus quæ non purgantur, vt menstrua & secundas pellant. Item difficile parietibus, his qui à serpentibus morfi sunt, & qui letale quid biberunt. Vesica tamen & renibus nocent. Folia cū melle illita sordida vlcera purgant, pterygia nomasq; cohibent. Dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contusis expressus succus & sole coactus. Cum vino & melle illitus, oculorū claritatem exacuit. Morbum regium per nares expurgat. Aurium doloribus perse, aut cum rosaceo instillatus prodest.

EX GALENO.

Prasium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur consentientem huic saporis actionem habet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemque expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergit ac discutit. Succo eius cum melle ad aciei oculorum claritatem vtuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus utique obstructionem discicere, meatumq; ipsum & explanationes membranarum expurgare necesse est.

EX PLINIO.

Huius folia semenq; cōtrita prosunt cōtra serpētes, pectorum & lateris dolores, tussim veterem. Iis qui sanguinem eiciūt eximie vtile, scapis eius cum
panico

PLANTARVM HISTORIAE

panico aqua decoctis, vt asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe, Sunt qui viridis semen, quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctum, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubeant. Alij nihil comparant. In eadem causa Marrubij & Foeniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisque ad sextarios duos, si cochlearij mensura in die sorbeatur in aqua cyatho. Virilium vitiiis tussim cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, conuulsis, nervorum contractionibus salutare. Potum aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierum. Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissima est. Item ad gangrenas & pterygia. Succus verò articulis, & e naribus morbo re gio, minuendæq; bili cum melle prodest. Item contra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinam ciet. Cauenda tamen exulcerata vesica, & renum vitiiis. Dicitur succus claritatem oculorum adiungere.

DE PERISTEREONE.

CAP. CCXXVI.

NOMINA.

Verbenas Περὶς ὀπών, ἰοπό βοτάνη Græcè: Verbenas
ca. ca, Verbena, Columbaris seu Colubina, herba
Verbena. ba Sagminalis Latine, herbarijs & officinis Verba
 bona vocatur. Germanicè Eisenkraut, vel Eisen
 fernhart,

ferrnhart, (Gallicè Veruaine,) hoc est, ferraria,
 quod nomen vt olim, sic hodie quoque habet. Peri Periste
 stercon nomen inditum à columbis, qui in ea versa recon cur
 ri plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc dicta.
 est, sacra herba ideo dicta, quòd ea olim apud Ro= Hierobo
 manos domus purgabatur, familia lustrabatur, lo= tane.
 uis mensa ad sacrificium & epulas verrebatur, &
 faciales in sacris legationibus illa coronabatur, vel
 vt Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspē
 sa & alligata mirè utilis sit. Sagminalis verò, quòd Sagmina
 inter sagmina, hoc est, gramina ex loco sacro, pra= lis.
 sertim arce Capitolij, cū sua terra cuius, primum
 hac honorem haberet.

G E N E R A.

Duo Verbenace & Græci & Latini fecerūt ge
 nera. Dioscorides & alij Græci à planta habitu re
 ctam & supinam. Plinius à sexu marem & femi
 nam. Recta Dioscoridis, est Plinij mas, alioq; nomi
 ne Crista gallinacea, à serratis foliis quæ gallinaceæ Crista gal
 crista formam referunt, dicitur. Recta autē nomi= linacea.
 nata est, quòd rectis ramulis assurgat. Supina autē
 Dioscoridis, apud Plinium femina est, Romanisq;
 Cincinnalis vocatur. Supinam verò vocarūt, quòd
 semper humi supinè procumbat. Germani etiā per
 sexum genera illa distinguunt, vocantque rectam
 Verbenacam Eisenkraut das menple, Supinam
 verò das Vueible.

F O R M A,

Recta

PLANTARVM HISTORIAE

Recta. Recta sine mas herba est altitudinis palmi, alio
quando etiam maioris. Folia huius incisa, subalbida,
e caule prodeuntia, qui ei vnus est magna ex parte;
quem admodum & radix vna. Flos luteus, quo solo
ferè à femina differre videtur. Hæc descriptio pul
chrè Verbenace mari responderet enim herba do
dratalis, interdum verò procerior, quem admodum
ea est quæ in Germania nostra provenit: nunquam
enim aut rarissimè palmi altitudinem nõ excedit.
Folia habet incisuris diuisa, albescencia, erumpen
tia è caule. Singularis denique illi, vt plurimum, cau
lis & radix vna. **Supina.** seu femina ramos pro
fert cubitales, aliquando etiam maiores, angulosos,
circa quos folia sunt per internalla quernis similia,
angustiora tamen & minora per ambitum incisa,
colore subcaeso. Radicem habet oblongam, tenuem.
Flores purpureos, tenues. Cuius iterum delineatio
nis nota, Verbenæ femina admissim conueniunt.
Siquidem multis statim à radice angulosis colicu
lis constat, coma subtus incana, folio querno nõ dis
simili, nisi quòd minus est & angustius, multis per
ambitum incisuris, flosculo ex albore & purpura
versicolore. Quibus omnibus manuscripti codicis,
qui Periskereon interpretatur Verbenam, accedit
testimonium, & cõmunis omnium consensus, à quo
sine manifestis coniecturis & rationibus nunquam
est discedendum.

LOCVS.

Vtraque

Vtraque in planis & aquosis locis prouenit.

TEMPVS.

Mas citius quàm samina apparet. Colligi debent, potissimum sœmina, circa Canis ortum, nam hoc tempore floret.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccat & adstringit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ folia cum rosacco, aut adipe suillo recenti apposita, vuluarum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescentia vlcera cohibent. Vulnura glutinant, veteraque ex melle ad cicatricem perducunt. Supina autem folia & radix in vino pota illitaq;, aduersus reptilia serpentesve faciunt. Eadem drachma pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina, quadragenis diebus ieiuno contra regium morbum bibuntur. Vetera cœdemata, & inflammationes illita mitigant. Sordida vlcera purgant. Tota autem herba in vino decocta tōsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarissata cohibet. Fertur sparsa aqua triclinio qua maduerit, latiores cōuinias fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacētibus folijs: quartanis, quartum.

EX GALENO.

Vini habet adeò desiccantē vt vulnura glutinet.

EX AETIO.

S

Verbenacæ

PLANTARVM HISTORIAE

Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigēes, si ea coronetur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo & illinatur, aut oleo decoquatur, ac foveatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisq; ulceribus medetur. Ad colicos radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato: efficacissimum id esse experientia compertum est. Facit & ad calculos atq; ad inchoantem elephantiasim, si cum melle propinetur. Vtere itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaeue febre laborantes. Ad podagricos vero & coxædicum morbo affectos, vino decocta exhibetur. Succus radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, et acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistula tanquam collyrium iniici, ac mirum in modum prodest.

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclinio qua maduerit Verbenaca, latiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex vino. Omnibus visceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab iis phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data caecis febre, aut ex vino amineo cochlearibus
quinque,

quinque additis in cyathis tribus vini.

EX SIMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dētiūm dolores sedat, & motos atque concussos confirmat. Oris vlcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota iis qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos verò & coxendicis morbo captos, vulneratōsque illita sanat.

DE PTERIDE. CAP. CCXXVII.

NOMINA.

PΤΌΡΙΣ, ἢ ΠΤΌΡΙΟΥ Græcis, Filix Latinis dicitur Filix. tur. Officinæ Latino nomine vtuntur. Germanicè Valdtfarr, (Gallicè Feuchiere.) Pteris Pteris cur autem & pterion ab alis auium, quarum formā in dicta. ramulis disposita eius folia referūt, Græcis dicitur: pennatus enim, & pennatis foliis frutex Filix est.

GENERA.

Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & fœmina. Mas Græcis simpliciter ΠΌΡΙΣ Latinis Filix mas, Pteris. Germanis Vualdtfarr mennle dicitur. Fœmina Græcis ΘΗΛΥ ΠΌΡΙΣ, Latinis Filix fœmina, Germanis Thelypteris Vualdtfarr Vueible appellatur. ris.

FORMA.

Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, sive Filix mas ne semine, ex vno pediculo cubitali longitudine cula.

S ij excentia,

PLANTARVM HISTORIAE

excuntia, incisa, alarum autem modo explicita, odore subgrauia. Radicem in terra superficie foris nigram, crassam, oblongam, adnascentias appendicesue multas habentem. Ex qua siquidem descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine pictam damus herbam, esse Filicem masculam: hac enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex vno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius excunt, vtroque latere pinnata, subgravi odore. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis & capillamentis fibrata, atque, ut summam dicam, omnes illi notæ adamusim respondent. Filix femina folia priori similia obtinet, non tamen vno singulari; pediculo ut illa hærentia, sed adnascentes ramulos multos altioresque habentia. Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflaua, aliquando verò rubescens. Quæ descriptio iterum per omnia cum ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non respondeat.

Filix fœmina.

LOCVS.

Nascuntur vbique, sed maximè in montibus, syluis & saxosis locis.

TEMPVS.

Effodiuntur Vergiliis occidentibus, hoc est, autumno.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Amara sunt Filices, paululum habentes adstric-
tionis, vt euidentissimum sit has calefacere &
exiccare posse.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Filicis mascula radix pellit latos lumbricos pō-
dere drachmarum quatuor cum aqua mulsā pota.
Melius autem si cum Scammonia, aut veratri ni-
gri quatuor obolis detur: veruntamen oportet sumē-
tes allia præsumpsisse. Lienosis vt restituantur pro-
dest pota. Radix etiam cum axungia illita contra
ictus ab harundine factos utilis est. Eius autē hac
probatio. Peribit Filix quam per ambitū copiosior
harundo coronet: & cōtra euanescet harundo, quā
obsapiens multa Filix in orbem cinxerit. Fœmina
radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lum-
bricos pellunt. Cum vino autem pondere triū dra-
chmarum pota, rotundos lumbricos eiciunt. Mulie-
ribus datæ sterilitatem faciunt. Et si prægnaus su-
mat, abortum. Sicca & in farinam trita, humi-
dis & iis quæ difficulter sanantur vlceribus insper-
guntur. Medentur iumentorum cervicibus. Folia e-
ius nuper prodeuntia olerum modo elixa comedū-
tur, aluumq; molliunt.

EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximè vtilem: latū
enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor
drachmarum pondere in aqua mulsā sumpserit. Ad

S. ij

eundem

PLANTARVM HISTORIAE

eundem modum factū quidem vinum necare, mortuum autem eiicere mirum non est. Vlceribus imposita valenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu femina Filix contra lumbricos ventris & latos & graciles utilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tenues autem in vino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, pregnantī quidem abortum: simpliciter autem foeminis sterilitatem facere affirmant.

EX PLINIO.

Vsus radice in trimatu tantum, neque ante neque postea. Pellunt interaneorum animalia. Ex his tineas cum melle, cetera ex vino dulci triduo potae. Vtraque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tineas cum Scammonij paripondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnius diei abstinentiam bibitur, melle prae gustato, contra rheumatismos. Neutra danda foeminis, quoniam grauidis abortū, ceteris sterilitatem facit. Farina earum vlceribus tetrīs inspergitur. lumentorum quoque cervicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni vtile est in locis suspectis. Vsta etiam fugant nidore.

APPENDIX.

Falsum

Falsum & commentitium haud dubiè est quicquid neoterici aliqui de Filicis semine fabulantur: Filix scilicet una solstitiali nocte floreat, eademque mince pro hora cum defloruit maturum in terram semen casus caret. dat, ideoque nisi quispiam tunc affuerit, nec videri florere, nec colligi semen posse, tum quia incredibilia sunt, tum quod omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine semine dixerunt. Neque etiam medici vel Arabes vel Persæ, ad magicas vanitates nati, seminis huius meminerunt. Quapropter omnia hæc agyrtarum commenta esse videntur humana ignorantia ad questum impudenter illudentium, quæ certè vel una hac ratione abundè satis confutari possunt, quod cuncta illa fieri & observari natali nocte diui Ioannis Baptiste præcipiunt cum natalis ea nox & solstitialis illa duodecim dierum numero nunc inter se distent.

DE PEUCEDANO. CAP.

CCXXVIII.

NOMINA.

PΕΥΚΕΔΑΝΟΣ Græcis, Peucedanus Latinis, of Fœniculicinis et herbariis nostræ ætatis Fœniculus lus porcinus dicitur. Germanis Harstrang, Seuufennus. chel, oder Schuuefeluurtz, (Gallis Peucedame, Peucedame, ou queu porceau,) quod lachryma è radice nus unde sulphuri aut thuri similis exudet. Peucedanum autem dicta. nomē inuenit à pinu, quæ græcis ΠΙΝΗ dicitur, cui Pinastella folio par est. Hinc posteriores latini Pinastellum lus.

PLANTARVM HISTORIAE

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix illita vulneribus auxiliatur. Quinetiam vultus maculas delet & aufert.

EX GALENO.

Radicem Polygonati quidam vulneribus illinūt. Sunt etiam qui illo naevos maculasque in facie detergant.

APPENDIX.

Hodie quoq; mulieres sigillo Salomonis sibi faciē extergūt & fucant, vt planē nullū subſit dubium, quin Polygonatum eſſe conſtanter credamus.

DE POLYPODIO. CAP.

CCXXIII.

NOMINA.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium, Filicula Latine, officina Græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Engelfutz, Baumfarr, Dropffuurtz, (Gallicè du Polypode) vocatur. Polypodia nomen à radice quæ polyporum modo cirros obtinet, inditū eſt. Filiculam autem Latini à ſimilitudine foliorum cum Filice nuncupauerunt.

Polypo=
dium vnde
dictum.
Filicula.

FORMA.

Herba eſt palmi altitudine, Filici ſimilis, ſubhirſuta, inciſuris diuiſa, non tamen ad cō tenuibus. Radix illi eſt hirſuta, cirros polyporum modo habens, minimi digiti craſſitudine. Deraſa hæc intus viridis eſt, acerba, guſtu ſubdulcis. Parte auerſa folia fuluis maculis notata, ſine ſemine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis petris, & in agrestibus quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augusti carpenda.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Purgandi vim obtinet. Coquitur autem cū galina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua ad purgationem. Arida aqua mulsæ insparsa, bilem & pituitam ducit. Radix trita & illita luxatis cōfert, & ad fissuras quæ inter digitos sunt.

EX PAVLO.

Polypodium exiccat admodum citra morsum, & potum per inferna purgat.

EX PLINIO.

Radix in vsu. Exprimitur succus aqua madefacta, & ipsa concisa inspergitur oleri, & Beta, & Malua, vel salsamento, vel cum pulicula coquitur ad aluum leniter soluendam vel in febrī. Detrahit bilem & pituitam. Stomachum offendit. Arida farina indita naribus Polypum consumit. Illita luxatis medetur.

DE PRASIO.

CAP.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Marrubiū Π *Πόσλον* Græcis, *Marrubium* Latinis, *Prasium* officinis vocatur. Germanis Andorn das vueiblin, Vueisz Andorn, Marobel, Gottszuergeſz. (Gallis du Marrubium.)

FORMA.

Frutex est ab una radice ramosus, subhirsutus, albicans, virgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amarū. Semen per intervalla in caulibus est. Flores asperi verticillorum figura. Hæc delineatio adamuſſim

Marrubiū Marrubio hodie dicto respōdet. Siquidem singulari radice, angulosis ramulis fruticat, lanuginosum: foliis ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, verticillato cinctu caulem ex intervallo amplectente, cui succrescit teres & asperum semen.

LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera

TEMPVS.

Colligitur herba in æstate, Iulio potissimū mense, dum semine est prægnans.

TEMPERAMENTVM.

Marrubium in caliditate quidem secundi ordinis iam completi est, in siccitate verò terrij medijs, aut completi.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius folia arida cum semine decocta in aqua,
aut

aut viridium expressus succus, datur cum melle a
sthmaticis, tuſſientibus & tabidis. Crassa è thora-
ce cum iride sicca ducunt. Datur mulieribus quæ
non purgantur, vt menstrua & secundas pellant.
Item difficile pariētibus, his qui à serpentibus mor-
si sunt, & qui letale quid biberunt. Vesica tamen
& renibus nocent. Folia cū melle illita sordida vl-
cera purgant, pterygia nomasq; cohibent. Dolores
laterum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contu-
sis expressus succus & sole coactus. Cum vino &
melle illitus, oculorū claritatem exacuit. Morbum
regium per nares expurgat. Aurium doloribus per
se, aut cum rosacco instillatus prodest.

EX GALENO.

Prasium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur
consentientem huic saponi actionem habet, iecur ac
lienem obstructione liberans, & thoracem pulmo-
nēque expurgans, ac menses promouens. Sed &
illitum detergit ac discutit. Succo eius cum melle
ad aciei oculorum claritatem vtuntur. Quinetiam
& per nares morbum regium purgant, & ad aurii
dolores inueteratos adhibent, in quibus utique ob-
structionem dissicere, meatumq; ipsum & explan-
tationes membranarum expurgare necesse est.

EX PLINIO.

Huius folia semenq; cōtrita prosunt cōtra serpē-
tes, pectorum & lateris dolores, tuſsim veterem. Iis
qui sanguinem ciiciūt eximie vtile, scapis eius cum
panico

PLANTARVM HISTORIAE

panico aqua decoctis, vt asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe, Sunt qui viridis semen, quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctum, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubeant. Alij nihil comparant. In eadem causa Marrubij & Foeniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisque ad sextarios duos, si cochlearij mensura in die sorbeatur in aqua cyatho. Virilium vitiis tussim cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, conuulsis, nervorum contractionibus salutare. Potum aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierum. Arida farina cum melle ad tussim succam efficacissima est. Item ad gangrenas & pterygia. Succus verò articulis, & e naribus morbo regio, minuendaeq; bili cum melle prodest. Item contra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinam ciet. Cauenda tamen exulcerata vesica, & renum vitiis. Dicitur succus claritatem oculorum adiuuare.

DE PERISTEREONE.

CAP. CCXXVI.

NOMINA.

Verbenac.
Verbena.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ, ἰσὸς βοτάνη Græcè: Verbenaca, Verbena, Columbaris seu Colubina, herba Sagminalis Latine, herbariis & officinis Verbenam vocatur. Germanicè Eisenkraut, vel Eisenhart,

ferrnhart, (Gallicè Veruaine,) hoc est, ferraria, quod nomen vt olim, sic hodie quoque habet. Peri Periste stercon nomen inditum à columbis, qui in ea versa reoncurri plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc dicta. est, sacra herba ideo dicta, quòd ea olim apud Ro= Hierobo= manos domus purgabatur, familia lustrabatur, lo= tane. uis mensa ad sacrificium & epulas verrebatur, & faciales in sacris legationibus illa coronabatur, vel vt Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspensa & alligata mirè utilis sit. Sagminalis verò, quòd Sagmina inter sagmina, hoc est, gramina ex loco sacro, pra= lis. sertim arce Capitolij, cū sua terra cuiusa, primum hac honorem haberet.

G E N E R A.

Duo Verbenace & Graci & Latini fecerūt genera. Dioscorides & alij Graci à planta habitu rectam & supinam. Plinius à sexu marem & foeminam. Recta Dioscoridis, est Plinij mas, alioq; nomine Crista gallinacea, à serratis foliis quæ gallinaceæ Crista gal crista formam referunt, dicitur. Recta autē nomi= linacea. nata est, quòd rectis ramulis assurgat. Supina autē Dioscoridis, apud Plinium foemina est, Romanisq; Cincinnalis vocatur. Supinam verò vocarūt, quòd semper humi supinè procumbat. Germani etiā per sexum genera illa distinguunt, vocantque rectam Verbenacam Eisenkraut das mennle, Supinam verò das Vueible.

F O R M A.

Recta

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Recta. Recta siue mas herba est altitudinis palmi, alia quando etiam maioris. Folia huic incisa, subalbida, e caule prodeuntia, qui ei vnus est magna ex parte, quemadmodum & radix vna. Flos luteus, quo solo ferè à femina differre videtur. Hæc descriptio pulchrè Verbenacæ mari respondet: est enim herba doctralis, interdum verò procerior, quemadmodum ea est quæ in Germania nostra prouenit: nunquam enim aut rarissimè palmi altitudinem nõ excedit. Folia habet incisuris diuisa, albescentia, erumpentia e caule. Singularis denique illi, vt plurimū, caulis & radix vna. **Supina.** Supina seu femina ramos profert cubitales, aliquando etiam maiores, angulosos, circa quos folia sunt per intervalla quernis similia, angustiora tamen & minora per ambitum incisa. colore subcaesio. Radicem habet oblongam, tenuem. Flores purpureos, tenues. Cuius iterum delineationis nota, Verbenæ feminae adamussim conueniunt. Siquidem multis statim à radice angulosis coliculis constat, coma subtus incana, folio querno nõ dissimili, nisi quòd minus est & angustius, multis per ambitum incisuris, flosculo ex albore & purpura versicolore. Quibus omnibus manuscripti codicis, qui Peristereon interpretatur Verbenam, accedit testimonium, & cõmunis omnium consensus, à quo sine manifestis coniecturis & rationibus nunquam est discedendum.

L O C V S.

Vtraque

Vtraque in planis & aquosis locis prouenit.

TEMPVS.

Mas citius quàm samina apparet. Colligi debent, potissimum samina, circa Canis ortum, nam hoc tempore floret.

TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccat & adstringit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ folia cum rosaceo, aut adipe suillo recenti apposita, vuluarum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescentia vlcera cohibent. Vulnera glutinant, veteraque ex melle ad cicatricem perducunt. Supina autem folia & radix in vino pota illitaq; aduersus reptilia serpentésve faciunt. Eadem drachma pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina, quadragenis diebus ieiuno contra regium morbum bibuntur. Vetera cedemata, & inflammationes illita mitigant. Sordida vlcera purgant. Tota autem herba in vino decocta tōsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarissata cohibet. Fertur sparso aqua triclinio qua maduerit, latiores cōuiuas fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacētibus foliis: quartanis, quartum.

EX GALENO.

Vim habet adeò desiccantē vt vulnera glutinet.

EX AETIO.

S

Verbenacæ

PLANTARVM HISTORIAE

Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigēes, si ea coronetur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo & illinatur, aut oleo decoquatur, ac foveatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisq; ulceribus medetur. Ad colicos radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato: efficacissimum id esse experientia compertum est. Facit & ad calculos atq; ad inchoantem elephantiasim, si cum melle propinetur. Vt et itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaeue febre laborantes. Ad podagricos vero & coxedicum morbo affectos, vino decocta exhibetur. Succus radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, et acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistulae tanquam colicarium iniici, ac mirum in modum prodest.

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclinio qua maduerit Verbenaca, letiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex vino. Omnibus visceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab iis phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data caerentibus febre, aut ex vino amineo cochlearibus quinque,

quinque additis in cyathis tribus vini.

EX SIMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dētiūm dolores sedat, & motos atque concussos confirmat. Oris vlcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota iis qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos verò & coxendicis morbo captos, vulneratōsque illita sanat.

DE PTERIDE. CAP. CCXXVII.

NOMINA.

ΠΤΕΡΙΣ, ἢ ΠΤΕΡΙΟΥ Græcis, Filix Latinis dicitur Filix. tur. Officina Latino nomine vtuntur. Germanicè Valdtfarr, (Gallicè Feuchiere.) Pteris Pteris cur autem & pterion ab alis auium, quarum formā in dicta. ramulis disposita eius folia referūt, Græcis dicitur: pennatus enim, & pennatis foliis frutex Filix est.

GENERA.

Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & fœmina. Mas Græcis simpliciter ΠΤΕΡΙΣ Latinis Filix mas, Pteris. Germanis Vualdtfarr mennle dicitur. Fœmina Græcis ΘΗΛΥ ΠΤΕΡΙΣ, Latinis Filix fœmina, Germanis Thelypteris Vualdtfarr Vueible appellatur. ris.

FORMA.

Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, sive Filix masculina semine, ex vno pediculo cubitali longitudine cula.

S ij exeuntia,

PLANTARVM HISTORIAE

excuntia, incisa, alarum autem modo explicita, odore subgrauia. Radicem in terra superficiei foris nigram, crassam, oblongam, adnascantias appendicesve multas habentem. Ex qua siquidem descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine pictam damus herbam, esse Filicem masculam: hæc enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex vno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius exeunt, utroque latere pinnata, subgravi odore. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis & capillamentis fibrata, atque, ut summam dicam, omnes illi notæ adamussum respondent. Filix femina folia priorisimilia obtinet, non tamen vno singularique pediculo ut illa hærentia, sed adnascentes ramulos multos altioresque habentia. Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflaua, aliquando verò rubescens. Quæ descriptio iterum per omnia cum ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non respondeat.

Filix fœmina.

LOCVS.

Nascuntur ubique, sed maximè in montibus, syluis & saxosis locis.

TEMPVS.

Effodiuntur Vergiliis occidentibus, hoc est, autumno.

TEM

TEMPERAMENTVM.

Amara sunt Filices, paululum habentes adstric-
tionis, vt euidentissimum sit has calefacere &
exiccare posse.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Filicis masculæ radix pellit latos lumbricos pō-
dere drachmarum quatuor cum aqua mulsâ pota.
Melius autem si cum Scammonia, aut veratri ni-
gri quatuor obolis detur: veruntamen oportet sumē-
tes allia præsumpsisse. Lienosis vt restituantur pro-
dest pota. Radix etiam cum axungia illita contra
ictus ab harundine factos utilis est. Eius autē hac
probatio. Peribit Filix quam per ambitū copiosior
harundo coronet: & cōtra euanescet harundo, quā
obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Famine
radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lum-
bricos pellunt. Cum vino autem pondere triū dra-
chmarum pota, rotundos lumbricos cūciunt. Mulie-
ribus datæ sterilitatem faciunt. Et si prægnans su-
mat, abortum. Sicca & in farinam trita, humi-
dis & iis quæ difficulter sanantur vlceribus insper-
guntur. Medentur iumentorum ceruicibus. Folia e-
ius nuper prodeuntia olerum modo elixa comedū-
tur, aluumq; molliunt.

EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximè vtilem: latū
enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor
drachmarum pondere in aqua mulsâ sumpserit. Ad

PLANTARVM HISTORIAE

eundem modum foetū quidem viuum necare, mortuum autem eiicere mirum non est. Vlceribus imposita valenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu femina Filix contra lumbricos ventris & latos & graciles utilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tenues autem in vino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, pragnanti quidem abortum: simpliciter autem foeminae sterilitatem facere affirmant.

EX PLINIO.

Vsus radice in trimatu tantum, neque antè neque postea. Pellunt interaneorum animalia. Ex his tineas cum melle, cetera ex vino dulci triduo potæ. Vtraque stomacho inutilissima. Alum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tineas cum Scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnus diei abstinentiam bibitur, melle prægustato, contra rheumatismos. Neutra danda foeminis, quoniam grauidis abortū, ceteris sterilitatem facit. Farina earum vlceribus tetrīs inspergitur. Iumentorum quoque cervicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni vtile est in locis suspectis. Vstæ etiam fugant nidore.

APPENDIX.

Falsum

Falsum & commentitium haud dubiè est quicquid neoterici aliqui de Filicis semine fabulantur: Filix se quod scilicet vna solstitiali nocte floreat, eademque mine prope hora cum defloruit maturum in terram semen ea sus caret. dat, ideoq; nisi quispiam tunc affuerit, nec videri florere, nec colligi semen posse, tum quia incredibilia sunt, tum quod omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine semine dixerunt. Neque etià medici vel Arabes vel Persæ, ad magicas vanitates nati, seminis huius meminerunt. Quapropter omnia hæc agyrtarum cõmentum esse videntur humana ignorantia ad quæstum impudenter illudentium, quæ certè vel vna hac ratione abundè satis confutari possunt, quod cuncta illa fieri & obseruari natali nocte diui Ioannis Baptiste præcipiunt, cum natalis ea nox & solstitialis illa duodecim dierum numero nunc inter se distent.

DE PEUCEDANO. CAP.

CCXXVIII.

NOMINA.

PΕΥΚΕΔΑΝΟΣ Græcis, Peucedanus Latinis, of Fœnicifcinis et herbariis nostræ ætatis Fœniculus lus porcinus dicitur. Germanis Harstrang, Seuufenus. chel, oder Schuuefeluurtz, (Gallis Peucedame, ou queu porceau,) quod lachryma è radice nus vnde sulphuri aut thuri similis exudet. Peucedanum autè dicta. nomē inuenit à pinu, quæ græcis ΠΙΝΗ dicitur, cui Pinastellus folio par est. Hinc posteriores latini Pinastellum lus.

PLANTARVM HISTORIAE

eum vocauerunt.

FORMA.

Caulē mittit tenuem, macilentum, Fœniculo
similē comam habet circa radicē copiosā &
densā. Florem luteū, radicē foris nigrā, in-
tus albā, grāui odore, crassā, liquore plenā. He-
sanē omnes notæ, nulla prorsus reclamante, huic
Officina quam pictā exhibemus herbæ conueniunt. Offi-
cīnæ, quæ non rarò adulterinas pro genuinis vē-
dunt herbas, Peucedanum ostendunt radicē nō suc-
cosa, sed lignosa, nec grāui odore, sed incundo : vñ
de satis constare potest verum non esse.

LOCVS.

Gignitur in montibus opacis, potissimum in mō-
te prope Tubingam, cui olim arx imposita fuit, in
itinere versus Rotenburgum sito.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, atq; deinceps
semen producit. Radix foditur exitu autumnī.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit ordine secundo iam completo: desiccāt
verò tertio iam incipiente.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radice adhuc tenera Peucedani cultello incisa
liquor effunditur, profluensq; statim in vmbra re-
ponitur: in sole siquidem languescit. Facit cū col-
ligitur capitis dolores & vertigines, nisi quis antea
rosaceo uares præungat, & caput irrigat. Radix
assata

assata inutilis fit. Colligitur & ex caulibus & ex radice sicut è Mandragora liquor atque succus. Minus tamen efficax succo liquor, & velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma thuri similis, caulibus radicibusque adherens. Ex aceto & rosaceo inunctus lethargicis, phreneticis, vertiginosis, comitialibus, diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: in vniuersumque nervorum affectionibus ex oleo & aceto inungitur. Strangulatu vuluæ laborantes olfactus, soporeque profundo correptos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus cum rosaceo instillatus prodest. Canis dentium erosio inditus eorundem dolores mitigat. Contra tussim in ouo sumptus facit. Difficultati spirandi, torminibus & inflationibus subuenit. Aluum leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregie adiuvat. Ad vesicæ renumque dolores & distentiones potus confert. Aperit vuluam. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Sicca trita sordida purgat vlcera, ossiumque squamas detrahit, veteraque cicatrice obducit. Ceratis malagmatisque calefaciendi vi præditis miscetur. Eligi debet recens, non cariosum, solidum, odoris plenum. Succus ad portiones amaræ amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho dissoluitur.

EX GALENO.

Pencedani radice quidem maximè, sed tamen
etiam

PLANTARVM HISTORIAE

etiam succo & liquore utimur. Sunt autem haec omnia eiusdem specie facultatis, sed valentior liquor, admodum excalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistētibz cōuenire creditur, tū morbis in pulmone & thorace ex crassitudine atque viscositate humorum factis. Et intrò quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu prosunt. Porro quòd incidat atque extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia videlicet est tenuium partium, & excalfactorius. Quinetiam lienes induratos inuat, nempe incidendo, digerendo & extenuando crassos humores. Sed & radice ad haec uti licebit, quae & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiccet, minus tamen quàm succus excalfaciēs. Et vlceribus malignis arida illita optimum est remedium: ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

EX PLINIO.

Pucedani radices conciduntur in quaternos digitos offeīs cultellis, funduntq; succū in vmbra, capite prius & naribus rosaceo perunctis, ne vertigo sentiatur. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens, incisq; manat. Probatur crassitudine mellea, colore ruffo, odore suauiter grani, feruens gustu. Et hic in usu & radix, & decoctū eius pluribus medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluatur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturque contra serpētes,

serpentes, & ex oleo perunctos tuetur. Idem pectoris doloribus subuenit. Pituita & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodest. Perungunt & radicem sudoris causa eliciendi, quoniam caustica vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis est, ut saniem ossibus extrahat. Cum semine Cupressi bibitur, si sanguis per os reditus est, fluitque ab infernis. Strangulatus vulua ni dore vstum recreat, laxanturque suffocationes eo: sed quidam ammiscent in vino semen Cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini aquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium ramici, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguria cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & ut perhibent ex euphorbio naribus tactis Peucedani succo.

DE PERSICA ARBORE.

CAP. CCXXIX.

NOMINA.

Περσικὴ μῆλέα Græcis, Persica mālus Latinis: antiquum nomen herbarij vulgares retinuerunt: Germanis Pfersichbaum, (Gallis Vn Pechier) appellatur. Persica fortè dicta Persica est, quod ex Perside primum aduecta sit. cur dicta.

FORMA.

Persica foliis amygdalæ maioribus constat: flore subpuniceo, pomo carnosio, succulento, foris lanuginoso, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis

PLANTARVM HISTORIAE

qualis amygdalis. LOCVS.

Passim in hortis, vineis potissimū, nascitur. Gaudet autem aquosis.

TEMPVS.

Floret primo statim vere, fructus verò eius autumnī ferè exitu maturescit, celerrimè marcescēs.

TEMPERAMENTVM.

Persica arbor in germinibus & foliis vincetem amaram qualitatem habet, vt hoc nomine calidā esse nemo dubitare possit. Fructus eius in secundo ordine frigidus & humidus existit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Persica poma stomacho grata sunt, matura bonā faciunt aluum, cruda verò aluum constringūt. Siccata vehementius adstringūt. Siccorum decoctum haustum stomachi & ventris fluxiones sistit.

EX GALENO.

Folia Persicæ trita & super vmbilicum imposita lumbricos necant. Alioqui sanè etiam discutiens medicamentum est. Pomorum verò eius succus & veluti caro facile corrumpitur, omninoq; noxā infert, quapropter haud post alios cibos vltimoq; sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo natantia corrumpuntur. Huius verò, quod omnibus commune est, meminisse oportet: quaecunq; vitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facileque descendunt seceduntve, præ aliis comedēda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & aliis præcunt, ac
quasi

quasi iter muniunt. Postremò autem sumpta, vnà
secum alia quoque in corruptionem trahunt.

EX PLINIO VALERIANO.

Persicorum cibus est quidem stomacho inutilis,
eò quòd citò succus eius inacescat, & caro aque in
digestione vitietur, verùm minimè grauis, dum nò
diutius in intestinis moratur, et ad ima semper exi
tu celeri festinat. Persicorum cibus negatur à medi
cis membra nutrire. Sed & Galenus suadet nūquā
omnino post cibum sumere, corrumpi affirmans si
cibis ceteris innatent. Persicorum folia trita & im
posita ventris animalia perimunt & expellunt. Ea
dem sicca & in puluere tusa, recentes plagas cruen
torum vulnorum claudunt. Nucleus Persicorum ca
pitis dolori cum oleo & aceto tritus illinitur: quana
uis quidam cum solo rosaceo terere maluerint. Gum
mi gutta quam Persici truncus illachrymat, fluxu
ti aluo medetur. Eadem mixta cum vino etiam in
vesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines
reprimit. Decocta cum croco tumores faucium mi
tigat. Asperam arteria canalem leniore facit. Ex
creantibus sanguinem miro modo subuenit. Thora
cis obstructos sinus reserat: vitia pulmonis expur
gat.

APPENDIX.

Flores Persice saccharo conditi, instar rosarum
aut violarum, aluum haud leuiter mouent atque
subducunt.

PLANTARVM HISTORIAE
DE PEPLO. CAP. CCXXX.
NOMINA.

*Esula ro-
tunda.*

Πέπλος Græcis, Peplos Latinis, officinis & vulgò Esula rotunda, Germanis Teufelsmilch, (Gallis Reueille matin des Vignes) appellatur. **FORMA.**

Exiguus frutex est albo liquore plenus: foliis paruis vt Ruta, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi fusa: semine sub foliis paruo & rotundo, minore quàm candidi papaueris. Radice vna, ex qua totus frutex prouenit.

LOCVS.

Nascitur in hortis & vineis.

TEMPVS.

Colligitur messibus, siccaturque in vmbra, & continue vertitur.

TEMPERAMENTVM.

Idem cum Tithymallis habet temperamētum, atque adeo ex quarto calefacientium ordine est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa multos habet vsus, radix verò inutilis. Semen eius tusum, feruidaq; aqua madefactum reconditur. Pituitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyatho potū ducit. Opsoniis mixta herba aluum conturbat. Conditur in muria.

EX GALENO.

Peplos frutex liquorem similem Tithymallis habet, cum in aliis, tum quia purgat cen illi.

EX

EX AETIO.

Pituitam ac bilem ducit acetabuli mensura cum mulsa cyatho bibitum Peplisemen. Sale etiam herba maceratur, flatusq; discutit, vt Hippocrates asserit. Summopere igitur confert flatuosis affectibus qui in melancholia dominantur, item diuturnis lienis & vteri & coli flatibus, tumefactisq; cedematibus in abdomine.

EX PLINIO.

Semine Pepli poto aluus soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media potio est acetabuli mensura, in aqua mulsa heminis tribus. Et cibus inspergitur opsonisq; ad molliendam aluum.

DE PILOSELLA. CAP. CCXXXI.

NOMINA.

Quo nomine veteribus Græcis aut Latinis nominata sit hac herba, ingenuè fateor me ignorare. Neque enim est $\mu\upsilon\delta\varsigma\ \delta\omicron\upsilon\varsigma$ Dioscoridis. Cum itaque Græco & Latino nomine destitueremur, barbaro vti nobis necesse fuit, nisi plane herbam hanc vulneribus glutinandis mirè utilem, præterire voluissimus. Herbarii itaque nostræ Pilosella ætatis à copiosis pilis quibus vestitur, Pilosellā, Ger vnde diuini Meuszorlin, vocant. Ela.

GENERA.

Duo eius herbæ genera reperiuntur, in nullo ferè nisi floribus distantia. Vnum genus maioribus foliis, & quæ se à solo sustollunt, floribusq; luteis, maior

PLANTARVM HISTORIAE

Minor.

ior Pilosella nominatur, Germanis propriè Nagelkraut. Alterum minoribus foliis, in terra sessilibus, floribus purpureis, & quasi in pappum euascentibus, Germanis Meuszorlin, oder Hasenpfatlin peculiariter appellatur. Sic etiam suam Pilosellam manuscriptus herbarius in maiorem & minorem digestit. **FORMA.**

Herba est foliis in terram graminis modo sparsis, pilosis, albicantibus à terra, supernè vircentibus, floribus luteis aut purpureis, radice in exilitatē multam extenuata. Ex qua descriptione sole clarius fit, non est Pilosella. **Myosotis** cam herbam quæ à Græcis Myosotis, à Latinis auricula muris dicitur, non esse Pilosellam: nam, ut reliqua taceam, neque maior neque minor Pilosella cœruleum flosculum velut Anagallis ob-

Auricula tinet: ut non parum errent herbarij nostri temporis qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam apellari tradunt. **LOCVS.**

Nascitur vtrunque genus locis montosis & collibus terrenis. Maior autem inuenitur etiam in asperis & incultis agrorum limitibus.

TEMPVS.

Maior & Iunior potissimum mense florent. Minor tamen Pilosella paulò post initia Iunij mēsis disparet, & nusquam subinde inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Esse calidas & siccas Pilosellas gustus palam declarat: habet enī adstrictionē cū exigua quadā acris

acrimonia cōiunctā, vt hoc nomine ad purificanda
ac subinde glutinanda vulnera sint mirificē vtilēs.

VIREs. EX RECENTIORIBVS.

Ferunt foliorum farinā vulnera mirum in mo-
dum glutinare. Herba recētis succū exprimunt ad
cohibendos quartanae febris horrores. Eodē tingunt
gladiatorum aciem, vt omne ferrum aliud domet, se-
cetq; : ferrum enim quod huius succo cōmaduit tā-
tam contrahere duritiā, tamq; magnum induere
robur produnt, vt chalybis aciem respuat. Has cer-
tē omnes facultates manuscriptus herbarius Pilo-
sella adscribit. Recentiores huius herba radicē Ma-
io mense effossam, siccātam, & in puluerem redā-
tātam, ac subinde potam, aut in cibo datam, effica-
cissimū esse aduersus ramicem remedium tradunt.

DE PIMPINELLA. CAP. CCXXXII.

Neutra ex his Pimpinellis nostram ex-
primit, quæ est odore cucumeris, coliculis
rubentibus, & flosculis in capitello purpu-
rascentibus, quam post sanguisorbā vo-
cat. NOMINA.

VT appellata sit Græcis aut latinis herba hæc
quam hodie vulgus herbariorum & officinæ
Pimpinellam vocant, nondū nobis certò scire licuit.
Sunt qui Pampinulam & Bipennullam nomināt.
Germani Bibinellē & Bibernellen (Galli Pim-
pinelle, ou Pimprenelle) appellant.

Pāpinula

GENERA.

T

Duām

PLANTARVM HISTORIAE

Duūm est generum Pimpinella. Vna maior, radice admodum longa, foliis multifariam scissis, Sissaro hand dissimilibus, caulib. angulosis, floribusq; in summo exiguis & candidis. Altera minor, caulibus rufescentibus, foliisque minoribus, & non dissectis multifariam, sed serratis tantūm, aliās priori per omnia similis.

FORMA.

Herba est folio mucronato, dissecto, aut in extremitatibus serrato, caulibus ab eadē radice binis aut trinis, angulosis, & interdum rubentibus, in quorū summo nascuntur flores minuti & cādidi, & iis decidentibus semen exiguum Oreoselini semini simile. Radice crassa, longa, & subrubente, acri admodum.

LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem marinis, affatim citra cultum erumpit.

TEMPVS.

Aestate in autumnum vsque floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum acrimoniam non exiguam in gustu praese ferat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit, imò secundum calefaciendi ordinem excedere credibile est, & ad tertium ferè accedere.

VIREs. EX RECENTIORIBVS.

Pimpinella succus bibitur contra serpentium morfus. Ex vino pota calculos terit. Straguriam etiam decocta

decocta leuat. Succus eius potus omne venenū discutit. Aqua eius ignis vi expressa oculorum caliginē discutit. Ha sunt facultates quas illi antiquus herbarius tribuit. Alii tradunt succum eiusdem faciei maculas detergere posse. Est autē radicis Pimpinellae tum vsus praecipuus, quum seuiantis popularim pestilentiae contagia arcere conamur: vnicū enim venenis aduersatur, & corpora ab hac lue vindicat, vt adfirmant, si tantū in ore teneatur.

Quod certē non potest ea quam hodie Sanguiforbā vocant herba. Quare mirum in modum errant, qui hanc cum Pimpinella confundunt, vt fusius suo dicemus loco.

Sanguifor-
ba non est
Pimpinella.

DE PASTORIA BURSA.

CAP. CCXXXIII.

NOMINA.

Quo nomine herba quam vulgus Pastoriam bursam appellat, Graecis & Latinis medicis dicta sit, ignorare me ingenuē fateor. Bursa autē sunt qui peram etiam pastoris nominant, à foliis peraculis in exiguae vulgae similitudinem cōpressis, turbinata cordis effigie. Germanis Deschelkraut & dicta. Hirtenseckel vocatur.

FORMA.

Herba raro pede altior, ramosa, Erucae folia habens, at minora. Flores exiguos, candidos. Semen in vulgus minutum & nigrum. Radicem candicantem & oblongam.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur propter vias passim, & in parietinis.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus legitur.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & adstringit.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Ex aceto trita collectionū inflammationes refrigerat, ac eò confluētes humores cohibet. Imponitur sacris ignibus, & quibus stomachus aestuat. Succus eius purulentis auribus infunditur. Cruenta sanat vulnera. Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neque non muliebri profluvio. Manuscriptus herbarius addit hanc sanguinem è naribus profluētem sistere mirificè posse. Herbam quoque manu tantum gestatam, mox idem efficere tradit. Quid multa? mirè efficax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus.

DE PEDE LEONIS. CAP. CCXXXIII.

NOMINA.

Quam vulgus herbariorum Pedem leonis nominat, non est Dioscoridis Leontopodion, id quod descriptio satis monstrat. Quo vero nomine Graeci & Latinis appellata sit, mihi non est nōdum constat. Sunt ex barbaris qui Alchimillam, Pes leonis alii etiam qui plantam leonis nominant. Sic autē herbario dicta, quod folia habeat instar leonini pedis laterum. & rotunda. Germanis Synnau Louentapē, Lo-
uenfusz,

uenfusz, & vnser frauue mantel (Gallis Pied de Lion) vocatur.

FORMA.

Dodrantal est herba, folia lata, crispa & retunda octo serratis incisuris distincta, non tamen ad pediculos vsque, qui statim è radice exeunt, fissa habens. Flores item exiguos & luteos profert. Radicem digito crassiore, & sesquipalmo longiorem, subrubescentem.

LOCVS.

Passim in prati, in alto potissimum sitis, nascitur.

TEMPVS.

Maior mense erumpit, & inter Iunii initia floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & radix adstrictione vehementi participant, atque adeo exiccant. Recentiores idipsum in secundo efficere ordine tradunt.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim illius lauantur vtiliter omnia vulnera. Linteu quoque in eo madefactum illis commodè imponitur. Mulierum mammas impensè laxas linteu decocto eiusdem intinctum & impositum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum interanea vulnera, rupturasque glutinat. Et quod dictu mirum est, tanta eius planta in glutinando vis est, vt ramices intestinorum, in pueris potissimum, sanare possit.

PLANTARVM HISTORIAE
DE POLYGONO MARE.
CAP. CCXXXV.

Polygonum mas herba innocentium vulgò dicitur, quod Parisiis in Cœmiterio Innocentibus sacrato luxuriat.

NOMINA.

Seminalis cur dicta.	Π	ολύγονον ἀρρεν Græcè. Proserpinaca, Seminalis à seminis multitudine, & Sanguinalis à cohibendo sanguine nominatur. Officinis corrigiola & Centumnodia. Germanicè V-ueggrasz, Denngrasz, Vuedritt appellatur.
Sanguinalis.		
Corrigio =		
la Centū =		Polygonon à geniculorum frequentia, & multitudine dictum est.
nodia.		FORMA.

Herba est ramis tenuibus, teneris, copiosis, geniculis intersectis, in terra graminis modo repētibus. Foliis Rutæ similibus, longioribus tamen. Iuxta singula folia semine, vnde masculum vocatur. Flore albo aut puniceo. LOCVS.

Nascitur passim, quotidieq; pedibus conculcatur, sua sponte in aggeribus & semitis proueniens.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiam tempore legitur.

TEMPERAMENTVM.

Vti adstrictionem quandam obtinet Polygonū, in sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio terti. Est etiam exiccatorium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet adstringendi & refrigerandi succus Polygoni potus. Prodest sanguinem expuētibus, & alui defluxionibus, cholerici & vrinæ stillicidio. Vrinam enim euidenter ducit. Cū vino potus venenatorum moribus auxiliatur. Valet etiā ad febriū circuitus vna hora ante accessionem sumptus. Muliebri profluvium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum vino decoctus melle adiecto, eximiē ad genitalium vlcera facit. Folia contra stomachi ardorē, sanguinis reiectionem, herpetas, ignes sacros, inflammationes, œdemata, & vulnera recentia illinuntur.

EX GALENO.

Polygonum iis sanè quibus stomachus astu feruet extrinsecus illitum auxiliatur: veluti etiā ignes sacros & calidas phlegmonas inuat. Porro tale cū sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione videtur exiccatorium esse. Quare cum herpetum, tum vlcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimū autem inflammatione & fluxione laborantiū partium. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest: & si vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & muliebri profluvii, & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vndecunque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quòd & vrinam pronocet exhibitum stillicidio affectis.

PLANTARVM HISTORIAE

Non tamen affectum exactè discriminat in quo dari ipsum expediat.

EX PLINIO.

Succus eius infusus naribus supprimit sanguinē, & potus cum vino, cuiuslibet partis profluvium excreationesq; cruentas inhibet. Vis eius s̄bissare ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, urinam ciet, rheumatismos cohibet: qui si nō fuere, nō prodest. Stomachi feruori folia imponuntur. Vesicae dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur et in febris ante accessiones, duobus cyathis in tertianis quartanisve præcipuē. Itē cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi.

DE PEGANO. CAP. CCXXXVI.

NOMINA.

Πήγανον καὶ τὸν Gracè, Ruta hortēsis Latine: officinæ retinuerunt nomen Latinum: Rauten & Vuerinrautē Germanicè (Gallicè de la Rue) vocatur. Peganon Graci, Plutarcho libro tertio sui symposii teste, à facultate, quòd calore sic citatēque genituram coagularet, dixerunt: τὸ πῦρον οὐκ ἐνὶ τῷ αἵματι coagulare, & quasi in glaciem contrahere est. Hinc vterum gestantibus inimica etiam coronis inserta putatur.

Peganon
vnde dicitur
etym.

FORMA.

Frutex est Ruta hortensis grauißimi odoris, semper ferè virens: folio exiguo, penè rotundo, caßi coloris,

loris, denso, surculosis ramis: flore luteo, angulosis calycibus, in quibus semen album continetur.

LOCVS.

Prouenit passim in hortis, amat aprica & sicca loca.

TEMPVS.

Floret æstate, semē autem Autumno maturescit, quo etiam tempore carpendum venit.

TEMPERAMENTVM.

Gustu non solum acri, sed & amaro est, ex tertio ordine ex calfacientium, & strenuē desiccantium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vrit, calfacit, exulcerat, urinā mouet, menstrua que ducit. Alium sistit pota & comesta. Letalium venenorum antidotum est, si semen acetabuli mensura in vino bibatur. Folia per se ante cibum sumpta, & cum nucibus iuglandibus, aridisq; ficis, inefficacia venena reddunt. Contra serpentes similiter sumpta prosunt. Genituram tam in cibo quam potu extinguit. Coctum cum anetho sicco, tormina sistit. Facit etiam ad lateris thoracisq; dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetentium febrium, vti prædictum est, pota. Ad inflationes coli, vteri & recti intestini, decocta cum oleo & infusa. Vulua strangulatu liberat trita cum melle, si à genitali vsq; ad sedem imponatur. Feruesacta cum oleo & pota, lubricos excutit. Articulorum doloribus cum melle,
aque

PLANTARVM HISTORIAE

aqua inter cutem, quae hyposarca dicitur, cum fuscis illinitur. Eisdem pota auxiliatur, in vino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergantur. Cruda, saleq; condita ac comesta, visus aciem exacuit, & oculorum dolores cum polenta illita sedat. Cum rosaceo & aceto capitis doloribus succurrit. Sanguinis narium profluvia trita & imposita sistit. Testium inflammationibus cum Lauri foliis illita, & exanthematis cum myrto & cerato prodest. Cum vino autem, pipere & nitro conficta, alba vitiliginis medetur. Cum iisdem illita thymos & myrmecias tollit. Cum melle & alumine imposita lichenibus prodest. Succus in malicorio calfactus & instillatus aurium doloribus succurrit. Oculorum hebetudinibus cum succo Foeniculi & melle inunctus subuenit. Ignis sacros, herpes & achores cum aceto, cerussa & rosaceo inunctus sanat. Ceparum & aliorum acrimoniam commanducata domat.

EX GALENO.

Ruta incidere atque digerere crassos lentosque humores potest. Ob eam autem vim & urinas monet. Quinetiam tenuium est partium, flatuq; extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac Veneris appetitum cohibet. Discutit atque exiccat strenue: est enim ex eorum medicamentorum numero quae valenter exiccant.

EX PLINIO.

Quaecumque Ruta & per se pro antidoto valet,
foliis

foliis tritis & ex vino sumptis. Cōtra aconitū maxime & ixiā. Item fungos, siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo cōtra serpentium ictus, utpote quū mustelæ dimicaturæ cū his, Rutam prius edendo se muniant. Valēt & contra scorpionū ictus, & araneorū, apum, crabronum, vesparum aculeos, & cātharidas, ac salamādras, canisve rabiosi morsus, acetabuli mēsurā si succus ē vino bibitur, & folia trita vel cōmanducata imponuntur cū melle et sale, vel cū aceto & pice decocta. Succo verò perunctos, aut etiā habētes, negāt feriri ab his maleficiis. Serpētesq; si vratur Ruta, nidore fugere. Efficacissima tamē est sylvestris radix cū vino sumpta: eadē adiiciūt efficaciorē esse sub dio potam. Pythagoras oculis noxiā putauit falso, quoniā sculptores & pictores hoc cibo vtūtur oculorū causa. Cū pane quoque vel nasturtio satinae atq; sylvestris propter visum. Vt aiūt, multi succo eius cū melle attrito inuēti discusserunt caligines, vel cū lacte mulieris puerum enixa, vel puro succo angulis oculorum tactis. Epiphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sint cephalaea, cū farina hordeacea, vel aceto. Eadē cruditates discutit, mox inflationes, dolores stomachi veteres. Vulnas aperit, corrigiq; conuersas, illita in melle toto vētre & pectore. Hydropicis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaque ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores

PLANTARVM HISTORIAE

dolores laterumq; & lumborum, tusses, suspiria, pulmonum, iecinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapula grauedines decoquuntur folia poturis. Et in cibo vel cruda vel decocta cōditāve prodest. Item torminibus in Hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinem sistit interiorem, & narium indita: sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito vt diximus modo. E syluestri vero contra tarditatē & somnitum cum rosaceo, vel cum laureo oleo, aut cum iano & melle. Succus & phreneticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrū. Adiecerunt aliqui & Serpyllum, & Laurum, illinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū. Dederunt & comitialibus bibendum decocta succum in cyathis quatuor ante accessiones, quarum frigus intolerabile est. Alsiosisq; crudam dari in cibo. Vrinam quoque vel cruentam pellit. Fœminarum etiam purgationes, secundasq; etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota. Itaque illitam & vuluarum causa etiā suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Et contra ileū decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi verò & cōtra purulentas excreationes sicca drachmas duas, sulphuris vnā & dimidiam sumi censent. Et cōtra cruentas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in vino contrita.

Dederunt

Dederunt & cum bitumine infriētā potioni propter anhelitum. Ex alto lapsis seminis tres vncias, ex olei libra, viniq̄ sextario. Illinitur cum oleo coctis foliis partibus quas frigus adusscrit. Si vrinā mouet, vt Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare velut inhibentem potui contra incōtinentiam vrine. Psoras & lepras cum melle & alumine illita emendat. Item vitiligines vel rugas, strumas, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, vel psimamithio. Carbunculū ex aceto. Nonnulli laſerpitiū vnā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas purāt. Imponunt & mammis turgētibus decoctā, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium verò epiphoris cum ramis laureæ teneris, adeo peculiari in visceribus his effectu, vt syluestri Ruta cū axūgia veteri illitos ramices sanari prodāt. Fracta quoque membra semine trito cū cera imposito. Radix Rutæ sanguinē oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex reliquis quoque quæ traduntur, mirum est, cum feruentem Rutæ naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosacco decoctum addita vncia aloes, perunctis sudorem reprimere. Itēque generationes impediri hoc cibo, ideo profluvio genitali datur, & Venerem crebrò per somnia imaginantibus. Præcauendū est grauidis, abstineāt hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedum quoque

PLANTARVM HISTORIAE

que morbis in maximo usu est, siue difficilè spirantibus, siue cōtra maleficorum animalium iētus, infusa per nares ex vino: aut si sanguisugam exhausta ferit, ex aceto, & quocūque in simili morborum genere vt in homine temperato.

EX SIMEONE SETHI.

Incidit crassos & tenaces humores, p̄rque vrinam vacuat, & ad inflationes conducit, appetentiāque Veneris compescit, ac strenuè exiccat. Ad inflatas aquas inter cutem, & anasarcam, morsus à vipera, succum Papaueris aut aconitum bibentes, colicōsque, pota & iniecta. Traditur quòd comesta visum acuet, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli cōmiscientes, medicamentum ad oculorum aciem acueudam conficiunt. Succurrit difficultati vrinae si cum oleo coquatur, & ea vesica foveatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim iuuat. Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remediū fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadā. Fertur etiam quòd si pragnans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit. Obstructiones iecoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eò die à veneno non ladetur.

DE POTENTILLA.

CAP. CCXXXVII.

NOMI.

NOMINA.

Quo nomine Græci & Latini hanc herbam
appellarint, à nullo, quòd sciam, adhuc pro-
ditum est. Recentiores herbarij Potentilla. Potētilla.
tillam, aliqui ob similitudinē Agrimoniam & Tanacetū
nacetum sylvestre nuncupant. Germani, quòd her- sylvestre.
ba illa anseres in cibo delectētur, Genferich (Gal-
li Tanaifi sauuage) vocant.

FORMA.

Herba Eupatorio, quòd Agrimoniam hodie vo-
cant, haud dissimilis. Caules ex vna radice multos
profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, su-
perne viridia, inferne candicantia. Flores luteos sin-
gulari pediculo pendentes. Radicem extrinsecus ru-
fescentem, intus candidam.

LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa,
atque in flumiorum ripis ac marginibus.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiam tempore legi debet.

TEMPERAMENTVM.

Quoniam folia eius & radix adstringant, tempera-
mēto à Pentaphyllo seu Quinquefolio nihil differ-
re videtur. Quare hac, potissimum autem eius ra-
dix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimūque
evidentis caliditatis habet. Errāt itaq; mirū in mo-
dū recētiore, qui hanc humidā esse statuunt, nul- Potentilla
la alia moti ratione, quā quòd in humidis locis nō est hu-
proueniat: mida.

PLANTARVM HISTORIAE

proueniat:quasi verò Nasturtiū aquaticum,quod Sifymbrium cardamine Dioscoridi vocetur,haud obstante quòd in aquosis nascitur,non etiam in tertio desiccet ordine.Debuisset certè illos ab hac sententia detertere non leuis illa adstrictio,quæ certissimus est sic citatis index:adstringentia enim, Galeno libro quarto de simplici. medicament. facult. capite sexto teste,terrena sunt & crassa corporis consistencia,atque adeò sicca.

VIRE S.

Recentiores potentillam fluxionibus & puncturis oculorum prodesse, recentia vulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierum menstrua compescere,artus & membra confirmare,rectè tradunt: nam idipsum posse,adstrictio, quæ in hac herba haud modica est,abundè docet.Et cū habeat Quinquefolij temperamentum,cuius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit. Exedentia oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluentis,coxendicis articulorumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliaq; potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quòd verò adiciunt hanc etiam lubricos exterminare posse, id

Herbarij minus rectè faciunt. Ea siquidè facultas non huic, Potentillæ sed illi inest herbae quæ verè Tanacetū dicitur, quæ cū Tana= quidè est tertia,vt suo diximus loco, Artemisiae speceto confusio. Proinde nō sine magno errore, Potentillā cū ea derunt. quæ propriè Tanacetū vocatur herba confuderūt.

Nondum nobis constat quo nomine hac herba veteribus tum Græcis tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorum & herbariorum Prunellam nominant. Germani Braunellen oder Gottheyl. Prunella.

FORMA.

Caules habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbacci, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lavandula vocata herba non dissimiles. Radicem tenuem, multis capillamentis fibratam.

LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse constat, id quod ex gustu patet: glutinosa enim admodum & modicè amara est.

VIREs.

Vulnerariam esse herbam evidentissimum est. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, vehementes capitis dolores sedare recentiores vno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur. Aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eiusdem sanat.

PLANTARVM HISTORIAE

DE PENTAPHYLLO.

CAP. CCXXXIX.

NOMINA.

π
ΕΥΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcis, *Quinquefolium* Latini & officinis, Germanis *Funff fingerkraut*, oder *Funffblatt* (Gallis *Quinte*

Quinque feuille) appellatur. Nomen à numero foliorū habet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse deprehenduntur.

GENERA.

Etsi Dioscorides vnum duntaxat *Pentaphylli* genus faciat, tamen nos ad nostras respicientes terras **Maius** *Pentaphylli* tria eius genera in vniuersum produximus. Vnum *taphyllū*. quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis *πικτὴρ* accedens, vt hoc nomine verum esse *Quinquefolium* putemus. Estq; duūm generum: vnum quod pallidos seu candidos flores obtinet, hinc est quod *Quinquefolium* maius candidum appellauerimus, Germanicè *groß Vveisz Funff fingerkraut*. Alterum floribus ornatur auri colorem amulantibus, seu luteis. Nos vt discernereamus à priori, *Quinquefolium* maius luteum nominauimus. Dioscorides etiā hac duo genera innuere videtur, cum inquit *florem habere vel candidum vel auri amulum*. Tertiū minus diximus, quod priori haud dissimile est, non tamen passim vt illud *quinquefolia* obtinens. Hoc cum nō haberemus aliud nomen quo ipsum appellaremus, inter *quinquefolij* genera connumerare placuit. Videtur verō Hippocrates etiā duo

duo. Quinquefolij genera ncuiffe, vnum humilius, alterum procerius, vt hoc nomine nobis etiã liceat minus & maius ftatuere.

FORMA.

Ramulos habet feftucarum inftar graciles, do-
drãtales, & in iis ſemen. Folia Menthe ſimilia, in
ſingulis pediculis quina, rarò plura, per ambitũ ſer-
ra modo incifa: florem in candido pallidũ, auri æ-
mulũ, Radicẽ ſubrubram, oblongã, Ellebero nigro
craſſiorẽ. Ex qua ſanẽ deſcriptione omnibus liquet, Maius
maius Quinquefolium eſſe legitimum. Ex vna ſi- Quinque-
quidem radice ſubruba & oblonga, ramulos pro- folium eſt
fert tenues, ac prorsus feſtucaceos, & in iis ſemen, verũ Pen-
folia Menthe, quina in ſingulis pediculis, per am- taphyllõ.
bitum ſerre modo crenata, florem luteum, aut au-
reum. Quibus accedũt natalis locus (in riguis enim
naſcitur) & immẽſa adſtringẽdi facultas: qua qui-
dem ſingula verum eſſe Quinquefolium docent. A-
deoq; mirari ſatis nõ poſſum, cur nonnulli adulteri-
na hæc eſſe Pentaphylla ſibi perſuaſerint.

LOCVS.

Prouenit aquoſis locis. & iuxta aquaductus. In-
terdum etiam in incultis, ſiccis & arenofis locis.

TEMPVS.

Floret Maio & Iulio menſibus potiſſimum.

TEMPERAMENTVM.

Vtriuſque certẽ folia, flores & radices vehemẽ-
ter adſtringunt: atque adeò, vt Galenus ait, radix,

PLANTARVM HISTORIAE

cuius multus est vsus, ex tertio est ordine desiccans-
tium, minimum habens euidentis caliditatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radici Quinquefolij decoctum ad tertias de-
pressum deductum ve, si in ore retineatur, dentiū do-
lores sedat. Putrescentia oris vlcera collutione sistit.
Arteriæ asperitates gargarizatum emendat. Con-
tra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. Item
articulorum & coxendicum dolores potum sanat.
Cocta in aceto & illita, herpes cohibet. Strumas
disentit, duritias, œdemata, ancurysmata, abscessus
erysipelata, digitorum pterygia, condylomata, sca-
biesque sanat. Tenuis radici succus, contra iecinas-
ris pulmonisq; affectiones & venena prodest. Folia
cum hydromelite, aut vino diluto, & exiguo pipe-
re, contra febrium circuitus bibuntur: in quartana
quidem quaternorum ramulorum folia, in tertiana
verò triū, in quotidiana vnius. Tricenis diebus po-
ta comitiali morbo medentur. Succus foliorum per
dies aliquot trium cyathorum mensura potus, cele-
riter regium morbum sanat. Vulneribus ac fistu-
lis cum sale & melle illita medentur. Enterocœlicis,
id est, intestinorum ramice laborantibus succurrūt.
Sanguinis eruptiones potum & illitum Quinque-
folium sistit. Inciditur ad expiationes lustrationesq;
ve, sanguinis profluvia & castimonias.

EX GALENO.

Pentaphylli radix desiccatur vehementer, mini-
mum

num verò acris est : quare in multo est usu, velut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium paratium, citra morsum desiccant.

EX PLINIO.

Quinquefolium adhibetur purgandis domibus. Strumis medetur, & pectoris vitiis. Idem ischia dicis bibitur & imponitur. Panos sanat. Impositum articulis vtilissimum. Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de Quinquefolio potus cyathis tribus angina medetur. Idem iecinoris & pulmonis vitiis, sanguinemque reiciētibus, cuicunque sanguinis vitio intus occurrat. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefolium, decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad tertias in vino ictericis dari atque illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex vino sumpta triginta diebus in betonica farine pondo denariorum tredecim cū aceti scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur, tribus cyathis cū sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsæ.

DE PISIS. CAP.

CCXL.

V ij

NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

ῥ' σον, ἢ λένυθος Græcè, Pisum Latine dicitur. Officinis hoc nomine notum. Germanicè Erbsz, oder Erueeyssen, (Gallicè Pisum Pois.) Sic autem à Pisa loco in quo olim copiosissimè nasccebatur, nominatum est.

GENERA.

Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnū in aruis caducum, humi serpens, quod genus Germani Klein feld Erueeyssen nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis vinciens illigat. Hoc Germani Grosz garten Erueeyssen vocāt. Genus hoc pictum exhibemus.

FORMA.

Caules in terrā spargit concavos, ramososq; præ tenui surculo: folio frequenti præter cæterorum morem longiusculo: flore papilionis forma, circa umbilicum purpurco: siliqua oblonga seu cylindracea: granis rotundis, & ut Plinius lib. xvij. cap. xij. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla: ut mirari satis non possim, unde plerisque suspicio orta sit, ut Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autem esse qui legumē hoc quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinum, quod scilicet valvule seu siliquæ eius cornu arietini formam habeant. Quorum certè sententiam probare non possum, quod, Plinio teste, Cicer

cer arietinum sic non sit dictum, quia valuula effigiem arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formam legumen hoc quod Pisum nominamus non refert.

LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorum nanque impatientissimum. Tepidum itaque locum, & coelum frequentis humoris desiderat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēſibus floret, & subinde etiam semina in valuulis profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum Pisum simile quid tota substantia cum faba, vt testatur Galenus, obtineat, necesse est vt non multum à medio temperamento in refrigerando & exiccando recedat.

VIRE. EX GALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pisa, nec alio quàm illa modo manduntur. In duobus autem euariant. Nō enim similiter ac faba inflant, nec abstergerendi facultatem habent, ideoq; segnius quàm illa per aluum secedunt.

EX PAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen adco inflat.

DE POLYTRICHO APV-
LEIANO. CAP. CCXLI.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Non temerè adiectum est Apuleū, ne scilicet quispiam Dioscoridis & aliorum Grecorum Polytrichi intelligeret Polytrichon, quod sanè forma ab eo chū Apu= quod nunc describimus alienissimum est. Germani cur di nicè à colore aureo quam habet, Guldiner Vuidethon vocatur. Officinis incognita est hac herba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum instar tenues sunt.

GENERA.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera. Vnū maius, alterum minus neque enim differunt nisi sola magnitudine.

FORMA.

Ramulos habet capillorum instar tenues, colore aurum referētes, circumq; hos folia multa capillacea, in summo capitula lentis aqua:ica ferè forma, eiusdem cum ramulis coloris.

LOCVS.

Maius nascitur in pratis humidis & vliginosis. Minus in petris ac muris humidis.

TEMPVS.

Mense Iulio vtrunque reperitur.

TEMPERAMENTVM.

In caliditate & frigiditate symmetra sunt: deo siccant tamen, extenuant & digerunt.

VIREs.

Decoctum eorūdem in aqua aut lixivia capillo-

rum radices firmat, ideoq; in alopecia caput glabrū capillis vestit. Potum, viscosorum crassorumq; è thore pulmoneq; excreationibus non mediocriter cōfert: lapides frangit, & vrinas ducit. Morbo regio correptis & lienosis auxiliatur. Strumas discutit, & in summa eadem quæ Adiantum potest. Recentiores superstitione quadam ducti illis multa ridicula & incredibilia tribuunt.

DE PERSICARIA. CAP. CCXLII.
NOMINA.

Non clām me est quām variè à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria vocata ve Persicateribus sit. Sed mea quidem sentētia in vniuersum ria omnes coniecturis vsi non satis firmis, decepti sunt. Et ego quidem fateor ingenuè, nec mihi constare num à veteribus descripta sit, tantum abest vt scire queam quo illam appellauerint nomine. Vulgus herbariorum vno consensu hodie, quod folia Persicæ habeat, Persicariā nominant. Germani Floh- kraut, (Galli Curaige.) *ria vnde dicta.*

FORMA.

Folia Persicæ arboris habet, fusca in medio macula plumbaginè ve: caule geniculato, rubente, longo: flore spiceo, primūm cādido, dehinc purpureo: semine minuto, radice lutea, numerosa.

LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequentius pro-
uenit.

TEMPVS.

Iulio

PLANTARVM HISTORIAE

FORMA.

Capitatum simplici capite ex alba cervicis angustis extuberante constat fronde super terram carinata, & in angulum oblonga. Sectius verò caulis est longus, intus cauus, multis in vertice floribus acervat in collectis, & in speciem absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accidit: quod etiam semmentescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur. Radix candicans, crassa, multis fibris capillata, ac tunicis quibusdam vestita.

LOCVS.

Leto solo gaudet, odit rigua.

TEMPVS.

Duodenesimo die à satū prorumpit, bimatiūque perfert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, vt eius facultatibus euidentius innotescet. Simeon Sethi calidum & siccum in secundo facit ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Porrum capitatum inflationem facit. Noxiū succum creat, difficilia insomnia parit. Vrinam ciet. Aluo accommodum. Extenuat. Oculorum obscuritatem facit. Menses pellit, vesicam exulceratam, renesq; ledit. Cum ptisana verò coctum & comestum, ea que in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in desessionibus ad preclusiones vulue & duritias, utilis habetur. Vna & altera

altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratum. lulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure aut m^ana, sanguinem, max. mè è naribus prorampentem, sistit. Venerè stimulat. Contra omnia thoracis vitia pro delinctu efficax est, & ad tabem comestum. Purgat etiam arteriam. Sed si assidue estur, visus obscuritate inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, contra bestiarum morsus auxilio est. Idem quoque illitus potest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui prodest. Varos tollunt folia, cum rhoe opsoniorum illita. Epinyclidi medentur. Crustas ex sale illita rumpūt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum aequali baccarū Myrti pondere potæ.

EX GALENO.

Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososq; incidit. Bis tamē aut ter in aqua decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem vim perdit extenuandi.

EX AETIO.

Porri capitati acris saporis veluti & cepe sunt, cuius ratione corpus calefaciunt, crassosq; humores attenuant, ac lentos incidunt, urinam prouocāt, sanguinem purgant. Præstantissimus vsus corū qui bis coquuntur: ita enim acrimoniam deponunt, neque amplius

PLANTARVM HISTORIAE

que morbis in maximo vsu est, siue difficile spirantibus, siue cōtra maleficorum animalium ictus, infusa per nares ex vino: aut si sanguisugam exhausta ferit, ex aceto, & quocūque in simili morborum genere vt in homine temperato.

EX SIMEONE SETHI.

Incidit crassos & tenaces humores, p̄rque vrinam vacuat, & ad inflationes conducit, appetentiāque Veneris compescit, ac strenuē exiccāt. Ad inflatas aquas inter cutem, & anasarcam, morsus à vipera, succum Papaueris aut aconitum bibentes, colicōsque, pota & iniecta. Traditur quòd comesta visum acuet, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli cōmiscentes, medicamentum ad oculorum aciem acnendam conficiunt. Succurrit difficultati vrinae si cum oleo coquatur, & ea vesica foueatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim iuuat. Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remediū fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadā. Fertur etiam quòd si pręgnans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit. Obstructiones iecoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eò die à veneno non ledetur.

DE POTENTILLA.

CAP. CCXXXVII.

NOMI.

NOMINA.

Quo nomine Græci & Latini hanc herbam
appellarint, à nullo, quòd sciam, adhuc pro-
ditum est. Recentiores herbarij Potentilla.
tillam, aliqui ob similitudinē Agrimoniam & Tanacetū
nacetum sylvestre nuncupant. Germani, quòd her- sylvestre.
ba illa anseres in cibo delectetur, Genserich (Gal-
li Tanaifi sauage) vocant.

FORMA.

Herba Eupatorio, quòd Agrimoniam hodie vo-
cant, haud dissimilis. Caulis ex vna radice multos
profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, su-
perne viridia, inferne candicantia. Flores luteos sin-
gulari pediculo pendentes. Radicem extrinsecus ru-
fescentem, intus candidam.

LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa,
atque in fluuiorum ripis ac marginibus.

TEMPVS.

Aestate floret, quo etiam tempore legi debet.

TEMPERAMENTVM.

Quoniam folia eius & radix adstringant, tempera-
mēto à Pentaphyllo seu Quinquefolio nihil differ-
re videtur. Quare hæc, potissimum autem eius ra-
dix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimūque
evidentis caliditatis habet. Errāt itaq; mirū in mo-
dū recētiore, qui hanc humidā esse statuunt, nullo Potentilla
la alia moti ratione, quàm quòd in humidis locis nō est hu-
proneuiat: mida.

PLANTARVM HISTORIAE

proueniat: quasi verò Nasturtiū aquaticum, quod Sifymbrium cardamine Dioscoridi vocetur, haud obstante quòd in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccet ordine. Debuisset certè illos ab hac sententia detertere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Galeno libro quarto de simplici. medicament. facult. capite sexto teste, terrena sunt & crassa corporis consistentia, atque adeò sicca.

VIRE S.

Recentiores potentillam fluxionibus & puncturis oculorum prodesse, recentia vulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierum menstrua compescere, artus & membra confirmare, rectè tradunt: nam idipsum posse, adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, ab eadè docet. Et cū habeat Quinquefolij temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit. Exedentia oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluentis, coxendicis articularumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliq; potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quòd verò adiciunt hanc etiam lubricos exterminare posse, id

Herbarij minus rectè faciunt. Ea siquidè facultas non huic, Potentillæ sed illi inest herba quæ verè Tanacetū dicitur, quæ cū Tana= quidè est tertia, vt suo diximus loco, Artemisia speceto confusæ. Proinde nō sine magno errore, Potentillæ cū caderunt. quæ propriè Tanacetū vocatur herba confuderunt.

Nondum nobis constat quo nomine hæc herba veteribus tum Græcis tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorum & herbariorum Prunellam nominant. Germani Braunellen oder Gottheyl.

FORMA.

Caules habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbacei, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lauandulæ vocatæ herbæ non dissimiles. Radicem tenuem, multis capillamentis fibratam.

LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Calidâ & siccâ esse constat, id quod ex gustu patet: glutinosa enim admodum & modicè amara est.

VIRE.

Vulnerariam esse herbam euidentissimum est. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, vehementes capitis dolores sedare recentiores vno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur. Aphthas & oris vlcera, fauciumque vitia succus eiusdem sanat.

PLANTARVM HISTORIAE

DE PENTAPHYLLO.

CAP. CCXXXIX.

NOMINA.

Π ΕΥΤΕΡΑΦΥΛΛΟΝ Græci, *Quinquefolium Latinis & officinis, Germanis Funff fingerkraut, oder Funffblatt (Gallis Quinte-*

Quinque fueille) appellatur. Nomen à numero foliorū habet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse depre-
de dictū. henduntur.

GENERA.

Etsi Dioscorides vnum duntaxat Pentaphylli genus faciat, tamen nos ad nostras respicientes terras **Maius** Pē tria eius genera in vniuersum produximus. Vnum **taphyllū.** quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis picturā accedens, vt hoc nomine verum esse *Quin-*
quefolium putemus. Estq; duūm generum: vnum
quod pallidos seu candidos flores obtinet, hinc est
quod Quinquefolium maius candidum appellauer-
imus, Germanicè grosz Vucisz Funff finger-
kraut. Alterum floribus ornatur auri colorem emu-
lantibus, seu luteis. Nos vt discerneremus à priori,
Quinquefolium maius luteum nominauimus. Dio-
scorides etiā hæc duo genera innuere videtur, cūm
inquit florem habere vel candidum vel auri emu-
Minus. *lum. Tertiū minus diximus, quod priori, haud dis-*
simile est, non tamen passim vt illud quinquefolia
obtinens. Hoc cūm nō haberemus aliud nomen quo
ipsum appellaremus, inter quinquefolij genera con-
numerare placuit. Videtur verò Hippocrates etiā
duo

duo Quinquefolij genera nouisse, vnum humilius, alterum procerius, vt hoc nomine nobis etiã liceat minus & maius statuere.

FORMA.

Ramulos habet festucarum instar graciles, dor-
dratales, & in iis semen. Folia Menthae similia, in
singulis pediculis quina, rarò plura, per ambitũ ser-
ra modo incisa: florem in candido pallidũ, auri æ-
mulũ, Radicẽ subrubram, oblongã, Ellebero nigro
crassiorẽ. Ex qua sanè descriptione omnibus liquet, Maius
maius Quinquefolium esse legitimum. Ex vna si- Quinque-
quidem radice subrubra & oblonga, ramulos pro folium est
fert tenues, ac prorsus festucaceos, & in iis semen, verũ Pen-
folia Menthae, quina in singulis pediculis, per am- taphyllõ.
bitum serræ modo crenata, florem luteum, aut au-
reum. Quibus accedũt natalis locus (in riguis enim
nascitur) & immẽsa adstringẽdi facultas: quæ qui-
dem singula verum esse Quinquefolium docent. A-
deoq; mirari satis nõ possum, cur nonnulli adulteris-
na hæc esse Pentaphylla sibi persuaferint.

LOCVS.

Prouenit aquosis locis, & iuxta aquaductus. In-
terdum etiam in incultis, siccis & arenosis locis.

TEMPVS.

Floret Maio & Iulio mensibus potissimum.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusque certè folia, flores & radices vehemẽ-
ter adstringunt: atque adeò, vt Galenus ait, radix,

PLANTARVM HISTORIAE

cuius multus est vsus, ex tertio est ordine desiccantium, minimum habens euidentis caliditatis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radiciſ Quinquefolij decoctum ad tertias de-
preſſum deductum ve, ſi in ore retineatur, detinē do-
lores ſedat. Putreſcentia oris vlcera collutione ſiſtit.
Arteriæ aſperitates gargarizatum emendat. Con-
tra alui profluuiā, & dyſenterias auxiliatur. Item
articulorum & coxendicum dolores potum ſanat.
Cocta in aceto & illita, herpetas cohibet. Strumas
diſcutit, duritias, œdemata, aneurysmata, abſceſſus
eryſipelata, digitorum pterygia, condylomata, ſca-
biēſque ſanat. Teneræ radiciſ ſuccus, contra iecino-
riſ pulmonisq; affectiones & venena prodeſt. Folia
cum hydromelite, aut vino diluto, & exiguo pipe-
re, contra februm circuitus bibuntur: in quartana
quidem quaternorum ramulorum folia, in tertiana
verò triū, in quotidiana vniuſ. Triceniſ diebus po-
ta comitiali morbo medentur. Succuſ foliorum per
dieſ aliquot trium cyathorum meſſura potuſ, cele-
riter regium morbum ſanat. Vulneribuſ ac fiſtu-
liſ cum ſale & melle illita medentur. Enterocœliciſ,
id eſt, inteſtinorum ramice laborantibuſ ſuccurrūt.
Sanguiniſ eruptioneſ potum & illitum Quinque-
folium ſiſtit. Inciditur ad expiationeſ luſtrationeſ
ve, ſanguiniſ profluuiā & caſtimoniaſ.

EX GALENO.

Pentaphylli radix deſiccatur vehementer, mini-
mum

num verò acris est : quare in multo est vsu, velut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium paratium, citra morsum desiccant.

EX PLINIO.

Quinquefolium adhibetur purgandis domibus. Strumis medetur, & pectoris vitiis. Idem ischia-
dicis bibitur & imponitur. Panos sanat. Impositum articulis vtilissimum. Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de Quinquefolio potus cyathis tribus angina medetur. Idem iecinoris & pulmonis vitiis, sanguinemque reiciētibus, cuicumque sanguinis vitio intus occurrat. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefolium, decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad tertias in vino ictericis dari atque illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex vino sumpta triginta diebus in betonica farina pōdo denariorum tredecim cū aceti scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur, tribus cyathis cū sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsa.

DE PISIS. CAP.

CCXL.

V ij

NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

ῥ'σον, ἢ Λεύθος Græcè, Pisum Latine dicitur. Officinis hoc nomine notum. Germanicè Erbsz, oder Erueyssen, (Gallicè Pisum Pois.) Sic autem à Pisa loco in quo olim copiosissimè nascèbatur, nominatum est.

GENERA.

Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnū in aruis caducum, humi serpens, quod genus Germani Klein feld Erueyssen nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis vinciens illigat. Hoc Germani Grosz garten Erueyssen vocāt. Genus hoc pictum exhibemus.

FORMA.

Caules in terrā spargit concauos, ramososq; præ tenui surculo: folio frequenti præter cæterorum morem longiusculo: flore papilionis forma, circa umbilicum purpureo: siliqua oblonga seu cylindræa: granis rotundis, & ut Plinius lib. xvij. cap. xij. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla: ut mirari satis non possim, unde plerisque suspicio orta sit, ut Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autem esse qui legumē hoc quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinum, quod scilicet valvula seu siliquæ eius cornu arietini formam habeant. Quorum certè sententiam probare non possum, quod, Plinio teste, Ci-

cer arietinum sic non sit dictum, quia valvula effigiem arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formam legumen hoc quod Pisum nominamus non refert.

LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorum nanque impatientissimum. Tepidum itaque locum, & cœlum frequentis humoris desiderat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēſibus floret, & subinde etiam semina in valvulis profert.

TEMPERAMENTVM.

Quum Pisum simile quid tota substantia cum faba, vt testatur Galenus, obtineat, necesse est vt non multum à medio temperamento in refrigerando & exiccando recedat.

VIRE. EX GALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pisa, nec alio quàm illa modo manduntur. In duobus autem euariant. Nō enim similiter ac fabæ inflant, nec abstergendi facultatem habent, ideoq; seſignius quàm illa per aluum secedunt.

EX PAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen ad eò inflat.

DE POLYTRICHO APV-
LEIANO. CAP. CCXLI.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Non temerè adiectum est Apuleū, ne scilicet quispiam Dioscoridis & aliorum Graecorum Polytrichon intelligeret Polytrichon, quod sanè forma ab eo chū Apu= quod nunc describimus alienissimum est. Germanicus cur di nicè à colore aureo quam habet, Guldiner Vuisethon vocatur. Officinis incognita est hac herba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum instar tenues sunt.

GENERA.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera. Vnū maius, alterum minus neque enim differunt nisi sola magnitudine.

FORMA.

Ramulos habet capillorum instar tenues, colore aurum referētes, circumq; hos folia multa capillacea, in summo capitula lentis aquatica ferè forma, eiusdem cum ramulis coloris.

LOCVS.

Maius nascitur in pratis humidis & vliginosis. Minus in petris ac muris humidis.

TEMPVS.

Mense Iulio vtrunque reperitur.

TEMPERAMENTVM.

In caliditate & frigiditate symmetra sunt: deo siccant tamen, extenuant & digerunt.

VIRES.

Decoctum eorūdem in aqua aut lixivia capillorum

rum radices firmat, ideoq; in alopecia caput glabriū capillis vestit. Potum, viscosorum crassorumq; è tho-
race pulmoneq; excreationibus non mediocriter cō-
fert: lapides frangit, & vrinas ducit. Morbo regio
corruptis & lienosis auxiliatur. Strumas discutit,
& in summa eadem quæ Adiantum potest. Recen-
tiores superstitione quadam ducti illis multa ridi-
cula & incredibilia tribuunt.

DE PERSICARIA. CAP. CCXLII.

NOMINA.

Non clām me est quām variè à multis diui-
natum sit, quo nomine Persicaria vocata ve Persica
teribus sit. Sed mea quidem sentētia in vniuersum via.
omnes coniecturis vsi non satis firmis, decepti sunt.
Et ego quidem fateor ingenuè, nec mihi constare
num à veteribus descripta sit, tantum abest vt sci-
re queam quo illam appellauerint nomine. Vulgus
herbariorum vno consensu hodie, quod folia Persi- Persica
ca habeat, Persicariā nominant. Germani Floh- ria vnde
kraut, (Galli Curaige.) dicta.

FORMA.

Folia Persica arboris habet, fusca in medio ma-
cula plumbaginè ve: caule geniculato, rubente, lon-
go: flore spiceo, primūm cādido, dehinc purpureo:
semine minuto, radice lutea, numerosa.

LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequentius pro-
uenit.

TEMPVS.

Iulio

PLANTARVM HISTORIAE

Iulio & Augusto mensibus floribus ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Frigidam & admodum siccam esse gustus abundè monstrat: mirificè enim gustata adstringit.

VIRE S.

Vulnerariam herbam esse temperamentum eius satis docet. Rectè itaque iuniores medici in vulneribus, & maximè fistulis curandis vtuntur. Vtilis haud dubiè in dysenteria, alijsq; malis quæ refrigerationem & adstrictionem requirunt.

DE PERFOLIATA.

CAP. CCXLIII.

NOMINA.

AN hæc herba veteribus cognita fuerit Graecis & Latinis, affirmare certò non possum. Ego planè Cotyledonem putarem Dioscoridis, nisi radix in diuersam me traheret sententiam, quæ omnia instar rotunda non est. Hodie tamen, quòd cau-
Perfolia- lis eius singula folia diffecat atque penetrat, Perfo-
ta cur dis- liata ab omnibus appellatur. Germanicè Durch-
cta. uurchsz, & Bruchuürtz dicitur.

FORMA.

Caulis illi rotundus, rubescens, folia singula penetrās, quæ Pisorum foliis haud dissimilia sunt, tenuia admodum & glabra. In summo coliculorum capitula, & in iis flores lutei, & semina formā ferè Tithymalli, quam vulgo Esulam nominant, præferentia. Radix candida, fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in hortis sata, & interdum sua sponte in arenosis locis prouenit.

TEMPVS.

Floret Iulio mense, & subinde semina producit.

TEMPERAMENTVM.

Amara modicè est & adstringit, vt hinc colligi liceat calidam & siccam esse.

VIREs.

Vulneribus et vlceribus tam externis quàm internis curandis aptissima est herba: hæc enim glutinat. Valet autem potissimum ad ramices puerorum sanandos. Auxiliatur etiam exulcerationibus et prominentiis vmbilici. Plurimus huius apud chirurgos vsus.

DE PORRO. CAP. CCXLIIII.

NOMINA.

ῥάσπον Græcis, Porrum Latinis & offici-

π cinis, Germa. Lauch (Gallis Poureau)

appellatur. Porrū autem dictum putant,

quòd porrò eat, & longè latèque grassetur.

Porrū vnū
de dictū.

GENERA.

Porri duo genera signauit antiquitas. Vnum capitatum, sic nominatū quòd eius radix in caput increscat atq; extuberet. Alterum sectium, cui frondens coma super terram eminens aufertur amputaturve. Hoc Germani pulchrè ad nomen Latinum alludètes, Schnittlauch, nomināt, et Bryszlauch.

Capitatiū
Porrum.
Sectiū.

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Capitatum simplici capite ex albae cervicis angustis extuberante constat fronde super terram carinata, & in angulum oblonga. Sectino verò caulis est longus, intus cauus, multis in vertice floribus acervat in collectis, & in speciem absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accidit: quod etiam semmentescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur. Radix candicans, crassa, multis fibris capillata, ac tunicis quibusdam vestita.

LOCVS.

Leto solo gaudet, odit rigua.

TEMPVS.

Duodeuigesimo die à satv prorumpit, bimatióneque perfert.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, vt ex eius facultatibus euidentius innotescet. Simeon Sethi calidum & siccum in secundo facit ordine.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Porum capitatum inflationem facit. Noxiũ succum creat, difficilia insomnia parit. Vrinam ciet. Alio accommodum. Extenuat. Oculorum obscuritatem facit. Menses pellit, vesicam exulceratam, renesq; ledit. Cum ptisana verò coctum & comestum, ea que in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defessionibus ad preclusiones vulue & duritias, vtilis habetur. Vna &
altera

altera aqua coctum, aut aqua frigida maceratum. lulceſcit, & multò minus inflat. Semen acrius eſt, & quandam adſtrictoriam vim habet. Quare ſuccus eius cum aceto, addito thure aut māna, ſanguinem, max. me è naribus prorampentem, ſiſtit. Venerè ſtimulat. Contra omnia thoracis vitia pro deſinctu effiçax eſt, & ad tabem comestum. Purgat etiam arteriam. Sed ſi aſidue eſtur, viſus obſcuritatē inducit. Stomacho aduerſatur. Succus ex melle potus, contra beſtiarum morſus auxilio eſt. Idem quoque illitus poteſt. Cum aceto, thure & lacte, aut roſaceo inſtillatus, aurium doloribus & ſonitui prodeſt. Varos tollunt folia, cum rhoe opſoniorum illita. Epinyclidi medentur. Cruſtas ex ſale illita rumpūt. Veteres ſanguinis reiectiones cohibent ſeminis drachmæ binæ cum aquali baccarū Myrti pondere potæ.

EX GALENO.

Corpus calefacit, & craſſos in eo humores extenuat, glutinososq; incidit. Bis tamē aut ter in aqua decoctum, acrimonia ſpoliatur: quanquam ne ſic quidem vim perdit extenuandi.

EX AETIO.

Porri capitati acris ſaporis veluti & cepe ſunt, cuius ratione corpus calefaciunt, craſſosq; humores attenuant, ac lentos incidunt, vrinam pronocāt, ſanguinem purgant. Preſantiſſimus uſus corū qui bis coquuntur: ita enim acrimoniam deponunt, neque
amplius

PLANTARVM HISTORIAE

amplius deprauatum succum retinent.

EX PAVLO.

Porrum mali succi est & acre. Vt autē Dioscorides ait, grauiā facit insomnia, aluūque bonam, urinā cit & extenuat. Habet & abstergerendi vim aliquam, cum ptisana: siquidem coctum, ea quae in thorace sunt educit. Semē verò eius nephriticis miscetur medicamentis. Folia etiam nonnihil adstringunt, ob eamq; causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

EX PLINIO.

Porro scētiuo profluvia sanguinis sisti in naribus, contrito eo obturatis, vel galla mixto, aut mentha. Item ex abortu profluvia, poto succo cum lacte mulierū. Tussi etiā veteri, ac pectoris & pulmonis vitiiis medetur. Illitis foliis sanantur ambusta, epinyctides: ita vocatur vlcus aciem hebetans, & angulo oculi perpetim humor emanans. Quidam eodem nomine appellant pustulas liuentes, ac noctibus inquietantes. Et alia vlcera cum melle trito. Vel bestiarum morsus ex aceto. Item serpentium. Aurium verò vitia cum felle caprino, vel pari mēsurā mulsi. Stridores cum lacte mulieris. Capitis dolores si in nares fundatur, dormiturū sive in aurem, duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad serpētium scorpionūq; ictus in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthisicis, destillationibus

bus longis, vel succus, vel ex ipso cibus prodest. Itē morbo regio, vel hydropicis. Et ad renum dolores, cum ptisana succo acetabuli mensura. Idem modus cū melle, vuluas purgat. Tostus verò editur & contra fungorum venena, imponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietatē discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur, inflationē quoque facere, quæ tamen stomacho non noceat, ventremq; molliat. Capitato maior est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum caule aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vuluasq; contritas aperiri putat. Fecunditatem etiam feminarum hoc cibo augeri. Contritū ex melle vlcera purgare. Tussim & destillationes thoracis. Pulmonis et arteria sanat vitia, datum in sorbitione ptisanæ: vel crudū, præter capita, sine pane, ita vt alternis diebus sumatur: vel si purulenta excrecentur. Sic vocī vel Veneri, somnōque multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluū sistunt, & inflationes veteres. Cortex decoctus illitusq; inficit canos.

EX SIMEONE SETHI.

Vrinam cit, & mali succi est. Assiduē comestum visus hebetudinē efficit. Difficilia inuchit somnia, & stomacho nocet. Semen genitale calefacit, & capitis dolores excitat. Iecur, renes & vesicam lædit. Cōfert ad hæmorrhoidas. Bis verò aqua coctū, & aceto, & garo & oleo, cuminoq; cōditū, salubre est.

PLANTARVM HISTORIAE

his qui frigido sunt stomacho.

DE PVLMONARIA. CAP.

CCXLV.

NOMINA.

VT veteribus Græcis & Latinis nominata sit hac herba, nōdum scire licuit. Hodierni temporis medici & herbarij Pulmonariam vocāt, Germani Lungēkraut, (Galli Herbe à Poulmō.)

Pulmonaria: Sic: utem haud dubiè appellari cœpit, quòd pulmonaria cur nonnum vitii, exulcerationibus potissimum eorundē, minata. præsens remedium sit.

FORMA.

Folia mollia habet, inuicem incumbentia, leniter laciniata, canis multis prædita, superiore parte viridia, inferiore in luteo albicantia, ac veluti punctis aut pustulis quibusdam notata, atque hoc nomine aliquam pulmonis humani formam referentia: unde etiam Pulmonariam dictam esse coniicimus.

LOCVS.

Prouenit in quercu arbore, & saxosis locis.

TEMPVS.

Tota æstate inuenitur locis iam monstratis.

TEMPERAMENTVM.

Recetiores frigidā & humidam esse, mea quidē sententia, falso statuunt admodū enim adstringit, ut hoc nomine idem cum quercu in qua nascitur habeat temperamentū. Desiccat itaque et paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt.

VIREs.

Desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, quamobrem vulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: nam quæ iam vehementes sunt, adstringentia respuunt. Confert autem haud dubiè etiam ad muliebrem profluuium, & sanguinis expuitiones, & diuturnos alui fluores.

DE PTARMICE. CAP.

CCXLVI.

NOMINA.

Πταρμική Græcis, Sternutamentaria Latine dici potest. Sunt qui Sylvestre Pyrethrū nominent, quòd scilicet Pyrethri modo, quanquam mitius, linguam vellicet. Atque hinc est quòd nonnulli pro vero Pyrethro seducti eius titillante acrimonia, descripserint. Germanis Vuilder Bertram appellari potest. Ptarmice dicta est, quòd flores eius naribus obiecti sternutamenta eliciunt.

Sternutamentaria
Sylvestre
Pyrethrū

Ptarmice
cur dicta.

FORMA.

Breuis frutex est, parvis, multis, teretibus, & Abrotono similibus ramulis, circa quos folia multa, oblonga, oleaginis similia. In summo Chamameli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde nomen inuenit, Haecenus Dioscorides. Quòd si itaq; naturam atque imaginem eius fruticis rectè expendas, vndiquaque ei planta cuius picturam damus, hac descriptio quadrabit.

PLANTARVM HISTORIAE

Nā surculis fruticat exiguis, multis, rotūdis, Abro-
tono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui foliis
frequentibus, longiusculis, olea similibus, angustis,
vtrisque leniter serratis ambiūt, cacumine Anthes-
midis vmbellam obtinente, quæ acri suo odore na-
res feriens sternutamentum irritat.

LOCVS.

Inuenitur sæpius in mōtib. altis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret æstate: radix eius extremo effoditur au-
tumno.

TEMPERAMENTVM.

Eius temperies est calida & sicca, viridis etiam
num ordine secundo, siccata tertio.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus illita sugillata emendare poss-
sunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

EX GALENO.

Ptarmices flores cienda sternutationis vim ob-
tinent, vnde & herba nomen. Sugillata & reli-
quas ecchymosæis discutit.

EX PAVLO.

Ptarmices folia sternutamenta mouent. Totus
autem frutex viridis sugillata, linorésque alios
disicit.

DE PYRETHRO. CAP. CCXLVII.

NOMINA.

Πύρεθρον Græcè, Saluaris Latine dicitur.
Officina Græcā appellationem retinuerūt.

Germanicè

Germanicè Bertram, (Gallicè Pied dalexandri, Pyrethrö ou pied de lilandre) nominatur. Pyrethron autē cur dictū à feruido, ac ignis simili, qui in eius radice est sapo Saluaris re, Græci dixerunt. Saluaris verò, quòd mansa vel herba qua ore tantum detenta eius radix, copiosam saliuam re nominat eliciat, Romanis appellata est. nata.

FORMA.

Herba est caulem foliaq; syluestris Dauci, & Fœniculi instar proferens. Umbellam Anetho similem orbiculatam. Radicem pollicis crassitudine, longam, sapore feruidissimam. Hæc Dioscorides. Vbi nobis monendus venit lector, Pyrethrum nostri soli non ex omni parte huic descriptioni respondere. Nō Pyrethrū enim umbellam anetho similem, sed anthemidis nostrum potius orbiculatū capitulū, quod Ptarmici tribuit Ptarmices Dioscorides, habere deprehenditur. Cætera omnia flores obad amussim respondent. Siquidem habet Pyrethrū tinct. caules & folia Dauci syluestris & Fœniculi, radicem pollicis crassitudine, gustus ardentissimi.

LOCVS.

In Germania nostra, quòd sciam, non nisi plantatum prouenit.

TEMPVS.

Floret æstatis maxima parte.

TEMPERAMENTVM.

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, vel ut aliqui putant, in quarto.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

PLANTARVM HISTORIAE

Pituitam elicit radix : ideoq; dentium doloribus decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, inuncta ex o'eo, Diurnis rigorib. efficax. Contra refrigeratas partes corporis ac resolutas eximie conducit.

EX GALENO.

Pyrethri radice potissimum utimur vrentem fasciata obtinente, qua utique dentium etiam refrigeratoriū dolores mitigat. Et ad rigores ante circuitum cum oleo infricatur. Ad hæc stupidos & resolutos adiuuat.

EX PAULO.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit. Item ad febrium rigores ante circuitum infricatur cum oleo. Ad hæc iis quorum corpora ex refrigeratione stupent, & resoluta sunt, efficacissime adhibetur.

DE PYXO. CAP. CCXLVIII.

NOMINA.

Πύσος Græcis, Buxus Latinis, Germanis Buchszbaum (Gallis Du Bouys) dicitur.

FORMA.

Arbor immortalis coma virens: folio Myrti, exiguo, subrotundo: flore herbaceo: semine rufo & rotundo, omnibus animantibus inuiso.

LOCVS.

Gaudet frigidis & apricis, plurimaq; ubiq; Buxus.

TEMPVS.

Perpetua

Perpetua fronde viret, neque ei vlllo tempore decidūt folia. Quo nomine potissimum hanc celebrat germanica illa cantilena, eiusdem ac Salicis contētionem continens.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores temperatam eius arboris essentiam esse statuunt, id quod ob multas causas, quas recensere superuacuum est, non videtur verisimile. Haud dubiè verò adstringit, atque adeo exiccat.

VIRE S.

Non admodum magnus Buxi in medicina vsus est. Folia eius in lixiu decocta rufant, aut flavescere efficiūt cupillos. Scobem eius decoctam in aqua alui profluuiū sanare tradunt. Somnum capere sub hac arbore, cerebro vehementer incōmodat, quod eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes vulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare.

DE PETASITE. CAP. CCXLIX.

NOMINA.

ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ Græcis, Petasites Latinis appellatur. Officinis penitus ignota. Germanis Pestilērz uurtz nominatur, quod

nimirum eius radix præsentaneum sit contra pestis Petasites lentiales febres remediū. Petasites autem à petaso, quare dipilium significante, dicta est, quod folium eius petasidulo superpositum, petasi modo amplum, vt fungus dependeat.

PLANTARVM HISTORIAE FORMA.

Pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, in quo petasi figura folium magnū, vt fungus dependet. Ex qua sanè descriptione satis perspicuum fit, herbā cuius picturam damus esse Petasitem. Hæc enim statim inter initia Martii, flores suos in albo purpureos, agglomeratos, & botri figurā referentes profert, citra quidē folia, quod Dioscorides omisit. Hi marcescētes sine fructu abeunt ac decidunt. Postea purpureos emittit pediculos, canos, hirsutos, quibus folia superposita sunt magna, pilei ampli figuram obtinentia, supernè viridia, infernè verò candicantia, quæ in tantam crescunt amplitudinē, vt vnum interdū, orbicularem mensam prorsus tēgat. Radix illi crassa & longa, intus candida, vehementer odorata & amara. Quibus accedit, quòd vires huius herbæ à viribus Petasites, vt ex sequentibus patebit, non discrepent: vt hoc nomine nihil euidentius sit, quàm eam herbam esse planè veterū Petasitem.

LOCVS.

Nascitur copiosissimè in pratis humidis & iuxta riuulos situs.

TEMPVS.

Initio Martii mensis, vt comprehensum est, floribus suis conspicua est herba, qui Aprili imminente statim citra fructum decidunt. Quo factō folia cum pediculis suis prodeunt.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio est ordine desiccantium, id quod amaritudo

ritudo eius, quàm gustu deprehendimus, facile monstrat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Facit ad maligna & phagedanica vlcera tritum & illitum.

EX GALENO.

Ad maligna & phagedanica vlcera, ea vtuntur. Idem etiam de Petasite tradit Paulus.

APPENDIX.

Experimento comprobatum est radicem hanc mirifice conferre pestilentialibus febribus, quòd sudorem vehemèter moueat, si in puluerem redacta cū vino sumatur. Nec minori efficacia bibitur à mulieribus quas vteri tormina & præfocationes exercet. Valet etiam vnice ad enecandos lumbricos. Succurrit quoque iis qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Hæc verò posse, amaritudo eius euidentissimè docet, cuius quidem hæ sunt facultates, vt ex iis quæ sæpe iam diximus, & Galenus lib. iij. de simpl. medica. facul. cap. xvj. fusius docet, manifestum est.

DE PERICLYMENO. CAP. CCL.

NOMINA.

Sylua ma

Pερικλόμενον Græcis, Volucrum maius Lat. ter. tinis, Scribonio Largo Sylua mater, vulgò Caprifolium & Mater sylua, & nonnullis Lilium lium. Lis inter spinas dicitur. Germanis Geyszblatt, Speck liß inter
X iij oder spinas.

PLANTARVM HISTORIAE

Periclymenon oder Vualdgilgen, & Zeunling (Gallis Cherefueille.) Sic sanè dictum, quòd circumuoluen-
vnde di- do ad se vicinas arbores aut frutices vocet.
Etum.

FORMA.

Simplex frutex est, ex internallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, Hederæ similia: flores candidos, Fabæ similes, subrotundos, quasi in folium procumbentes: semen durum, & quod difficile vellitur: radicem crassam, rotundam. Ex qua quidem descriptione perspicuum fit, fruticem quæ pictum exhibemus esse Periclymenon: siquidem caulibus suis vicina amplectitur, gemina per internalla umbilicata folia habens, à terra caesis, supernè herbosis ad Hederæ similitudinem: flores albos, Fabæ non dissimiles, subrotundos, potissimum antequam dehiscant, baccas hederaceas aut Rusci, radicem crassam.

LOCVS.

Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se vicinis fruticibus. Nunc in hortis etiam passim plantatur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer calefacit & desiccatur, id quod gustu etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem acrimoniam quandam præ se ferunt gustata.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius semen postquam maturuit collectum, &
in

in vmbra siccatur, drachma pondere datur in vino quadraginta diebus, vt lienē minuat absumatque, & lassitudinem discutiat. Orthopnœa & singultui prodest. Vrinam cit à sexto die cruentam. Partum accelerat. Habent easdem vires & folia: quæ trigintaseptem diebus pota, sterilitatē facere produntur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earum horrores mitigant.

EX GALENO.

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia, adeo vehementer incidentis, & excalescentis facultatis, vt si plusculum bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant. Principio quidam vrinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita calfaciunt. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes. Compertens potionis mensura est, drachmæ vnius pondus cum vino. Ceterum desiccatur quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnino bibentibus afferre. Sunt etiam qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, quemadmodum Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradi refert. Hic quoque cruentam vrinam reddi à sexto die memorat.

EX PLINIO.

Semen eius in vmbra siccatur tunditur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, cumque vrinâ cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligi-

PLANTARVM HISTORIAE

tur à decimo statim die. Vrinam cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis profunt.

APPENDIX.

Ex iam commemoratis facultatibus nemo non intelligit fruticem hunc esse Periclymenon: cum enim gustu acrimoniam præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ veteres Periclymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quòd recentiores etiã herbarii suo Caprifolio easdem vires assignent. Exiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & sordida, sanare impetigines, & alias cutis sceditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ non attinet referre.

DE PYRO. CAP. CCLI.

NOMINA.

Propòs Græcis, Triticum Latinis dicitur. Officina antiquum latinum nomen retinuerunt. Germa. Vuysslen (Gal. Ble, ou formēt) appellatur. Triticum vero dicitur, quod tritum ex spicis sit, ut auctor est Marcus Varro.

Triticum
vnde dictum.

GENERA.

Tritici summa genera tria observant qui frumentaria rei periti sunt. Primum quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet, Germanis simpliciter Vuysslen nominatur. Secundum trimestre, & nonnullis Sitanium dicitur. Trimestre quidem, quod tertio ferè satum mense maturescat:

id

id quod tamen nostro in orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tandem, hoc est, Iulio mense metitur. Germanis Amelkorn dicitur, haud dubiè non alia ratione, nisi quòd ex hoc genere tritici amyllum optimum conficiatur. Eius picturam dare hoc tempore non potuimus. Tertium genus tritici, non undiquaque notum Germanis Vuelscher V. Tertium.
ueyssen, & Vucyssenkolb dicitur.

FORMA.

Primum tritici genus culmo est quàm hordeum altiore, tribus geniculis constāte, folio arūdineo, spica à foliis remotiore, incondita, & in nullos versus disposita. Exeritur in area, vt alia quædam frumenta. Alterum culmo, geniculis, graniq; priori simile, nec ab eo differt, nisi quòd spicam multis aristis vallatam, & in duos versus dispositam obtinet.

Tertium genicula habet quaterna, aliās precedenti per omnia propemodum simile.

LOCVS.

Passim prouenit Triticum primi & secundi generis. Postremum in Alsatia, & agro Tubingensi gignitur.

TEMPVS.

Floret, vt alia ferè omnia frumenta, Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TEMPERAMENTVM.

Triticum vt medicamentum foris impositum, primi est ordinis excalescentiū, nō tamē nec resiccare, nec humectare manifestò potest. Porro quod ex

PLANTARVM HISTORIAE

eo conficitur amyliū, eo tū frigidius est, tum siccius.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Optimum ad secundae valetudinis vsum Triticum habetur quod recens & iam perfectè adultū, & colorem māli refert. Crudum in cibis rotundos lumbricos gignit. Canum morsibus prodest māsum & illitum. Cōfectus ex eius similagine panis, plus alit quā cibarius, quem Græci συγκομισδὺ vocant. E Sitaniī farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eius cum hyoscyami succo illinitur aduersus nernorum fluxiones. Item contra intestinorum inflationes. Lentigines ex oxymelite tollit. Furfures autem acri in aceto elixi & calentes illiti, lepras pellunt. Incipientes etiam inflammationes omnes illiti leniunt. In Ruta verò decocto elixi, mammas turgentētes sedant. Viperarum iētibz auxiliantur, & torminosis prosunt. Confectum ex farina triticea fermentum calefaciendi extrahendiq; vim habet. Priuatim quæ in plantis pedum sunt extenuat. Cetera tubercula, furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitaniī farina contra venenatos iētus cū aceto aut vino commodè illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruenta excreantibus succurrit. Contra tuſsim & exasperatam arteriā, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydreleo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & cū melicrato

licrato coctus & crudus inflammationes omnes illitus mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret, mixtus herbis succisq; quibusdam. Vetus autem & aridus per se, adiectisq; aliis quibusdam, citam alum cohibet. Recens muria maceratus & illitus, vetustus impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

EX GALENO.

Triticum quiddā lentoris, & obstruentis naturæ habet. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico: nimirum quum & salem & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum vim habet attrahendi digerendiq; ea quæ in alto resident. Plura de Tritico petenda erunt ex capite primo, libri primi de alimentorum facultatibus, quo in loco variae panis species exponuntur.

EX PLINIO.

Grana Tritici ferro combusta, iis quæ frigus vserit presentaneo sunt remedio. Farina ex aceto coacta, nervorum contractionibus auxiliatur: cum rosaceo verò & sico sicca myxisq; decoctis. Item suppuratis nervis cum hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini. Furfures tonsillis faucibusq; gargarizatione prosunt. Sex. Pompeius prætorei viri pater, Hispaniæ citerioris princeps, quū horreis
suis

PLANTARVM HISTORIAE

suis ventilandis praesideret, correptus dolore podagra, merfit in Triticū sese super genua, leuatusque siccatis pedibus mirabili modo, hoc postea remedio vsus est. Vis tanta est, vt cados plenos siccet. Paleā quoque tritici vel hordei calidam imponi ramicū incommodis experti iubent, quāque decocta sunt aqua foveri.

DE POTAMOGETONE.

CAP. CCLII.

NOMINA.

ΠΟΤΑΜΟΓΕΪΤΩΝ, ἢ ΣΑΧΥΪΤΗΣ Græcè, Fontalis & Potamogeton Latinis dicitur. Offici-

Potamogeton unde Stachyites.

nis ignota est herba. Germanis Samkraut vocatur. Potamogeton autem quasi fluminibus vicina dicta est: siquidem aquosis & palustribus locis nasci amat. Stachyites verò quasi spicata, ob caulē quē ex se mittit floribus & semine spicatū.

FORMA.

Folium Betæ simile habet, densum, & paulum extra aquam eminens. Ex qua quidem breui admodum declinatione satis intelligi potest, herbā cuius picturam damus esse Potamogetonem. Caulē nāque rotundum habet, geniculus intersectum, è quibus pediculi exeunt foliis Betæ aut Plantaginis vestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiā spicatos, Plātaginis instar, profert ac subinde semē. Quid multa? folia huius herbæ planè referunt folium Indum vocatum officinis.

LOCVS.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis.

TEMPVS.

Floribus prægnans est Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, vt gustus etiã abunde docet. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerat & adstringit: pruritibus, vlceribusq; vetustis, & iis quæ pascendo serpunt, confert.

EX GALENO.

Adstringit & refrigerat similiter Polygono, sed essentia eius crassior quàm Polygoni est.

EX PLINIO.

Potamogeto ex vino dysentericis & cæliacis medetur. Peculiariter refrigerat, spissat. Vsus in foliis, cruribus vitiosis utilia, & contra vlcerum nomas, cum melle vel aceto,

DE PEDE ANSERINO.

CAP. CCLIII.

NOMINA.

Quo nomine veteribus tum Græcis tum Latinis sit appellata hæc plāta, nondum cognoscere potui: quapropter nouam vt illi nomēclaturā inderē necesse fuit. Aliā autē & comodiore non licuit inuenire præter eam, quā alludētes ad germanicā appellationē imposuimus. Nā si fo- Pes anseri
lia eius spectes in ambitu laciniata, planē anserini nus cur di
pedis formam ac similitudinē representant. Hinc Etā.
apposita

PLANTARVM HISTORIAE

appositissimè Germanis nostris vocata est Gensz-
fusz, oder Genszfusz'e. Quà verò eadem her-
ba suis inimica admodum sit, atque adeò mortem
inferat, factum est vt à muliereulis etiam sit nomi-
nata Seutod, & Schuueinsztod. Etsi verò in
officinis eius herba nullus sit vsus, tamen quia pas-
sim nascitur, & temerè fortassis à nonnullis vires
eius ignorantibus vsurpari posset, cā silentio trās-
ire nolimus, quò scilicet facultas tam vulgaris
herba omnibus patefieret.

FORMA.

Caulem profert cubitalem, striatum: folia ad Ha-
licacabi formam accedentia, in ambitu tamen la-
tiniata, atque adeò anserini pedis speciem referen-
tia: flores exiguos rubentes, semē racematim, velut
in atriplice sylvestri, singulis ramis insidēs: ra-
dicem obliquam, multasq; adnascantias habētē.

LOCVS.

Pasim in hortis, aliisq; locis vbi finum reponi-
tur, nasci solet.

TEMPVS.

Iunio mense potissimum floret.

TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè in secundo refrigerat ordine, non se-
cus atque Solanum hortense.

VIRE S.

Suis exitiū affert herba hæc comestā, id quod
experientia cognitum est. In humano corpore idem
potest

potest quod Solanum hortense. Quare facultates eius
iusdem suo quares loco.

DE PETROSELINO.

CAP. CCLIIII.

NOMINA.

ετροσίλινον Græcis, Apium saxatile Latine Apium sa-
xis, & Petroselinum appellatur. Germanicè xatile.
frembder Petersfilien Gallicè Persil, ou
Persil des Roches & lieux pierreux) nomina-
ri commodè, ad alterius quod Oreoselinum est, ut
suo diximus loco, differentiam, potest. Officinæ eius Officina.
herbæ cuius nunc picturâ damus semine pro Amomum erratū.
mo vtuntur, non tamen sine magno errore, quoniam con-
stet omnibus, modò conferre inter se vtriusque his-
toriâ non pigeat, Amomum ab ea herba esse diuer-
sissimum. Nos ut tandem sciremus è qua stirpe semē
hoc decerperetur, terræ illud mandauimus, & hæc
cuius pictura formam ostendit herba erupit, quam
nos verum esse Petroselinum, ut paulò post ostendi-
mus, credimus. FORMA.

Petroselinum, inquit Dioscorides, semen Ammi
simile obtinet: odoratius tamē, acris, & aroma olēs.
Breuis quidem delineatio hæc est, atque imperfecta,
ita, ut nihil mirum sit, nos hæctenus quod verū es-
set Petroselinum nō potuisse cognoscere. Meritò ita-
que hoc loco, ut compluribus etiam aliis, Dioscori-
des negligentia insimulari potest, ut qui mancas ac des negli-
mutilas plerasq; posteritati relinquere stirpiū his gentiæ in-
Y storias

PLANTARVM HISTORIAE

*simulas-
tur.*

storias voluerit. Si verò quispiam paucas etiā has
notas expendat, haud dubiè herbam hanc cuius pi-
cturam oculis subiicimus, Petroselinum esse compe-
riet. Semen enim eius Ammi tam simile est, vt ab
eo vix discerni queat: odoratius etiam existit, & a-
cre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi
non respōdeat, vt hoc nomine verum Petroselinum
esse credā. Quin etiam tota eius herbe forma, quæ
nō multū à nostro & Germanico Petroselino abest,
atque odor, Selini speciē esse docent, vt pro Petroselino
vsurpare hanc ipsam officina tutò possint: semē
enim quo hodie vtuntur, non Macedonicum Petro-
selinum, sed Hipposelinū, vt suo diximus loco, exi-
stit.

LOCVS.

In Macedonia frequens optimumq; nascitur, hinc
Macedonicum dicitur: inque saxis & præruptis
potissimum locis, vnde cæpit appellari Petroseli-
num. Nascitur & aliis in locis, vt lib. i. de antido-
tis testatur Galenus, at minus laudatum.

TEMPVS.

Floret Augusto mense, atque subinde semen pro-
fert.

TEMPERAMENTVM.

Petroselinum vt gustu acre est cum amaritu-
dine, sic & in operibus calidum. Fuerit itaque &
ipsum tertii ordinis tum excalfacientium, tum de-
siccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, & mens̃trua ducit. Stomachi & co-

in inflammationibus auxiliatur, & torminibus. La-
terum quoque, renum & vesicæ doloribus in potu
sumptum succurrit. Miscetur antidotis urinæ cien-
tibus. EX GALENO.

Petroselinii semen maximè vsui est, quum tota
etiam herba vnà cum radice similem, sed imbecil-
liorem facultatem sortiatur. Incidendi etiam vim
habet: hinc menses & urinas largiter promocat. Flas-
tus quoque extinguit.

APPENDIX.

Sunt qui hanc herbam quam pro Petroselino da-
mus, Sisona esse putent: quorum sententiæ cur non
magnopere repugnem, facit in primis Dioscorides,
qui Sisona perinde atque Petroselinum suis notis
haud descripsit. Dein quod viribus non discre-
pent, atque adeò in vsu huius aut illius nullum sit
periculum. Nos tamen nostram sententiam propter
adductas paulò antè rationes deserere, nisi eiden-
tibus conuicti argumentis, non possumus.

DE ROSA. CAP. CCLV.

NOMINA.

Pῶδov Gracè, Rosa Latinè, officinis eodem serua-
to nomine appellatur. Germanicè Rosen (Gal-
licè Rose.) Rhodon autem Gracis, Plutarcho f. hodon
autore, nominatur, quòd largum odoris effluuium cur dictū.
emittat.

GENERA.

Theophrastus libro sexto, cap. vi. de plantarū hi-

Y ij storia,

PLANTARVM HISTORIAE

storia, genera rosarum multa esse tradit, quæ foliorum multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore & odore differunt. Plinius etiam li. xxi. cap. iij. ex loci diuersitate multa rosarum genera colligit. Nos simpliciter duo duntaxat illarum genera faciemus, syluestres scilicet & domesticas. Syluestres, quæ etiã Canina rosa vocatur, asperiores tũ virgis, tũ foliis sunt, ac odore, colore, magnitudine à domesticis superantur. Germani Heydrosen, & Vuil-drosen vocant. In utroque verò genere duplices existunt, puniceæ nimirum & candidæ. Nos utrumque genus vna pictura complexi sumus.

FORMA.

Vulgò omnibus nota est rosa. Virgas siquidẽ fuscis maculis tinctas, & aculeis plenas emittit: folia incisuris diuisa, nigricantia & aspera. Germinat primum inclusa granoso cortice, quo mox intumescẽte, & in virides alabastros fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices staminaq; capillamentis insidentia, quæ propriè flores dicuntur. Syluestris spongiolas etiam producit, quas pleraq; officina Germaniæ nostræ, non sine detestando errore pro Bedegar vsurpant: fructum quoque parit rotundum, initio viridem, dein puniceum.

LOCVS.

Domestica passim in hortis prouenit. Syluestris etiã nusquã non in cãpestribus & dumetis nascitur.

TEM

TEMPVS.

Rosa vt nouissima inter vernos flores erūpit, ita etiā statim deficit. Decerpēda itaque erit Iunio mēse ubi primū erupit, ne mox nusquam compareat.

TEMPERAMENTVM.

Rosarum vis ex aquea calida substantia duabus aliis qualitatibus, adstringenti videlicet & amara mixta, composita est. Flos earum magis etiam ipsis Rosis adstringit, ac proinde sanè exiccatorius est.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca magis adstringit. Succus recentibus foliis exprimendus, detracto forfice vngue. Sic appellatur quod cādidū est in folio: reliquū mortario premi & teri debet in vmbra donec densetur, & ita ad oculorū circūlitiones recondi. Siccantur etiam folia in vmbra crebro versata, ne mucescant. Ex aridis rosis in vino decoctis expressus liquor, ad capitis, oculorū, aurīū, gingivarū, sedis, recti intestini ac vuluæ dolores penna illitus, collutus infususve, cōducit. Eadē sine expressione cōtusa & illita, præcordiorū inflammationibus, stomachi humiditati, et sacris ignibus medetur. Siccæ ac tritæ fæmorib. insperguntur. Misceri solent cōpositionib. quas antheras vocant, & vulnerariis antidotis. Vruntur folia ad honestandas palpebras. Flos qui in mediis Rosis inuenitur siccatus, gingivarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita posita, aluū profluentē, & sanguinis reiectiones sistunt.

Vnguis.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Vfus succi ad aures, oris vlcera, ginginas, tōsillas, gargarizatu: stomachum, vuluas, sedis vitia, capitis dolores. In febre per se, vel cū aceto ad somnos, nauseas. Folia vruntur in calliblepharum. E siccis femina asperguntur. Epiphoras quoque aridas leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum maximè albas, in posca potus, et sanguinis excreationes. Stomachi quoque dolores, quantū in vini cyathis tribus. Semen his optimū crocinum, nec anniculo vetustius, & in vmbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinā ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro non veteri. Naribus subditum caput purgat. Capita pota, sanguinem & ventrē sistūt. Ungues Rosae epiphoris salubres sunt: vlcera enim oculorum Rosa sordescūt, praterquā in initiis epiphorae, ita vt arida cum pane imponatur. Folia quidem vitiis stomachi, rosionibus, & vitis vëtris, & intestinorum, & praecordii utilissima vel illita. Cibo quoque Lapati modo coniunguntur. Cauendus quoque in iis situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis vsus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe vsino alopecias mirificè emendat.

EX SIMEONE SETHI.

Odorata calidis capitibus prodest, humida verò offendit, eaq; destillationi obnoxia reddit. Sumpta verò

verò ad febres ex flaua bile procreatas iuuat, & roborat stomachum & iccur. Proprietate autem quadam testes ledit, prohibetq; acres exhalationes ne in caput ferantur.

APPENDIX.

Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi seu syluestris Rose mirificè valent contra calculū, & vrina difficultates, si leuigatæ in puluerem exhibeantur.

DE RAPHANO. CAP. CCLVI.
NOMINA.

Pάρανος, ἡ ῥαφανίς Græcis: Raphanus, Radix, Radicula Latinis (Gallis Raue, ou Rafort) dicitur. Hæc autē generis sunt nomina, idēque errant non pauci nostræ ætatis medici & herbarii, qui Radiculæ nomen ad satium duntaxat Raphanum transferunt. Raphanus autem sibi nomen ἀπὸ τοῦ ῥα φαίνεν, id est, quod facile appareat, adsciuit: nam die tertio à satū profilit. Radicis verò nomen sibi arrogauit, quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerunque in tantam molem coalescit, vt frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio lib. xix. cap. v. teste, infantium puerorum magnitudinem æquet. Et memini me stupendæ magnitudinis Raphanos Erfordia, Turingia celeberrimo oppido, vidisse.

Raphanus unde dictus.
Radix.

GENERA.

Raphani Græci duo faciunt genera, satini & syluestris,

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Raphanus nostris. Satiuus officinis hodie peculiariter **Raphanus minor** dicitur, Germanicè **Rettich**. Sylvestris **Armoracia** Latinis **Armoracia** appellatur. Germani ad vocem **cia**. Romanam alludentes, **Merretich** & **Kren** nominant. Noſtri hodie herbarii, ſua potius quàm veterum autoritate freti, Radicem ſimpliciter, generis nomine, vocant. Nonnulli **Raphanum** maiorem appellant, propter folia ipſa, quæ ſatini folia magnitudine ſuperant: aut quia acrimonia maiore, aut viribus efficacioribus præditus eſt.

F O R M A.

Satiua radix. Radix ſatiua caudice vno aſurgit nonnunquam arborco, radice ad Rapi ſimilitudinē, foliis laciniatis, angulisq; horrida: floribus candidis, & ſemine in ſiliquis. Sylveſtris dicta **Armoracia** fronde copioſior quàm corpore, folia ſatiuæ ferè ſimilia habet, magis tamen ad **Läpfane** formam accedentia, longa & acuta: radicē gracilem, mollem, Sinapi inſtar acerrimam, adeò vt caput tentet, & lachrymas incitet.

L O C V S.

Raphanus in hortis naſcitur. Amat autem terrā pinguem, Palladio lib. ix. cap. quinto teſte, ſolutam & diu ſubactā. Sylveſtris etiam hodie in hortis habetur, ſicq; translatus ad culta, edomita feritate miſceſcit meliorq; fit. Creſcit aliàs circum margines itinerum, & loca arenosa, inq; pratis nonnunquam ſua ſponte copioſe prouenit, vt ſit in prato ad oppidum **Tubingam** ſito, ſacriſicorum vocato.

T E M=

TEMPVS.

Cum frigoris patientissimus sit Raphanus, non solum aestate, verum etiā hyeme colligi potest. Estq; illius vsus quotidianus. Floret aestate.

TEMPERAMENTVM.

Raphanis satius excalefacit quidem ordine tertio, desiccatur verò secundo. Sylvestris autem in vtresque efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Raphanus satius excalefacit, flatus gignit, oris suavis est, sed stomacho inimicus. Ructus & urinam cit. Bonā facit aluum. Si quis à cibo ipsum sumpserit, distributioni eius magis cōferet. Prasumptus autē, cibum subleuat. Prodest ante cibum datus vomituris. Sensus exacuit. Decoctus cōtra veterē tuſim, & crassitiem in thorace natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus maiori efficacia vomitiones citat. Hydropicis utilis. Illitus lienosis etiam confert. Cum melle ea quæ serpendo pascunt sistit. Sugillata tollit. Contra viperarū iētus auxiliatur. Alopecias pilis explet. Lentigines cū farina loliacea exterit. His qui à fungis strangulantur subuenit. Menses trahit. Semen eius vomitum proritat, urinamq; mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctū cū oxymelite calido angina laborantibus utiliter gargarizatur. Cōtra Ceraſtis morsum ex aceto potum auxilio est. Cum aceto illitum
gangrenas

PLANTARVM HISTORIAE

gangrenas efficaciter dirumpit scarificatve. Syl-
uestris tam folia quàm radix olerum modo in ci-
bo coquuntur. Excalefacit autem, vrinam cit, æ fluo-
sus est. EX GALENO.

Facultas inest Raphano discutiendi, itaq; ad sugila-
ta, & alios id genus liuores ob eam facultatē con-
ducit. Radix eius ex corū numero est quæ opsonij
potius quam nutrimenti nomine frequenter come-
duntur. Vis illi extenuatoria, cū qua conspicuē vnā
excalefacit: aquis enim in ea qualitas exuperat. Ver-
no tempore caulem in altum assurgentem produce-
re solet, cetera alia quæ nata sunt ex caulescere. Hic
elixus estur ex oleo, garo & aceto, vt Rapa & caulis,
Sinapi & Lactuca. Et sanè caulis hic magis quàm
crudus Raphanus nutrit, vt qui acrimoniam in a-
qua deponat: quanquā minimā sanè & ipse alendi
potestatē habeat. Quidā non solum caulem, sed vnā
Raphanos ipsos elixantes comedunt Raparum mo-
do. Ceterū cum medicos, tū idiotas illos mirari
subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ
gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundē
compertum habere dicunt, nullus tamen exemplū
illorum sine dāmo imitari potuit. Hactenus Gale-
nus, cuius equidem verba cō libētius recitauimus,
quod vulgi errorē Raphanos à cœna comedentis le-
pidè notare videātur. EX PLINIO.

Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos,
cōminuunt & eiiciunt calculos. Iidē in posca deco-
cti,

Et, contra serpentium morsus illinuntur. Ad tussim
etiam mane ieiunis prodest Raphanus cum melle.
Semen eorum tostum, ipsumq; commaducatum ad
lagonoponen: In aqua foliis eius decoctis, bibere
vel succum ipsius cyathis binis. Contra phlegmoni
ipso illinire tusos utile. Inchoantibus autem recen-
tem corticem cum melle, veteriosis verò quam ac-
cerrimos mandere. Semenque tostum, dein contri-
tum cum melle suspiriosis. Idem & contra vene-
na profunt. Caterum cerastis, scorpionibus aduer-
satur, vel ipso semine infectis manibus impunè tra-
ctantibus. Imposito Raphano scorpionibus, moriun-
tur. Salutares & contra fungorum aut hyoscyami
venena aque, vt Nicander tradit. Et contra ixiam
quoq; dari duo Apollodori iubent, sed Citieus semē
ex aqua tritum, Tarentinus succum. Lienem item
extenuant, iecinori profunt & lumborum dolorib.
Hydropicis quoque ex aceto & sinapi sumpti, &
lethargicis. Praxagoras & iliosis dandos censet. Plis-
tonicus & colicis. Intestinorum vlcera sanant. At
purulenta præcordiorū, si cum melle edantur. Qui-
dam ad hac coquere eos in luto illitos malunt, sic et
feminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intesti-
norum animalia detrahunt. Item ad tertias deco-
cto eorum poto cum vino enteroccelis profunt. San-
guinem quoque inutilem sic extrahunt. Medius ad
hac & sanguinem excreantibus coctos dari iu-
bet. Et puerperis ad lactis copiam augendam.
Hippo

PLANTARVM HISTORIAE

Hippocrates capillos mulierum defluos fricari Raphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impositum sistit vlcera quæ phagedenas vocant. Democritus Venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis tantum nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi vero acrior Raphani medicina admota sit, Hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. Et aurium grauitati succum Raphani instillant. Nam vomituris, summo cibo esse eos, vtilissimum est. Syluestris vrinae duntaxat eiicienda vtilior.

DE RIBE. CAP. CCLVII.

NOMINA.

Ribes.

GRæcis cognitus fuerit nec ne frutex ille, nondum compertum habeo. Mauritanis & officinis hodie Ribes nominatur. Germanis S. Iohannsz treublin, oder Beerlin, quod scilicet circa diuini Ioannis Baptiste diem fructus eius fruticis ad maturitatem pertingant.

FORMA.

Frutex est nullis spinis horridus, sed topiarius magis, vitis pusillæ foliis, baccis rubentibus ex pediculis longis dependentibus refertus, ut pictura ipsa abunde docet. Vnde manifestum sit Mauritanorum Ribes à nostro diuersum esse, quod non vitis, sed lata potius, magna, rotunda & viridia folia habeat.

Quamquam

Quamquam non lateat Arabes etiam in Ribes descriptione non admodum concordēs esse.

LOCVS

Pasim in hortis nascitur, ac eorundem puluiros & arcus sepit.

TEMPVS.

Circa diui Ioannis Baptiste natales ferias, & Iulio potissimum mense, baccis ac vuis rubentibus frutex ille ornatur.

TEMPERAMENTVM.

Folia & fructus vehemēter adstringūt. Mauri-
tani frigidum & siccum faciunt in secūdo ordine.

VIRES. EX MAVRITANIS.

Bacca acido sapore placent. Refrigerant aestuam
tem stomachum: sitim restinguunt, quæ cum alios,
tum maximè febricitantes excruciat. Cibi fastidia
discutiunt, & appetentiam inuitant. Fœdam vētris
proluuiem cohibent. Vomitiones sistunt, stomachū
firmant. Alui profluvium quod bilis attulit, retinēt:
erosiones & vellicationes eiusdem tollunt. Sanguis
nis feruorem demulcent, & bilis acrimoniam do-
mant. Sepiasarii succum eius fructus condiunt, ad
anni totius vsum, Rob de ribe appellantes.

DE RHODIA RADICE.

CAP. CCLVIII.

NOMINA.

Pόδια ῥίζα Græcè, Rodiaradix Latine nomi-
natur. Officinis ignota, Germanicè Rosen-

PLANTARVM HISTORIAE

Rhodia uirtz vocatur. Rhodiam autē tam Graci quā
radix cur Latini dixerunt, quoniam contrita Rosas redolet.
dicta. Quapropter rosa, quas Graci ῥόδον nominant, non
Rhodus insula, vt imperiti putant, huic radici no-
men fecerunt.

FORMA.

Radix rhodia Costo similis est, lenior tamen mi-
norisque ponderis, & inaequalis, odorem Rosarum
cum teritur reddens. Reliqua eius facies Telephii
refert, nisi quod flore & semine carere videtur, id
quod Galenus etiā asserit, & in Corollario suo an-
notauit Hermolaus. Dioscorides etiam illorum nul-
lam facit mentionem.

LOCVS.

Nascitur potissimum in Macedonia nunc in mul-
tis Germania hortis plantatur.

TEMPVS.

Radix autumnno effodienda.

TEMPERAMENTVM.

Rhodia radix in calefaciēdo secundi ordinis, aut
certē tertij incipientis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madefacta fronti
& temporibus cum modico rosaceo imponitur.

EX GALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

DE SAMPSVCHO. CAP.

CCLIX.

NOMINA.

ἀμύχου, ἢ ἀμάρχου Græcis: Maio- **Maiorana**
 Z rana, *Amaracus* Latinis: officina Latinā
 appellationē retinuerunt, Germanis Ma-
 ioran, vel Meyrā, (Gallis Mariolaine, ou Ma-
 rone) dicitur. Animaduertendum autem nos hic
 de Amaraco ea loqui quæ incūdo placet odore. Du- **Duplex**
 plex enim Græcis *Amaracus* est. Vna quæ Diosco- **Amaracus**
 ridi alio nomine *Parthenium* dicitur, ingrato pro-
 fus & viroso odore prædita, meritōque ea de causa
 hodie *Cotula fœtida* nominata. Altera de qua hic
 agimus, odorata, quam *Sampsuchon* Græci prima-
 tim nominant. Id, ne imperitis vox illa τολύση-
 μος imponeret, monendum esse duximus.

FORMA.

Herba est *Sampsuchum* surculosa, per terrā ser-
 pens: foliis hirsutis & rotundis, *Calaminthæ* tenuis-
 foliæ similibus, admodum odoratis. Hæc delineatio
 ad amussim herbæ *Maioranæ* vulgò dictæ fauet:
 est enim surculis lentè rubentibus, foliis pilosis, &
 rotundis, incundo odore, semine copioso, quod bul-
 lulis quibusdam continet: flore candido & exiguo.
 Serpit etiam per terram: verum id non vbique fit,
 interdum enim recta surgit in altum.

LOCVS.

Passim in hortis & scitilib. vasis prouenit. Gau-
 det autem locis vmbrosis, aqua & simo.

TEMPVS.

Acstate

PLANTARVM HISTORIAE

Aestate dum floribus pragnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Sampsuchū tenuiū partiū, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & calefacit ordine tertio.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi vim obtinet, & coronamētis apta. Decoctum eius potum, incipiēti aqua inter cutem prodest, & iis quos vrinae difficultas, & tormina discruciat. Arida folia ex melle illita, sugillata tollūt. In pessa subdita menses ducunt. Cōtra scorpionis ictum ex sale & aceto illinuntur. Luxatis cera to excepta imponūtur. Similiter & œdematis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polenta illinitur. Miscentur acopis & malagmatis calefaciendi gratia. EX PLINIO.

Sampsuchū scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum confert impositum. Minor est eidem potio vis. Cohibet oculorū epiphoras cum polēta. Succus decocti tormina discutit. Vrinis & hydropicis vtile. Mouet & nariū sternutamenta. Fit ex eo oleum quod Sampsuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad excalfaciendos emolliendosq; nervos. Vuluas calefacit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera profunt.

DE SPANACHIA. CAP. CCLX.

NOMINA.

Σπινάχια Græcis recentioribus, Spinacia, vel Spinacum olus Latinis appellari potest.

Arabica

Oleū Amaracinum.

Arabice factionis principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nominant. Germani Spinet, oder Spinnat (Gallis des Espinartz.) Spanachiam Spanas haud dubie ab oleris raritate dixerunt Græci: raro chia cur enim illo utebantur medici, quod cibo magis foris dicta. tan, quam medicina nata esset, nec quicquam illius stre fortita. Vel, quod etiā simile veri est, ab aliis nationibus emendicato spinaceo nomine. Spinacia Spinacia vulgò dicta est ab insigni seminis spiculorum nota: unde vocata, et si enim herba ipsa glabra & mollis sit, semen tantum in spinas occalescit. Hispanicum verò olus non Hispaniam, forsitan quod inde primum duxerit ori cū olus. ginem, ad cæteras tandem nationes translata.

FORMA.

Exit septem diebus à satū, folio primum triangulo, molli, mox intybi, plerunque qua pediculo cohaeret laciniato, incerti sapore, exigua radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, nonnunquam altiore, intus cavo: floribus in vertice rotundis, racematim cocuntibus, exiguis: semine spinulis horrido.

LOCVS.

Nullum solum respuit, sed ubicunque satum fuerit hic letissimè prouenit.

TEMPVS.

Seritur Septembri mense, non horrens hyemis frigora, ut verno tempore cibum suppeditare possit. Martio etiam mense seritur, Iunio autem & Iulio mensibus semen & flores profert.

Z

TEM

PLANTARVM HISTORIAE

eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud praesentius est auxilium, cum ad fauces vel pulmones vitium decubuit. Et in summa, omnia quae Symphyton, praestat etiam Sanicula. Potissimum verò sanguinis sputo, dysenteriae, renumq; vitiis medetur.

DE SONCHO. CAP. CCLXII.

NOMINA.

Σόνχος Græcè, Sonchus, Cicerbita Latine dicitur. Sunt qui Lactucellam & Lacteronem appellent, quòd scilicet caulis eius dissectus copioso diffuset lacte. Germanicè Mosz, oder Genszdistel, (Gallicè Latteron, ou Palais au lieure) vocatur. Sonchus autem sibi nomen vindicavit à τὸν cur dicta. τὸν σῶον χέρον, eò quòd salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantia nutritibus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus praesidio sit. Cicerbita tamen vocabulum, quo omnis Heturia adhuc vititur, recens esse adiectitiumq; , & ex non multo tempore Dioscoridi accreuisse videtur.

GENERA.

Sonchus Sonchi duo sunt genera. Alterum sylvestrius, aculeatus, & nigrius, quod Genszdistel Germanicè Non aspera vocatur. Alterum tenerius esculentumq; , ac minus nigrum, Germanis Hasenkol dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quòd cum leporem animus defecit astu, hac sibi herba mederi soleat.

FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, canus & aliquādo rubescens, & qui fractus copioso lacte manat. Folia habet per intervalla in ambitu scissa. Florē luteum, qui, vt Senecionis, breui digestus abit in pappos, vanescitq; in lanugines.

LOCVS.

Vbique ferè in maceriis hortorum, potissimum autem in vineis Sonchus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus Sonchus vterq;.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum eius quodammodo mixtum est: constat enim ex aquea terreaq; essentia, vtraq; leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps. Et siue cataplasmatibus in morem imponatur, siue edatur, manifestè refrigerat. Postea verò quàm planè resiccatus fuerit, terrestre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vis vtrique Soncho refrigeratoria, modicèque adstringens. Proinde stomacho aestuanti & inflammationibus illiti prosunt. Succus eorum in sorbitione datus stomachi rofiones morsusve mitigat, et laetis abundantiam efficit. In lana appositus, sedis ac vulue inflammationibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita scorpionum ictibus subuenit.

EX GALENO.

Z iij Sonchus

PLANTARVM HISTORIAE

eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud presentius est auxilium, cum ad fauces vel pulmones vitium decubuit. Et in summa, omnia quae Symphyton, praestat etiam Sanicula. Potissimum verò sanguinis sputo, dysenteria, renumq; vitiis medetur.

DE SONCHO. CAP. CCLXII. NOMINA.

Σόνχος Græcè, Sonchus, Cicerbita Latine dicitur. Sunt qui Lactucellam & Lacteronem appellent, quòd scilicet caulis eius dissectus copioso diffuset lacte. Germanicè Mosz, oder Gensz distel, (Gallicè Latteron, ou Palais au lieure) vocatur. Sonchus autem sibi nomen vendicauit à τὸν cur dicta. τὸν σῶον χροῖν, eò quòd salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantia nutritibus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus praesidio Cicerbita sit. Cicerbita tamen vocabulum, quo omnis Hetruria adhuc vititur, recens esse adiectitiumq; , & ex non multo tempore Dioscoridi accreuisse videtur.

GENERA.

Sonchus Sonchi duo sunt genera. Alterum sylvestrius, ac
aspera. leatius, & nigrius, quod Gensz distel Germanicè
Non aspe- vocatur. Alterum tenerius esculentumq; , ac minus
ra. nigrum, Germanis Hasenkol dicitur. Et Apuleio
Lactuca leporina, quòd cum leporem animus defecit astu, hac sibi herba mederi soleat.

FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, cauus
& aliquādo rubescens, & qui fractus copioso lacte
manat. Folia habet per intervalla in ambitu scissa.
Florē luteum, qui, vt Senecionis, breui digestus abit
in pappos, vanescitq; in lanugines.

LOCVS.

Vbique ferè in maceris hortorum, potissimum au-
tem in vineis Sonchus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus Sonchus vterq;.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum eius quodammodo mixtum
est: constat enim ex aquea terreaq; essentia, vtraq;
leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est
particeps. Et siue cataplasmatibus in morem impona-
tur, siue edatur, manifestè refrigerat. Postea verò
quàm planè resiccatus fuerit, terrestre eius tempe-
ramentum redditur, modicam habens caliditatem.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vis vtrique Soncho refrigeratoria, modicèque
adstringens. Proinde stomacho astuanti & inflam-
mationibus illiti prosunt. Succus eorum in sorbitio-
ne datus stomachi rosiones morsusve mitigat, et la-
etis abundantiam efficit. In lana appositus, sedis ac
vulue inflammationibus opitulatur. Tam herba
quàm radix illita scorpionum ictibus subuenit.

EX GALENO.

Z iij Sonchus

PLANTARVM HISTORIAE

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Caterum viridis etiamnum & tener estur perinde ut cetera olera syluestria.

EX PLINIO.

† aliās obo-
lorum.

Albus qui è lacte nitor, utilis orthopnoicis Lactucarum modo. Erasistratus calculos per urinam pellico monstrat, & oris graueolentiam commanducato corrigi. Succus trium† cyathorum mensura in vino albo & oleo calefactus adiuvat partus. ita ut à potu ambulent grauidae. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantiam nutriticibus, coloremq; meliorem infantium: utilissimus iis quae lac sibi coire sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in stranguria bibitur, cyathi mensura: & in stomachi rossonibus cum semine Cucumeris, nucleisque pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionesque, radix verò illinitur. Eademque decocta in oleo punicis mali calyce, aurium morbis praesidium est. Haec omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesci, ut morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succo eius uti. Refrigeratoriam tamen vim esse conuenit nigro, & hac causa imponendum cum polenta. Zeno radice albi stranguriam docet sanari.

DE SERIDE. CAP.

CCLXIII.

NOMINA.

Σ Εἰς Græcis, Seris & Intubus Latinis vocatur. (Gallis Chicorée.) Reliqua quæ illi sunt nomina, in generũ distinctione mox dicemus.

GENERA.

Serin Græci in duo fastigia partiuntur, in satiuã & syluestrem. Sic & Intubum Latini in duo genera digesserunt, in satium & erraticũ. Satiũ, qui non nisi cultu & humana diligentia prouenit. Erraticum verò, qui suæ spontis & liber, sub nulla litoris lege vagatur & errat, dixerũt. Satiũ Intubus, quem priuatim, Plinio lib. xx. cap. viij. teste, Serin nominarunt veteres, in duas distrahitur species. Vna latiore folio cõstat, Lactuca similior. Hæc corrupta ab Intubo voce, In Hetruria passim Endiuiã appellatur. Et debet in omnibus pro vera Endiuiã vsurpari officinis. Nam qua hodie sub hac voce vtuntur, non est vera Endiuiã, sed Lactuca syluestris, vt suo diximus loco. Germanicè Endiuien vocari potest. Altera angustiora folia habet, et sub amara est. Hæc diminutiuo à Seris nomine Seriola dicitur, quod deinde corrũpentes recentiores Scariolam fecerunt, Germanicè Scariol appellari poterit. Erraticus iterum Intybus in duas species, Plinio loco antea citato autore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine πικρὴς, ἡ ἀχόροπ nominatur, Latinis autem Ambubeia. Vulgus herbariorum & officina Cichoream Cichorea. Z iij vocant,

PLANTARVM HISTORIAE

- vocant, Germani Viegwartten, quasi viarum custodem, vel Viegueit, quod peregrinis quasi viam indicare videatur. Altera, quae latiore folio prodit, Plinio Hedychnois nominatur, haud dubie non alia ratione, nisi quod suauiter dormire, somnumque irrepere faciat. Vel, si paulo durior haec videtur interpretatio, quod flos eius praeter alias Serides suauiter admodum spiret. Theophrasto libro septimo de plantarum historia, capite septimo, & Plinio lib. xxi. cap. xv. Aphaca alio nomine appellatur: diuersa tamen ab ea quam supra descripsimus, & quae alias Vitia sylvestris dicitur. Vulgo Dens leonis, quod folium sinuatum per lacinias denticulatum sit, & Rostrum porcinum nominatur. Officinis nostris, quae barbaris delectantur vocibus, Taraxacon, aut Altaraxacon dicitur, Germanis Korkraut, Pfaffenrorlin, Pfaffenblatt.

FORMA.

- Satiuus Satiuus Intubus caulem edit magnum, rotundum, Intubus. striatum, frequentibus surculis brachiatum. Germinat foliatus statim à radice venoso. Flos illi in ramulis caeruleus, & nonnunquam etiam candidus emicat. Prima autem eius species, ut diximus folio latiore, altero angustiore constat. Erratici Intubus. Cichorii. tubi genus primum, quod Cichorium vocant, germinat à radice post Vergilias, folio Betae laciniato, ferè semper in solo procumbente: caule magno, fistuloso, frangi contumace, multis ramulis brachiato, ad

to, ad vinctum quoque lentis: flore cæruleo, interdū albo, particulatim vsq; in autumnū erūpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper cōpressus, & interdiu hiscēs. Hinc panditur rudissimus quorundam error, qui hanc herbam quam Germani Viegwart nominant, Heliotropium esse contendunt, cū tamen primum folia repugnent, quæ nō sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis. Deinde non candidum, sed magna ex parte cæruleū florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropij, non inutilis, sed, experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum alijs satiuīs intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse syluestrem, & non Heliotropiū. Vt quorundam temeritatem non satis mirari queam, qui contra apertam veritatem, & omnium medicorum consensum, secus pronunciare audent. Alterū, quod Leonis dens nominatur, foliis multis constat, vtrinā Leonis que denticulatis, in terra sessilibus, cauliculis drantalibus, concavis, leuibus & enodibus, flore luteo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanescit in lanuginem, quæ cum aura raptim fertur.

LOCVS.

Satiuus non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana: haud tamen difficulter vbi satus fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera

PLANTARVM HISTORIAE

Rhodia uirtz vocatur. Rhodiam autē tam Graci quā
radix cur Latini dixerunt, quoniam contrita Rosas redolet.
dicta. Quapropter rosae, quas Graci ῥόδον nominant, non
Rhodus insula, ut imperiti putant, huic radici no-
men fecerunt.

FORMA.

Radix rhodia Costo similis est, leuior tamen mi-
norisque ponderis, & inaequalis, odorem Rosarum
cum teritur reddens. Reliqua eius facies Telephii
refert, nisi quod flore & semine carere videtur, id
quod Galenus etiā asserit, & in Corollario suo an-
notauit Hermolaus. Dioscorides etiam illorum nul-
lam facit mentionem.

LOCVS.

Nascitur potissimum in Macedonia nunc in mul-
tis Germaniae hortis plantatur.

TEMPVS.

Radix autumnno effodienda.

TEMPERAMENTVM.

Rhodia radix in calefaciēdo secundi ordinis, aut
certē tertij incipientis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madesacta fronti
& temporibus cum modico rosacco imponitur.

EX GALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

DE SAMPSVCHO. CAP.

CCLIX.

NOMINA.

αμύχρον, ἡ ἀμάρχρον Græcis: Maio- Maiorana
 Z rana, *Amaracus* Latinis: officina Latinā
 appellationē retinuerunt, Germanis Ma-
 ioran, vel Meyrā, (Gallis Mariolaine, ou Ma-
 rone) dicitur. Animaduertendum autem nos hic
 de Amaraco ea loqui quæ incūdo placet odore. Du- Duplex
 plex enim Græcis *Amaracus* est. Vna quæ Diosco- *Amaracus*
 ridi alio nomine *Parthenium* dicitur, ingrato pro-
 prius & viroso odore prædita, meritòque ea de causa
 hodie *Cotula* foetida nominata. Altera de qua hic
 agimus, odorata, quam *Sampsuchon* Græci priu-
 atim nominant. Id, ne imperitis vox illa τολύσχη-
 μος imponeret, monendum esse duximus.

FORMA.

Herba est *Sampsuchum* surculosa, per terrā ser-
 pens: foliis hirsutis & rotundis, *Calaminthæ* tenuis
 foliæ similibus, admodum odoratis. Hæc delineatio
 ad amussim herbæ *Maioranæ* vulgò dictæ fauet:
 est enim surculis lentè rubentibus, foliis pilosis, &
 rotundis, incundo odore, semine copioso, quod bul-
 bulis quibusdam continet: flore candido & exiguo.
 Serpit etiam per terram: verum id non ubique fit,
 interdum enim recta surgit in altum.

LOCVS.

Passim in hortis & scitilib. vasis prouenit. Gau-
 det autem locis vmbrosis, aqua & simo.

TEMPVS.

Acstate

PLANTARVM HISTORIAE

Aestate dum floribus pragnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Sampsuchū tenuiū partiū, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & calefacit ordine tertio.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi vim obtinet, & coronamētis apta. Decoctum eius potum, incipiēti aqua inter cutem prodest, & iis quos vrinae difficultas, & tormina discruciat. Arida folia ex melle illita, sugillata tollūt. In pecto subdita menses ducunt. Cōtra scorpionis ictum ex sale & aceto illinuntur. Luxatis cerato excepta imponūtur. Similiter & œdematis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polenta illinitur. Miscentur acopis & malagmatis calefaciendi gratia. EX PLINIO.

Oleū Amaracini.

Sampsuchū scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum confert impositum. Minor est eidem potio vis. Cohibet oculorū epiphoras cum polēta. Succus decocti tormina discutit. Vrinis & hydropicis vtile. Mouet & nariū sternutamenta. Fit ex eo oleum quod Sampsuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad excalfaciendos emolliendosq; nervos. Vulvas calefacit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera prosunt.

DE SPANACHIA. CAP. CCLX.

NOMINA.

Σπινάχια Gracis recentioribus, Spinacia, vel Spinaceum olus Latinis appellari potest.

Arabica

Arabice factionis principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nominant. Germani Spinet, oder Spinnat (Gallis des Espinartz.) Spanachiam Spanas haud dubie ab oleris raritate dixerunt Græci: raro chia cur enim illo utebantur medici, quod cibo magis forsi dicta. tan, quam medicina nata esset, nec quicquam illius sortita. Vel, quod etiā simile veri est, ab aliis nationibus emendicato spinaceo nomine. Spinacia Spinacia vulgò dicta est ab insigni seminis spiculatorum nota: unde vocata. etsi enim herba ipsa glabra & mollis sit, semen ta-ta. men in spinas occalescit. Hispanicum verò olus non Hispani minare forsitā quod inde primum duxerit ori cū olus. ginem, ad ceteras tandem nationes translata.

FORMA.

Exit septem diebus à satū, folio primum triangulo, molli, mox intybi, plerumque qua pediculo coheret laciniato, inertis sapore, exigua radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, nonnunquam altiore, intus cauo: floribus in vertice rotundis, racematim coeuntibus, exiguis: semine spinulis horrido.

LOCVS.

Nullum solum respuit, sed ubicunque satum fuerit hic latissime provenit.

TEMPVS.

Seritur Septembri mense, non horrens hyemis frigora, ut verno tempore cibum suppeditare possit. Martio etiam mense seritur, Iunio autem & Iulio mensibus semen & flores profert.

Z

TEM

PLANTARVM HISTORIAE

TEMPERAMENTVM.

Spanachia primi refrigerantium & humectantium ordinis est. VIRE S.

Alium emollit. Melius Atriplice suppeditat alimentum, sed alio parū hærrens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitius humor abiiciatur. Ventrem decoctæ ius proluuit. Stomacho inutile. Et ceteras ferè omnes Atriplicis vires sibi fertur arrogasse.

DE SANICVLA. CAP. CCLXI.

NOMINA.

Herba quam omnes hodie *Saniculam* vocāt, à nullo, quòd sciam, veterum descripta est, sed à recentioribus inuenta, vt multa alia vulnearia herbae. Sunt autē qui *Diapensiam* nominent. Germanis *Sanickel*, (Gallis *Sanicle*) dicitur. Nos *Sanicula* men *Saniculam* à *Sanandis* vulneribus traxisse cur dicta. vulgò constat.

GENERA.

Duū est generum. Vna quæ propriè appellatur *Sanicula*, ideoq; marem, vt certius esset discrimen, appellauimus Germanicè *Sanickel mennle*. Altera ab omnibus ferè herbariis pro specie *Ostretij* vulgò vocati habetur, sed falso, quando neq; in foliis, neque in radice vlla appareat acrimonia, sed perinde atque in mare *Sanicula*, amaritudo & adstrictio. Germanis errore etiam quodam die *klein Meisteruurtz* nominatur. Nos eandē cūm & for-

ma & facultate ad veram Saniculam, quam mater fecimus, proximè accederet, Saniculam feminā nūcupauimus. Germanicè sanickle Vueible.

FORMA.

Sanicula vera, atque adeo mas herba est folio vitis, aut Apū, in quinque partes dissecto, rubentib. in fine sectionum maculis quibusdam: surculis quoque rubris ad radicem, quæ multis ei capillamentis fibrata subest: capitulis in summis coliculis pusillis, herbacei coloris & subnigris. Fœmina quòd ad folia attinet priori similis, rubentibus tamen maculis caret; itemq; rubris ad radicem surculis, quòd in ea hæc singula candida sint. Flores in summo cādidos, ac subinde semen striatum & oblongum profert.

LOCVS.

Nascitur in syluis & vmbrosis locis.

TEMPVS.

Carpenda cum suis capitulis Maio & Iunio mē-sibus.

TEMPERAMENTVM.

Non est simplicis natura, sed, vt indicio est gustus, adstringit simul & amara est, vt hoc nomine calefactoriam & exiccatoriā esse nulli dubiū sit. Statuunt autem calidam & siccam ordine secūdo.

VIRE S.

Sanicula herba succum vulneratis in potu mirificè conferre experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositā, aut

Z. ij eius

PLANTARVM HISTORIAE

eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud praesentius est auxilium, cum ad fauces vel pulmones vitium decubuit. Et in summa, omnia quae Symphyton, praestat etiam Sanicula. Potissimum verò sanguinis sputo, dysenteria, renumq; vitiis medetur.

DE SONCHO. CAP. CCLXII. NOMINA.

Σόνχος Græcè, Sonchus, Cicerbita Latine dicitur. Sunt qui Lactucellam & Lacteronem appellent, quòd scilicet caulis eius dissectus copioso diffuset lacte. Germanicè Mosz, oder Genszdistel, (Gallicè Latteron, ou Palais au lieure) vocatur. Sonchus autem sibi nomen vendicauit & τὸν οὖνον χείρον, eò quòd salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantia nutritibus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus praesidio Cicerbita sit. Cicerbita tamen vocabulum, quo omnis Heturia adhuc vititur, recens esse adiectitiumq; , & ex non multo tempore Dioscoridi accreuisse videtur.

GENERA.

Sonchus Sonchi duo sunt genera. Alterum sylvestrius, ac uersaspera. leatius, & nigrius, quod Genszdistel Germanicè Non aspera. vocatur. Alterum tenerius esculentumq; , ac minus nigrum, Germanis Hasenkol dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quòd cum leporem animus defecit astu, hac sibi herba mederi soleat.

FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, cauus
& aliquādo rubescens, & qui fractus copioso lacte
manat. Folia habet per intervalla in ambitu scissa.
Florē luteum, qui, vt Senecionis, breui digestus abit
in pappos, vaneſcitq; in lanugines.

LOCVS.

Vbique ferè in maceriis hortorum, potiſſimum au-
tem in vineis Sonchus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio menſibus Sonchus vterq;.

TEMPERAMENTVM.

Temperamentum eius quodammodo mixtum
eſt: conſtat enim ex aquea terreaq; eſſentia, vtraq;
leniter frigida. Nam & adſtriſtionis cuiuſdam eſt
particeps. Et ſiue cataplaſmatis in morem impona-
tur, ſiue edatur, manifeſtè refrigerat. Poſtea verò
quàm planè reſiccatus fuerit, terreſtre eius tempe-
ramentum redditur, modicam habens caliditatem.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vis vtrique Soncho refrigeratoria, modicèque
adſtringens. Proinde ſtomacho aſtuanti & inflam-
mationibus illiti proſunt. Succus eorum in ſorbitio-
ne datus ſtomachi roſiones morſuſve mitigat, et la-
ctis abundantiam efficit. In lana appoſitus, ſedis ac
vulue inflammationibus opitulatur. Tam herba
quàm radix illita ſcorpionum icſtibus ſubuenit.

EX GALENO.

Z iij Sonchus

PLANTARVM HISTORIAE

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Caterum viridis etiamnum & tener estur perinde vt cetera olera syluestria.

EX PLINIO.

† aliās obolorum.

Albus qui è lactenitor, utilis orthopnoicis Lactucarum modo. Erasistratus calculos per urinam pellico monstrat, & oris graecolentiam commanducato corrigi. Succus trium cyathorum mensura in vino albo & oleo calefactus adiunat partus. ita vt à potu ambulent grauidae. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantiam nutriticibus, coloremq; meliorem infantium: vtilissimus iis quae lac sibi coire sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in stranguria bibitur, cyathi mensura: & in stomachi rofionibus cum semine Cucumeris, nucleisque pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionesque, radix verò illinitur. Eademque decocta in oleo punici mali calyce, aurium morbis praesidium est. Hec omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesci, vt morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succo eius vti. Refrigeratoriam tamen vim esse conuenit nigro, & hac causa imponendum cum polenta. Zeno radice albi stranguriam docet sanari.

DE SERIDE. CAP.

CCLXIII.

NO=

NOMINA.

Σ Εἰς Græcis, Seris & Intubus Latinis vocatur. (Gallis Chicorée.) Reliqua quæ illi sunt nomina, in generū distinctione mox dicemus.

GENERA.

Serin Græci in duo fastigia partiuntur, in satiuā & syluestrem. Sic & Intubum Latini in duo genera digesserunt, in satium & erraticū. Satiū, qui non nisi cultu & humana diligentia prouenit. Erraticum verò, qui suæ spontis & liber, sub nulla litoris lege vagatur & errat, dixerūt. Satiū Intubus, quem priuatim, Plinio lib. xx. cap. viij. teste, Serin nominarunt veteres, in duas distrahitur species. Vna latiore folio cōstat, Lactucæ similior. Hæc corrupta ab Intubo voce, In Hetruria passim Endinia appellatur. Et debet in omnibus pro vera Endinia usurpari officinis. Nam qua hodie sub hac voce vtuntur, non est vera Endinia, sed Lactuca syluestris, vt suo diximus loco. Germanicè Endiuien vocari potest. Altera angustiora folia habet, et sub amara est. Hæc diminutiuo à Seris nomine Seriola dicitur, quod deinde corrūpentes recentiores Scariolam fecerunt, Germanicè Scariol appellari poterit. Erraticus iterum Intybus in duas species, Plinio loco antea citato autore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine πικρὴς, ἢ αἰχόριον nominatur, Latinis autem Ambubecia. Vulgus herbariorum & officina Cichoream Cichorea.

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

- vocant, Germani Vueguuartten, quasi viarum custodem, vel Vueguueilz, quod peregrinis quasi viam indicare videatur. Altera, quæ latiore folio prodit, Plinio Hedyphnois nominatur, haud dubiè nō alia ratione, nisi quod suauiter dormire, somnūque irrepere faciat. Vel, si paulò durior hæc videtur interpretatio, quod flos eius præter alias Serides suauiter admodum spiret. Theophrasto libro septimo de plātarum historia, capite septimo, & Plinio lib. xxi. cap. xv. Aphaca alio nomine appellatur: diuersa tamen ab ea quam supra descripsimus, & quæ aliàs Vitia syluestris dicitur. Vulgò Dens leonis, quod folium sinuatim per lacinias denticulatum sit, & Rostrum porcinum nominatur. Officinis nostris, quæ barbaris delectantur vocibus, Taraxacon, aut Altaraxacō dicitur, Germanis Korkraut, Pfaffenrorlin, Pfaffenblatt.

F O R M A.

- Satiuus** Satiuus Intubus caulem edit magnum, rotundū, **Intubus.** striatum, frequentibus surculis brachiatum. Germinat foliatus statim à radice venoso. Flos illi in ramis musculis cœruleus, & nonnunquam etiam candidus emicat. Prima autem eius species, vt diximus folio latiore, altero angustiore constat. Erratici Intubus **Cichoriū.** tubi genus primum, quod Cichorium vocant, germinat à radice post Vergilias, folio Betæ laciniato, ferè semper in solo procumbente: caule magno, fistuloso, frangi contumace, multis ramulis brachiato, ad

to, ad vinctum quoque lentius flore cœruleo, interdū albo, particulatim vsq; in autumnū crūpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper cōpressus, & interdū hīscēs. Hinc panditur rudissimus quorundam error, qui hanc herbam quam Germani Viegwart nominant, Heliotropium esse contendunt, cū tamen primum folia repugnent, quæ nō sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis. Deinde non candidum, sed magna ex parte cœruleū florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropij, non inutilis, sed, experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum alijs satiuīs intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse syluestrem, & non Heliotropiū. Vt quorundam temeritatem non satis mirari queam, qui contra apertam veritatem, & omnium medicorum consensum, secus pronunciare audent. Alterū, quod Leonis dens nominatur, foliis multis constat, vtrin⁹ Leonis que denticulatis, in terra sessilibus, cauliculis dens. drantalibus, concavis, leuibus & enodibus, flore luteo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanescit in lanuginem, quæ cum aura raptim fertur.

LOCVS.

Satiuus non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana: haud tamen difficulter vbi satus fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera

PLANTARVM HISTORIAE

itinerata nascitur. Altera in hortis, & passim ferè etiam sponte sua gignitur.

TEMPVS.

Sativus Innio & Iulio mensibus floret. Cichoriū eodem ferè tempore incipit florere, & in autumnū vsque durat. Hedypnoidis in Martio erumpunt flores, & in aestatem vsque perdurant.

TEMPERAMENTVM.

Seris olus est subamarum, & magis quod sylvestre est, quod ob id ipsum Picrida quidā nuncupāt, quidam verò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigidaq; temperatura, vtrunque secundo abscessu. Porro domestica magis etiam quàm sylvestris refrigerat. Sed & humiditatis multæ admixtio siccitatem extinguit. Vtraque autem adstringentis qualitatis particeps est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnes adstringunt & refrigerant, & stomachis adiuvant. Alium sistunt coctæ, si cum aceto assuamātur. Sylvestres autem stomacho meliores. Comestis imbecillum & aestuantem leniunt. Cardiacis per se aut cum polenta vtiliter illinuntur. Podagris & oculorum inflammationibus succurrunt. Herba & radix illita, percussis à scorpione subuenit. Ignibus sacris cum polenta medetur. Succus eorum cum cerusa & aceto vtiliter iis quæ refrigerationē desiderant inungitur.

EX PLINIO.

Intubi

Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosacco & aceto capitis dolores lenit. Idemq; cum vino potus, iecinoribus & vesicæ & epiphoris imponitur. Cichorium refrigerat. In cibo sumptum & illitū collectiones, succusq; decocti vētrem soluit. Iecinori & renibus, & stomacho prodest. Item si in aceto decoquatur, vrine tormina discutit. Item morbum regium è mulso si sine febre sit. Vesicā adiuuat. Mulierum purgationibus quidē decoctum in aqua adeò prodest, vt emortuos partus trahat. Adiiciunt magi, succo totius cum oleo perunctos fauorabiles fieri, & quæ velint facilius impetrare. Hedypnois stomachum dissolutum adstringit cocta: crudaq; sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cū lente. Rupta & conuulsa vtroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Seris vtraque stomacho utilissima, præcipuè quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant vel illitæ, discutiuntq; & alios quàm stomachi. Cū polenta syluestriū radices stomachi causa sorbentur, & cardiacis illinūtur super sinistram māmam ex aceto. Omnes hæc & podagricis vtilis, & sanguinem reiicientibus. Item quibus genitura fluit, alterno dierum potu.

Hedypno-
idis facul-
tates.

EX SIMEONE SETHI.

Stomacho bonum est Intubum, si cum aceto quis eo vtatur. Postquam decoctum est, aluū sistit. Obstructiones auferendi vim habet vt nullum aliud
olus.

PLANTARVM HISTORIAE

olus. Sanguinis feruorem sedat, & inflammationes iecoris discutit, & ictericos iuuat. Iecur proprietate quadam corroborat. Mediocriter somnum inducit. Tradunt quidam post venae sectionem, aut cucurbitas, si quis cum aceto vtatur, iecinoris sanitatem conseruare. Veneris appetentiam extinguit, & semen genitale in iis qui frigidam habent temperaturam, minuit. Vtile est ad sanguinis excreationem. Huius etiam decoctum iecinori admodum vtile. Semen febres ex flaua bile ortas iuuat: at lieni nocet.

DE STAPHYLINO.

CAP. CCLXIIII,

NOMINA.

ΣΤΑΦΥΛΙΝΟΣ Græcè, Pastinaca Latinè dicitur. Germanicè Pastiney, oder Pastnaché Pastinaca (Gallicè Des Pastenades, ou Panetz.) Pastinaca verò nomen à pascendo dictum videtur: natura enim ei calens, sapor vehemens, alit corpus, & Venerem cit.

GENERA.

Duplex Pastinacæ genus. Vna enim satiuæ est, quæ iterum duorum est generum. Vnum genus quod vulgò Carota dicitur, Germanicè Zam Pastiney, & rot Ruben. Alterum, quod quidam inter Rapa connumerant. Hinc est quod Germani Geel Ruben vocant. Syluestris altera, quæ propriè Staphylinus Græcis nominatur, Germanicè autem Vuild Pasteney, oder Vogelneß.

FOR.

FORMA.

Folia Gingidū habet Pastinaca syluestris, latiora tamen & subamara. Caulem rectum, asperumque, umbellam anetho similem obtinentem, in qua flores candidi, exiguum quiddam purpurei in medio habentes, & ferè ad croceum accedētis. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Hortenses syluestribus per omnia similes sunt, nisi quòd flores in medio purpureum quiddā non habeant, & radix vnus in suprema sui parte purpurea sit, alterius autem magis lutea.

LOCVS.

Passim circa itinera, loca petrosa, & hortorum maceries sua sponte proueniunt erratica. Satiua in hortis nascuntur.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mēsis flores & semina Dauco similia producit vtraque.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & abstergit vtraque, magis tamen syluestris.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Erratica semen potum aut appositum mēses ducit. Vrinæ difficultatibus, hydropicis, & pleuriticis in potu confert. Contra venenatorum morsus & ictus vtile. Ferūt non ladi à venenatis qui id præsumpserint. Conceptus adiuvat. Radix ipsa urinam cit, & Venerem stimulat. Fetus ex utero pellit apposita.

PLANTARVM HISTORIAE

posita. Folia trita cum melle imposita vlcera depa-
scentia expurgant. Hortensis Pastinaca cibo aptior
est. Ad eadem, sed minori efficacia, prodest.

EX GALENO.

Pastinaca satiuā imbecillior, syluestris ad omnia
potentior. Vrinās mouet, & menses promocat cum
herba quidem tota, tum maxime semen & radix.
Habet porro etiam abstersorium in se quippiam:
quamobrem pascentia vlcera quidam folijs eius cū
melle, quò pura reddant, illinunt.

EX PLINIO.

Pastinaca erratica semen contritum, & in vino
potum, tumentem aluum, & suffocationes mulie-
rum doloresq; lenit in tantū vt vuluas corrigat. Il-
litū quoq; è passo ventri earū prodest. Viris verò cū
panis portione aqua tritum. Ex vino potum contra
ventris dolores. Pellit & vrinam, & phagedenas
vulcerū sistit recēs cum melle impositum. Vel arida
farinae inspersam radicem eius Diouches contra ie-
cinoris & lienis, ilium, lumborum & renum vitia,
ex aqua mulsa dari iubet. Eleopphantus & dysente-
ricis veteribus. Philistiō in lacte coquit, & ad strā
guriā dat radicis vncias quatuor. Ex aqua hydro-
picis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis co-
mitialibus. Habētes eā feriri à serpētibus negātur,
aut qui ante gustauerint, non lēdi. Percussis impo-
nitur cum axungia. Folia cōtra cruditates mādūa-
tur. Orpheus amatorium inesse Staphylino dixit,
fortassis

fortassis quoniam Venerem stimulari hoc cibo cer-
tum est: ideo conceptus adiunare aliqui prodiderunt.
Ad reliqua & sativa pollet, efficacior tamen sylue-
stris. Semen sativæ quoque contra scorpionum ictus,
ex vino aut posca salutare est. Radice eius circum-
scalpi dentes, dolore liberantur.

DE STRYCHNO. CAP.

CCLXV.

Halicacabum peregrinum & Stramonia
ex horto sancti Germani pratensis iam
vulgaria multis sunt.

NOMINA.

τρυχvos Græcè, Galeno per unius literæ
Ξ abiectionem τρυχvos, Solanū Latine, offi Solanum.
cinis Solatrum, vulgò Cuculus, Vva lupi-
na, Vva vulpis, Morellæque dicitur. Germanicè Morella.
Nachtschatt. (Gallicè Morelle.)

GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus, Sola Solanum
ni sunt genera. Primum hortense dicitur, quod sci hortense.
licet olim in hortis cum aliis oleribus quæ edendo
sunt, seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cul-
toribus provenit. Nigrum alio nomine, à nigris ni-
mirum foliis, aut in extrema maturitate fructu ni-
gro, appellatur. Germanis simpliciter Nachts-
chatt, (Gallis Morelle) vocatur. Secundum Halicaca
quod prinatim Halicacabum nominatur. Vesica-
riam quoque vocant à folliculis quos producit, Vesicaria
vesicarum

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

vesicarum in animantibus speciem imitantibus, vel quòd vesica calculis medeatur. Officinae Ara-
Alkakēgi bes secuta, corrupto Halicacabi nomine, Alkaken-
 gi appellant. Germani nostri Iudenhutlin, oder
 Docklin, Iudenkirschen, Schlutten, Boberellē,
 Rot Nachtschatten. (Galli Baganau des.) Est
 præterea alia Halicacabi species nuperrimè inuen-
 ta, & aliunde in Germaniā allata, cuius nemo an-
 tiquorum scriptorum, quòd sciam, mentionem fecit.
 Nos discriminis gratia Halicacabum peregrinum
 nominauimus. Germanicè Vuelsch Schlutten nō
Solanum ineptè nuncupauimus. Tercium solanum somni-
 somnificū. ficum ab effectu scilicet nominant. Sunt qui Sola-
 trum dormitorium vel marinum dicant, quod rus-
Solanum pibus non lōgè à mari inueniatur. Quartū Græ-
 furiosum. cis μανικόν, hoc est, furiosum nominatur, officinis
 Solatrum mortale.

F O R M A.

Hortense. Solanum hortense frutex est esculentus, exilis, a-
 las multas habens, folia nigra, Ocimo maiora &
 latiora, fructum rotundum, viridem, cū autem
 maturuerit, nigrum, aut rufum. Flos huic cādicat.
Halicaca Halicacabum foliis priori simile, latioribus tamē.
bum. Caules eius postquam increuerunt in terram incli-
 nant. Fructum fert in folliculis rotundis vesicis si-
 milibus, rufum, rotundum, leuem, vuarū acinis si-
 milem, quo coronarij vtuntur texentes coronas.
 Peregrinum, planta est pergulis operiendis aptissī-
 ma:

ma: latissimè enim suis clauiculis sese diffundit. Folia habet oblonga, & laciniata. Flores candidos, vesiculosas Halicacabo similes, in quibus semen includitur pisis aut ciceribus simile, in cuius medio effigies veluti cordis humani insculpta & incisa apparet. *Somnificum* frutex est ramos habens multos, densos & lignosos, difficile fragiles, foliis pinguibus refertos mali cotonei similitudine, florem rubrum, grandem. Semen in siliquis croceum. Radicem corticem habentem subrubrum, grandem. *Furiosum* folium obtinet Eruca simile, maius tamen, satis ad spinam quam *Pæderota* vocant accedens. Caules à radice proceros decem aut duodecim emittit, vlnarum cubitorumve quatuor altitudine, capitulū effigie oliuæ insidens, sed hirsutum vt Platani pilula, maius tamen & latius. Florē nigrum, post hunc fructum racemosum, rotundum, nigrum, denis aut duodenis acinis constantem, Hederæ corymbis similibus, mollibus vt vna. Radicē candidam, crassam, canam, cubitalē. Ceterum plantatur nunc in hortis Germaniæ herba Italis vocata *Stramonium*, & pomum spinosum, quam nonnulli inter Solani species numerant, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opii odorem referre videantur. Quare vt aliis occasionem daremus cogitandi de hac planta, hoc loco eius picturam inferere placuit. Flores huius herba suauem Lili spirant odorē. Videtur viribus parum à posterioribus generibus *Son*

PLANTARVM HISTORIAE

lani distare. Germa. à pomis appellare libuit,
Stechend oderrauch opffelkraut.

LOCVS.

Hortense passim in opacis locis, & semitis obuiū est. Nascitur & in hortis. Halicacabū in vineis copiosissimè provenit. Somnificum in saxosis nec procul à mari locis producitur. Furiosum in montanis, ac vento perflatis locis, & ubi Platani nascuntur.

TEMPVS.

Hortense tota ferè æstate floret, autumno autem fructus eius maturescit. Halicacabum vesicas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septēbris mensis colore primum viridi, mox paulatim rubescente profert.

TEMPERAMENTVM.

Hortense refrigerat & adstringit in secundo ordine, medium autem absolutè in humectando & exiccando, Galeno lib. v. simp. cap. ix. teste. Idem faciunt Halicacabi folia. Somnificum tertii est refrigerantium ordinis. Manici seu furiosi cortex radice refrigerat secundo ordine incipiente, & desiccat in secundo iam completo, & tertio incipiente.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hortense refrigerandi facultatem obtinet, quæ propter folia ignibus sacris, herpetibus cum farina polenta illita profunt. Per se autem trita & imposita agilopas, capitisque dolores sanant. Stomacho æstnanti auxiliatur. Parotidas cum sale trita

& illita discentiunt. Succus eius valet aduersus i-
 gnes sacros, & herpetas, cū cerusa, rosaceo & li-
 thargyro. Ad egilopias verò cum panc. Infantium
 quoque ardori, quem syriasin vocant Graci, cum
 rosaceo perfusus proficit. Miscetur collyriis pro a-
 qua aut ouo contra acres fluxiones ad inunctiones.
 Aurium dolori instillatus prodest. Muliebria pro-
 fluvia in lana appositus sistit. Succus fuluo galli-
 narum in domibus oberrantium simo subactus &
 linteo appositus agilopis remedio est. Halicacabū
 vim vsūque hortensis Solani habet, verū non
 comeditur. Fructus eius potus, eò quòd vrinam mo-
 uet, regium morbum expurgat. Vtrorumque herba
 exprimitur, & succus siccatus in vmbra reponitur,
 ad eadē utilis. Sonifici radice cortex in vino drach-
 ma pondere potus, somnificam facultatem obtinet
 Papaueris succo mitiorem. Fructus vehementer vo-
 rinam cit. Corymbi eius ferè duodecim hydropicis
 dantur. Plures autē poti ecstasin faciunt. Remedio
 est aqua mulsa copiosa potui data. Succus eius me-
 dicamentis dolorem leuātibus & pastillis miscetur.
 In vino decoctus & in ore retentus dentiū doloris
 succurrit. Radicis succus cū melle inunctus ocu-
 lorū hebetudines tollit. Furiosi radix in vino drach-
 ma vnus pondere pota, nō illepidas neque iniucun-
 das imagines speciesve efficit. Duarum verò drach-
 marum pondere pota, ad tres vsque dies ecstasin af-
 fert. Quatuor autem drachmae hausta interimunt.

PLANTARVM HISTORIAE

Remedio est aqua mulsa maiore copia pota, & vomitione reiecta.

EX GALENO.

Solanum esculentum quod in hortis nascitur, notum est omnibus, utunturq; illo ad ea omnia quae refrigerari & adstringi postulant. Caterorum verò non esculentorum vnum quidem nuncupatur Halicacabum fructum habens rufum, acino vuae tamen figura, tum magnitudine ad similem, quo etiam ad coronas utuntur. Alterum autem fruticosum, quod somnificum, & tertium quod furiosum dicitur. Halicacabum igitur in foliorum facultate hortensi simile est, fructum habens cienda urinae idoneum: proinde multis compositis facultatibus quae ad iecur, ad vesicam & renes accommodantur, miscetur. Solani verò somnifici cortex radice si cum vino bibatur, somnum accersit drachma pondere sumptus. Sed et ad cetera Papaueris succo persimilis est, nisi quod eo usque imbecillior est, ut ipse tertii habeatur ordinis refrigerantium, quum hic in quarto sit constitutus. Huius semen urinam mouendi facultatem habet. Si autem plus duodecim corymbis hauserit, dementiam furiamve adsciscet. Porro quod reliquum est ex dictis Solanis, ad medicationes quae intro in corpus adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachmae sumantur, mortem inferent: si pauciores, insaniam. Vna certe innoxie offertur, ceterum nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori illinatur,

vlcera

ulcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radice cortex optimus est.

EX PLINIO.

Strychno, quam quidam Trychnon scripsere, uti-
nam nec coronarij in Aegypto vterentur, quos inui-
tat Hederae florum similitudo, in duobus eius gene-
ribus. Quorum alterum cui acini coccinei, granosi fol-
liculi, Halicacabum vocant. Nostri autem vesica-
riam, quoniam vesicae & calculis prodest. Frutex
est surculosus verius quam herba, folliculis magnis
latisq; & turbinatis, grandi intus acino, qui matu-
rescit Nouembri mense. Tertio folia sunt Ocimi, mi-
nimè diligenter demonstranda. Remedia enim, non
venena tractamus: quippe insaniam facit paruo quo-
que succo. Quanquam & Graeci autores in iocum vere-
tere. Drachmae enim pondere lusum pudoris gigni
dixerunt, species vanas imaginesq; conspicuas obser-
uari demonstrantes. Duplicatum hunc modum, legi-
timam insaniam facere. Quicquid verò adiiciatur po-
deri, representari mortem. Hoc est venenum quod inno-
centissimi autores simpliciter Dorycnion appellaue-
re, ab eo quod cuspides in praeliis tingerentur illo
passim nascente. Quin & alterum genus soporiferum
est, atque etiam opio velocius ad mortem. Laudatum
verò à Diocle & Euenore: quippe praesentaneum re-
medium ad dentes mobiles firmandos, si collueren-
tur: huic tamen exceptionem addidere, ne diutius
id fieret: delirationem enim gigni eo. Comendatur &

Vesicaria

PLANTARVM HISTORIAE

in cibis tertium genus; licet præferatur hortensis saporibus. Et nihil esse corporis malorum, cui non salutare sic Strychnos, Xenocrates prædicat. Somnifici radicem bibunt qui sunt vaticinandi callentes, quod furere ad confirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est (id enim libetius retulerim) aqua copiosa mulsa calida potui data. Nec illud præteribo, aspidum natura Solanum somnificum in tantum aduersum, ut radice eius propius admota soporentur, illud sopore enecante vim earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur.

APPENDIX.

Quod nos somnificum esse dicimus Solanum, alii qui hortense non sine maximo errore esse putant, plurimumque suis conferre, ac easdem à letalibus morbis præservare asserunt. Nos tamen non laboramus magnopere quomodo suis succurrat, sed quid in homine possit magis consideramus, quum constet pleraque aliis animantibus esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientia verò cognitum est, geminos pueros statim ex esu acinorū huius generis Solani mortuos esse. Quod sanè exemplū nos mouet ut somniferum esse credamus, potissimum cum in vniuersum ferè illi descriptio quadret, vno hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Sunt autem nota quedam in hortensis etiam delineatione quæ illi non conueniunt. Neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborecens: neque

que etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet. Quod verò ad flores & fructum attinet, videtur accedere ad historiam Solani furiosi, ut suspicio ferè sit duorum horum generum historias esse confusas: quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundem descriptione nonnihil à Dioscoride variat. Quicquid verò sit, certum est Solani esse speciem, quod forma ipsa foliorum abundè docet: atque huic vehementem refrigerandi vim, maxime si paulò copiosius sumatur, inesse, ut hoc nomine pro somnifero Solano eius usus medicis nullo periculo esse queat. Nos vulgi sententiam sequenti, appellauimus Dollkraut. Possent etiam Germanicè vocari Schlaff Nachtschatt. sunt qui Seu-kraut nominant. Quod si tamen hæc nonnullis haud satisfecerint, certè necesse erit Mādragoræ speciem esse fateantur tertiam, quā pingit Theophrastus li. vi. de histo. planta. capite ij. iis verbis: ἰδιὸς δὲ ὁ καρπὸς τοῦ μανδραγόρου τῷ μέλει τε καὶ ῥαγώδης καὶ οἰνώδης εἶναι τῷ χυμῷ, hoc est, fructus Mandragoræ peculiaris, quia niger, acinosusque & vinosus suo sapore sentitur. Hæ enim omnes notæ in fructu huius fruticis reperiuntur. Sed plura ea de re in capite de Mandragora diximus.

DE SYMPHYTO MAGNO.

CAP. CCLXVI.

AA iij NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

ὕμφυτον, ἢ σύμφυτον μέγα Græcis, Symphytū & Solidago latinis, officinis & herbariis Consolida maior, Germanis Vualturtz, Schuuarztuurtz, Schmeruurtz, groſſe beyneuell (Gallis de la Conſyre) Nomen illi apud Græcos Latinosq; egregia conſtringendi & conglutinandi vis fecit. FORM A.
Symphy-
tum cur
dictum.

Caulem emittit binūm cubitorum, aut maiorem, leuem, craſſum, anguloſum, Sonchi modo inanem, circa quem folia ſunt non magnis interuallis diſtanti, hirsuta, anguſta, oblonga, ad Bugloſi foliorū figuram accedentia. Habet caulis ſecundum angulos eminentias quaſdam productas. Folium tenue ex ſingulis alis prodit. Flores lutei, & ſemen Verbaſci. Totus verò caulis & folia quandam lanuginem modicè aſperam, tactu prurituū mouentē, habent. Radices in ſuperficie extrā ve nigrae, intus candidæ & glutinoſæ, quarum eſt uſus. Hæc ſiquidem delineatio adamiſſim huic herbae quæ vulgò Coſo-
 Confolida lida maior appellatur, cōpetere videtur, quòd nula maior. la prorſus ſit nota quæ illi non quadret. Sed obtrudet quiſpiam, ſlorum colorem non reſpondere, quem Dioſcorides luteum eſſe dicit, quum in noſtra Conſolida alius ſit. Cui ita reſponſum volo. Coloris iſta in ſloribus diuerſitas nō tanti momenti eſt, vt aliud à Conſolida maiori Symphytō eſſe, conuincere poſſit: neque enim vbique terrarum, etiam earundem herbae

herbarum, flores similes sunt. Exemplo est Buglossum, quod Boraginem hodie officina vocant: hoc enim interdum albos, quos nos Norimbergæ & Culmachii sæpe vidimus: magna autem ex parte purpureos producit flores. Sic quoque Symphytum frequenter flore subrubro, vel leniter purpurascete, ut Onoltzobachii, rarius candido conspicitur. Tubingæ tamē omnia flore albo visuntur. Luteis floribus nullum in Germania vidisse me memini. Quod autem alios quā luteos nonnunquam proferat flores Symphytum, satis docet Apuleius in commentario illo quem de herbis conscripsit, qui illius flores nigros esse tradit, subrubros aut subpurpureos haud dubiè innuēs. Nos una pictura utrosque flores exhibemus. Germani candidis floribus Symphytum scemnam, subrubris verò marem appellant. Caterum non est quod in Symphyti descriptione te perturbet aut remoretur, quod idem caulis simul levis & angulosus dicitur: id enim sic intelligendū venit, quod caulis non perpetuò levis aut angulosus sit, sed modo hunc, modò illum producat pro soli diuersitate.

LOCVS.

Locis aquosis, palustribusq; abundè prouenit.

TEMPVS.

Per integram æstatem floret. Radix tamen in autumnno carpenda venit.

TEMPERAMENTVM.

Modicè, ordine scilicet secundo, calefacit, exica-

cat

PLANTARVM HISTORIAE

cat & contrahit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radices trita & pota cruenta expuentibus, ruptisq; profunt. Recentia vulnera illita glutinant. Carnes si vnà coquantur cogunt. Inflammationibus, sedis potissimum, cum Senecionis folis vtiliter illinuntur.

EX GALENO.

Symphytum magnum similem petraeo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neque odorantibus odoratum apparet, sed iis sanè ab illo diuersum est. Caterùm quatenus viscositatem quandam & mordacitatē obtinet, Scilla simile est. Vtitor eo ad omnia quæ petraeo. Potest autem petraeum collectū in thorace, pulmoneq; pus expurgare. Habet etiam contrahendi vim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocœlijs imponitur, & ad cōuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. In vino decoctum ad dysenteriam, & profluiū muliebri rubrum constringendum exhibetur.

EX PLINIO.

Symphyti radix illita, enterocœlas cohibet. Vulnibus sanandis tanta præstātia est, vt carnes quoque cū coquūtur, conglutinet addita, vnde & Græci nomen imposuere. Osibus quoque fractis medetur.

SYMPHYTI PETRAEI VIRE.

Quum Dioscorides & Galenus ad Symphyti facultates

cultates lectorem in Symphyti magni historia ab-
 legent remittantq; necesse est, vt illas ordine conu-
 meremus more quidem nostro, primū ex Dioscori-
 de, deinde ex Galeno & Plinio.

EX DIOSCORIDE.

Decoctum ius aqua mulsa & potū Symphytum
 petræū, quæ in pulmone sunt expurgat. Sanguinem
 reiciientibus & renum doloribus cum aqua datur.
 Ad dysenteria & rubra fœminarum profluvia in
 vino decoctum bibitur. Ad cōuulsa & rupta ex ace-
 to mulso sumitur. Cōmāducatum sitim arcet. Gut-
 turis asperitatibus prodest. Recentia vulnera gluti-
 nat, & intestinorum ramices illitum coerces. Cara-
 nes cū vnā coquitur, conglutinat.

EX GALENO.

Symphytū petræū ex cōtrariis constat facultati-
 bus: habet enim incidēdi vim quampiā, qua colles-
 ctum in thorace & pulmone pus expurgare potest.
 Habet etiā quādam contrahendi facultatem, qua
 eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia ad eas
 inest humiditas quādā nō immodicē calida, p quā
 gustantibus dulce apparet, & odoratu incundum.
 Mansum sitim extinguit, & arteria asperitates sa-
 nat. Porro secundum omnium dictarum virium mi-
 stionē simul digerere abādē potest, simulq; corpora
 cōtrahere & cōstringere. Proinde enterocœliis im-
 ponitur, & ad cōuulsa & rupta cum oxymelite
 bibitur. Cæterū qui ipsum in vino decoctum ad
 dysentes

PLANTARVM HISTORIAE

dysenteriam, & rubrum muliebri profluuiū exhibent, tanquam desiccante & contrahente vtuntur. Qui verò ad nephritin renūmve dolorem, tanquam expurgante & incidente.

EX PLINIO.

Vtilissimum lateribus, lienibus, renibus, torminibus, pectoris pulmonibus, sanguinem reicientibus, faucibus asperis. Bibitur radix trita, & in vino decocta, & aliquando superlinitur. Quin & commāducata sitim sedat, præcipueq; pulmonem refrigerat. Luxatis quoque imponitur & conuulsis, lieni, interaneis. Aluum sistit coacta in cineres. Detrahit quoque folliculis trita cum piperis nouem granis, & ex aqua pota. Vulneribus sanādis tāta præstantia est, vt carnes quoque cū coquuntur, cōglutinet addita, vnde & Græci nomen imposuerunt. Ossibus quoque fractis medetur.

DE SICY SATIVA.

CAP. CCLXVII.

NOMINA.

Σίκυς, κὶ σίκυος ἡμῶς Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur. Officinæ latinā appellationem retinuerunt. Actius angurium etiā vocari tradit. Germani Cucumern (Galli Concombre) vocant. Cucumer autem, vt Varroni placet, dicitur à curuore, quasi Curuimer. Sicyn verò Græci ex aduerso ἀπὸ τοῦ σθ' εἶναι τὸ κύναι, quòd scilicet appetentiam concumbendi minime stimulet,

Cucumer
vnde dicitur
Etus.
Sicys.

let, nominasse videntur. Hinc celebratum Græcis
 prouerbiū est, vt ex Athenæo annotauit Hermo- Adagiū.
 laus: Texens pallium mulier cucumerem deuoret, Textrices
 quod textrices magna ex parte, si Aristoteli credi- magna ex
 mus, impudicæ sint, & opportuna Veneri. Vt ergo parte im-
 iis impetus infrenetur & elanguesciat, adagium e- pudicæ.
 dendos cucumeres textricibus consulebat.

GENERA.

Cucumerum genera sunt Pepones & Melopepo- Pepones.
 nes in quos statim degenerant, figura tantum & Melopepo-
 quantitate inter se dissidentes. Siquidem qui ma- nes.
 gnitudine excedunt, aut in longitudinem procedunt,
 quales multis locis nascuntur, Pepones quondam
 vocati fuerunt. Sed qui formam & effigiem mæli
 referunt, & humi rotundantur, Melopepones Græ-
 cis vocantur, facti ex Pepone & mælo nomine: nes
 que inter Pepones & Melopepones aliud quā quod
 sumitur, ex figura quondam, vt diximus, discrimen
 fuit. Totum hoc genus Palladius Melones, quasi Melones
 μέλωνες, id est, pomeos, à mælorum figura appella cur dicti.
 uit, quo nomine maior pars hodie medicorum si-
 mul cum officinis vtitur. Sunt itaque in vniuer-
 sum tria Cucumerum satiuorum genera. Pri-
 mum genus absolute Cucumis, à nostræ ætatis her Cucumis.
 bariis, cum adiectione Cucumis citrinus, hoc est,
 flavus, à colore quem habet cum maturuerit, appel-
 latur. Aetius, quod equidem sciam primus Anguria Anguria.
 vocari tradit, quæ veteribus σικυα, id est, Cucu-
 meres

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

meres nominantur. Horum sanè plura sunt genera, nos quatuor potiora commemorabimus, quorum etiam picturas exhibemus. Primi generis est vulgaris Cucumer, fructum obtinens oblongum & maculosum, Germanicè vocatur gemeyn Cucumern. Sunt qui illum priuatim Anguriam appellent. Ad quod sanè nomen alludentes Germani nostri, alio nomine Gurchen nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum nuncupat, priori multò maior ac procerior foliis, floribus & fructu, qui vt in primo nō est maculosus, sed tamen oblongus etiam. Germani Türkisch Cucumern appellant. Fructus eius admodum flauus existit. Hinc est quòd multi eundem priuatim Citrulum & Citreolum, quasi citrinum, hoc est, flauum vocent. Huius semina alba & lata sunt. Tertiij generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quòd ad folia, flores & semina attingit, ferè similis, nisi quòd in hoc omnia sint minora. Fructus verò rotundus, vt pictura monstrat. Vulgus Zucco marin vocat. Germani meer Cucumer. Officinis perinde atque Turcicus ignotus. Quarti generis Cucumer est, quam officinae hodie Citrulum vocant. Folia habet ferè Colocynthis, multifariam dissecta & incisa: fructum rotundum, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, hoc est, in rufa atra. Nos officinas respicientes nominauimus hunc Cucumerem citrulum,

Citreoli
aut Citru
li.

lum, Germanicè Citrullen. Alterum genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Pepon, & τὸ τοῦ πεπο. ποῦνδου, hoc est, maturescere dicitur. Is enim mitis ac tener maturitate flaccescit. Germani Pfeben appellant. Tertium genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus vocatur, Germani Melaun non Melon. minant. A priore forma & suauitate differt: rotundior siquidem & mæli cotonei quasi formam referens, mitiorq; existit. Discrimen hoc sentientes postiores Græci σίκω simpliciter dixerunt, quem nos priuatim modò Cucumerem vocamus. Adiecta autem Peponis voce, hūc quem nostra ætas priuatim Peponem nominat, σίκω τῷ πεπονί, id est, Cucumerem Peponem dixerunt, mitem scilicet & maturitate tenerum Cucumim innuentes. Sub quo etiam, quem à tereti ac rotunda mæli effigie μήλων peculiariter dixerunt, complexi sunt.

FORMA.

Cucumis sarmētis viticulisq; prælongis serpit, in Cucumis. ramósque vitis modo se diffundit, tamen ob caulis infirmitatem humi spargitur, ni propius adsit cui caducus incumbat: folio anguloso, flore luteo, fructu cartilagineo, & interdum maculoso, coloris tū herbacei, tū citrini, tum nigri. Pepo vite serpit præ Pepo. longa, flagellis vltro citroq; reptantibus, vitigineis ferè frondibus, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim striato, prominulis puluinarum toris, strigilibus in vertice pomi & umbilico cocuntis

PLANTARVM HISTORIAE

coeunt bus, ibidemq; stellatim decussatis, cute aspera velut lentiginibus occupata, carne intus suavi, seminibus in utero liratim digestis.

LOCVS.

Pingui gaudet solo, lociq; apricis vberior prouenit Cucumis. Nascuntur & pepones bene cultis locis, eoque latius si subinde rigentur. Amant tamen aprica loca, & sole irradiata: ideoque cum annus est pluuiosus & nubilus, non aequè ut in siccis annis proueniunt. Libertate etiam gaudent, qua possint ultro vagari. Magna copia Peponum & Melonum apud Norimbergam, celeberrimum Germaniae nostrae oppidum, prouenit.

TEMPVS.

Aestatis fine, Iulio potissimum mense, maturescunt. Citius tamen Melones quam priuatim Cucumeres dicti.

TEMPERAMENTVM.

In Cucumeribus superat humida & frigida temperies, non tamen vehementer, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit natura, sed iam desiccantis, idq; in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Satius Cucumis bonam facit aluum, stomachoque accommodatus est. Refrigerat nec corruptionem sentit. Prodest vesicae. Olfactu animo deficientes restituit.

restituit. Semen eius mediocriter urinam cit. Cum lacte aut passo vesicæ exulcerationibus subuenit. Folia eius cum vino illita, morsus canum sanant, cum melle verò epinyctidas. Peponis autem caro comesta urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Superior eius cortex contra adustionem infantium, quam siriasin vocant, sincipiti imponitur. Fronti ut oculorum fluxiones auertat, imponitur. Mixtus farina, & cum semine in sole siccatus succus, singula fit ad extergendam cutem, & nitorem in facie conciliandum. Radix sicca, & cum hydromelite drachmæ pōdere pota, vomitiones mouet. Quod si quis modicè à cæna vomere cupiat, gemini oboli satis erunt. Sanat & vlcera in modum faui ecreta, ceria vocant, cum melle illita.

EX GALENO.

Cucumis esculētus maturus quidem tenuioris essentiae est, qui verò immaturus est, crassioris. Sed et abstergendi & incidendi facultate participat, quare & urinam mouent, & corpus splēdidum reddūt: at magis si quis semine arefacto contusoq; atq; cribrato, vice pulueris absterforiæ utatur. In semine et radice maior abstergendi facultas, quàm in fructus ipsius carne. Vniuersa Peponū natura frigidior cum larga humiditate existit. Habent & quandā abstergēdi vim, ideoq; urinā cient, & deorsum expeditius quàm Cucurbita & Melo pepones rapiūtur. Quod porrò abstergāt, discere licet sordidā cutem BB deficiādo.

PLANTARVM HISTORIAE

defricando. Quamobrem maculas etiam solis calore factas, & lenticulas faciem occupantes, & in superficie alphas extergere possunt. Semē quod in eorum veluti carne continetur, ad hoc efficacius, addēdū vt renibus etiam calculo infestatis sit accommodatum. Gignit in corpore vitiosum succū, potissimum quando non rectē concoquitur. Tū verò morbum etiam qui cholera dicitur, inducere consuevit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit, vomitioni quoque idoneus est: largiūsq; ingestus, nisi quis aliquid eorum quae boni sunt succi supermādet, omnino vomitum concitabit. Melopepones minus humidi quā Pepones sunt, nec adēdō prauī succi, segnius item prouocant vrinam, tardiūsq; deorsum descendunt. Ad vomitum excitandum non eandem vim Peponibus obtinent, sicut nec celeriter in ventriculo, quādo illic prauus humor coacervatur, aut alia corruptionis causa illum infestauerit, corrumpuntur. Ventriculo haudquaquam ceu Pepones officiunt. Cucumeres autem vrinam mouēdi facultatem, perinde atque Pepones habent, sed imbecilliozem: minus nanque substantia humidi, ideoq; non facili, vt illi, in ventriculo corrumpuntur. Inuenias qui hos ceu alia multa, quae bonae hominum parti concoqui non possunt, conficiant, ob totius scilicet naturae cum eis proprietatem.

EX PLINIO.

Pepones qui vocantur, refrigerāt, maximē in cibis, &

bo, & emolliunt aluum. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat vlcera cœcreta in modũ faui, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, in farina tusa datur, quatuor obolis in aqua mulsa, ita vt qui biberit, quingētos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adiicitur. Cortex quoq; vomitionem mouet, faciẽ purgat. Hoc & folia cuiuscunque satini illita. Eadem cū melle epinyctidas sanāt: cum vino canis morsus. Cucumis odore defectum animi.

EX SIMEONE SETHI.

Anguria, quæ Cucumeres dicuntur, secundũ verò communem sermonem Tetrangura ob frigidum & humidum temperamētum noxia sunt, & mali succi. Ex iis autẽ parua magnis anteferre oportet. Hæc vrinã ducūt, & si in aceto macerētur, in acutis præsertim febribus, mitiorem calorẽ reddunt. Crebrior verò horũ vsus semen genitale minuit, in Venerẽque impetum aufert. Semen autem horum deficcatum, caliditatem quandam possidet, contrariãque his actionem efficit, vrinamq; magis prouocat. Pituitã glutinosam Tetrãgura in vëtriculo gignūt, quæ cruda per venas diffunditur. Propterea qui his crebrius vtuntur, illi propter humores temporis spatio in venis, & aliis corporis cavitatibus coactos, longis corripuntur febribus. Semen verò horum vrinam cit, sed minus quàm Peponum, quoniam celerius in ventriculo corrumpuntur. Meliora

PLANTARVM HISTORIAE

in his sunt quæ habent semen exiguum. Calidos autem & siccos stomachos inuant, & si in ardente febre cū aceto porrigantur, valde prosunt. Proprium verò horum est nauscas ventriculi calore excitatas, sedare. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodum concoquuntur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates, ut animo deficientes propter excessentem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nanciscantur, nauscas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passiones.

DE SICY SYLVESTRI.

CAP. CCLXVIII.

NOMINA.

Ἰκὺς ἄγριος, ἢ ἐλατήριον, sic autem propriè vocatur succus eius Grecis, Cucumis anguinus, sylvestris & erraticus Latinis, of Cucumer ficinis & barbaris Cucumer asininus, Germanis asininus. Vuild Cucumer, vel esels Cucumer (Gallis Concombre sauuage) appellatur.

FORMA.

Solo fructu à satiuo Cucumere distat, quem multo minorem habet, glandibusq; longiusculis similè. Folia & sarmenta satiuo similia. Radicem albam & magnam. Totus futex amarus.

LOCVS.

Ruderibus sabulosisq; locis prouenit. Nusquā ta-

men

men in Germania, quòd sciam, nisi satus nascitur.

T E M P V S.

Augusto mēse floret, atque subinde autumnò fructum tempestiuum producit, qui seminibus ac succo plenus est, qui decerpto pediculo confestim exilire solet.

T E M P E R A M E N T V M.

Calidus & siccus est Cucumis sylvestris, vt ex viribus latius patebit.

V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Foliorum succus instillatus aurium dolori cōuenit. Illita ex polentaradix omne vetus œdema discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex aceto & illita podagras discutit. Ischiadicis infunditur eius decoctum, eoque in dolore dentes colluuntur. Arida trita, alphas, lepras & impetiginem abstergit. Cicatrices nigras, & in facie maculas expurgat: Radicis succus sesequioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiiciunt, præsertim in hydropicis. Purgat verò citra stomachi iniuriam. Radicis selibram accipere oportet, inque duobus vini, præsertim Libyci, sextariis conterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè subsederit. Quod verò Elaterium vocatur, ex fructu huius Elaterii in sce Cucumeris paratur ad hunc modum. Eligito confectio. Cucumeres qui tacti saliendo succum ex se profundunt, ac nocte vna repositos dimitte. Postridie

PLANTARVM HISTORIAE

cribrum varius neque crebra foramina habens crateri superposito, supinóque cultro sursum versus a-
 vicem habente sigillatim Cucumeres utrisque mani-
 bus prehendens diuidito, & per cribrum in subie-
 ctum craterem humorem exprimito, simulq; carno-
 sum in eis quod iam cribro adhæret exprimito, ut
 & illud descendat. Quæ expressa sunt in paratam
 peluim coniecito. Coaceruatis autem in cribro quæ
 antea dissecta fuerūt, ea dulci aqua perfundito, &
 cum exprefferis abiicito. Humorem in pelui agita-
 tum & linteo opertum, soli exponito, dumq; stete-
 rit totam supernatantem aquam, cum humore con-
 creto, percolato. Facitóque id sæpius donec superna-
 tans aqua subsidat, quam cum diligenter excolau-
 ris, coniectum in mortarium sedimentum terito, &
 in pastillos conformato. Elaterium verò à bimatu
 ad decennium purgationibus utile. Integra quan-
 titas obolus est, minima semiobolus, pueris chalci
 duo. Copiosius enim potum, periculum adfert. Pi-
 tuitam & bilē per inferna pariter & superna tra-
 hit. Optima autem per ipsum difficulter spirantis
 bus sit purgatio. Quòd si itaque in animo est per
 aluum purgare: adiecto salis duplo, & stibij quod
 colorari sufficiat, ex aqua catapotia erui magnitu-
 dine dato. Postea cyathus vnus aque tepide sorbea-
 tur. Ad citandas verò vomitiones aqua diluens
 Elaterium, subiectas lingue partes penitissimè pē-
 na oblinito. Quòd si quispiā difficilius vomat, oleo

Vires Ela-
 terij.

aut vnguento irino diluito. Somnum inhibeto. Porro iis qui supra modum purgantur, vinū cum oleo mixtum continuò dare conuenit: etenim vomendo emēdantur. Quòd si vomitiones non finiātur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachū densare possunt offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Fœtus enecat in passo subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diurnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum veteri oleo, melle, aut felle taurino.

EX GALENO.

Cucumeris sylvestris, et fructus ipsius succus, quē Elaterium vocāt, & nō minimè radicis ac foliorū, ad medicationes perutilis est. Elaterium itaq; menses ciet, & fœtum interimit appositum, cœu alia omnia amara & subtilium partium, maxime si alia quam habeant caliditatem, veluti Elateriū. Sūmè siquidem amarum est, leuiter calidum, vt ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cū melle, aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectis fusum cū lacte in nāres. Hoc etiam vsu dolores capitis sanat. Atque Elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt & foliorum, licet similem vim habeat, imbecilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet, abstergit nanque, digerit atq; emollit. Porro cortex eo potentius desiccatur.

PLANTARVM HISTORIAE

EX PLINIO.

Ex Cucumere sylvestri fit medicamentum quòd vocatur Elaterium, succo expresso è fructu. Cuius causa nisi maturius incidatur, succus exilit, oculorum etiam periculo. Obscuritates & vitia oculorum sanat, genarumque vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non attingi vnas ab auibus. Radix autem ex aceto cocta podagris illinitur, succoque dentium dolori medetur, arida cum resina impetiginem & scabiem, quam psoram & lichenas vocant. Parotidas & panos sanat, cicatricibus colorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Nullum ex medicamentis Elaterio longiore aeo durat. Incipit atri-
matu. Melius autem quo vetustius erit, quod iam ducentis annis seruatum esse, autor est Theophrastus. Et vsque ad quinquagesimum lucernarum lumina exstinguit. Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quàm exstinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Efficax est contra scorpionum ictus Elaterium, & ad purgandũ vterum, aluiumque. Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthirias bibitur & hydropises. Illitum, anguinas & artérias cum melle, & oleo vetere sanat.

DE SMILACE HORTENSI.

CAP. CCLXIX.

NOMINA.

μίσλαξ κητωρία Græcè, *Smilax hortēsis*

Latine, *Officinis inusitata*: recentiores

Græci ac herbarij, & qui Arabum, præ-

sertim Serapionis & Auicennæ, sectantur placita,

Phasiolos vel Faseolos. Galenus et alij veteres Græci Phasioli.

ci Dolichos appellant. Germani Faselen, Vuel. Dolichi.

sch oder Vuild Bonen (Galli Phasiolæ) vocāt.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, molliora tamē: cau-
les tennes, & capreolos vicinis fruticibus se impli-
cātes, in tantum incrementos, vt tabernacula effin-
gere possint. Fructum Fænogracæ similem profert,
longiorem tamen maioremque, in quo semina reni-
bus similia, non vnius coloris, sed ex parte subrusa
continentur. Ex qua certè delineatione sole clarius
fit, Smilacem hortensem Dioscoridis non esse nisi
Phaseolos vulgò vocatos, cū sint foliis Hederae,
mollioribus atque venosis, cauliculis tenuibus, cla-
uiculis propinquis fruticibus se implicantibus, ra-
mis incremento suo tentoria & hortorum cameras
fornicesve facientibus, siliquis Fænogracæ haud
dissimilibus, longioribus autem & maioribus, semi-
nibus intus versicoloribus, & renib. in vniuersum
similibus. Quæ certè vnica nota ad docēdum Smi-
lacem hortensem esse Phaseolos sufficere posset. Ac-
cedit quòd Phaseolorum apud Serapionem descri-
ptio non sit alia quàm apud Dioscoridem Smilacis
hortensis,

PLANTARVM HISTORIAE

hortensis, id quod manifestè patebit utrasque confe-
renti. Caterùm etsi duo Phaseolorum vidcātur es-
se genera: sunt enim aliqui cādidi, nonnulli verò ru-
bentes, tamen quia in foliis nulla est prorsus diuer-
sitas, & Dioscorides quoque innuat semina hæc nō
esse vnius coloris, sed vt Serapion interpretatur,
quædam ad candorē, quædam verò ad ruborē acce-
dant, ideo sub vnica pictura vtriusque coloris Pha-
seolos exhibemus: neque enim distant alia ratione,
quàm quòd albi producant flores candidos, ruben-
tes verò purpurascētes. Licet non ad candidos &
ισόχροα. rubētes tantū hæc Dioscoridis verba, & ἰσόχροα,
referenda esse existimem, sed ad alios etiam: sunt
enim nonnulli fuscī, alij verò gilui, cœrulei & cœ-
si, alij maculis & orbibus atris variegati, nisi quis
omnes iam dictos colores sub candido & rubro, ex
quibus ij commixti esse videntur, complecti velit.

LOCVS

Smilax de qua hic agimus, vt ex nomine satis
constat, in hortis sata prouenit, & cum lōgis serpat
flagellis, propè poni ridicæ palæve debent, quas ca-
preolis suis, vbi increuerit, complectatur.

TEMPVS.

Aestate florent, ac subinde siliquas & in iis se-
men producant.

TEMPERAMENTVM.

Simeon Sethi & Mauritani in primo ordine ca-
lidos & humidos esse Phaseolos statuunt. Galenus
etiam

etiam in libro primo de Alimētorum facultatibus,
humidiores natura esse asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Olerum modo esui apta est siliqua cum semine
Asparagi modo elixa. Vrinam pellit, insomniāque
grauia & tumultuosa facit.

EX GALENO.

Dolichi nō minus quā Pīsa nutriunt, similiter
etiam flatu carent: sed quōd ad suauitatem attinet
& deiectionem, peiores sunt. Alibiles itaque sunt,
nisi quādo integri & etiamnum virides vnā cum
suis siliquis ex olco & garo ab hominib. ingerūtur.
Aliqui vinum etiā adiiciunt. Sed horum in reposi-
tione, vt Pisorum, nullus est vsus: quippe quum na-
tura sint humidiores, citò corrumpi consueuerunt.
Attamen si quis hos tutò reponere cupiat, siccare
prius diligenter & exactè oportebit. Siquidē eo mo-
do & à putrefactione et à corruptione tota hyeme
vindicanur, eundē quē nobis Pīsa vsum exhibētes.

EX AETIO.

Siliqua seu Lobi qui nunc passim vocātur, apud
omnes antiquos Dolichi & Phasioli appellati, de
genere Pisorum sunt, similes illis quantum ad mi-
nimam flatu generationem: quantum verò ad in-
cunditatem cibi & egestionem peiores. Peculiariter
autem Lobi dicuntur, quoniam ferè isti tantum
eorum omnium quæ siliqua vestiūtur, cum siliquis
suis comeduntur.

EX SI

PLANTARVM HISTORIAE EX SIMEONE SETHI.

Qui ex iis magis rubri sunt, calidiores. Manifesta quoque in iis humiditas, quòd cito putrescant. Humorem generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, vt ait Galenus, inter ea qua facile & difficulter concoquuntur, celeriter & tarde trās- eunt, inflant & non inflant, parum & multum nu- triunt. Ante alios cibos cum sapa sumpti, ventrem proritant. Cum sinapi oblati, plurimum noxa depo- nunt. Alibi igitur Phasioli crassiores, & difficilio- ris coctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Pro- prietate autem quadam turbulenta somnia facit, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, & vrinas mouent. Et horum decoctum mēses mouet.

DE SATYRIO TRIFOLIO.

CAP. CCLXX.

NOMINA.

ατύριον τρίφυλλον Græcis, Satyrium
Z trifoliū Latinis, Officinis nostris incogni-
Testiculi tū aut inusitatū: vulgò Testiculus vulpis
vulpis. aut sacerdotū, Germ. Stendeluurtz, (Gallis Du
Satyriū à trois fueilles) nominatur. Satyrio au-
Satyrium tem nomen fecerunt Satyri, qui primi syluestres dū
vnde di- colludētes nymphis per syluas & antra, ad firmior
Etum. rem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifoliū
Trifoliū. verò, quoniam tria fert folia ad terram versa.

FORMA.

Folia tria fert Rumici aut Lilio similia, minora
tamen

tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubi-
talem. Florem Lilio similem, album. Radicem bul-
bo similem, mâli modo extuberantem, foris rufam,
intus oui modo albam, gustu dulcem & ori gratâ.
Quod verò hîc dicimus Lilio similem, non sic intel-
ligendum venit quasi quantitatē & tota figura Li-
lio similis flos sit, quando euidentissimum sit Liliū
quantitate sua Satyrū florem multis modis supera-
re. Denique nec figura etiam per omnia respondet:
quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiã
referri potius debet, quæ planè eadem est cum Li-
lij colore & essentia, id quod conferenti hos duos
flores manifestum fiet.

LOCVS.

In montosis & apricis nascitur.

TEMPVS.

In Iunio mense potissimum compâret.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & humidum est, quamobrè gustu dul-
ce apparet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix in vino austero, nigro, ad opisthotonum
bibitur. Ferunt etiam hanc impetum ad Venerem
excitare.

EX GALENO.

Satyrion excrementitiã & flatuosã humidi-
tatem possidet, quocirca ad Venerem incitat. Hæc
verò & herbæ ipsius radix præstare potest. Porro
vt nonnulli scribunt, cum vino nigro austero potum
opisthotonum

PLANTARVM HISTORIAE

opisthotonum sanat.

EX PLINIO.

Radix cū Satyrio gemina sit, eius inferior pars
et maior mares gignit, superior ac minor fœminas.

DE SATYRIO BASILICO.

CAP. CCLXXI.

NOMINA.

Palma
Christi.
Digiti ci-
trini.

Σ ατύριον βασιλικόν posterioribus Græcis,
Satyrium regium Latinis, Officinis Palma
Christi, Arabibus Bucheiden, Auicennæ Digiti ci-
trini, Germanis Kreutzblumen, (Gallis Du Sa-
tyrium royal) vocatur. Palmam Christi propter
similitudinem quam eius radix cum humana ha-
bet manu, dixerunt.

GENERA.

Mas.

Fœmina.

Duo eius sunt genera, quorum alterum mas folia
non maculosa. florésque purpureos habet. Alterum
fœmina maculosis est & paulò latioribus foliis,
floribus in purpureo albescentibus. Radicum etiam
in colore est differentia, quòd maris quidem radix
flauescat citra albedinem, fœmina autem cum al-
bedine. Quam sanè differentiam Auicenna etiam
expressisse videtur, dum vnā ex flauo & albo
commistam esse colore, alteram verò ex flauo sine
albedine inquit.

FORMA.

Folia cum reliqua superficie Cynosorcho similia
sunt. Radix tamen ei subest lutea aut flauescēs, in-
star

star manus ramosa: modo enim quatuor, modo quinque, modo sex aut plures radices prodeunt, quæ fecerè humanos digitos imitari videntur.

LOCVS.

Prouenit in montibus, & locis soli expositis.

TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus inuenitur. Mas quidem Iunio, femina verò Maio.

TEMPERAMENTVM.

Vtrunque amarum est, magis tamen amarum quod maculosis constat foliis. Ideoque non perperâ censent Auicenna & alij quidam ex recentioribus medicis, qui calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt.

VIRES. EX RECENTIORIBVS.

Vsus eius ad erugandam cutem, ad nervorum dolores, & cōtra noxia medicamenta. Fertur & amuletum esse radix gustata. Semen ex vino sumptum nouem diebus, comitiales sanat. In eundē effectum vinum diluitur herbæ decocto. Scobs radicis propinatur in vino ad arcendam quartanā, quam & vomitione curat paulò ante accessionem pota. Plura in præsentia rescire de huius facultatib. non licuit.

DE SVCCISA. CAP. CCLXXII.

NOMINA.

Quo nomine veteres aut posteriores Græci appellauerint hanc herbam, cognitamque illam habuerint nec ne, nobis nondū constat.

PLANTARVM HISTORIAE

Succisa. *stat. Nonnulli Geum esse arbitrantur. Nos Succisam nominare voluimus, partim quòd id nominis Latinum esset, & pulchrè huic herbae quadraret, cuius radices circūrosae sunt, partim quòd antiquus manuscriptus herbarius sic vocaret. Vulgus superstitione quadam motum credit cacodæmonia, tantæ efficaciæ radicē invidere hominibus, atque hac ratione ubi succreuerit statim cum vndiquaque circumrodere. Hinc est quòd Diaboli morsum appellant. Quam etiam superstitionem plusquam muliebrem secuti Germani Teuffels abbißz, (Galli Mors de Diable) hoc est, præmorsam à diabolo, nominant.*

**Morsus
diaboli.**

FORMA.

Binum cubitorum fastigiatur altitudine, foliis Plantaginis minoris, aut Cirsii lenioribus, solidioribusq; leniter laciniatis. Floribus purpureis. Radicibus subnigris, succisis & circumrosis.

LOCVS.

Nascitur locis incultis & montanis, saltibus, ac interdum etiam pratis & dumetis.

TEMPVS.

In Augusto eius magna est passim in locis iam dictis copia.

TEMPERAMENTVM.

Supra modum amara est, vnde calidam & siccam esse satis constare cuius potest.

VIRE S.

Præsentaneo remedio ad maturandos, atq; aded sanandos

sanandos carbunculos adhibetur, si herba viridis trita imponatur, aut vinum in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estur, aut vinum eius decocti in vulua doloribus bibitur. Hæc manuscriptus herbarius. Hodie, cū habeat facultatem discutienti & incidendi, vtuntur ea ad dissoluendos sanguinis grumos.

DE SCABIOSA. CAP. CCLXXIII. NOMINA.

ET hæc herba quo nomine Græcis vocetur, scitemur nos ignorare. Sunt qui Actio ἰώεον dictam velint: verum cum nomine tenus cum tantum prosequatur non adiecta descriptione, nihil certi cōstitui potest. Vulgus Scabiosam vocat, quo nomine nobis vtendum erit donec legitimum compertum fuerit, Germani Scabiosen, oder Apstemkraut, (Galli La Scabieuse) nomināt. Scabiosam verò aut à scabro herbe habitu, aut quod scabiei medeatur, appellatam esse euidentissimum est: id quod etiam Psora vox præterevidetur. Stæben Dioscoridis non esse multis argumentis constat, quæ prætereo.

Scabiosa.

Scabiosa
vnde dicta.Scabiosa
nō est Stæbe.

FORMA.

Folia carnosæ: Eruce modo laciniata & multifida habet, subhirsuta, non tamen aculeis horrētia. Flores speciosos, diurnos, coloris ex casio aut purpureo albicantis. Radicem crassam.

LOCVS.

CC

Passim

PLANTARVM HISTORIAE

Passim in omnibus, potissimum autem humidis pratis prouenit.

TEMPVS.

In Iunio, antequam gramine denudentur prata, passim floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum sit vehementer amara, calidam & siccam esse nemo nescit, idemque cum Succisa temperamentum habet.

VIREs.

Easdem quas Succisa facultates obtinet. Potissimum autem scabiem & tussim sanat.

DE SMILACE ASPERA.

CAP. CCLXXIIII.

Smilax aspera etiam foliorum ambitu spinoso modo solo stipite in Gallia Narbonensi visitur.

NOMINA.

Smilax et Milax. Σ $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma \tau\rho\alpha\chi\epsilon\acute{\iota}\alpha$ Dioscoridi, $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma$ Gale-
no, Smilax aspera Latinis dicitur, officinis nostris incognita, Germanicè Grosz Stechend oder scharpff Vuindt, ab aculeis quos habet, nominari aptè potest.

FORMA.

Folia habet Peryclimeno similia, vel, ut Theophrastus ait, hederacea: ramulos multos, tenues, paliuri aut Rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sursum deorsum se circumagens. Florē candidum,

didum, fructum racemosum fert, cum maturuerit
rubentem, gustu leuiter mordentem. Radicē cras-
sam & duram.

LOCVS.

In palustribus & asperis nascitur, Plinio autem
teste in conuallibus opacis.

TEMPVS.

Smilacem quidem asperam nascentem, non vidi:
sicca enim aliunde ad me transmissa est, ita vt cer-
tò indicare quo tempore florcat aut fructum produ-
cat, haud possim. Id quod ideo referre volui, ne nos
calumniadi ansam habeat os peruersus, si non ex
omni parte picturam nativæ ipsius herbæ formæ
respondere viderit. Cogitet enim non viridem, sed
siccā nos pingendam tantum dedisse. Theophra-
stus tamen lib. iij. cap. vlt. de hist. plant. hanc verno
tempore florere scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quale sit eius temperamentum, vires satis decla-
rāt, & folia ipsa atque fructus, quæ singula in gu-
stu lenem quandam mordicationem præ se ferunt,
vt calidum esse & siccā haud dubium sit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius folia & fructus si antè & post bibantur
contra letalia venena efficacia sunt. Traditum est,
quòd si quis tritum eorum aliquid nuper genito in-
fanti bibendum dederit, nullum illi postea venenum
nociturum. Conciditur etiam in alexipharmaca.

PLANTARVM HISTORIAE

EX GALENO.

Milax aspera clauiculis plena est, vt arboribus sursum deorsum diuersimodè circumuoluatur. Folia gustata acrimoniam aliquam habent, & alioqui si illis vtaris, calefaciunt.

EX PLINIO.

Coronā ex ea factam impari foliorum numero, aiunt capitis doloribus mederi. Contra venenata efficacissimi acinorum corymbi, in tantum vt acinorum succo infantibus saepe instillato, nulla postea venena nocitura sint.

DE SMILACE LAEVI. CAP.

CCLXXV.

Smilax laevis Liset & Liseron à ligandis quibus adnascitur plantis hic pingitur.

NOMINA.

Volubilis
maior.

Funis ar-
borum.

Smilax
laevis cur
nominata.

Σ $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\kappa\acute{\iota}\lambda\epsilon\alpha$ Dioscoridi, $\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\kappa$ Galeno, & Paulo dicitur. Latinis Smilax laevis. Officinis & herbariis Volubilis maior, à nonnullis Camponella, & Funis arborum, Germanis Vuindenkraut, glatte Vuinden, oder Vucisz glocken (Gallus des Phasceles) vocatur. Laevis autē non alia ratione, nisi quòd aculeis careat, dicta est.

FORMA.

Hederae similia folia habet, molliora tamen, lauiora et tenuiora. Ramulos supra dicta similes, aculeis carētes. Cōuoluitur & hac arboribus, vt prior. Fructum fert Lupino similem, nigrum, paruum, super

super quem semper flores albi, copiosi, & orbiculati per totam Smilacem exeunt. Aestate tabernacula per ipsam fiunt, autumno autē folia cadūt. Ex qua descriptione planum fit omnibus, herbam hāc quā vulgus herbariorū Volubilem maiorem vocat, esse Smilacem leuem, quod illi scilicet singula nota à nobis commemorata conueniant. Id quod etiam pictura Smilacis aspera, si cum hac cōferas, satis demonstrat, quam vno hoc nomine dedimus, vt ex eiusdem collatione manifestius leuis ipsa agnosceretur. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, qui Smilacem leuem, Volubilem maiorem interpretatur. Eius etiam pictura, Volubile quam maiorem appellamus, penitus exprimit.

LOCVS.

Nascitur passim per fruteta, & sepibus sese inuoluit. Amat culta, & in iis etiā potissimū gignitur.

TEMPVS.

Aestate floret, autumno semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Modicam amaritudinem in gustu præ se fert.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius semen cum Dorycnio, & vtrunque trium obolorum pondere potum, somnia multa & turbula lenta facere fertur.

EX GALENO.

Milax leuis facultate quodammodo prædicta similis est.

PLANTARVM HISTORIAE
EX PLINIO.

Nullius est effectus.

APPENDIX.

Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidas vtuntur passiones, capitis potissimū & oculorū.

DE SISYMBRIO. CAP.

CCLXXVI.

Sisymbrium alterum seu Cardamine crescio, à crescendi celeritate vulgò dicitur.

NOMINA.

Corona
Veneris.

Σισύμβριον Græci, Sisymbriū Latinis, (Gallus Cresson) appellatur. Sisymbriū dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit veteribus comædiis meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, vel quòd ob odoris suauitatē quam præ se fert, eo inuentus quæ amoribus gaudet coronata, in comessionibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret. Vel potius, quòd Sisymbrii caulis articulatim per internodia verticillato florum ambitu concinne coronetur.

GENERA.

Sisymbrii duo sunt genera. Vnum quod simpliciter **Balsamiter** Sisymbrium dicitur: hoc seplasiarij Balsamita, ut manuscriptus etiam testatur herbarius, vulgus autē Mētham aquaticam, Germani Fischmütz, aquatica. Vuassermuntz, oder Bachmuntz vocant. Alterum cum adiectione Sisymbrium cardamine nominatur. Officinis Nasturtium aquaticum, Germanis Brunnenkresz.

Brunnenkresz. Sic verò dictū, quòd sapore Cardamum, hoc est Nasturtium, imitetur.

FORMA.

Sisymbrium hortensi *Mentha* simile, quadrato *Sisymbrium* caule, quadantenus purpurascēte, foliis *Menthæ*, brium serratis, latioribus & odoratioribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu. *Sisymbrium* cognomento cardamine *Sisymbrium* folia inter initia orbiculata habet, cū autem crebrius caruerint vt *Erucae* folium laciniatim finduntur. Caulis damine. le proslit cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alaribus cauis cirri frequentes sinuatim erumpunt. Flore candido. Semine *Erucae* instar in siliquis acris & exiguis.

LOCVS.

Vtrunque riguos tractus amat. Primum autem potissimum circa stagna & piscinas nascitur. Alterum nusquam non in aquatilibus.

TEMPVS.

Aestate, potissimum verò Augusto mense, cum *Mentha* florent.

TEMPERAMENTVM.

Sisymbrium primum excalescit atque resiccat in tertio ordine. Alterum autem quum siccum est, itidem tertij est ordinis excalescentium & exiccantium: quum humidum & viride, secundi.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sisymbrium primum vim calfaciendi obtinet.

PLANTIARVM HISTORIAE

Semen eius ad strangurias & calculos cū vino potum prodest. Tormina & singultus sedat. Folia temporibus & fronti illinuntur contra capitis dolorem. Aduersus etiam apum & vesparum ictus valent. Vomitiones potum sistit. Alterum cardamine cognominatum calefacit, vrinam ciet. Comeditur quoque crudum. Lentigines & cutis à sole nigriciē & asperitatem exterit tota nocte illitum, mane autem ablutum.

EX GALENO.

Sisymbrium primum tenuium partium est, digerentis, calefacientis & exiccantis facultatis. Semen quoque eius tenuium partiū est & calidum. Quos circa ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Sisymbrium quod quidam Cardaminen vocant, quandoquidem Cardamo, id est, Nasturtio simile quiddam gustu praefert, eadem ferè potest.

EX PLINIO.

Vtrūque Sisymbrium efficax aduersus aculeata animalia, vt sunt crabrones & similia. Sedāt capitis dolorem, item epiphoras. Alij panē addunt. Alij perse decoquunt in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierū intra quartum diem noctibus impositam, diebusq; detractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum grauidis nisi mortuo conceptu. Quippe
etiam

etiam impositum eiicit. Mouet urinā cum vino potum. Syluestre & calculos. Quos vigilare opus sit excitat infusum capiti cum aceto.

DE SIO. CAP. CCLXXVII.

Sio seu Lauer diuersissimam pingit ab ea quam medici & officinæ syllabarum metathesi vocant verlá, & ad nephriticos affectus vti & Cardamine plantam persimilem & congenerem feliciter vsurpant.

NOMINA.

Σίον, ἡ ἀναγallis ἑνὸς ποσ Græcis: Sion, Lauer & Anagallis aquatica Latinis dicitur.

Officinis ignota herba. Germanis Vuasserpungen, Bachpungen, oder Pungen (Gallis de la Berle) appellatur. Sion autem nomen sibi adscinit à concussu, quod Græci σείειν dicunt: nam excutiendi vim nactum est, utpote quod à renibus calculos pellat, urinā & menses ducat. Anagallis aquatica, quod flores eius Anagallidis sceminæ floribus per omnia respondeant. Lauer nomen haud dubiè à lauando contraxit, quod sonantibus aquis enatum semper elui gaudeat.

Sion vnde dictum.

Anagallis aquatica. Lauer.

FORMA.

Pusillus est frutex, rectus, pinguis, foliis latis, Olusatro similibus, minora tamē, & odorata. Quæ delineatio prorsus astipulatur huic herbæ quæ Germani Vuasserpungen nomināt. Hæc enim riuuslis gaudet, frutex pusillus pinguisq; est, latis foliis,

Hippofelino

PLANTARVM HISTORIAE

Hippofelino similibus, & digitis leniter friata incundum expirantib. odorem. Floribus cœruleis, Anagallida fœminam referentibus.

LOCVS.

Inuenitur in aquis citato lapsu repentibus, aut etiam resedibus. Sape verò intumescantibus demersum videtur.

TEMPVS.

Iunio mense floribus pragnans est.

TEMPERAMENTVM.

Quā amara admodū sit hæc herba, ut calefaciat & exiccet necesse est. Atq; hinc iterum colligere licebit, ut patebit ex verbis Aetij, eam esse Sium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sij folia cocta crudaque comesta calculos cōminuit & excernunt. Vrinam mouent. Fœtus & menses educunt. Dysentericis vtiliter comeduntur.

EX GALENO.

Sium quantū gustu odoratum est, tantum etiam calefacienti facultatis est particeps. Digerit autem & urinam mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

EX AETIO.

Sium quatenus gustu odoratum est, eatenus calefacit, & exiccat. Discutiendi etiam vires habet, urinam mouendi, calculos in renibus dissoluendi, ac menses ciendi.

EX PLINIO.

Prodest vrinis, renibus, lienibus, mulierūque mensibus,

mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semen è vino drachmis duabus. Calculos rumpit, aquisq; quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest infusum. Item lentigini illitum, & mulierum vitiiis in facie, noctu illitum momento cutem emendat, & ramices lenit, & scabiem equorum.

APPENDIX.

Veterinarij in hodiernum vsq; diem hac herba in tumoribus discutiendis, & scabie equorū sananda vtuntur, vt hinc manifestum fiat illam esse Sium.

DE STRATIOTE MILLEFOLIA. CAP. CCLXXVIII.

NOMINA.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὁ χιλιόφυλλος Græcis, Stratiotes millefolia Latinis, officinis & herbariis, Millefolium, Germanis Garben, Schafgarben, Schafripp, Tausendtblatt, & Geruuel, (Gallis Millefeuille, ou Cumin, ou Aneth saulauge) nominatur. Stratiotes verò Stratiotes Græcis, id est, militaris dicta est, quòd vulnera fer vnde dirro facta sanat, atque adeo in militia & castris multatus eius vsus sit. FORM A.

Frutex est exiguus, dodrātalīs & maior. Folia habet pulli anium pennis similia. Sūntque foliorū exortus admodum breues, incisuris diuisi. Breuitate verò & asperitate Cumino syluestri maximè assimilantur, & etiamnum breuiora. Huius denique umbella densior & plenior: surculos enim in cacumine

PLANTARVM HISTORIAE

cacumine paruos habet, in quibus Anethi modo umbella sunt. Flores illi candidi & exigui sunt.

LOCVS.

Nascitur in agris asperis, & præcipuè circa vias ac semitas.

TEMPVS.

Per integram floret æstatem.

TEMPERAMENTVM.

Nonnihil adstrictionis habet, atq; adeò exiccat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eximiè utilis est herba ipsa ad sanguinis eruptionem, & ad vlcera vetera ac recetia: itē ad fistulas.

EX GALENO.

Vulnera glutinare potest, & vlceribus utilis est. Sunt qui ea ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas.

EX PLINIO.

Hetruria Millefolium appellat herbam in prætis tenuem, à lateribus capillamēti modo foliosam, eximij vsus ad vulnera. Boum nervos abscissos vomere, solidari ea rursusq; iungi addita axungia affirmant.

APPENDIX.

Recentiores ad eisdem vsus millefoliū suum adhibent, ad sananda nimirum omnis generis vulnera, dissoluendum sanguinem concretum, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefolia nō esse diuersum omnibus perspicuum fit.

DE SARRACENICA SOLIDA-
GINE. CAP. CCLXXIX.

NOMINA.

QVVM nobis non constet quo nomine veteris
bus nominata sit herba hæc, placuit vsitatã
ac tritam nostri temporis herbariis ap-
pellationem vsurpare, donec veriore comperire
contingat. Non tamen latet à nonnullis corrupta Herba for-
voce Cartasflaginem, vel magis deprauata Filagie tis non est
nem nominari, cum dicendum esset Ceratophylæ Cartasila-
cem, quia nimirum partem oculorum ceratoida, go, seu vt
hoc est, corneam defendat, salutique percussam ac rectius di-
lesam restituat. Cur verò hoc nomine non appel- cã, Cerato-
landam censeam, facit in primis quòd descriptio phylax.
Ceratophylacis illi non conveniat. Dein quòd pi-
etura eiusdem in manuscripto herbario illi herbe
quam Fortem vocant, prorsus non respondeat. Her-
bam itaque Fortem, vel vt alii habent Sortis, non
minamus eam quæ Germanis heydnisch Vund-
kraut vocatur, quòd fortè à Sarracenis reperta pu-
tetur. Hinc, ni fallor, à quibusdam Consolida Sar-
racenica dicitur. Fortis verò à vehementi odore.

FORMA.

Caulem rubescentem, duum triumve cubitorum
ac cauum habet, è quo prodeunt folia oblonga, in
extremitatibus serræ modo incisa, Saliciq; similia.
Flores luteos in pappos cuanescentes. Radicem mul-
tifidam, forisq; rubentem.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur in syluis & in montibus altis. Copiosè autem in monte post arcem Tubingensem, quæ Germanico nomine die odenburg vocant, prouenit.

TEMPVS.

Augusto mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, modicèq; amara est, atque adeò siccare euidentissimum est.

VIRESEX RECENTIORIBVS.

Vulneraria herba est, id quod Germanica appellatio abundè satis monstrat. Imposita itaq; vulneribus carnem primum generat, dein statim glutinat. Sicca in puluerem trita recentia vulnera, si inspergatur, celeriter sanat. Fistulis etiam medetur, malignaq; vlcera mundificat, ac confestim sanat.

DE SAXIFRAGA. CAP.

CCLXXX.

NOMINA.

Ἀρσίφραγον, ἢ σαρσίφραγον, ἢ ἔμπετρον Græcis, Saxifragon & Saxifraga Latinis. Officinis quibusdam perperam

Capillus Veneris dicitur, vt in Adianto docuimus.

Rectius muraria ruta vocaretur. Sunt qui Saluiā

Saxifragam vitam hodie nomenclant. Germanis Maurrauten gon cur di & Steinrauten appellatur. Saxifragon, quòd cal- culos è corpore pellat frangatq;. Empetron verò,

Empetro. quoniam in saxis proueniat. Officina hodie alias prater

præter hanc latinorum Saxifragas ostendunt, de quibus suo dicemus loco.

FORMA.

Surculosus frutex saxis hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, foliis Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa verò parte annexa puncta habentibus, sine flore, sine semine, radice nigra supernacua.

LOCVS.

In saxis & asperis locis provenit. Ideo eius magna copia inuenitur apud vetusta ædificia, in lapidum commissuris.

TEMPVS.

Vere & æstate inuenitur, potissimum autem Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Satis ex facultatibus eius gustuq; in quo manifesta quedam adstrictio apparet, colligitur hanc herbam calidam & siccam esse.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

In vino cocta & pota, febricitantibus opitulatur, stranguria & singultui medetur. Lapidem vesicae frangit, & vrinam mouet.

EX PAVLO.

Saxifraga vrinam ciet, & calculos conterit.

DE SILIQVASTRO. CAP.
CCLXXXI.

Siliqua

PLANTARVM HISTORIAE

Siliquastrum & piperitis quę quibusdam piper Indicū dicitur, aliis cardamomi genus putatur, in siliquis Pyramidalibus semen habet rufum, latum, iura croci colore tingens & piperis sapore condiens.

NOMINA.

Siliquastrum.

Siliquastrum conuenientissimo nomine à Plinio lib. xx. cap. xvii. dicta est herba hac, à siliquis nimirū magnis & oblongis quas producit. Ea-

Piperitis.

dem etiā ab eodē Piperitis, quod semen eius gustatum piperis saporem & acrimoniā pra se ferat, nominatur. Alia tamē est ab ea quā vulgō Piperitim appellant, ut suprà etiā monuimus. Sunt qui piper

Piper Indianum.

Hispanū, alij piper Indianum, nonnulli etiā piper ex Chalechut vocant. Auicenna videtur appellare

Zingiber caninum.

Zingiber caninum. Germanicē dici potest Chalechutischer oder Indianischer Pfeffer.

GENERA.

Maius & minus est Siliquastrū. Maius siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus contrā minores profert, & colore puniceas. Nos tamen utrunque genus vna pictura cōplexi sumus utq; hiantes duę pingerentur siliqua curamus, nō sanē quod sponte sua sic rumpatur, sed ut quale intus esset semen cerneretur. Prater hac, genera alia sunt bina, quorū vnum longissimas & colore puniceas, alterū verō latiores multoq; breuiiores producit siliquas. Damus itaque quatuor Siliquastrū

quastri distincta genera, vt ex pictura manifestissime deprehenditur. Horum primū discriminis gratia maius, alterum minus, tertium longum, quartum latum appellauimus Siliquastrum.

F O R M A.

Herba est caule rubro & longo, crebris geniculis, foliis Lauri, floribus candidis, semine in siliquis oblongis & magnis albo, vel potius flauescente, tenui, gustu Piperis acerrimo. Radice vnica, subalba, capillamentis fibrata. Ex qua nimirū delineatione satis constat herbā cuius picturam damus, esse Plinij Siliquastrū seu Piperitim. Caule siquidē vt ex Castore collegit Plinius, rubro & longo, densis etiam geniculis, vnde folia Lauri foliis similia erumpūt, semine albo, tenui admodum, gustu piperis. Quibus omnibus etiam Siliquastrū & Piperitidis nomenclaturæ, quæ huic optimè quadrant, accedunt.

L O C V S.

In Germania iam in fictilibus ac testaceis satum passim ferè prouenit. Per paucis antè annis Germanis incognitum fuit.

T E M P V S.

Aestate quidem floret, atque mox decedente flore siliquæ primum herbaceæ, dein punicæ aut fusci coloris subnascuntur, plenæ semine.

T E M P E R A M E N T V M.

Valèter excalfacit atque desiccant, id quod seminis immensa acrimonia, & foliorum amaritudo

PLANTARVM HISTORIAE

euidentiſſimè monſtrat: vt certè non temerè pleris
que hoc ſemine loco veri Piperis vtantur: eaſdem
enim facultates handdubiè habet, quas etiam ex
Dioſcoride ſumptas ſubiiciemus.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Piper cõmuniter calefaciendi facultatem habet,
vrinam mouendi, concoquendi, extrahendi, diſcu-
tiendi, & quæ pupillas oculorum obtenebrant exte-
rendi. Prodeſt rigoribus circuitu certo inuadenti-
bus potum & inunctum. Venenatorum morſibus
ſuccurrit. Factus ex utero ducit. Tuſſi & omnibus
thoracis affectibus in eclegmate & potu ſumptum
auxiliatur. Cum melle inunctum angina correptos
iuuat. Tormina cum teneris Lauri foliis potum ſol-
uit. Pituitam ex capite purgat cum Staphyſagria
commanducatum. Dolores leuat, valetudinẽque
tuetur. Appetentiam mouet. Concoctionem adiu-
uat ad intinctus additum. Strumas cum pice exce-
ptum diſcutit. Cum nitro alphas abſtergit.

EX PLINIO.

Siliquaſtrum vtile gingiuis, dentibus, oris ſuaui-
tati, & ructibus.

APPENDIX.

Auicenna Zingiber caninum abſtergere cutis &
faciei maculas, lentẽſque tradit. Item ſtrumas a-
liõſque tumores, eius ſemen digerere ſcribit, vt hinc
etiam eaſdem cum verò Piperis habere facultates
colligere liceat.

Κόρεον Græcè, Allium Latine appellatur. Officinæ Latinum nomen retinuerunt.

Germa. Knobloch, oder Knoblauch

(Gallicè Ail, ou Aulx) Scorodon autè dicitur, Scorodon ut nonnullis placet, quasi σκωδὸν κόρεον, id est, ru unde dicitur Rosa, quòd asperè supra modum redolcat, & ol factum. facientium nares offendat. Latini Allium à Græco Allium. fortassis verbo ἀλλεῖν, id est, exilire vocāt, quòd nimirum exiliendo crescat.

G E N E R A.

Tria in vniuersum Allij sunt genera. Vnū hortense Allij hortense & satium domesticumve, quod Germani garten-ten oder heymisch Knoblauch vocāt. Alterū sylvestre quod Græci ὀφιοσκόρεον, id est, anguinum Allij nominant, in aruis ac campestribus sponte Anguinū nascens. Cuius nos duo genera damus, quorum prius Allium. mum Germanis Vuilder Knoblauch dicitur, alterum verò Feldknoblauch. Tertium itidem sylvestre, vrsinum cognominant, in syluis proueniens, Vrsinum. Germanis Vualdknoblauch appellatur.

F O R M A.

Allium hortense fronde viret cepitia, caule tereti Hortense. ti & inani. In cacumine flores in globū circūaguntur, in quo semē emicat. Radicis bulbus tenuis, ve-

PLANTARVM HISTORIAE

latur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & iis separatim vestitis, in cuius vertice complures fibrae cirrorum exemplo crispantur, tadioso habitu & aspero sapore. Sylvestre foliis constat praelongis, teretibus, intus concavis, iuncum speciem representantibus, caule procero, leni, purpureos flores ostendente, cacumine tum colore tum forma conspicio, radice bulbosa & capitata, nucleis spicatum compactilibus intumescente, summo vertice capillamentis fibrato. Vrsinum odore molli, foliis gradibus, & Ephemeris non letalis foliis similibus, floribus in summo candidis, capite praetenui.

LOCVS.

Hortense passim in hortis satum & plantatum provenit. Sylvestre sponte in aruis, ut diximus, & campestribus nascitur. Vrsinum autem in nemoribus.

TEMPVS.

Hortense & sylvestre aestate florent. Vrsinum autem vere, Aprili & Maio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Allia desiccant & calfaciunt quarto excessu.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Facultas Allio est acris, calfacit, flatus excernit, aluum turbat, stomachum exiccat. Sitim efficit. In-

Legendum flationes permutat alteratque, & summam corporis in Dioscoro cutem exulcerat. Eadem potest Anguinum allium. Comaride, non estum latos ventris lumbricos expellit. Urinas dupliciter cit. Contra viperarum morsus & hemorrhoidum prodest.

prodest, ita vt non aliud magis, si vinum iugiter sumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabio-
 forum morsus vtiliter illinitur. Allium ipsum in ci-
 bo sumptum contra aquarum mutationes confert.
 Asperas arterias clarificat. Veterem tussim crudū
 & coctum comestum lenit. Cum origani decocto po-
 tum, pediculos & lendes enecat. Vstum & cū mel-
 le subactū illitumq; , hypopya & alopecias sanat.
 Exanthemata cum nardino vnguento, sale & oleo
 curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, le-
 pras, furfuresq; eximit. Cum teda & thure deco-
 ctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat.
 Cōtra muris aranei morsus cum ficulneis foliis, &
 Cumino illinitur. Comæ decoctum in infestationibus
 menses & secundas trahit. Eiusdem gratia suffitus.
 Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Graci
 μντλωτὸν vocant, vrinam cit, & obstructiones a-
 perit. Vtile etiam hydropicis.

EX GALENO.

Excalescit corpus, crassos in eo humores exte-
 nuat, glutinososq; incidit. Bis tamen aut ter in aqua
 decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam nec sic
 quidem vim perdit extenuandi, verum facultatem
 quandam obscurissimā alendi corporis acquirit, cu-
 ius antea quā coqueretur, nihil prorsus obtinebat.
 Cæterum Allium non modò vt opsonium, verum
 etiam vt medicamentum sanitati accomodū, quod
 obstructa soluere & discutere possit, vsurpatur. Est

PLANTARVM HISTORIAE

autem Allium ex eorum ciborum genere, qui & flatum discutiant, & minimè sitim inferant. Ophioscorodon domestico, vel reliqua omnia sylvestria, valentius est.

EX AETIO.

Allium comestum flatus discutit, sitim reprimat. crassos & lentos humores incidit. Habet tamen quidpiam virosum, & mali succi, quod amittit si aqua elixetur. Ab eius assiduo vsu praesertim calidas temperaturas cauere oportet.

EX PLINIO.

Allio magna vis, magna etiam utilitates contra aquarum & quorumlibet locorum mutationes. Serpentes abigit & scorpiones odore: atque, ut aliqui tradidere, bestiarum omnium ictibus medetur, potu vel cibo, vel illitu. Priuatim contra hemorrhoidas prodest, cum vino redditum vomitu. Ac ne contra araneorum murum venenatum morsum valere miremur, aconitum, quod alio nomine pardalianches vocatur, depellit: item Hyoscyamum: contra canum morsus, inque vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum restibus suis, efficacissime ex oleo illinitur. Attritisque corporum partibus, vel si vesica intumuerit. Quin & suffitus eo, secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo, capitis ulcera manantia sanitati restituens. Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Dioscles hydropicis cum Centaurea, aut in fico duplici

ad euacuandam aluum: quod efficacius præstat vi-
ride, cum Coriandro in mero potum. Suspiriosis ali-
qui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras &
contra morbum regium vino miscuit: & contra ileū
in oleo & pulte, sic illinens. Strumis quoque. An-
tiqui & insanientibus dabant crudum. Diocles
phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi
& gargarizare prodest. Dentium dolorem tri-
bus capitib. in aceto tritis imminuit: vel, si decocta
aqua colluatur, addaturq; ipsa in caua dentiū. Auri-
bus etiā instillatus succus cū adipe anserino. Phthi-
riases & prurigines potum, tusum item in aceto &
nitro. Compescit & destillationes cum lacte coctū,
vel tritum permixtūve casco molli: quo genere et
raucitatem extenuat: vel phthisin, in fabæ sorbitio-
ne. In totum autem coctū vtilius est crudo, elixūm-
que tosto, sic & voci plus cōfert. Tineas & reliqua
animalia interancorum pellit, in aceto mulso co-
ctum. Tenaismo in pulte medetur. Temporum do-
loribus illitum, elixum, & pustulis coctum cū mel-
le, deinde tritum. Tussi cum adipe vetusto decoctū,
vel cum lacte. Aut si sanguis etiam excreetur, vel
purulēta sint. Et pituita sub pruna coctum potum,
& cum mellis pari modo sumptū. Conuulsis & ru-
ptis cum sale & oleo. Nā cum adipe tumores suspe-
ctos sanat. Extrahit fistulis vitia cū sulphure et re-
sina, etiā harundines cū pice. Lepras, lichenas, len-
tiginas exulcerat, sanátque cum origano, vel cinis

PLANTARVM HISTORIAE

eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sanguillata aut liuentia ad colorem reducit, combustum ex melle. Credunt & comitiale morbum sanare, si quis eo in cibo vtatur aut potione. Quartanas quoque excutere potum caput vnum cum Lasertii obolo. In vino austero tussim, & alio modo acceptum. Suppurationes quātaslibet sanat, fracta in coctum fabae, atque ita in cibo sumptum, donec sanitatem restituat. Facit & somnos, atque in totum rubicundiora corpora. Venerē quoque stimulat cū Coriandro viridi tritum, potumq; è mero. Ceterum contra pituitam & gallina & gallinaccis prodest. Mixtū farre in cibo, iumentis vrinam reddere, atque nō torqueri tradunt, si eo trito natura tēgatur.

EX SIMEONE SETHI.

Commodissimum est crassum & tenacē, aut crudum humorem aggregantibus: eum enim includit, & obstructions ab eo factas tollit. Habet verò quippiam mali succi, quod decoctum aqua abiicit. In frigidis temperaturis saepe sanitatem praeservat. Temperatura verò calidos laedit, & maximè oculos, caput, pulmonem, & renes eorum. Proprietate autem quadam sitim à salso humore factā sedat, & lumbricos eiicit, & flatus discutit. Et si verò sanum visum offendat, nihilominus tamen eius hebetudinem propter humiditatem ortam sanat. Semen in calidis corporibus exiccat. In frigidis verò & humidis corporibus idē calefacit, Venerēq; excitat.

Est

Est etiã remediũ contra venena et morsus venenatorum, perinde atque theriaca: vnde & Gal. hoc theriacam rusticorũ vocat. Hoc ipsum fugiunt serpentes, tanquam Rutam. Quapropter Persæ coquinas ipsorum Alliis replent. Non solũ autem flatus discutit, sed etiam horum generationem prohibet. Colicos affectus à flatibus ortos, & diurnos coxendicum qui à pituita proueniunt dolores, iuuat. Alimentum & sanguinem extenuat, & faciem rubificat, asperamq; arteriam purgat. Si verò assetur, & corrosis dentibus aut propter humiditatem dolentibus imponatur, prodest. Non solum verò sumptum ad venenatorum morsus confert, sed etiã postquam tritum est, superpositum. Ledit prægnantes & lactantes, mensesq; ducit.

DE SANCTI IACOBI FLORE.

CAP. CCLXXXIII.

NOMINA.

NVM herba hæc veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit, nondum certò affirmare aut inficiari audeo. Vulgus tamen herbariorum sancti Iacobi florem aut herbam nominat. Officinis incognita est. Germani S. Iacobs blũ (Galli L'herbe de S. Iaques) appellant.

FORMA.

Herba est fruticosa, cauliculis rubente, multifariam striato, foliis exiguis, Eruca instar confectis, floribus luteis, forma Chamameli floribus haud dissimis.

PLANTARVM HISTORIAE

disimilibus, radice adnascantias multas habente.

LOCVS

Nascitur in agrorum marginibus, & aquarum ripis, locisq; arenosis.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Amara est & adstringit, ideoq; calidam & siccam esse constat.

VIREs.

Recentiorum medicorum experientia cognitum est, herbam hanc vulneribus mirifice mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque iidem curare, & ne ultra serpent prohibere, impositam tradunt. Quae sane omnes facultates pulchre eius temperamento respondere videntur.

DE SELINO HORTENSI.

CAP. CCLXXXIIII.

NOMINA.

Ἑλινον ἡρτωλῶν Græcis, Apium hortense aut satium Latinis vocatur. Officina latinū retinuerunt nomen: Germanis Epffich, oder Eppich (Gallis du Pertil cultivaée, ou de quare di- Iardi) nominatur. Selinon autem Græci vocant, Etum. quasi ἑλας σευόμενον, hoc est, paludibus impulsū: paludosis enim gaudet, & in iis enatum latius exurgit.

FORMA.

Apium hortense sæpe cubitalem aequat altitudinem: caule rotundo, tenuiter striato, multisq; ramulis

mulis brachiato: foliis tripartitò dissectis, & leniter crispis, in extremitatibus laciniatis: flosculis candidis, & quibus minores haud temerè reperias: semine exiguo: radice singulari, longa, capillata. Hæc itaque herba, cuius picturā damus, est verū Apiū, quòd illi omnes respondeant notæ, adeò vt temerè nonnulli putent esse vulgare nostrum Petroselinū.

LOCVS.

In hortis satum prouenit: amat autem loca potissimum aquosa. Hinc est quòd sua sponte nō procul à Canstadio Ducatus Vuirtenbergensis oppido in paludosis proueniat.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, ac semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, & siccum in medio tertij.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Ad oculorum inflammationes cum pane aut tenui polenta illitum prodest. Aestum stomachi mulcet. Mammas grumis induratas discit. Crudum aut coctum comestum vrinam mouet. Decoctum eius radicūque potum, letiferis medicamentis aduersatur, vomitum ciens. Aluum cohibet. Semen efficacius vrinam cit. Succurrit & ferarum moribus, & iis qui lithargyrum hauerunt. Inflationes discutit. Miscetur etiā vtiliter medicamētis dolore leuantibus,

PLANTARVM HISTORIAE

lenantibus, theriacis, & tussi medentibus.

EX GALENO.

Apium vsque adeò calidum est, vt & vrinas & menses cieat. Flatus quoque discutit, & magis semē quàm herba ipsa. Ori, stomachoq; gratissimum.

EX PLINIO.

Rami Apii largis potionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Oculis illitum cum melle, ita vt subinde foveantur feruenti succo decocti, aliisq; membrorum Epiphoris per se tritum aut cum pane, aut polenta impostum, mirè auxiliatur. Pisces quoque si aegrotent in piscinis, apio viridi recreantur. Verum apud eruditos non aliud erutum terra in maiore sententiarum autoritate est. Ad cibos non est admittendum, imò omnino nefas, nam id defunctorum epulis feralibus dicatum existimant. Ipsius quoque visus claritati inimicum. Eos qui ederint sterilescere mares fœminasq; tradūt. In puerperiis verò ab eo cibo comitiales qui vbera hauriunt. Innocentior tamen esse marē. Ea q; causa est, ne inter nefastos frutices dānetur. Mammarum duritiam impositis foliis emollit. Suauiores aquas potui incoctum præstat. Succo maximè radicis cum vino lumborum dolores mitigat. Eodem iure instillato grauitatem aurium. Semine vrinam ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foveantur semine decocto sugillata reddit color, cum oui albo illitum. Aut ex aqua coctum potumq; renibus

renibus medetur. In frigida tritum oris vlceribus. Semen cum vino, vel radix cū veteri vino vesicæ calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex vino albo.

EX SIMEONE SETHI.

Vrinam cit, obstructions tollit, non inflat, magis verò flatus discutit, & menses ducit, Difficulter autem concoquitur, atque ob eam causam oportet ipsum in medio ciborum sumi. Paululum quid ventrē sistit. Proprietate verò quadam comitiales laedit, & oportet hos omnino abstinere. Sape enim quidam qui ferè ex hoc morbo conualuere, parati autem eum incidere, ex eius usu iterum comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quàm folia validius & efficacius, et eo radix. Prodest ad singultus à crassis excrementis profectos. Abstergit renes & vesicam. Obstructions in venis & arteriis factas aperit. Semen præsumptū, ebrietatem arcet. Confert etiam ad bonum & corporis odorem, multiq; crebriore huius usu grauem & corporis odorem abegerunt. Mulieres ad rem veneream promptiores facit. Si in huius decocto calculosi desistant, calculos, vt ferunt, eiicit, & difficultatem vrinae sanat & renes curat. Lactentes mulieres oportet ab eius usu abstinere: minuit enim lac.

† Alias
oris.
† Oris.

DE S. BARBARAE HERBA.

CAP. CCLXXXV.

NO

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

NEquē huius herbae aliud nomen, quān quo vulgò appellatur, afferre potuimus. Superstitione enim quidam ducti prioris temporis herbarii, diuā Barbarā herbam nominarunt. Nec nos aliud nomen vtcumque inuestigantes ex herbarie rei peritis extorquere potuimus. Germanis S. Barakraut (Gal. L'herbe de S. barbe) vocatur.

FORMA.

Caulem habet rotundum, solidum, striatum, folia Erucae modo laciniata, flores luteos, siliquas teretes, semine refertos, radicem ex obliquo prodeuntem, & oblongam.

LOCVS.

Passim in campestribus nascitur.

TEMPVS.

Maiō & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Gustanti primum subacris esse, dein parum etiā adstringere videtur, vt calidam & siccam esse nemo dubitare debeat.

VIRE S.

Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius & experientia docet. His verò potissimum vlceribus medetur quae impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit: nam quia valenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.

DE SAXIFRAGA MAIORE.

CAP. CCLXXXVI.

NOMINA.

AN veteribus Græcis & Latinis herba hæc cognita fuerit, nondum mihi constare ingenuè fateor. Vulgus herbariorum & officinæ Saxifragam maiorem, & albam, quòd scilicet mirificam in comminuendis frangendisq; calculis vim, ac flores albos habeat, hodie vocant. Germani hohen Steinbrech, vel Vneissen Steinbrech appellat.

FORMA.

Caulē habet lanuginosum, subrubicundum, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriandrī seminis quantitatem referentia adherent, partim alba partim rubea, quibus officinæ pro semine eius vtuntur.

LOCVS.

In pratis & montibus, potissimā siccis, provenit.

TEMPVS.

Maiō mense floret, dein statim evanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quum flores, folia & radix gustanti amara sint, calidam & siccam in ordine tertio esse verisimile existit.

VIREs.

Vrinā mouet, calculos frangit & conterit. Stranguriæ itaque confert: abstergit enim expurgatque, & quæ in venis est crassitiem, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit. Menses quoque cit, crassasq;

PLANTARVM HISTORIAE

saq; ac glutinosa ex thorace educit.

DE SAXIFRAGA LVTEA.

CAP. CCLXXXVII.

NOMINA.

NOmen hoc in praesentia fingere adlubuit cum scilicet aliud quo herbam hanc appellaremus non occurreret, ut hac ratione à priori discerni pos-

Saxifra- set. Saxifragam autem vocare placuit, quod nimi-
ga cur di- rum calculos frangat. Ad quod sanè nomen alluden-
ta. tes Germani Steinklee nominant, quod idem va-

let, ac si Trifolium frangens lapidem dicerent. Alio nomine gulden oder geelenklee, &, quod sententiam nostram confirmat, Steinbrechen, à comminuendo lapide appellant. Luteam verò diximus à luteis floribus, volentes eam ab alba discriminare Saxifraga. Commodissimè itaque germanicè geeler Steinbrech vocabitur. Perperam ea officina nonnulla pro Meliloto usurpant, ut suo etiam loco indicauimus.

FORMA.

Caulem cubiti ferè altitudine obtinet, folia fœno græco similia, in quouis pediculo tria: floribus pisi, multò tamè minoribus, luteis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per ramulos diffuso rotundo, radice subcandida.

LOCVS.

Passim in aruis & segetibus provenit.

TEMPVS.

Floret tota aestate, potissimum autem Iulio mense,

se, in quo semen etiam producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse gustus abundè docet: amara enim & subacris existit.

VIREs.

Abstergit, expurgat, & quæ in venis est, crassitiè incidit, atque adeo obstructions iecinoris & lienis tollit. Vrinā mouet, menses cit, lapidē frangit, & quæ in thorace sunt glutinosa extenuat & educit. Re-
ctè itaq; recetiores in obstructionibus renū & vesicae, eandemq; partium calculis hac herba vtendum esse docet. Succus etiā eius herbae ac florū eiusdem ad caliginem oculorum instillatus confert.

DE SISARO. CAP. CCLXXXVIII.

Sisarum pingit quod in hortis hodie est frequentissimum, Panacis nomine à cheruilla dicta diuersum, quæ huic Siser est fatium.

NOMINA.

Σ Ἰσάρων Græcis, Siser Latinis, vulgo Pastis Siser. naca quod ei congener sit, appellatur. Sunt qui extritis prioribus literis diminutrice forma, Serullum, aut Seruillam, aut Chernillā, pro Siser= Serullum culo nomenclant. Germani ad corruptā hanc appellationem respicientes, Gerlin & Geirlin (Gallia Cherny) vocant.

GENERA.

Duo sunt Sisari, Plinio lib. xx. cap. v. autore, ge-

PLANTARVM HISTORIAE

nera. Vnū satiuū, quod iterū duūm est generū : vnū enim magnū dicitur. Germanis groß zam Moren. Alterū verò minus, quod iidē priuatim Geir- lin, Vuelitz Morelen, klein zam Moren, vel Morchelen nomināt. Alterū erraticū quod Vuild

Baucias. Moren appellāt. Officinis nonnullis Baucias dicitur.

FORMA.

Sisarum satium. Sisariū satium caulē habet angulosum, folia oblonga & in extremitatibus incisa, flores magnū luteos, minus verò candidos, semen latū & foliaceū, radices intus cādidās, incūdi gustus, esuiq; gratissim.

Erraticū. Erraticū caule est bicubitali, foliis Pimpinella, sed maioribus, flore luteo & umbella Anethi, semine lato & rotūdo, vt satiuū, radice tenui ac lōga.

LOCVS.

Copiose in Germania nostra prouenit : gaudet enim frigidis locis. Satium quidem in hortis, erraticum verò passim in incultis, vberius autem in aspricis pratis.

TEMPVS.

Vtrūq; æstate floret, atq; subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Sisaron Paulus in tertio ordine, Galenus autem rectius in secundo calidum esse statuit. Satiuū autem siccum quidem simul in primo ordine, quādo quidem Venerem stimulat: erraticum verò, quoniā adiectam amaritudinem quandam cum lenicula adstrictione, siccius existit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Suavis

Suauiori elixa Sisari radix, stomacho utilis, vrinam cit, & appetentiam excitat.

EX GALENO.

Sisari radix cocta, stomacho grata est, & vrinam mouet.

EX PAVLO.

Sisari radix cocta, stomacho utilis est, & vrinam ciēda. Sementenue est & discussorium validumq;: idcirco iis quos singultus & tormina male habet, cum vino exhibetur.

EX PLINIO.

Sifer erraticum satiuo simile est & effectu. Stomachum excitat, fastidium discutit. Ex aceto laserpitiatum sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo, vrinam ciet, vt Opiō credit, & Venerem. In eadem sententia est Diocles. Præterea cordi conuenire conualescentium, aut post multas vomitiones perquam utile. Heraclides contra argentū vinum dedit, & Veneri subinde offensanti, agrisq; se recolligentibus. Satiui priuatim succus cum lacte capriæ no potus, sistit aluum.

DE SYCE. CAP. CCLXXXIX.

NOMINA.

Υἱὸν ἡμῶς Græcis, Ficus satina Latinis
 & officinis, Germanis Feigenbau, (Gal- Ficus.
 lis Vn Figuier) dicitur.

FORMA.

Ficus satina arbor est non magnopere procera,

EE ij quanquam

PLANTARVM HISTORIAE

quanquam amplissima quaedam inueniantur, vel pyris emula magnitudine, caudice breui, cortice laui, medulla carnosâ, folio perquâ magno vmbrosoq; profundè admodum laciniato, sine flore, pomo quod supra folij pediculum nascitur, tubinato, molli, intus granoso, succo cum maturescit lacteo, postea melleo: radicibus multis, obliquis ac longis.

LOCVS.

Iam in plerisque Germaniæ nostræ hortis plantatur, at in paucissimis fructus maturos producit. Calidiora & aprica loca amat: arbor enim omnium ferè tenerrima & delicatissima, gelicidia & glacies horret.

TEMPVS.

Germinat sub Arcturum post ver, aut paulò ante solstitium.

TEMPERAMENTVM.

Ficus arbor calidæ temperaturæ est, tenuiumq; partium, cen indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum vterque calidus est. Ficus quoque recentes & aridæ primo ordine completo calefaciunt, aut secundo incipiente: desiccant verò in medio primi.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fici maturæ, teneræ recentēsve stomacho noxiæ. Aluum soluunt, sed faciliè ab eis contracta fluxio sistitur. Exanthemata & sudores prouocant. Sitim sedant, calorem restringunt. Sicca nutriunt, calefaciunt,

faciunt, sitim magis afferunt, bonam faciunt alui. Fluxionibus tamen stomachi & vëtris inutiles: arteriæ verò vesicæ & renibus vtilis. Amicæ etiã iis quos longa valetudo decolorauit, asthmaticis, comitiali morbo laborantibus & hydropicis. Decocta cū Hyssopo & potæ, quæ in thorace sunt, purgât. Veteri tussi, & diuturnis pulmonis affectibus præsent. Aluum molliunt, tussæ cum nitro & croco mäducata. Decoctum earum arteriæ & tonsillarum inflammationibus gargarizatu cõfert. Cum hordeacea farina cataplasmati miscetur, & in muliebria fomēta cum scenogracō, aut ptisana. Cū ruta decocta, in torminibus infundūtur. Cocta, trita illitaq; duritias discutiunt, parotidas ac furunculos emolliunt. Panos maturant, maximè iride, nitro, aut calce addita. Cruda cum antedictis tussæ, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio difficiles curatu & maleficas tibiæ fluxiones sanant. Quin cum vino decocta, addito absinthio & hordeacea farina, hydropicis illita auxiliantur. Cremata & cerato cõmixta, perniones sanant. Cruda & trita sinapi humido excepta, ac auribus imposita, sonitus & prurigines curât. Succus tam syluestris quàm satiuæ Fici, coaguli modo lac coagulat, concretumq; vt acetum dissoluit. Exulcerat corpora, ac venarum ora aperit. Soluit aluum. Vterum laxat, cum amygdala trita potus. Mēstrua ciet cum luteo oni appositus, aut thyrrhenica cera.

PLANTARVM HISTORIAE

Podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis. Lepras, lichenas, disciorem à sole cutem, alphas, scabies, achoras, cum polenta expurgat. Instillatum plagæ percussis à scorpionibus, venenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur. Dētiū doloribus lana exceptus prodest, & canis eorum inditus. Myrmeciam tollit cum asidipe circumlita in ambitu carne.

EX GALENO.

Fici arboris liquor, & succus foliorum eius non mordicat tantum, aut absterget vehementer, sed & ulcerat, & ora vasorum reserat, & myrmecias eiicit. Verūm & purgare potest. Ficus aridæ tumores duros concoquunt, eosq; statim discutiunt. Atque ipse per se illita eiusmodi vim obtinent. Sed & decoctū earum eiusdem utiq; natura est. Verūm ubi magis cōcoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi verò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio est. In presentiarum hæc de caricis nouisse sufficiat. Scire verò oportet, quod quæ pinguiore sunt, magis possunt concoquere: quæ verò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Ceterū quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed & facultate. Porro Ficus virides comæsa propter admistam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen alium utraq; tum humidum sicca. Præterea Ficus comæsæ sunt, & facile

facile in totum corpus pervadunt, penetrantque. Nam & abstergerendi vi pollent haud obscura: cuius gratia commansæ, è calculosis renibus arenularum vim propellant. Carica licet multiplici utilitate commendetur, si quis tamen crebrò largiterq; esitauerit, sentiet non esse innoxias. Non admodum enim probum sanguinem gignunt, quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandiq; vim habent, quo nomine alui stimulant ad excretionem, renesq; expurgant. Iecori autem lieniq; inflammatione obsessis officiunt, velut Ficus quoque, communi ratione omnium dulcium epularum, non peculiari quadam eximia facultate. Obstructis autem illis, aut scirrhotentatis, ipsæ ex sese propriis viribus nihil prosunt, nec obsunt: sed incidentibus, extenuantibus, & abstergetibus iunctæ, nō mediocriter auxiliantur: ideoq; medici nonnulli in dictis lienis iecorisq; affectibus eas longè ante cibum cum thymo, aut pipere, aut xingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamentha, aut origano, aut hyssopo dare soliti sunt. Ad eundem modum cū alio quouis acrem qualitatem, aut omnino incidendi extenuandiq; vim gerente caricas assumere, nō solum ita affectis, sed sanis quoque ex usu fuerit. Siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, patentes apertosq; servari non solis laborantibus, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus extenuante

PLANTARVM HISTORIAE

sale, aceto garoq; conditas vulgò comedunt, experimento id vtile esse compertum habentes.

EX PLINIO.

Fici succus lacteus, aceti naturam habet: itaque coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatē pomi, & in vmbra siccatur ad aperienda vlcera, cienda menstrua, appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Podagris illinitur cum farina fœ nigraei & aceto. Pilos quoque detrahit, palpebrarumq; scabiem emendat. Item lichenas & psoras. Aluum soluit. Lactis ficulni natura aduersatur crabronum, vesparumq;, & similiū venenis, priuatim scorpionum. Idem cum axungia verrucas tollit. Folia & quæ non maturuere Fici strumis illinuntur, omnibusq; quæ emollienda sunt discutiendāve. Præstant hæc & per se folia. Et alij vsus eorum, tâquā in fricando liene & alopecii, & quæcunque exulcerari opus sit, & aduersus canis morsus. Ramorū teneri cauliculi cuti imponuntur. Idem cum melle vlceribus quæ ceria vocantur, illinuntur. Extrahūt infracta ossa cum Papaneris foliis sylvestris. Canū rabiosorum morsus, folio trito ex aceto restringunt. E nigra ficu candidi cauliculi illinuntur furunculis, muris aranci morfibz cum cera. Cinis earum è foliis, gangranis, consumendisque quæ excrescūt. Fici mature urinam ciunt, aluum solvūt, sudorem mouent, papulāsque. Ob id autumno insalubres, quoniam sudantia huius cibi opera corpora refrigerant.

gescunt. Nec stomacho vtilis, sed ad breue tempus.
 Nec voci contraria intelliguntur. Nouissima salu-
 briora quàm prima. Medicata verò nonnunquam
 iuuenum vires, augent. Scribis meliorem valetu-
 dinem faciunt, minùsque rugarum. Sitim sedant,
 calorem refrigerant: ob id non negàda in febribus
 constrictis, quas stegnas vocant. Sicca Fici stomas-
 chum ledunt, gutturi & faucibus magnificè vtilis.
 Natura iis excalfaciendi. Sitim afferunt. Aluum
 molliunt, rheumatismis eius & stomacho cōtraria.
 Vesicae semper vtilis, & anhelatoribus, ac suspirio-
 sis. Item iecinorum, renum, lienum vitiis. Corpus &
 vires adiuuant, ob id antè athleta hoc cibo pasce-
 bantur. Pythagoras exercitator, primus ad carnes
 eos transtulit. Recolligentibus se à longa valetudi-
 ne vtilissima. Item comitialibus & hydropicis, o-
 mnibusq; quae maturanda aut discutienda sunt, im-
 ponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At
 cocta cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tuſsim
 veterem. Cum vino autem ad sedem, & tumorem
 maxillarum, & furunculos, panos, parotidas deco-
 cta illinuntur. Vtilis & decocto earum fouere fœ-
 minas. Decocta quoque eadem cū fœnograeco vti-
 les sunt pleuriticis & peripneumoniacis. Cum Ru-
 ta cocta, torminibus prosunt. Tibiarum vlceribus
 cum aris flore. Pterygiis cum punico mào. Ambu-
 stis, pernionibus cum cera. Hydropicis cocta in vi-
 no, & cum absinthio & farina hordeacea, nitro
 addito.

PLANTARVM HISTORIAE

addito. Aluū sistūt māducata. Scorpionū icibus cū
sale trita illinuntur. Carbūculos extrahuntur a vino
cocta & imposita. Carcinomati, si sine vlcerē est,
quam pinguiſsimam Ficum imponi, penē singulae
remedium est: item phagedena. Cinis non ex alia
arbore aciem purgat acrior, conglutinat, replet, ad-
stringit. Bibitur & ad discutiendum sanguinem cō-
cretum. Itē percussis, praecipitatis, conuulsis, ruptis,
cyathis singulis aquae & olei. Datur tetanicis &
spasticis. Atē potus vel infusus coeliacis, dysentericis.
Et si quis eo cum oleo perungatur, excaesfacit. Item
cum cera & rosacco subactus, ambustis cicatricem
tenuissimam obducit. Lusciosos ex oleo illitus emen-
dat, dentiumq; vitia, crebro fricatu. Produunt etiam
si quis inclinata arbore, supino ore aliquem nodum
eius morſu abstulerit nullo vidente, atque in aluta
illigatum licio ē collo suspenderit, strumas & pavo-
tidas discuti. Cortex tritus cum oleo, ventris vlcer-
a sanat. Cruda grossi verrucas & thymos nitro fa-
rinaq; additis tollunt, spodi. q; vicem exhibet fruti-
cum à radice excuntium cinis. Bis tostus adiecto
psimmythio digeritur in pastillos, ad vlcera oculo-
rum & scabritiam.

EX SIMEONE SETHI.

Ficus admodum nutriunt, nō tamen adstrictam
& robustam carnem efficiunt, vt panis ac caro, sed
laxam. Ventrem flatibus implent, nisi probē coquā-
tur. Minus verò quā cetera sopora sunt mali suc-
ci, &

ci, & ventrem proritant, & facile exeunt. Effatu dignam extergendi facultatem obtinent: proinde a renosa multa si edantur nephreticis excernuntur. Maturæ Ficus nihil ferè obsunt, proximeq; ad caricas accedunt, quæ multa vtilia habent. Malū hoc illis inest, quòd sanguinem non admodum bonū gi- gnunt, vnde & pediculi procreantur. Oportet au- tem post vsum Ficuum, alimētum quod extenuet, ingerere. Ad hæc Fici pulmonē & thoracem inuāt. Aiunt insuper contra venena facultatem habere, si quis singulis diebus ieiunus iis vtatur. Caricæ pe- ctus inuant, & tusses. Vrinā ciunt, satisq; nutriūt, corporis etiam bonam habitudinem efficiunt. Ante cibum sumptæ, ventrem irritant, sed nisi celerius ventrem pertranseant, non bonum sanguinem gi- gnunt. Quapropter si ad satietatem vsque edun- tur, scabiem & pruritum excitant. Cibus autem bonus est, & aduersus venena remediū, si cum nu- cibus aut amygdalis comedantur. Renes expurgāt, & iecoris, lienisq; obstructions auferūt, verū ca- lefaciunt, & sitim inferunt, & flauam in calidioribus temperamentis bilem procreant. Impositæ pa- rotidibus & reliquis abscessibus, emolliunt & con- coquunt, potissimum in iis quibus sunt carnes mol- liores. Podagricis cum fœnogræco & aceto imposi- tæ, non parum inuant.

DE SPARTO. CAP.

CCXC.

Spartum

PLANTARVM HISTORIAE

Spartū iam Parisiis frequens in calathis
ficuum & vuarum passarum vſu frequen-
tiſſimum. NOMINA.

Σ πάρτον, ἢ σπάρτίον Græcis, Spartū Ro-
manis vocatur: Officinis incognitum Germa-
nis Pſrimmen (Gal. du Geneſt) appellari poteſt.
Spartum vnde di-
ctum. Sparton verò dixerūt, quòd funiculi ac vinculi v-
ſum in alligandis vitibus præbeat.

FORMA.

Frutex eſt virgas longas proferens, ſine foliis, va-
lidas, difficulter fragiles, quibus vites ligant. Sili-
quas phaſelorum modo fert, & in iis ſemina lentis
formam habētia. Florem luteum, veluti Leucoion.

LOCVS.

Aridum ſolum amat, eſtq; veluti terræ iuncus.

TEMPVS.

Floret circa idus Iunias, ac ſubinde ſiliquas
producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & ſiccum eſſe, & guſtus & vires in-
dicant. VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sparti ſemen & flores in aqua mulſa pota quin-
que obolorum pondere, per ſuperna cum intenſione
veluti elleborus citra periculum purgat. Semen per
inferna purgat. Quinetiam maceratis in aqua vi-
rus eius, deinceps verò tuſis & expreſſis, ſi ſuccus
cyathi vnius meſura ieiunis bibatur, iſchiadicis &
angina laborantibus auxiliatur. Quidam etiam
muria,

muria, aut marina macerantes, ischiadicis clystere infundunt. Strigmenta autem cruenta elicit.

EX GALENO.

Sparti, quo & vites apud nos alligant, tum semen, tum virgarum succus, non instrenue trahentis est facultatis.

EX PAVLO.

Sparti, quo vites ligant, & semen & flos cum mulsâ pondere quinque obolorum pota, per superiora purgant veratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgæ ipsius ad coxendicium dolores proficiunt.

EX SIMEONE SETHI.

Sparti, quo vites ligantur, semen & flores cum aqua mulsâ si bibantur pondo obolorum quinque per superna purgant, vt Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgæ verò ischiadicis prosunt.

DE SMYRNIO. CAP. CCXCI.
NOMINA.

μύρτιον Græcis, Smyrnion Latinis, officinis

☞ Leuisticum, Germanis Liebstockel, (Gallis

Leuefle, ou Liuesch) dicitur. Smyrnion di-

ctum, quod huic idem sit odor qui myrrhae. Errant qui Smyrnion Leuisticum hodie nominatam herbam, eam esse putant quæ Diosc. Ligusticum appellatur. Neque enim Leuisticum caulem geniculatum, neque etiam folia Meliloto non est simile profert. Tolerabilior est sententia eorum qui gusticum arbitrantur

PLANTARVM HISTORIAE

arbitrantur secundam esse Dauci speciem.

FORMA.

Caulem habet Apio similem, adnascens obtinentem multas. Folia latiora Apio, ad terram confraeta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicataq; & colore sublutea. Umbellam supra caulem Anetho similem. Semen rotundum, nigrum, sapore acre. Radicem acrem, odoratam, teneram, succosam, fauces mordetem, foris nigram, intus pallidam, aut subalbā. Caterum si quis singulas has notas velit expendere, facile perpendet Smyrniūcam esse herbam quam hodie Leuisticum nomināt.

Smyrniū
esse Leui-
sticum.

Siquidem ea ut Apium caulem profert concavum, ac stolones multos. Folia quoque Apii, at latiora, ad terram cōfraeta, subpinguia, firma, cum quadam acrimonia odorata, odore tamen medicato, colore in luteum lāguido: muscarium in capitibus caulium Anetho simile: semen rotundum, nigrum, acri sapore: radicem odoratam, acrem, gustu fauces mordentem, succosam, mollem, foris atram, intus subalbidam, aut pallidam. His accedit quod Leuisticum

Leuisticū
forma &
odore A-
pio simile.

forma & odore Apio valde simile est, ita ut nonnulli hac ratione moti putauerint esse Apii speciem quandam: ut congenerem esse herbam, quem admodum testatur Galenus, nemini dubium esse debeat. Vnde iterum liquido colligi potest esse Smyrniū, quod certē statim ab Apio Dioscorides, tanquam similem cōgenerēque herbam, idipsum describat.

Conuoco

Conueniunt etiam vtrarumque herbarum facultates, vt paulò post monebimus. Item Dioscorides scribit Pæoniam fœminā folia Smyrni habere. Quid verò foliis Pæonia fœmina, quàm folia Leuistici hodie nominati magis simile? vt nemo dubitare debeat subinde Smyrnion esse Leuisticum.

LOCVS.

Nascitur hodie passim in hortis. Humida autem loca amat.

TEMPVS.

Floret æstiuo tempore.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum in tertio ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi facultatem habent radix, herba & semen. Olerum modo comeduntur folia muria macerata, aluūque sistunt, Radix serpentium moribus pota succurrit. Tusses & orthopnceas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia œdemata, phlegmonas, & duritias discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Feruesacta & subdita, abortus facit. Semen eius lienis, renum & vesicæ vitiis prodest. Menses & secundas pellit. Commodè datur ischiadicis cum vino. Inflationes stomachi lenit. Sudores & ructus ciet. Potū peculiariter hydropicis, & februm circuitibus prodest.

EX GALENO.

Smyrnion est eiusdem generis cum Apio & Petroselino: fueritq; Apio quidem validius, Petroselino
lino

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

lino autem imbecillius. Menses itaque & urinas mouet. Cilices in Amono monte natum Petroselinum vocant. Est quidem & ipsum Smyrnion, minus vero Petroselino & Smyrnio acre est. Proinde & ulceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia desiccatur. Sed et digerere quæ indurata sunt, valet. Reliqua facultas eius Apio & Petroselino similis est. Quocirca & semine utimur ad menses, urinas et asthmata. Hæc Galenus. Ex iis Galeni verbis liquido apparet duplex esse Smyrnion, vnum quod alio nomine Hipposelinon, de quo suo diximus loco, dicitur: alterum autem quod in Amono nascitur monte, de quo hic nobis sermo est.

E X P L I N I O.

Urinam & menses ciunt folia & radix. Alium sistit semen. Radix suppurationes recentes, & collectiones discutit: Item duritias illita. Prodest contra phalangia, ac serpentes, admixto cachry aut polli-
ne, aut apiastro in vino pota, sed particulatim, quoniam vniuersa vomitiones mouet, qua de causa nonnunquam cum ruta datur. Partus adiuvat, & secundas pellit. Medetur tussi & orthopnoea radix vel semen. Item thoracis, lienis, renum & vesicæ vitium. Radix autem ruptis, conuulsis auxiliatur. Sudores ciunt & ructus, ideo inflationem stomachi discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Datur ischiadicis in vino cum crethmo. Exprimitur succus radicis, utilis foeminis, thoracis & precordiorum desiderijs:
calefa,

calefacit enim, concoquit, & purgat. Semen peculiari ex hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur. Concoctiones facit. Sapore similis apii est, ideo ad opsonia utuntur cum mulso, oleo & garo, maximè in elixis carnibus.

APPENDIX.

Confer cum iam dictis facultatibus eas quas *Leuistico* recentiores tribuunt, & comperies prorsus eadem esse. Tradunt enim eius semen mouere menses & vrinas, inflationes tollere, serpentium moribus mederi, calculos confringere, sudores ciere, vulnera conglutinare, licniq; obstructions auferre: adeo ut hinc iterum constet, *Leuisticum* à *Smyrnio* non esse, saltem viribus, diuersum.

DE SILPHIO. CAP. CCXCII.

Laserpitium Germanicum in horto diui *Germani Pratenfis* est multum.

NOMINA.

Ἰλφιον Græcis, *Laser* & *Laserpitium* Latinis dicitur. Vulgo & officinis corrupta voce, deflexa tamen quadam à *Laserpitio* pristini nominis umbra, *Osteritium* vocatur. Primum siquidem, ut dictum est, *Laserpitium*, deinde deprauata nomenclatura, *Osteritiū*, postremo *Ostritiū* cepit appellari. Qui sanè lapsus facilis admodum fuit. Abiecta nanque prima litera, *Asteritium*, & deinde mutato in o, *Osteritiū*, ac postremo magis cōcise *Ostritium* *Ostritium* nominare imperiti ceperunt. Veteribus cur dictum.

PLANTARVM HISTORIAE

Germanis haud dubiè Laseruurtz dicta est hæc herba, quā quidem vocē, utpote semilatinā, posteri non rectè intelligētes, in Meysteruurtz mutarūt. Quæ quidē appellatione adhuc hodie omnes vtuntur Germani. (Galli Benioin, ou L'herbe dont prouiēt le Benioin.) FORM A.

Caulē ferula similem habet, folia verò Apī, aurei coloris, semen latum, foliaceum, radicem quæ corticem nigrum obtinet, à qua liquor etiam modicè rubens, translucidus, myrrhāque redolens, ac odoratus destillat. Ex qua quidem descriptione luce clarius constat, herbam hanc cuius picturam da-

Lasertiū germanicum. mus, esse Laserpitium, saltem germanicum. Caulis enim ei sceniculaceus, seu ferula, hoc est, geniculatus, folia Apī in auri colorem languescētia, semen foliaceum & latum, nempe quod figura exile foliolum exprimit: radix crassa & multa, foris nigricans, intus candida, mirāque flagrans iucunditate, quæ si vulneratur, liquor profluit lentus, ac modicè rufus, suauissimumq; spirans odorē, & linguam suā acrimonia vellicās, ut sanè nulla sit prorsus nota quæ reclamare videatur. His accedit quòd facultates Ostritiū nominati à Laserpitiū viribus non discrepant, quæadmodū ex sequētibus patebit.

LOCVS.

Nascitur in Syria, Armenia, Media & Aphrica. Quod ex Armenia et Aphrica affertur suauissimū odorem habet, præsertim Cyrenaicum, vnde &
ὄπρς,

ὠδς, id est, succus Cyrenaicus appellatur. Nec hoc Succus
 Lasepitiū aliud est quā concretus ille succus, Cyrenai-
 quē officina Belziniū, vel Ben Iuinum vocant. *cus.*
 Quod verò ex Media & Syria affertur Dioscoride Belziniū
 este, virosū odorem obtinet, ac putrilaginē re- est Lase-
 pit, ideoq; videtur esse id quod hodie officina pas- pitium.
 im Asam foetidam nomināt. Quod etiam hinc col- Asa foetia.
 ligi potest, quod in hodiernū vsque diē ex Syria da.
 Alexandrina, & hinc Venetias deportatur. Nostrū
 in montosis locis prouenit, ac in omnibus fere hor-
 tis nunc plantatur.

TEMPVS.

Iunio mense flores admodum exiguos ac candi-
 dos, instar Anisi, profert, atque subinde semen latū.

TEMPERAMENTVM.

Silphii liquor calidissimus est. Verum enim vero
 & folia, & caulis, & radix sat strenuē excalsa-
 ciunt. Nostrum etiam Lasepitiū in vniuersum
 calidius atque acrius est pipere ipso, adeoque cale-
 facit & exiccat in tertio ordine. Radix autem &
 semen, folia & caulem superant, vt in eo etiam ef-
 ficacissimus omnium aliarum partium sit liquor,
 secundo loco folia, postremo caulis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Lasepitiū liquor acris est, inflat. Inunctus cū vi-
 no, pipere & aceto, alopecias sanat. Oculorū aciem
 exacuit. Incipientes suffusiones cum melle inunctus
 dissipat. Cancerns dentium in eorundem dolore in-

FF ij ditor,

PLANTARVM HISTORIAE

† ὡρον
τασχα-
σθέντων
legendum.

ditur, aut cū thure in linteo circumponitur, aut col-
luitur eo os cum Hyssopo, & Ficis coctis in posca.
His prodest, quos bestia in rabiem efferata momoro-
derit, vulneribus impositum. Valet aduersus o-
nia animantia quæ virus ciaculantur, venenata
tela, potus aut inunctus. Scorpionum plagis oleo di-
lutus circumlinitur. Gangranis † antea scarificatis
immittitur. Carbunculisque cum ruta, nitro &
melle, vel per se. Clauos, callōsque prius circum-
scarificatos tollit, cerato, aut aridorum Ficuū car-
ne præmollitus. Recentes lichenas ex aceto sanat.
Excrecentias carnis, polypōsque, si aliquot diebus
cum atramento sutorio aut arugine illinatur. Extus
berantia cum forfice extrahit. Diuturnis asperæ ar-
teriae asperitatibus opitulatur. Vocem subitō ex-
asperatam iraucescentēve, dilutus aqua & ab-
sorptus confestim restituit. Vuam cum melle inun-
ctus reprimat. Angina laborantibus ex aqua mul-
sa utiliter gargarizatur. Coloris bonitatem iis qui
eo vescuntur auget. In sorbili ouo datus tussi auxi-
liatur, pleuriticisq; in sorbitionibus. Saffusus felle,
& hydropicis cum aridis Ficis utiliter exhibetur.
Cū pipere, thure & vino potus, rigores soluit. Ner-
uorū distentione laborantibus, opisthotonicisq; da-
tur oboli pondere deuorandus. Hærentes gulæ his-
rudines, gargarizatum cum aceto deiecit. Ad lac-
intus in grumos concretum. Comitialibus ex oxy-
melite sumptus succurrit. Menses ciet cum pipere

¶

& myrrha potus. Cœliacos in acino vna sumptus
 iuuat. Cum lixiuio potus, repentinis conuulsionibus
 & rupturis prodest. Ad potiones dissoluitur amaris
 amygdalis, aut ruta, aut calido pane. Foliorum li-
 quor eadem potest, sed multò minori efficacia. Cum
 oxymelite manditur ad expediendam asperam ar-
 teriam, præsertim amissam vocem. Vtuntur eo cum
 Lactucis, pro eruca comedentes.

EX GALENO.

Omnes Silphii partes flatulenta magis sunt es-
 sentia, ac proinde concoctu difficiles. Foris tamen
 imposita corpori, efficaciores, & omnium potissimū
 liquor, admodum trahentem facultatem obtinens.
 Attamen excrescentias imminuendi, & liquandi
 vim quandam propter iam dictam temperiem ha-
 bentem. Liquor Cyrenaicus quidem omnes & ca-
 liditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiam o-
 mnium maximè discutit.

EX PLINIO.

Folia Silphii ad expurgandas vuluas, pellendosq;
 que emortuos partus, decoquuntur in vino albo odo-
 rato, vt bibatur mensura acetabuli à balneis. Ra-
 dix prodest arteriis exasperatis, et collectionibus san-
 guinis illinitur. Sed & in cibis concoquitur aggrè.
 Inflationes facit & ructus. Urinae quoq; noxia. Su-
 gillatis cum vino & oleo amicissima, & cum cera
 strumis. Verruca sedis crebriore eius suffitu cadūt.
 Liquor eius per se algores extalfacit. Potū nernorū

PLANTARVM HISTORIAE

vitia extenuat. Foeminis datur in vino. Et lanis mol-
libus admonetur vuluae ad menses ciendos. Pedum
clauos circumscribendos ferro, mixtus cera extra-
hit. Urinam ciet ciceris magnitudine dilutus. An-
dreas spondet, copiosius sumptum nec inflationes fa-
cere, & concoctioni plurimum conferre senibus &
foeminis. Item hyeme quam aestate utilius, verum-
tamen aqua bibentibus, cauendumq; ne qua intus sit
exulceratio. Ab agritudine recreationi efficax in co-
bo. Tempestiue enim datus, cauterium obtinet: as-
suetis etiam utilius quam expertibus. Ad externa cor-
porum, indubitatas confessiones habet. Venena telo-
rum & serpentium extinguit potus: ex aqua vul-
neribus his circumlinitur. Scorpionum tantum pla-
gis ex oleo. Ulceribus vero non maturefcentibus, cum
farina hordeacea, vel fico sicca. Carbunculis cum ru-
ta, vel cum melle, vel per se visco superlitum ut ha-
reat. Sic & ad canis morsus. Excrescentibus circa
sedem, cum tegmine punici mali ex aceto decoctus.
Clauis pedum qui vulgo morticini appellantur, nitro
mixto, ante subactus. Carnes replet cum vino & cro-
co, aut pipere, aut murium fimo et aceto. Perniones
ex vino fouet, & ex oleo coctum imponitur: sic &
callo. Clauis pedum superrasis praecipue utilitatis.
Contra aquas malas, pestilentes tractus. vel dies.
In tussi, vna, fellis veteri suffusione, hydropicis, ran-
citatibus: confestim enim purgat fauces, vocemque
reddit. Podagras, in spongia dilutus posca lenit.

Pleuria

Pleuriticis in sorbitione vinū poturis datur, contra-
 Etionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera
 circumlitis. In angina gargarizatur. Anhelatorib.
 & in tussi vetusta, cum Porro ex aceto datur, atq;
 ex aceto his qui coagulū lactis sorbuerint. Precora-
 diorum vitiis, syntecticis, comitialibus in vino, in
 aqua mulsa linguae paralyti. Coxendicibus & lumborum
 doloribus cū decocto melle illinitur. Nō cen-
 suerim, quòd autores suadent, cauernis dentium in
 dolore inditum cera includi, magno experimēto ho-
 minis qui se eadem causa precipitauit ex alto.

APPENDIX.

Laserpitium nostrum ex traditione recentiorum
 vnicè venenis aduersatur. Item pestilentie popula-
 riter grassantis arcet contagia. Lentitiam pituito-
 forū humorum incēdit ac discutit: quapropter tussi
 quam frigus attulit, medetur. Crassa quæ in thora-
 ce coeūt, discutit. Coloris corporis bonitatem iis qui
 eo vescuntur, efficit. Concretum in corpore lac &
 sanguinē resoluit. Stomachū esu corroborat. Pitui-
 tam ventriculi deiecit, & elanguescentem appeten-
 tiam inuitat. Menses & vrinam ciet. Rabiosi canis
 morsu, aut serpentis iclu liberat, si cōtrita folia vul-
 nerī indantur. Hypochōdriorum vitiis auxiliatur.
 Item lumborum doloribus. Carbunculos cum polē-
 ta tritum & impositum sanat. Cum vino potū ri-
 gores discutit. Herba ipsa in vino & aqua cocta
 vulnera interna glutinat: & in summa, omnia quæ

Laserpitiū
 germani-
 ci faculta-
 tes.

PLANTARVM HISTORIAE

Angelica vocata herba, & maiori efficacia, potest: ut hinc etiam constet Oſteritium à nostris nominatum, easdem habere quas veterū Laserpitium, inefficaciores tamen, facultates. Quare cum metus sit ne Laserpitium adulterinum, aut saltem non optimum ad nos afferatur, præstat nostro uti, quod scilicet exigua admodum pecunia comparari possit, & viribus satis efficax sit. Nam eadem qua Dioscorides & Plinius Laserpitio assignant, recentiorum testimonio præstare valet.

DE STACHY. CAP. CCXCIII. NOMINA.

Τάχυσ Græcis, Stachys Latinis dicitur, officinis ignota. Germanis riechender Andorn (Gallis sauge saulauge, ou

Stachys de montaigne) nominatur. Stachys verò dicta, unde dicta. quòd verticillato florum ambitu, & orbibus spicarum caules cingentibus coronetur.

FORMA.

Frutex est Marrubio similis, sed altior, folia ferēs plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab una radice plures emittit Marrubio candidiores. Ex hac descriptione perspicuū sit omnibus, herbam quam præteritam damus, esse Stachyn: est enim fruticosa, Marrubijq; similitudinem refert, nisi quòd altior est: folia quoque plura, at rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata, & albicantia. Virgulas denique, etsi pictura id ipsum non ostēdat, ab

vna

*una radice plures emittit, candidiores quàm Mar-
rubium. Quibus omnibus florum purpureorū ver-
ticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum, qui
caules circundant.*

LOCVS.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

*Stachys gustu acri & amaro est, tertiiq; ordinis
excalfacientium. Vnde iterum liquet hanc herbam
esse Stachyn, quod gustata acris et amara videatur*

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

*Vim habet excalfactoriā & acrem. Ideoq; deco-
ctum foliorum eius potū, menses & secundas pellit.*

EX GALENO.

Menses prouocat, abortum facit, & secundas eiicit.

EX PLINIO.

Pellit menstrua.

DE SECALE. CAP. CCXCIIII.

NOMINA.

SEcale dicitur Plinio lib. xviij. cap. xvi. & Far-
rago, Germanis Rocken & Korn (Gallis du
Seigle) nominatur. Magno in errore versantur qui
hoc frumenti genus Siliginem esse existimant. Si-
quidem ex hac, Plinio lib. xviij. cap. ix. teste, lau- Secale nō
tissimus fit panis, tener, candidus, & primatum te- est Siligo.
nens: ex illo cibarius, ater, & pōdere precipuus, ad
arcendam

PLANTARVM HISTORIAE

arcendam pauperum famem tantum utilis, qui vet-
terascens acorem etiam contrahit. Item Siligo ha-
bet spicam erectam, Plinio loco iam citato, cap. x.
autore, nec rorem continet, quæ rubiginem faciat:
hoc verò procumbentem, & ideo quòd imbres reti-
neat, rubigini opportunum. Siligo præterea grano
est candido, leui & multipliciter tunicato: hoc con-
tra nigro, striato, & glumis ferè explicito. Deni-
que Siligo sine arista est, hoc verò aristis horret. Po-
stremum ex Siligine pistrinarum opera sunt lau-
datissima, ex Secale nullum fere tentatum est. His
itaque rationibus evidentissimum esse puto, hoc fru-
menti genus quod Germani nostri Rocken vocant,
non esse Siliginem.

FORMA.

Secale frumenti genus vulgò notissimum, stipu-
la est culmo triticeo, graciliore & proceriore, geni-
culis ut plurimum quatuor, spica innocentioribus
aristis horrente, non erecta, sed semper propemodum
procumbente, grano glumis explicito, & ob id ca-
dusco, tristi, nigricante, strigoso. Plinius cap. xvi. li-
bri xviii. scribit, Secale fecunda, sed gracili stipu-
la esse præditum, nigritia triste, sed potèrè præci-
puum. Quæ singula satis monstrat, frumentum quod
Rocken vocant Germani, esse Secale, & non sili-
ginem.

LOCVS.

Gignitur qualicumque solo, ideoq; passim in Ger-
mania, præsertim Rhetia, & Vindelica feritur.

TEM.

TEMPVS.

Floret Iunio mense, metitur autem Iulio.

TEMPERAMENTVM.

Magis videtur excalfacere quàm Triticum, minus tamē refrigerare quàm Hordeum. Magis item exsiccare quàm Triticum, minus tamen quàm Hordeum aut Zea.

VIRE S.

Habet aliquid lentoris & obstruentis nature. Hinc panis ex eo confectus, potissimum si à furfuribus non sit probè purgatus, stomacho gravis esse solet. Reliquæ vires ex capitibus de Tritico & Hordeo colligendæ.

DE SIDERITIDE PRIMA.

CAP. CCXCV.

NOMINA.

Sideritis Græcis, Sideritis prima Latinis di Chamæpitytur. Magna officinarū pars hac herba pro Chamæpity vera utitur, non sine errore, cum satis ex forma illius constet, ut paulò post monstrabimus, non esse Chamæpityn. Germanis Glidkraut (Gal-
lis de Lespargoutte, ou apparitoer) appellatur. Sideritis verò nominata, quod glutinandus vul-
neribus apta, præcipuum in bello habeat usum. Sideritis cur dicta.

FORMA.

Herba est folia Marrubio similia habens, longiora tamen, ad saluic aut quercus figurā accedentia, verū minora & aspera. Caules fundit quadratos, dedran

PLANTARVM HISTORIAE

**Sideritis
prima.**

dodrantales, aut longiores, gustu non iniucundos, aliquo modo adstringentes, in quibus per intervalla velut in Marrubio verticilli in orbem circumacti, & in his semen nigrum. Ex qua quidam delineatione sole clarius constat, herbam cuius hic picturam exhibemus, esse Sideritin primam. Siquidem folia Marrubi habet, sed longiora ad salviae similitudinem aspera & rugosa, minora tamen. Caulis quadratus & hirsutus, non iniucundi gustus, aliquantulum subadstringens, quem per intervalla verticillati orbis coronant, ut in Marrubio videre licet, in quibus flores subcandidi ac lutei, & subinde semen nigrum.

Sideritis iuxta Dioscorides. Non esse verò hanc herbam Iuam non est Iua arthriticam, nec Chamapityos generibus posse anarthritica numerari, hinc conicere licebit: primum, quod non sit pumila, sed in altum surgat, fruticis verius, quam herbae specie. Quod verò neque primum neque secundum genus Chamapityos dici queat, hinc manifestum fit, quod utrumque foliis Semperuii minoris sit, à quibus salviae, qualia hac habet, diversissima sunt. Neque etiam tertium, quia folia eius non sunt exilia.

LOCVS.

Nascitur asperis, petrosis & incultis locis.

TEMPVS.

Iunio mense florere incipit, nec desinit nisi in Autumni fine.

TEM.

TEMPERAMENTVM.

*Sideritis habet quandam abstergendi facultatē,
id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam
adstrictionē. Plurima tamen eius pars humida est,
& mediocriter frigida.*

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

*Folia eius illita vulnera glutinare, & inflamma-
tionem arcere possunt.*

EX GAIENO.

Phlegmonem sedat, & glutinandi vim obtinet.

EX PLINIO.

*Sideritis tantam vim habet, vt quamvis recen-
ti gladiatoris vulnere illigata, sanguinem claudat.*

DE SORGI. CAP. CCXCVI.

Sorgi panicum Indicū Parisiis dicitur.

NOMINA.

Peregrinum est hoc genus frumenti, & ex Ita-
lia ad nos allatum, ideoq; Germani Vuelichē
Hirsz (Galli Ble barbu, ou espece de Paniz)
vocāt. Alj Sorgiomen, quod scilicet in Italia Sor-
gi nominetur. Neque constat quo nomine veteribus
sit appellatum, nisi farris genus sit, quod in Gallia
nunc rubrum & barbatum frumentum nuncupāt.
Probē enim illi hęc nomenclaturā videtur cōueni-
re, quod nimirū eius spica rubra et barbata sit. Cer-
tò tamen nihil affirmare audemus, nam Panicum
etiā referre, quāvis magnitudo repugnet, videtur.

FORMA.

Culmos

PLANTARVM HISTORIAE

Culmos habet quatuor aut quinque altos, crassos, geniculatos, rubicundos, foliis vestitos longis, latis, & in summitate acuminatis, harundini nõ dissimilibus: spicam quàm Panicum maiorem ac densiorem, rufam & barbatam, in qua semen rufum, rotundum, lentis magnitudine, & acuminatũ. Florem luteum. Radicem multis fibris capillatam.

LOCVS.

Non provenit nisi satũ, & nunc in multorũ hortis colitur ac plantatur, non tamen faciliẽ emergit.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, flore, vt diximus, luteo, nec nisi extrema ferẽ autumnii parte ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Semen dulce est, & Panicum planẽ in gustu refert, idẽque temperamento ab hoc minimẽ differre putamus.

VIRES.

Tametsi de illius facultatibus nihil cõperti habeamus, tamen quia Panicum gustu refert, easdem illi facultates obtinere existimamus, quas suo loco inuenies.

DE SERPENTARIIS OFFICINARVM. CAP. CCXCVII.

NOMINA.

Quo nomine veteribus medicis Græcis & Latinis appellatæ sint, nemo hactenus, quod sciam,

sciam, indicare potuit. Recentiores herbarij & offi- Officina
cina non sine magno & intolerando errore, Serpē rū erratū.
tarias vocant, nō certē quōd in nomenclatura tan-
tū sit situm, sed quōd forma & viribus plurimū
ab ea herba quam Graci δεξιότιον, Latini au-
tem Dracunculum ac Serpētariam nominant, pla-
rimum discrepent, vt suo loco latius demonstrabi-
mus. Germani nostri has herbas Nateruurtz sua
lingua appellant. G E N E R A.

Duo sunt Serpentariae recentiorum & officina-
rum genera, forma non multum variantes. Vnum Mas.
quod leuibus admodum foliis, & radice in se con-
torta constat. Hinc est quōd herbariis nostri tempo Bistorta.
ris Bistorta dicatur. Nos certioris discriminis gra-
tia marem fecimus, germanicēque Nateruurtz
mennle vocauimus. Alterum rugosioribus foliis,
maiorique radice, & minus intorta, ac multū ca- Fœmina.
pillata videtur. Vulgares herbarij Colubrinā nun- Colubris
cupant. Nos fœminam constituimus, ideōque Ger- na.
manicē Nateruurtz Vueible vocauimus. Serpē-
tarias verò vtrunque genus dixerunt, propterea
quōd vbi primum ē terra prodeunt, lingua serpens
tina pelle tenui vestita, formam obtinent.

F O R M A.

Cauliculo constant tenui ac iunceo, glabrescēte,
per ima tantū foliato, spicoso florum vertice, qui-
bus dilutioris purpura color inest: folio Rumicis à
terra cæsis, supernè viridi & herbaceo: radice mas
quidem

PLANTARVM HISTORIAE

quidem draconis modo inuoluta & cōtorta, fœmina verò oblonga, maiore ac capillata, extra nigricante, intus rubescente.

LOCVS.

Nascuntur locis vmbrosis & humidis, pratis potissimum Martiana syluæ.

TEMPVS.

Florent Maio mense & Iunio, quo maximè tempore, vt omnes aliæ quæ floribus ornantur plantæ, dignosci ac inueniri possunt.

TEMPERAMENTVM.

Vtriusque radix mirificè adstringit, vt refrigerandi ac exiccandi facultate prædita esse nemini sit dubium. Antiquus manuscriptus herbarius frigidæ & siccas esse in tertio ordine censet.

VIRE S.

Radices illarum glutinant vulnera, fletum in vtero retinent, vomitum biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Hæc antiquus herbarius. Nostræ verò ætatis medici, aliorum errata impudenter sectantes, ad longè diuerso vsus Serpentariæ vtriusque radices adhibent, nempe ad eos ad quos Dioscorides, Galenus & alij veteres suum Dracontium, cum tamen viribus inter se maximè discrepent, quod gustus etiã abundè testatur, cum Dracontij radix acris sit, illarum verò vehementer adstringat. Vt igitur errorem hunc relinquant, subinde medicos & seplasiarios hortor, nisi fortè perdere magis quam sanare

sanare in delitiis habeāt: sciantq; Serpentarius suas non alias quā Britānicam habere facultates, adstringendi nimirum, priuatim ad ea quae in ore & tonsillis sunt depascentia vlcera accommodatas, & ad omnia alia quibus adstrictione opus est. Folia etiam in farinam trita labiles dentes confirmant.

DE SCORDIO. CAP. CC XCVIII.

Scordium iam notius est, quā vt sit pluribus declarandum, nomen retinet.

NOMINA.

Σ κρόδιον Græcis, Latinis Trixago palustris dicitur. Officinis ferè omnib. incognita. Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem apte Vuarlserbatenig (Gallis de la Germandrée) nominabitur. Scordiō autem Græcis ab Alliis dicta est herba hæc, quod nimirū eius folia affricta, Allij, quod Græcis Scorodon vocatur, odorem referant. Ab hoc mali & ingrati odoris sensu, iisdem etiā δύσσομον appellata est. Vt verò Trixago dicta sit, similitudo fecit: Trixagini enim, quæ Græcis Chamædrys nominatur, similis est. Palustris autem, quoniam humentibus ac palustribus locis nascatur.

Scordion
vnde dictum.

Dysosmō.
Trixago
palustris
cur vocata.

FORMA.

Folia Trixagini seu Chamædryi similia habet, maiora tamē, nec sic in ambitu incisa, odore aliquātum Allium referentia, gustu adstringentia & amara. Caules quadrangulos, in quib. flos subrubescēs.

GG

Hæc

PLANTARVM HISTORIAE

Hæc delineatio sic refert herbã hanc, cuius picturam damus, vt ouum oyo non sit tam simile. Folio siquidem est Trixaginis, maiore, & per ambitum non ita profundè serrato, & inciso odore aliquatenus Allium reddēte, adstringentis & amari gustus, quadrāgulis caulibus: flore in caulibus, instar Chamædrys et Teucris, subrubro, & minimè in summis caulibus, vt aliqui putant, quemadmodum pictura ipsa abundè docet. Hæc itaque herba in theriacos pastillos inserenda erit, & non syluestre Allium, vt Seplasia maximo i errore versentur seplasiarj institores, qui riorū er pro re tam salutari atque omnibus putridis marcori. ribus, Galeno lib. i. de antidotis autore, aduersante, syluestre Allium vsurpant. Sed indignius erratum, quàm quod multis explodi debeat. In hunc autem eosdem vicinitate vocabulorum potissimum incidiſſe errorem, libro primo Paradoxorum, ca. xxiiij. abundè monstrauimus.

LOCVS.

Nascitur in mōtanis & hamētibus locis. Nec inter se pugnant Dioscorides & Plinius, dū hic in cāpis humidis pinguibusq; ille autē in montanis nasci scribit. Vterq; enim verum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnib. prouenit, sed, quod Dioscorides etiam adiecit, humentib. tantum. Plantatum autem Scordiū non difficulter nascitur, & possunt de vno duntaxat ramo complures promerire, modò solo humido committantur.

TEM

TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, flos tamen nō nisi diem vnum durare videtur, sic continuò vnus alium sequitur.

TEMPERAMENTVM.

Tum ex saporibus, tum etiam facultatibus paulò post exponendis satis constat Scordium calidum esse. Nam, Galeno etiam teste, amarum quid obtinet, & acre.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba vim calefaciendi habet, & urinā cit recens trita & pota. Arida quoque cum vino decocta contra serpentium morsus, & letalia venena bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteria, & urinae difficultatem pondere duarum drachmarum cum hydromelite. Purgat crassa purulenta e thorace. Facit ad veterem tussim, rupta, conuulsa, cum nasturtio, melle & resina in ecligmate arida commixta. Hypochondriorum vetustas inflammationes excepta cerato lenit. Succurrit eadem podagris cū acri aceto circumlita, aut ex aqua illita. Menses supposita mouet, vulnera glutinat, vetusta vlcera purgat, & cum melle ad cicatricem ducit. Siccata carniū excrescentias reprimat. Succus præterea ex ea expressus ad prædicta vitia bibitur.

EX GALENO.

Expurgat simulq; excalfacit viscera, tum menses urinamq; mouet. Præterea conuulsa ruptaque &
GG ij laterum

PLANTARVM HISTORIAE

laterū dolores ab obstructione & frigore nato san-
nat potum. Denique viride illitum magna vulne-
ra conglutinat: verū sordida purgat, & maligna
ad cicatricem perducit, illitum aridum.

EX PAULO.

Scordium varium existit, vt quod amarum, ac-
bū & acre sit. Purgat igitur simul & calfacit vi-
scera, vrinas & mēstrua cit, refrigerata omnia re-
calfacit, vulnera glutinat, repurgatque, aridum il-
litum cicatricem inducit.

DE STICHAE. CAP.

CCXCIX.

NOMINA.

Stichas
arabica.

Stichas
vnde di-
cta.

Arabica
quare vo-
cata.

ΤΙΧΟΣ Græcè, Stichas vel Stæchas La-
tine appellatur. Officina cognomento A-
rabicam vocant. Germanis nominatur
Stichaskraut (Gallis du Stechados citrin.)
Stichas verò nomē accepit à Stæchadibus ex ad-
uerso Massilia sitis Gallia insulis, in quibus proue-
nit. Arabæ factionis autores patriam Stichada re-
liquis omnibus prætulerunt, hinc sequaces illorum
gentili cognomento Arabicam nuncuparunt.

FORMA.

Herba est tenuibus ramulis, comam similē Thy-
mo habens, longiore tamen folio, & gustu acris, &
aliquantum subamara. Hactenus Dioscorides, qui
flores atque spicam prorsus omisit. Sunt autem flo-
res, vt pictura abundè mōstrat, exigui & cœrulei,

spica

spica verò flauescit. semine referta exiguo, triquetra, & coloris spadicei. Radix illi est tenuis & ligrosa.

LOCVS.

Nascitur, vt antea est commemoratum, in insulis Gallia è regione Massilia, quæ Stichades appellantur, à quibus etiam gentilitiam appellatione accepit. Prouenit etiam in Arabia, aliisq; compluribus locis, & in multis etiam Germaniæ nostræ hortis.

TEMPVS.

Floret eo quo Lanandula tempore, nimirum ante Solstitium æstiuum, hoc est, Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Stæchadis qualitas gustu quidem amara est, & mediocriter subadstringens. Temperamentum verò compositum ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex tenui, altera, quæ terrena est, copiosiore, à qua utique amara est.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius quæadmodum & Hyssopi, ad thoracis vitia efficax est. Miscetur antidotis utiliter.

EX GALENO.

Obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tum omnia viscera, tum totum corpus est nata.

EX PLINIO.

Menses cit potu, thoracis dolores leuat. Antidotis quoque miscetur.

DE STRUTHIO. CAP. CCC.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Radicula **Σ** **ῥαβδιον** Græcis, Radicula, siue Lanaria her-
Lanaria. **ba** Latinis, Mauritanis & officinis Condifi,
Condifi. nonnullis herba fullonū, vulgò Saponaria, Germa-
Sapona- nis Seyffenkraut (Gallis l'Herbe à foulon) di-
ria. citur. Vnde verò Græci hanc herbam Struthium
Struthiū appellauerint, nō satis constat, nisi fortè à foliorum
vnde no- positura, quæ anuum alas quadantenus imitantur,
minatum nomē illi indiderint. Nam gens ea **ῥαβδιον** & **ῥαβ-**
διον passerem, & minores alias aues appellat. Vel
 forsitan quòd Venerē stimulet. Græci enim, vt di-
 ctum est, **ῥαβδιον** passerem vocant, & ab eius auis
 salacitate lasciuos, & in venerem procliuiiores ho-
ῥαβδοι. mines **ῥαβδοι**, quasi passeres vocant. Porro stru-
 theum, vt est apud Festum, nuncupant obscenā vi-
 rilem partem. Qua imitatione Martialis & Catul-
 lus passerem pro virili mēbro in suis versibus vsur-
Lanaria passe videntur. Lanariam verò dixerunt, quòd ad
curdicta. candorem & mollitiem lanarum ea vsa fuerit an-
 tiquitas. Nā cum succida lane æsypo spurcata co-
 lores respuerent, proluta huius radici succo, ad
 quoscunque suffectus imbibendos preparabantur,
 quibus æsypum erat impedimento. Sic sordescentes
Radicula lanas veteres hac herba eluebant, ad munditiē con-
 quare ap- trahendam, quæ primum ab insectoribus quareba
pellata. tur, sordidis colores aspernantibus. Sic quoq; à præ-
Sapona- cipua & vtiliore parte, Radicula Romanis est ap-
ria cur vo pellata. Saponaria recētioribus dicta est, quoniam
cata. eluendis

eluendis vestimentorum maculis, sordibúsq; lanarum expurgandis, saponis vicem exhibet. *Herba autem fullonum nominata est, quod ea inter fullonum pollandis vestibus, & mangonio poliendis fullones vtantur.*

FORMA.

Struthion herba est caule lanuginoso, foliis olæ prodeuntibus ex intervallo quasi geniculatim, plerumque quinis in vnum coeuntibus, in summo coliculorum floribus candidis: radice, quam summo cepite non in altum vltro citroque per longitudinem fundit, magna, tereti & oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

LOCVS.

Nascitur in Asia Syriáque, saxosis & asperis locis præcipuè. Nunc in hortis quibusdam plantatur.

TEMPVS.

Floret æstate, Iunio maximè mense, sed per duos continuos menses floribus prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccū temperamēto, ex quarto quodammodo ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix eius acris est, vrinam cit, iecinorosis auxiliatur, tussi & orthopnœis cū melle cochlearis mensura sumpta. Aliū subducit. Eadē cum Panace & Capparis radice sumpta, calculos frāgit, & per vrinam exturbat. Lienem induratum minuit. Subdita mēses elicit, & factū manifestè enecat. Cum polēta

PLANTARVM HISTORIAE

& aceto illita, lepras tollit. Cum farina hordeacea in vino elixa, tubercula discutit. Miscetur præterea collyriis & malagmatis quæ ad claritatem oculorum conficiuntur. Sternutamenta cit, & trita cum melle naribus infusa, per os purgat.

EX GALENO.

Struthij radice potissimum utimur, gustus acris quidem existēte. Sed & abstergit, & irritat, ideoq; sternutamenta mouet, ceu cætera omnia quæ gustu acria sunt, & temperamento calida.

EX PLINIO.

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, & ius potum : item thoracis vitiis. Urinā cit, aluū soluit, & vuluas purgat. Ea & ex melle prodest magnificè ad tussim orthopnoeæ cochlearis mensura Cum polenta verò & aceto lepras tollit. Eadem cū Panace & Capparis radice calculos frangit, pellitq; Panos discutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Miscetur & malagmatis & collyriis, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lien quoque ac iecinori. Eadē pota denarij vnius pondere ex mulsa aqua, suspiriosos sanat.

DE SCILLA. CAP. CCCI.

NOMINA.

ῥιζα Græcis, Scilla Latinis, Squilla, exemplo Varronis, omnibus nūc officinis vocatur. Germanis autē Meerzuibel (Gallis stipouille, ou Charpentaire.)

FOR

FORMA.

Scillæ radix capæ modo multipliciter tunicata corticosaq; ex qua prius, vt in croco, caulis profilit tum ex eo flos in lutco candidus emergens insidit, qui cum senuerit folia demum multis post diebus emicant lata, nullo nixapediculo, capitia quadam specie, & pleraque ex iis in terram deflexa.

LOCVS.

Scilla, vndique, vt capæ & allia, prouenit.

TEMPVS.

Scillam ter florere, triaq; tempora sationū ostendere, Theophrastus libro septimo capite duodecimo tradit. Primum enim florum prouentū, arandi primum tempus significare scribit, secundum medium, tertium nouissimum. Quot enim fuerint isti, totidē & arari tempora ferme occurrunt. Scillæ præterea flos, vt est Berytius autor, nigrata specie profiliens, modò celeriter non emarcescat, largos frugum prouentus, ac vberem annonam nobis promittit.

TEMPERAMENTVM.

Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam, sed secundum hoc eam quispia secundi ordinis censeat ex calfacientium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim acrem & feruentē habet. Assata verò multiplicem obtinet vsum. Pasta aut luto oblita, in clibanum coniicitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficienter testa fuerit. Qua amo-
ta, s̄

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

ta, si non emollescat, altera pasta aut luto circumlini-
 nitur, & eadem quæ prius sunt. Nam quæ ita non
 assatur, noxia magis est, præsertim interaneis data.
 Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum
 coniecta. Sumitur ex ea, adiectionis extimis par-
 tibus, quod maximè medium est, quod coccisum, ef-
 fusa priore aqua, coquitur, nouaq; superinfusa vsq;
 dum nec amaritudinem, neque acrimoniã habeat
 aqua. Siccatur autè in umbra dissecta, & lino tra-
 iecta, ita ut ne taleolæ inuicem se cõtینگāt. Sic igitur
 secta, ad oleũ, vinũ, acetumq; scilliticũ utimur.
 Ad rimas verò pedum crudæ Scillæ interanea pars
 in oleo feruefacta, aut cũ resina liquefacta imponi-
 tur. Decocta in aceto demorsis à vipera cataplas-
 ma est. Assæ eiusdem pars vna tosti salis partibus
 octo subigitur, datũque ieiunis cochlearis vnius
 duorũve pondere ad emolliendam aluum. Addi-
 tur potionibus & odoramentariis medicamētis, &
 iis cum quibus vrinam ciere voluerimus, hydropi-
 cisq; & stomachis, quibus innatant cibi, & morbo
 regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, crue-
 tarciicientibus. Trium verò obolorũ pondus in de-
 linctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem
 cum melle, sumiturque in cibo ad eadem maximè
 coctionem adiuuans. Strigmentitia per aluum du-
 cit. Cocta & simili modo sumpta, idem potest. Ca-
 uendus Scillæ vsus iis, quibus interaneum aliquod
 exulceratum erit. Prodest verrucis & pernioni-
 bus

bus assam inungere. Semen eius tritum, cum caris-
cis aut melle exceptum, si manditur, aluum emol-
lit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est.

EX GALENO.

Præstat assam aut elixam sumere: sic enim vi-
rium eius vehementia exoluitur.

EX PLINIO.

Scillarum in medicina alba est quæ masculus, fœ-
mina nigra. Scilla quæ candidissima fuerit, vtilissi-
ma erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum
è vino est, consutum suspenditur lino modicis inter-
uallis, postea arida frustra in cadum aceti quam a-
sperrimi pendentia immerguntur, ita ne vlla parte
vas contingat. Hoc fit ante Solstitium diebus qua-
draginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur
sub tegylis, totius diei solem accipiētibus. Post eum
numerum dierum tollitur vas, Scylla eximitur,
acetum transfunditur. Hoc clariorem aciem fa-
cit. Salutare est stomachi laterumq; doloribus, pa-
rum sumptū binis diebus. Sed tanta vis est, vt auis-
dius haustum extinctæ animæ momento aliquo spe-
ciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus,
vel per se commanducata. Tincas & reliqua ven-
tris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Lin-
gua quoque recēs subiecta præstat ne hydropici si-
tim sentiant. Coquitur plurib. modis in olla, quæ co-
iiciatur in clibanū aut furnū, vel adipe aut luto il-
lita, aut frustati in patinis. Et cruda siccatur, deinde
concidit

PLANTARVM HISTORIAE

conciditur, coquiturq; in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vsus sic coctæ ad hydropicos. Ad urinã ciendam tribus obolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus inmatet cibus. Ad tormina, regios morbos, tußim veterem cum suspirio. Discutit & ex foliis strumas, quadrinis diebus soluta. Furfures capitis, & vlcera manantia illita, ex oleo coctæ. Coquitur & in melle cibi gratia, maxime vti coctionem faciat. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo coctæ, & mixta resine. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine ianuæ suspensam, malorum medicamentorum introitum pellere tradit.

DE STAPHIDE AGRIA.

CAP. CCCII.

NOMINA.

Τάφης ἄγρια Græcis, herba Pedicularis et Pituitaria latinis, officinis Staphisagria, Germa. Biszmütz (Gallis de l'Estaphisagrie, ou l'herbe aux Poulx.) Pedicularis autē Pituitariaq; Latinis à viribus quas habet, dicta. Est a est: erūpentibus enim è corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur, & cōmanducata feruore multam pituitā trahit. **FORMA.**

Folia habet Labruscæ incisuris diuisa, coliculos rectos, molles, nigrosq; flores Isati similes, semen in vasculis

vasculis viridibus similibus Ciceri, triangulum, asperum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre. Hæc descriptio herba huic cuius hic effigiem damus, per omnia quadrat, floribus tantū exceptis, qui minimè Isatis similes sunt, neque in colore, neque in quantitate. Isatis enim flores lutei sunt, & exigui, huius cōtra subcassii, ac multo maiores, ut hinc ferè suspicer eam herbam non esse quā veteres pingunt Staphida agrian. Cæterum cum proximè tamen ad picturam accedat, neque viribus distet admodum, inter Staphidis agrias species rectè à plerisque hodie herbariæ rei studiosis cōnumeratur. Folia enim fert plerunque septem, aliquādo etiā paucioribus incisuris diuisa, coliculos rectos, nigros, & in folliculis herbaceis semen triquetrum, in nigro subrufum, intus cādidum, gustu acre, ita ut illi omnes nota, demptis floribus, respondeant.

LOCVS.

Nascitur, Plinio authore, in opacis. Ea cuius picturam exhibemus, nūc passim in hortis plātatur.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Quum vrendi vim habeat Staphis agria, consequitur eandē in quarto ordine esse excalescentiū & desiccantium.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Eius grana quindecim si quis trita in aqua mulsā dederit,

PLANTARVM HISTORIAE

dederit, crassa per vomitum purgant. Sed qui biberint, ambulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, & aquā mulsam potui dare, quòd strangulationis pericula inferant, & fauces deurent. Trita eadem, & ex oleo inuncta, pediculationi, pruriginì & scabiei auxiliatur. Plurimam cit pituitā comm. inducata. Decocta in aceto, dētium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingiuarum rheumatismū sistit. Vlcerā oris, apthas nominant, cum melle sanat. Miscetur præterea vrentibus malagmatis.

EX GALENO.

Vehementer acrem obtinet facultatem, adeò vt ex capite purget pituitam, abstergatq; valenter. Itaque ad scabiem accommodata est. Sed & vrenti vim aliquam habet.

EX PLINIO.

Nucleis eius ad purgationes vtī non censuerim propter ancipitem strangulationem, nec ad pituitā oris siccandam: fauces enim ledunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti. Facilius admixta sandaracha. Item pruritu & psoris. Ad dētium dolores decoquuntur in aceto. Ad auriū vitia, rheumatismum gingiuarum, vlcerā oris manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur. Semen enim abdicauerim, propter nimiā vim odoris. Quiddā eam Pituitariam vocant, & plagis serpentium utiq; illinunt. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consumptus est. Nascuntur quoq; in sanguine ipso
hominis

hominis animalia exesura corpus. Resistitur Staphidis agrias succo, cū olco peructis corporib. Hæc quidē in aceto decocta, etiā vestes eo tadio liberat.

DE SESELI MASSILIENSI.

CAP. CCCIII.

NOMINA.

ἑσέλι τὸ μασσαλιωτικὸν Græcis, Sefeli

Σ Μασιλιενσε Latinis, Officinis Siler montanum dicitur. Semen tamen quod à seplatanum.

fiariis hoc nomine venditur, non Μασιλιενsis, sed, si amaritudinē respicias, Aethiopici, vel quod magis vero simile est, Peloponesiaci (neutrius enim integram imaginem vidimus) Sefeli semen est: latius enim, odoratius, & carnosius Μασιλιενσι existit. Germanis incognita hætenus planta fuit, ob id Sefel rectè illam appellabunt.

FORMA.

Folia gerit Fœniculi, crassiora tamen. Caulē vegetiorem, umbellam Anetho similem, in qua semen est oblongum, angulosum, & degustanti confestim acre: radicem longam, & odoratam. Ex qua Dioscoridis delineatione satis constat stirpem, cuius pieturam damus, esse Sefeli Μασιλιενσε, quod huic ni mirum, nulla prorsus nota reclamante, tota descriptio suffragetur. Quid multa? dato etiam quod singule illi non responderent notæ, tamē cū eas quas veteres Sefeli attribuerunt facultates obtineat, citra omne periculum pro eo vsurparetur.

L O.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Optimū iuxta Maſſiliam, teſte Dioſcoride, Gal-
liae urbem naſcitur, vnde etiam cognominatum eſt
Maſſilienſe. Prouenit autem aliis quoque in locis
calidioribus, & nūc in plariſque Germania hor-
tis, ſed non niſi ſatum & cultum.

TEMPVS.

Floret æſtate, & ſemen ſubinde producit.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & deſiccāt in ſecundo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semē & radix calefaciendi vim obtinēt. Strā-
guria, orthopnœa, vteri ſuffocationibus & comitia-
libus pota medentur. Menſes & fœtus ex vtero duc-
cunt. Interaneis omnibus proſunt, & diutinas tuſ-
ſes ſanant. Ipſum ſemen cum vino potum coctioni
confert, tormina diſcutit, & epialis febribus vti-
le eſt. Ad arcenda in itinere frigora cum pipere
& vino bibitur. Datur capris aliisq; quadrupedi-
bus bibendum, vt partus inuet.

EX GALENO.

Scſeli & radix & ſemē vſque adeo excalefacit,
vt admodum vrinam mouere queat. Sed & te-
nuium eſt partium, vt & comitialibus, & ortho-
pnœis competat.

EX PLINIO.

Prodeſt homini ad tuſſim veterem, rupta, con-
uulſa, in vino albo potum. Item opiſthotonicis, &
ieccinorum.

iecinorū vitis, & torminibus, & stranguria, duarum aut trium ligularum mensura. Sunt & folia vtilia, vt quæ partus adiuvant etiam quadrupedū. Hoc maximè pasci dicuntur ceruæ paritura. Illinitur & igni sacro. Multum in summo cibo coctionibus confert, vel folio, vel semine. Quadrupedū quoque alui sistit, siue tritum potui infusum, siue mādendo commanducatum è sale. Boum morbus medetur, vel si contritum infunditur.

DE SANGVISORBA.

CAP. CCCIIII.

NOMINA.

QUum ignoraremus quo nomine stirpem hanc veteres Græci & Latini, si modò iis cognita fuit, appellarint, maluimus interea vulgari vt nomenclatura, donec aliud certius nomen inuenerimus. Elatinem tamen esse iudicarem, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nūc quum neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed micronata esse videantur, certi statuere nihil possum. Sanguisorba verò dicta est hæc herba, non quòd vulneribus iniecta ferrum & spicula facile & citra sensum doloris exigat, vt nonnulli arbitrantur: Et id ipsum enim non posse mirifica quæ illi inest adstringēdi facultas abundè ostendit: sed potius quòd ei insisterendo sanguine vndeunque emanarit, mira admodum insit efficacia, adeò vt hunc ipsum quasi absorbere videatur. Erroris autē huius nulla alia

HH causa

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

Error eo² causa est, nisi quòd hanc stirpem multi cum ea quæ
 rû qui Pî² hodie Pimpinella vocatur, confundunt, quæ certè
 pinellam propter caliditatem quam obtinet haud exiguan,
 cum San² quandam etiam trahendi facultatem habere vide-
 guisorba tur, adeò ut infixæ corpori extrahere facilè queat.
 cõfundūt. Quòd verò cum Pimpinella confuderint non alio
 factum est nomine, quàm quòd huius folia proximi-
 mè ad Pimpinella folia, quæ itidem ut hæc serra-
 ta sunt, accedere videntur. Sed hæc confusio nō ca-
 ret errore, ut paulò pòst dicemus. Germanis hæc
 herba Kolbleskraut, à capitellis quæ rufescenti-
 bus punctis maculata sunt, dicitur. Nonnulli etiam
 Germanorum Hergots Bartlin nominant, Qui-
 dam etiam à sistendo sanguine Blutkraut.

G E N E R A.

Duo sunt eius herbe quæ Sanguisorba vocatur
 Sanguisor genera. Vna enim maioribus constat foliis ac lōgio-
 ba maioribus, coliculis tamen tenuioribus, ideoq; ab hac fo-
 Minor. liorum forma maior à nobis dicta est. Altera mi-
 noribus foliis, coliculis autem maioribus esse depre-
 hēditur, quare ab ista foliorum effigie rectè minor
 appellari potest, ut inter eas aliquod discrimen esse
 herbària rei studiosi hac ratione animaduertant.

F O R M A.

Herba est à radice crassa & longa, statim folio-
 sa, minor potissimum, coliculos habens plurimos ru-
 bentes, folia aspera, in extremitatibus latè crenata
 & serrata, in summo coliculorum capitella rufes-
 centibus

ſcentib. punctis maculata, quæ ſi hiant flores exeunt herbacei, in medio croceam comam oſtendentes.

LOCVS.

Nascuntur locis incultis, aridioribus, & ſoli expoſitis. Vnde iterum colligere licebit non eſſe Elatinen, vtcunque à facultatibus illius non diſcrepet, quòd Dioſcoride & Plinio teſtibus, Elatine incultis & ſegetibus proueniat.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio menſibus.

TEMPERAMENTVM.

Guaſtantibus adſtrictionē hand vulgarē ac viſcoſitatem herba præ ſe ferre videtur. Quapropter ſiccam admodum conſiſtentiam naſta eſt, ſimulq; corpora contrahere, & conſtringere poteſt, atque adeò emplaſtica, eò quòd glutinoſa ſit, facultatē obtinet.

VIRE S.

Ex iis quæ diximus abundè cõſtat vtranque Sanguisorbam in reſtringendis ac ſupprimendis ſanguinis profluuiis eſſe efficaciffimas, adeò vt nonnulli conſtanter aſſerant, eas etiã manibus geſtatas ſanguinem vndecunque manantem ſiſtere poſſe. Experiencia certè cõpertum eſt ad muliebre profluuium ſanandum, nullum poſſe reperiri præſentius iis ſtipibus præſidium. Glutinant etiam vulnera illarum folia, carcinomatiffique & fiſtulis medentur. Generoſum denique ac ſtrenuum remedium eaſdem eſſe ad dyſenterias, & reliquos vëtris fluxus, ſi ex aqua

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

aut vino bibantur, nemini non notū est. Quid multa? Elatines herba, cuius certè hæc duæ stirpes generis Pimpinellæ esse videntur, facultates habent. Quare tota cella non solo errant qui herbas has, ut suprà etiam cōmemoratum facul raturū est, cum Pimpinella confundant, quòd hæc facultatibus, ipsa acris admodum sit & multum calida: illa con verū etiā trā sapore, haud secus atque Elatine, adstringente. forma à Verū non tantū differunt facultatibus, imò et Sanguis tiam odore, coloreq; foliorum, maximè verò florum sorba di diuersitate, ut quini ex vtriusque herbae pictura uersa. collatione statim deprehendet.

D E S C O L Y M O . C A P . C C C V .

Scolymus Artichaut Gallis.

N O M I N A .

Carduus. **Σ**κόλυμος Græcis, Carduus & Strobilus La-
Strobilus. **Σ**tinis, Columella Cinara dicitur. Sunt qui ho-
Cinara. die Arcocum corrupta voce nominent, primam vo-
cis syllabam articuli vice præponentes. Alii paulò
Alcocalus rectius Alcocalum vocant: Cocali siquidem nomi-
Cocalus. ne, nux pinea, cui Scolymi capitulum simile est, ve-
nit. Nunc vulgo herbariorū ab articulo statim dua
Articoca- bus interiectis literis Articocalus, aut expuncta vo-
lus. cali, a, Articoclus, vel magis curtato, ut ferè sit, vo-
Articoca. cabulo, Articals vel Articoca nūcupatur. Germani
instar vulgi Articoca, (Gal. Artichaut) nomina
Strobilus bunt, aut Strobildorn. Strobilū autē Rom. hanc
cur dicta. stirpem non alia ratione dixerunt, quàm quòd eius
capitulum, ut diximus, structili nucleorū serie pi-
neam

neam nucem referre videtur. Cinarā verò sunt qui Cinara appellatam putent, quòd satum & cultum cineri: quare apibus gaudeat. Alii à Cinara potius puella, quæ in eo pellata. ius speciei Carduum mutata est, dictam esse volūt.

FORMA.

Folia habet Chamæleontis, & spina alba vocata similia, nigriora tamen ac crassiora. Caulem emittit oblongum, foliosum, in quo capitulum spinosum. Radicem verò nigram & crassam Hæc Dioscorides. Ceterū caput eius & vertex in squarosum extuberat globum, corticosis vnguibus turgentem, spicisq; squamatim coagmentatum, quorum orbis exterior viuet, interior niueo candore nitescit. Flos purpureo rutilat colore, qui tandē euanescit in pappos. Caput vetustate tandē dissilit in corticeas laminas, semen ostendens Cnici figura. Nos tamen integram Scolymi faciem ac picturam hoc tempore dare nō potuimus, quòd primo anno fructum suum nō ostendat. Curabimus autem alio tempore ut studiosi integram eius habeant picturam.

LOCVS.

Nusquam, quòd sciam, in Germania provenit Cinaræ Scolymus, nisi sata et culta. Quare Scolymus qui in hor hortensis tū colitur & plantatur, verè Cinara existit. Quod propriè idèò monendum esse duximus, quia inter Græcos Cinara esse constat, ut est Paulus & Aetius, qui Scolymum dicitur. à Cinara discriminant. Non est autem aliud inter Scolymus eas stirpes discrimen, quàm quòd Scolymus ferus

PLANTARVM HISTORIAE

Cinara. est & syluester, Cinara verò domita cultu, ideoq; à
Carduus nonnullis *Carduus altilis* nominatur.
altilis.

TEMPVS.

Quum Solstitium æstiuum agitur, Scolymi flos
erūpit, Hesiodo in lib. ij. cui titulus Opera & dies,
teste, qui ea florente cicadas acerrimi cantus esse,
& mulieres libidinis auidiſſimas, virosq; in coitum
pigerrimos, capite, genibus, ac toto corpore præ Si-
rii æstu areſcentibus, ſcribit.

TEMPERAMENTVM.

Quæ ſecūdam qualitatem editur actio, calidum
in ſecundo ordine completo, aut tertio incipiente,
medicamentum indicat, ſiccum verò in ſecundo.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Radix scolymi illita graueolentiam alarum, &
totius corporis emendat. Item ſi decocta in vino bi-
batur. Vrinam etiam copioſam foetidamque pellit.
Herba cū recens naſcitur teneſcitve, aſparago-
rum modo in olera tranſit.

EX GALENO.

Scolymi radix copioſam urinam graueolentem
elicit, ſi quis eam in vino coctam bibat: ideoq; gra-
ueolentiam ſanat, tum alarum, tum totius corporis.
Atque hoc ſanè medicamēto ex tota ineſt eſſentia,
vtpote eius ſucco exiſtente purgatorio. Et in libro
ſecundo de alimentorum facultatibus: prauī ſucci
edulium eſt Cinara, præcipuè cū iam durior euas-
ſerit: tum enim bilioſi humoris copia abundat, to-
tāque

tâque eius substantia durior existit, adeoq; vt ex ipsa melâcholicus, ex succo verò eius tenuis & biliosus humor producat. Proinde coctâ edere præstiterit adiecto coriandro, dein ex oleo, garo, vinoq; sumatur. Si tamen in Patina aut sartagine ad esum præparetur, absque iis comedatur. Plerique enim sic eius veluti cacumina comedunt, quæ spondylos nominant.

EX PLINIO.

Vrinâ ciere Scolymū præcipuè traditur. Sanare lichenas & lepras ex aceto. Venerē stimulare in vino, Hesiodo et Alcaeo testibus, qui florēte ea cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis avidissimas, virōsque in coitum pigerrimos scripsere, velut providentia naturæ hoc adiumento, tunc valentissimo. Item graueolentiam alarum emendat radice emedullata vncia, in vini falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balneo ieiuno, itemq; post cibum cyathis singulis pota. Mirum est, quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per urinam effluere.

DE SPHATULA FOETIDA.

CAP. CCCVI.

Sphatula foetida cū Xiride magis cōuenit.

NOMINA.

Herba quā officinæ Sphatulam foetidam vocant, quod grauem exhalet odorem, quomodo veteribus sit appellata nondum certò scire possum. Nomen quidem ipsum Xiphū seu Gladioli

Sphatula
foetida
dicta.

HH iij

speciem

PLANTARVM HISTORIAE

Sphata. speciem esse docet: *Sphata* siquidem Latinis gladii
Sphatula significat. Non esse autem *Xiphium* radix eius eni-
 fetida nõ denter admodum ostendit, quæ non est bullosa, nec
 est *Xiphi-* gemina, ita vt altera alteri insideat, sed capillamē-
 um. tis fibrata. Neque etiam *Sparganium* esse partim
 Non est folia eius, quæ in terram non procumbunt, partim
Sparga- etiam semina, quæ non in pilulis, sed folliculis aut
 nium. siliquis profert. Non videtur etiam esse *Xyris*,
 Non est quod illa radicem habeat longam & rufam, *Spha-*
Xyris. tula verò fetida nec longam nec rufam, sed rotun-
 dam, albam & capillatam. Tamen quicquid sit gē-
 tilem iis esse foliorum similitudine constat. Ger-
 mani eam *Vuandt leutzkraut*, à necandis cimi-
 cibus appellant.

FORMA.

Folia *Iridi* similia habet, minora tamen & an-
 gustiora. Caulem ex se mittit, in cuius summo folli-
 culos aut siliquas *Pæonia* femina non dissimiles
 profert, quibus dehiscuntibus semen in iis apparet
 rotundum & rubrum. Radicem obtinet capilla-
 mentis multis fibratam.

LOCVS.

Circa sepes & dumeta nascitur, frequens in Ita-
 lia, nusquam tamen in Germania, quod sciam, nisi
 sata provenit.

TEMPVS.

Fructum seu siliquas suas autumnno profert, ac
 subinde in iis, ubi dehiscunt, semen ostendit.

TEM.

TEMPERAMENTVM.

Vehementer acrem qualitatem obtinet, adeò vt gustata, fauces quasi virere videatur. Proinde calidam & siccam admodum esse constat.

VIRES.

Non multum à Staphidis agria viribus abesse apparet: valenter enim abstergit. Hinc ad scabiem, eius potissimum succus, abigendam utilis est. Surculos etiam & spicula, perinde atque Xiphium & Xyris, sine dolore extrahit. Cimices quoque necat atque fugat.

DE TRICHOMANE.

CAP. CCCVII.

NOMINA.

TΡΙΧΟΜΑΝΕΣ Græcè, Trichomanes, Capillaris Polytrichon Latine vocatur. Officinis Polytrichon falso dicitur: id enim nominis Adianto herba, quam hodie Capillum Veneris vocant, Dioscoride & veteribus aliis testibus, debetur. Germanicè Vuiderodt, oder Abthon (Gallis du Polytrichon) Trichomanes autem à facultate sua Græci nominauerunt, quòd scilicet fluentem capillum expleat, & subnasci faciat: μανὸν enim ea græsarum vocant, τριχὰ autem capillum. Hoc etiam Capillaris nomine Capillarem latini dixerunt.

FORMA.

Filici simile est Trichomanes, paruum admodum. Ex vtraque parte ordine quodam folia habet

PLANTARVM HISTORIAE

bet tenuia, Lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendentibus, subnigris & austeris. Cuius equidem descriptionis nota omnes, nulla penitus reclamante, herba illi quam hodie officina Polytrichon vocant, pulchrè quadrant. Si quidem cauliculis iunceis, quincuncialibus, à radice statim penè foliatis constat, foliis rotundis, lenticulae forma, aduersis inter se pediculis ramulis subnigris & nitentibus, sine flore, sine semine.

LOCVS.

Nascitur in palustribus atque vmbrosis locis, humentibus muris, & iuxta fontes, haud secus atque Adiantum.

TEMPVS.

Carpitur aestate & autumnii initio.

TEMPERAMENTVM.

Trichomanes in caliditate quidè & frigiditate symmetrū est, verū desiccatur, extenuatur & digerit.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eadem potest quæ Adiantum. Cum itaque Adiantum aliunde in Germaniam sit deportandum, & Trichomanes passim proueniat, licebit hoc in alterius inopia uti. Et consultius multò ut Trichomanes utantur Officina, quàm Adianto adulterino. Prodest igitur Trichomanis decoctum potum asthmaticis, dyspnoicis, felle suffusis, lienosis, vrineq; difficultatibus. Calculos frangit. Aluum sistit. Venenatorum morsibus, & stomachi fluxionibus in vi-

no potum medetur. Menses & secundas ducit, sanguinis autem reiectiones sistit. Crudum illinitur venenatorum moribus. Alopecias explet, strumas dissolvit. Furfures & achores cum lixivio exterit. Cum ladano, myrtino, susino, aut hyssopo & vino capillos defluentes continet. Decoctum etiam eius cum lixivio & vino si eo abstergantur, idem potest.

EX GALENO.

Alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, lapidesque frangit potum. Viscosorum crassiorumque ex thorace pulmonéque excreationibus non mediocriter confert. Ventris profluvium sistit, nullam tamen manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem.

EX PLINIO.

Calculos è corpore mirè pellit, frangitque, utique nigrum. Qua de causa potius quam quòd in saxis nasceretur, et à nostris Saxifragum appellatum crediderim. Bibitur è vino quantum terni decerpere digiti. Urinam cient. Serpentium & araneorum venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex iis sedat. Contra scolopendreae morsus illinuntur, crebro auferendi ne pereant. Hoc & in alopeciis. Strumas discutit, furfuresque in facie, & capitis manantia ulcera. Decoctum ex his prodest suspicioso, & iecinori, & lieni, & felle suffusis, & hydropicis. Stranguriae illinuntur, & renibus cum Absinthio. Secundas cient & menstrua.

Sanguinem

PLANTARVM HISTORIAE

Sanguinem sistunt ex aceto, aut Rubi succo poti. Infantes quoque ulcerati perunguntur ex iis cum rosaceo & vino prius. Folium in urina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum ventri mulierum, ne rugosus fiat, prestare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse utilissimos.

DE TELI. CAP. CCCVIII.

Fœnumgræcum corrupte, Vulgus Senegrec, per S loco F.

NOMINA.

Tήλιν, κρόαιτις αἰγὸκῶρος, βούκῶρος Græcis, Fœnūgræcum Latinis: officinae genuinum nomen retinuerunt: Germanis Bockshorn, oder Kuhorn, (Gallis Fenegrei, ou Fenegrec) dicitur. Magna græcarū appellationum pars à siliquarum quas producit figura desumpta est: hæ enim corniculis similes existunt. Hinc Ceraitis à cornu simpliciter dici cæpit: κῶρος enim Græcis cornu est. Aegoceros autem à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod sanè nomen Theophrastus libro quarto de historia plantarum illi imposuit. Cum itaque corniculis similes habeat siliquas, factum est ut illam Columella simpliciter Siliquam nominauerit, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

Ceraitis
cur dicta.
Aegoceros
Buceros.

FORMA.

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, folio pe-

nè Trifolij, flore candido & exiguo, semine in siliquis oblongis, ac cornu instar incuruis fuluo. Radice subrotunda & oblonga innititur.

LOCVS.

Satum Fœnogræcum passim ferè provenit.

TEMPVS.

Iunio & Iulio mēsisbus floret, & vnà siliquas producit. Semen tamen in Augusto maturum legitur.

TEMPERAMENTVM.

Fœnumgræcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Molliendi & dissiuolendi facultatem habet fœnogræci farina. Facit ad inflammationes quæ intus forisq; sunt si cum aqua mulsa decocta trita illinatur. Lienem cū nitro & aceto subacta & illita minuit. Decoctū eius in seculo ad muliebria mala, quæcunq; per inflammationes aut præclusiones consistunt, vtile est. Expressus Fœnogræci in aqua decocti succus, capillos, furfures & achores exterit. Cum anserino adipe pessi vice apponitur, loca quæ iuxta vterum sunt emolliens & relaxans. Viride cum aceto imbecillis & exulceratis locis prodest. Decoctū eius aduersus tenesmos, & grauiter olentia dysentericorum excrementa confert. Oleum eius cum myrtino capillos & in genitalibus cicatrices abstergit.

EX GALENO.

Fœnumgræcum feruentes inflammationes irritat.

PLANTARVM HISTORIAE

tat. Quæ verò minus sunt calida, & magis dura, eas digerendo curat.

EX AETIO.

*Fœnumgracum habet etiam abstergendi vires. Variis modis comeditur, sed copiosius sumptum caput tentat. At cremor decocti Fœnograci cum modico melle exhibitus, omnes deprauatos intestinorum humores educit. Permodicū esse oportet quod permiscetur mel, ne erodat. In diuturnis verò doloribus qui sine feбри thoracem infestant, pingues si mul palmulæ elixantur, inde succo expresso mel-
léque admixto suppositis carbonibus rursus decoquantur vsque ad congruam consistentiam. Datur id diu ante cibum, obseruariq; oportet ne iis exhibeatur, quibus facile caput dolet: palmulæ enim capiti infestæ sunt.*

EX PLINIO.

Vis eius siccare, mellire, dissoluere. Succus decocti fœminarum pluribus malis subuenit: siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, fouentur, insidunt. Infusum quoque prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic iecinori decoctū. Diocles difficilè parientibus semen eius dedit acetabuli mensura tritum in nouem cyathis sapæ ad tertias partes bibere, vt qui biberent in calidala uarentur. Et in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquū, pro sum-

mo auxilio. Farinā fœnogræci cum hordeo aut lini
 semine decoctā aqua mulsa cōtra vuluæ cruciatus
 subiecit. Itemq; imposuit imo ventri. Lepras, lenti-
 gines, sulphuris pari portione mista farina curauit,
 nitro antè præparata cute, sæpius die illinēs, perun-
 giq; præcipiēs. Theodorus Fœnogræco miscuit quar-
 tā partem purgati Nasturtij acerrimo aceto ad le-
 pras. Damion Fœnigræci semen acetabuli dimidia
 mensura cum sapæ & aquæ nouem cyathis ad mē-
 ses ciendos dedit potu. Nec dubitatur quin decoctū
 eius vtilissimum sit vuluis, interaneisq; exulcera-
 tis, sicuti semen articulis atque præcordiis. Si verò
 cū Malua decoquatur, postea addito mulso potus,
 ante cetera vuluis interaneisq; laudatur: quippe cū
 vapor quoque decocti plurimum possit. Alarū etiā
 graucolentiam decoctum Fœnogræci semen emen-
 dat. Farina porrigines capitis fursurēsque cum vino
 & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem de-
 cocta addita axungia genitalibus medetur. Itē pa-
 rotidi, podagra, chiragra, articulis, carnibusq; quæ
 recedunt ab ossibus. Aceto verò subacta luxatis. Il-
 linitur & lieni decocta in aceto, & melle tantum.
 Carcinomata subacta ex vino purgat, mox addito
 melle persanat. Sumitur & sorbitio è farina ad pe-
 ctus exulceratum, lōgamq; tussim. Diu decoquitur
 donec amaritudo desinat, postea mel additur.

DE TELEPHIO.

CAP.

CCCIX.

Telephium

PLANTARVM HISTORIAE

Telephium pingit vulgo Gallorum Orpin dictam herbam, in qua tamē quædam desiderantur.

NOMINA.

TΕΛΕΦΙΟΝ, ἢ ἀείζων ἄγριον Græcis, Telephium & Illecebra Latinis, officinis & vulgo Crassula maior appellatur. Sunt qui Fabā crassam, à foliorum quam cum faba habent similitudine, nominant. Germanis Vuundkraut, Knabenkraut, Forzzuuang, Forzuuein, (Gallis du Chicotrin) dicitur. Telephiū verò dictū est, quod unde di- ulceribus malignis & deploratis, quibus Telephus Elum. Mysia rex ab Achille vulneratus cōsenuit, quæ eā Telephia etiam ob rem Telephia vocantur, auxilietur.
ulcera.

GENERA.

Dioscorides duo genera facit. Vnum floribus albis, quod nobis Telephium album nominare placuit, Germanicè Vuundtkraut das vueible. Alterum floribus luteis, quod Norimbergæ me vidisse memini. Damus pro illo Telephium purpurascētibus floribus emicans quod ad differentiam prioris Telephiū ris Telephium purpurascens appellare volumus, purpurascens. Germanicè Vuundkraut das mennle. Præter flores qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascētes, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis & herbaceus existit, in purpurascente autem paulò pallidior. Cætera omnia in iis similia apparent, folia potissimum, quæ fabacea

fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora, & crassiora existunt.

FORMA.

Foliis & caule Portulacæ similis herba Telephium. Alas binas in singulis foliorum geniculis inhaerentes habet. Ramuli à radice semi septenive prodeunt, referti foliis cæruleis, crassis, glutinosis, carnosis: flores illi lutei, vel albi, vel purpurascens radix ima, quod Diosco. omisit, innumeris tuberibus scatet. Nō est autem cur diuersum Telephium hoc nomine ab ea herba, quam herbarij hodie crassulā maiorem nominant, suspicemur, cum omnes reliquæ notæ à Dioscoride commemoratæ, illi adamussim conueniant. Et solenne certè est Dioscoridi ut multas notas, in his potissimum herbis quas ipse nō vidit, atque adeò ex aliorum fide pingit, easq; maxime quidem necessarias omittat, & silentio trāseat. Quibus etiam accedit locus natalis, & facultates Telephij, quæ eadem sunt cum iis quæ Crassulæ maiori recentes herbarij adscribunt. Sunt qui alterum acetabulum esse putent, quorum sanè sententiam non admodum absurdam esse indico.

LOCVS.

Nascitur inter vites, locis cultis & incultis, humidis.

TEMPVS.

Vere statim prosilit, Iulio autem & Augusto mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

PLANTARVM HISTORIAE

Telephium exiccat ordine secundo intenso, aut certe principio tertij, non tamen insigniter calida, verum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia senis horis illita, albas vitiliginis sanāt: sed oportet postea hordeacea farina illinere locum. Quinetiam alphas tollunt cum aceto in sole inuncta. Sed ubi inaruerint, absterguntur.

EX GALENO.

Telephium detergendi & exiccandi facultate est prae-ditum: proinde ad putrida vlcerum conuenit, & leucas & alphas cum aceto sanat.

EX PLINIO.

Illinitur lentigini, & cum inaruit teritur. Illinitur & vitiligini, ternis ferè mensibus senis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

APPENDIX.

Recentiores herbarij sua *Crassula* maiori in curandis vulneribus, & sistendo sanguinis profluuium vtuntur vt eandem esse cum *Telephio* vel hoc saltem nomine nemo dubitare debeat. Magnā autem efficaciam habere in internis potissimum vulneribus & vlceribus, mirificēque herniosis prodesse iidem tradunt.

DE TRINITATIS HERBA.

CAP. CCCX.

Herba

Herba Trinitatis nobis Pensée.

NOMINA.

Quo nomine priuatim plāta hæc Græcis aut Latinis appellata sit medicis, ignorare me fateor. Constat tamen Viola inodora genus esse, & mea quidem sententia Iouis florem. Iouis flos. Vulgus à triplici colore floris, herbā trinitatis nominat. Sunt qui Iaceam, & herbam clauellatam appellāt. Germani Dreyfeltigkeytblumen, & de dicta. Freyschamkraut (Galli Herbe de la Trinité) Iacea. vocant.

FORMA.

Herba hæc folio est initio rotundo, per ambitum serrato, processu tēporis oblongiore, cauliculo triangulo, intus cauo, leniter striato, ex internallis geniculato, prodeuntibus ex alarum sinu pediculis longis, in quibus summatim elucēt flores figura & specie violarū purpurearū, superiore parte purpurei, in medio cādidi, inferiori verò lutei, radiis quibusdam nigris distincti. Quibus decidentibus semina protuberant.

LOCVS.

Sua spē in aruis interdū prouenit. In hortis tamen vt plurimum plantatur, speciosiorq; nascitur.

TEMPVS.

Vere viola hæc post purpuream emicat, & tota æstate floret.

TEMPERAMENTVM.

Herba in gustu lentorem quendam, atque modicam acrimoniam cen mordacitatem præ se fert,

II ŷ atque

PLANTARVM HISTORIAE

atque adeò à Symphyti temperamento non admodum abesse videtur, id quod etiam ex facultatibus quas illi recentiores tribuunt facile deprehenditur. Calida itaque & sicca est.

VIRE S.

Quum acrimonia ratione incidendi vim quampiam habeat, ideo recte recentiores asthmaticis, pulmonisque phlegmonibus prodesse tradunt: collectum siquidem in thorace & pulmone pus expurgare potest. Hac ratione puerorum etiam comitialibus morbis auxilio esse solet. Caterum non parum ad pruritus & scabiem confert, omniaque cutis vitia emendat, idque mediocris acrimoniae & siccitatis ratione. Vlcera etiam, quia viscositatem obstat, glutinare potest.

DE TEUTLO. CAP. CCCXI.

NOMINA.

TΕΥΤΛΟΝ, ἢ σβύτλον Græcis, Beta Latinis appellatur. Germanis Mangolt, oder Pissen σβύτλον (Gallis de la Porrée, ou de la Iotte.) σβύτλον unde dictum. autem Græci ab impulsu nominarunt, etenim cultus ratione quadam incrementum capeßit arboris, neque vlli hortensium latitudo foliorum maior. Beta nomen sibi adsciuit, quoniam figuram β literæ græcæ dū semine turget referre videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatum nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens.

Nomine

Nomine tum Graio, ceu litera proxima prima,
 Pangitur in cera docti mucrone magistri,
 Sic & humo pingui ferratae cuspidis ictu
 Deprimitur folio viridis pede candida Beta.

G E N E R A.

Eius à colore omnes duo genera faciunt, candidam & nigram. Candida alio nomine Sicula, vt Candida Theophrastus libro octauo de historia plantarum, Beta. & Plinius libro decimonono, capite octauo, memorie prodiderunt, appellatur. Et nunc extrita litera vna ferè omnibus nostri seculi medicis Sicla nominatur. Germanicè Vuiffer Mangolt. Nigra ad a Sicla. Nigra Beta videtur tendere colorem, & à Germanis rotter Mangolt vocatur. ta.

F O R M A.

Caulem habet striatum, bicubitalem, foliū ferè Atriplicis, flores exiguos luteos, semen in caulibus copiosum: radicem vnicam in longum protensam, è cuius lateribus aliæ, modò singulæ, modò binæ, nonnunquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ.

L O C V S.

In hortis passim, & cultis locis nascuntur Betae.

T E M P V S.

Iulio & Augusto mensibus floribus & semine turgent.

T E M P E R A M E N T V M.

Nitrosa qualitate particeps est. Nigra tamen adstrictionis quippiam adiunctum habet, & magis in

PLANTARVM HISTORIAE

radice quàm in aliis partibus. Simeon Sethi calidam & siccam esse in tertio ordine asserit.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Nigra Beta cum lente cocta aluum efficacius cohibet, multoq; magis radix. Cãdida aluo utilis est. Vtraque verò propter nitrosam vim quã habet mali succi est. Vnde succus earũ cum melle naribus inditus caput purgat. Aurium etiam doloribus auxiliatur. Decoctũ radicum & foliorum furfures & lēdes deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis foliis alphos nitro prius perfrictos, alopecias prurientes, atque depascentia vlcera illini prodest. Cocta exanthematis, erysipelatis, & ambustis medetur.

EX GALENO.

Beta nitroſe facultatis est particeps, qua tñ extergit, tum digerit, & per nares purgat. Caterũ cocta nitroſitatem omnem exuit, fitq; facultatis phlegmonis aduerſe, leuiter diſcutientis. Porro ad detergendum digerendũque validior est Beta alba. Nam nigra adiunctum habet quippiam adſtriſſionis, & magis in radice quàm aliis partibus. Beta itaque abſterſorius inesse ſuccus conſpicitur, adeo vt aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquam ſtomachũ demordeat, præſertim iis quibus ille ſenſilior obtigit: cõque largius commanſa: ſtomachum infeſtat. Huius ceu aliorum olẽũ, exigua eſt alimonia. Iecoris obſtructionibus, quàm Malua, aptius accommodatur, magis autem vbi cũ

Sinapi

Sinapi estur, aut aceto. Lienosos item similiter māducata, mirificè iuuat.

EX PLINIO.

Nec Beta sine remedio est vtraque. Siue cāddide, siue nigra radix recens & madefacta, suspensa fūniculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, cōtra tineas. Nigra radices ita in aqua cocta, pruriginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres & vertigines, item sonitum aurium sedat, infusus iis. Ciet vrinam. Medetur dysentericis iniecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus valet, sed huius radici duntaxat expressus. Ipsa verò decocta, per mionibus occurrit. Alba succus epiphoras sedat, frōte illita. Aluminis pauco admixto, ignem sacrū. Si ne oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones papularū cocta. Eadē cōtra vlcera quæ serpunt. Illinitur & alopecis cruda. Et vlceribus quæ in capite manāt. Succus eius cum melle naribus inditus, caput purgat. Coquitur & cum lēticula addito aceto, vt ventrem molliat. Validius cocta, fl. & nationes stomachi sistit & ventris.

EX SIMEONE SETHI.

Eius succus mediocriter abstergit. Hic etiam vētrem ad effluxum proritat, & stomachū aliquādo vellicat, eorum præsertim qui hunc valde sensilem

PLANTARVM HISTORIAE

obtinēt. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimum comedatur. Exiguum est eius alimentum, sicut ceterorum olerum. Vtilis verò est ad iecoris obstructiones cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionibus bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrariis facultatibus. Succus enim eius calidus est, ventrem constringit, & sitim affert. Eius verò corpus crassius partium, flatuosum, concoctum difficile & frigidum. vètemq; sistit, maxime si qua in aqua coctum est, subinde abiiciatur.

DE TINCTORIO FLORE.

CAP. CCCXII.

NOMINA.

AN herba hæc veteribus cognita fuerit nondum compertū habemus: quapropter ad germanicam alludentes appellationem, Tinctoriū florem interim dum certius nomen nacti fuerimus, nominabimus. Germani Gilb oder Streich oder Ferbblumen, quòd florum illius in tingendis libris & aliis quibusdam vsus sit, nuncupant. Sunt qui Ackerpfrimmen vocant.

FORMA.

Genista nō admodū dissimilis est hæc herba: ramos enim herbaceos, ut illa habet, ac scabros, folia tamē paulò longiora & latiora, ad Hyssopi ferè formā accedētia, florē luteū, Piso simile, semē ī siliquis Lenticulæ haud adsimile, radicem planè ligneam.

LOCVS.

Prouenit locis altis, incultis & aridis, atque pratis nonnullis.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atque deinceps semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Amara est haud aliter quā Genista, vt caleface re illā & siccare in altero ordine sit euidentissimū.

VIRE S.

Vt forma & temperamento Genista similis est, sic etiam facultatibus haud dubiè eidem respondet. Has igitur suo loco reperies.

DE TORDYLO. CAP. CCCXIII.

NOMINA.

Tόρδυλον, ἢ τordύλιον, ἢ σέσελι κρητικόν
 Græcis: Tordylon & Tordyliō, & Sefeli Cre
 ticum Latinis. Paulus Gordylion appellat. Germanis Beeruurtz (Gallis du Sefeli) dicitur, vt supra in capite de Dauco quoque diximus. Nā cum Dauci semen hirsutum sit, utcumque cetera respondeant, hoc verò minimè, non est cur Daucum esse credamus.

FORMA.

Fruticosa est herbula, semen habens rotundum, geminatum, clypeo simile, subacre, & odoratum. Quæ sanè omnes notæ huic herbæ, quæ à Germanis Beeruurtz dicitur, respondent, vt eius pictura, quam
 in capite

PLANTARVM HISTORIAE

in capite de Dauco reperiens, abundè docet. Hęc autem propterea radicum similitudinem inter Daucorum effigies habere locum voluimus.

LOCVS.

Nascitur in Amano Cilicia monte. In multis etiam Germania nostra locis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Calfacit & exiccat, vt ex facultatibus eius abundè colligere licet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Potum eius semen contra vrina difficultatem, & ducendis mensibus prodest. Succus verò caulis seminisq; adhuc virentis trium obolorum pondere haustus decem diebus in passo, nephriticos sanat. Efficax etiam radix, cum melle siquidem linctā, quæ in thorace sunt educit.

EX PAVLO.

Cordylon alij Seseli appellant, vrina & mensibus ducendis habile. Radix ipsius ex melle linctā, quæ in thorace hærent, educit.

EX PLINIO.

Combusta potu ciet menses, & pectoris excretiones, efficaciore etiānum radice. Succus eius ternis obolis haustus renes sanat. Additur radix eius & in malagmata.

DE TITHYMALIS. CAP.

CCCXIIII.

Tithymalorum genera passim luxuriât,
Reucille matin Gallis dicuntur, opinor
quòd vrente acrimonia insomnia pariât.

NOMINA.

Tιθυμάλος, ἡ τιθυμάλου Græcis, Lactaria
herba, & Lactuca caprina aut marina Lati-
nis, barbaris & officinis Esula, Germanis Vuolffs-
milch (Gallis du tithymale, ou herbe à lai &)
dicitur. Lactariam autem herbam communi appel Lactaria
latione, ob commune omnibus lac, vniuersum hoc herba cur
genus vocauerūt. Lactucā verò ob eādem causam, nominata
quia scilicet ex hac herba haud secus atque ex La Lactuca
Etuca secta lac fluit. Caprinam, quòd capra Tithy caprina
malis vescantur. GENERA. quare vo-

Septem sunt, Dioscoride & aliis veterib. testibus, cata.
Tithymalorum genera. Primus Characias, id est, Characias
vallaris dicitur, quòd vallis septisq; muniendis ido-
neus sit. Secundus Myrsinites, à Myrti foliorum si Myrsinis
gura: aut à nucibus, quibus similem fert fructum, tes.
Caryites nominatur. Hunc fructum sunt qui Nucē
vomica, Germanis Kronaglin vocatam, esse pu-
tent. Tertius Paralysus, id est, marinus, quòd in ma- Paralysus.
ritimis nascatur, appellatur. Quartus Helioscopius, Heliosco-
hoc est, solisequus, quia eius coma ad solis cursum pins.
circūagitur nominatur: germanicè Sōnen vuēde-
de Vuolffsmilch vocari potest. Aliis nominatur,
großz

PLANTARVM HISTORIAE

Cyparissias. grosz Vuolffsmilch. Quintus Cyparissias à Cypresensi similitudine nūcupatur. Germanicè cypresene Vuolffsmilch nominari potest. Sextus Dendroides. droetdes, à ramorum copia dicitur. Septimus Platyphyllos. id est, latifolius, à latitudine foliorum nominatur. Germanicè Breytbletterne Vuolffsmilch, alij grosz Teuffelzmilch vocāt. Nos ex iis generibus tria tantum depicta damus, quòd reliqua videre nondum nobis licuerit. Proferent fortè alij longè plura.

FORMA.

Nos ea tantum genera quorum picturas exhibemus, omiſſis aliis, describemus. Helioscopius itaq; **Helioscopius.** Portulacæ similia folia obtinet, tenuiora tamen atque rotundiora. Ramos autem à radice prodeuntes quatuor aut quinque mittit, dodrātales, tenues & rubentes, copioso lactis liquore plenos. Caput huic est Anetho simile, & semē veluti in capitulis inclusum Circumagitur huius coma cum sole, vnde & **Cyparissias.** Helioscopij nomen accepit. Cyparissias caulem emittit dodrantalem, aut maiorem, subrubrum, ex quo germinant folia pini similitudine, teneriora tamen ac tenuiora. Et in vniuersum pino nuper nata similis est, vnde & nomen traxit. Abundat hæc etiam succo candido. **Platyphyllos.** Platyphyllos Verbasco similis est, longioraq; reliquis folia habet.

LOCVS.

Helioscopius in ruderibus potissimum, & circa oppida

oppida nascitur. Cyparissias in cāpestribus frequē-
tissimus occurrit. Platyphyllos verò in syluis.

TEMPVS.

Semen Tithymalorum autumnio legitur, succus
verò incipiente pomorum lanugine.

TEMPERAMENTVM.

Vincentem habent acrem calidamq; facultatem,
inest verò & amaritas. Ex quarto itaque calefa-
cientium sunt ordine, & valenter desiccant.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Characia liquor lacteus aluum per
inferna purgandi, pituitā, & bilem ducens, duorū
obolorum pondere ex posca sumptus. Cum melicra-
to autem vomitū cit. Appetente vindemia lacteus
colligitur liquor. Depilat liquor hic recens ex oleo
in sole inunctus, renascentesq; flauos & exiles effi-
cit, tādēq; omnes destruit. Cauernis dentiū indi-
tur, leuatq; dolores: sed cera dentes oblinendi, ne ef-
fluens fauces aut linguam vitiet. Idē inunctus myr-
mecias, acrochordonas, thymos & impetigines tol-
lit. Valet etiā aduersus pterygia, carbunculos, pha-
gedenas, gangrenas, fistulāsque. Semē & folia ea-
dem lacteo succo præstant, dimidiū acetabuli pōde-
re pota. Radix drachmæ pondere cum hydromeli-
te inspersa & pota per inferna purgat. Decocta cū
aceto, colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Helio-
scopiū eandem priori vim habet, non tamen vsq;
que adeò intentam. Nec diuersam facultatem obti-
nent

PLANTARVM HISTORIAE

nent Cyparissias & Platyphyllos.

EX GALENO.

Validissimus Tithymalorū liquor est. Secundum locū tenet semen & folia. Sed & radix earundem facultatum particeps est, sed nō ex aequo. Sanē ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximē qui illis erosio proveniunt. Ad liquores ut qui valentiorē vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur. Caterū si aliam corporis partem contigerint, continuō adurunt, ulcerantq̃: quapropter foris illis cera circūlinitur. Sic pilos quoq; succus inunctus tollit. Porro quum vehemētior sit, oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandē prorsus radices praeiorum adusta corrumpuntur, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia & thymos auferunt, detergentq̃; lichenas & psoras, quia scilicet abstergendi illis facultas inest, propter amaritudinem. Præterea ulcerum phagedanica, anthracode & gāgranode, quia valēter calefaciunt & abstergūt, si in tēpore & moderatē quis utatur, iuuare poterunt. Verum enimvero & fistularum callos, eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanē & ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrimē nāque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi, ad aqua superficiem feruntur. Caterū quū septem sint eorum genera, valentissimus

tissimus est quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui verbasco adsimilis est, & Cyparissias: post Paralium, denique Helioscopium. Proportionem verò comprehendere illorum facultatis & cinis & liciisium erit.

EX PLINIO.

Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characia exceperit. Est & semē in usu cum melle decoctum ad catapotia soluenda alui gratia. Semen & dentium canis cera includitur. Colluuntur & dentes succo radicis decoctæ in vino aut oleo. Alinunt & lichenas succo, bibuntque eum ut purgent vomitiones, & aluo soluta, aliās stomacho inutilem. Trahit pituitam sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluū purgari libeat, in posca: si vomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis constat. Ficos à cibo sumpsisse melius est. Fauces vrit leniter. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extra corpori impositū, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Helioscopium trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo. Ceteri usus qui Characiae. Cyparissia eadē vis quæ Helioscopio aut Characiae. Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice vel foliis, vel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas.

DE TRIPHYLLO.

CAP. CCCXV.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Tριφύλλον Græcis, Trifolium odoratum Latinis, officinis simpliciter Trifolium dicitur. Germanis Sibengezeit, propterea quod singulis diebus septies odorem suum habeat, & toties etiam amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptū enim & exiccatum, odorem suum perpetuò retinet. Quā certē pluuiosa temporis constitutione ac tempestate instante multò vehementior est, sic sanè ut totas aedes, in quibus hæc herba reposita est, odore suo compleat. Potest etiam appellari cōmodissimè Vuolriechender Klee.

FORMA.

Frutex est cubito altior, virgas habēs tennes, nigris, iunceisq; adnascentiis multis præditas, in quibus folia Loto arbori similia sunt, terna in singulis germinationibus. His recens enatis odor Rutæ inest, auctis verò iam, bituminis. Florem emittit purpureum, semen modicè latum & subhirsutum, ex altero extremo apicem obtinens. Radix illi tenuis, lōga, valida. Ex qua quidem delineatione satis constat herbam, cuius picturam damus, esse Trifoliū odoratum: siquidem cubito altior est, caules tennes obtinens, vnde ramusculi multi nigricantes quodāmodo, ac iuncea oriūtur, qui singuli terna folia produciunt odorata. Flores etiam habet in purpureo cæruleos. Semen quoque Milio haud dissimile in folliculis modicè latis, pilosis, & in summitate aculeum

leum habentibus, profert. Radicem denique longam, candidam ac validam habet, vt prorsus nihil sit quod descriptioni non respondeat.

LOCVS.

Sponte sua in Germania non prouenit. Satum verò nulla difficultate prodit.

TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est & siccum in tertio ordine.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & folia in aqua pota lateris dolore laborantibus, difficultati vrinae, comitialibus, incipienti aquae inter cutem, vuluaq; strangulationibus auxiliantur. Menses etiam ducunt. Oportet autem seminis tres, foliorum verò quatuor drachmas dare. Succurrunt & venenatorum morsibus folia trita cum oxymelite & pota. Referunt quidam, si totius fruticis radicis & foliorum decocto foveantur fausti ex serpentium morsibus dolores, eos mitigari. Si verò alius vlcus habens eodem illo decocto quo quispiam sanatus fuerit foveatur, eadem sentit quae morfi à serpentibus. Dant quidam etiam in tertianis bibenda folia eius tria, aut totidem semina cum vino, in quartanis autem quatuor, veluti quae circuitus solvere possunt. Miscetur verò eius radix & antidotis.

EX GALENO.

KK

Triphyllum

PLANTARVM HISTORIAE

Triphyllum potum laterum dolores ab obstru-
ctione natos inuat, vrinam & menses prouocat.

EX PLINIO.

Trifolium scio credi praualeere contra serpentium
ictus & scorpionum, ex vino aut posca. seminis gra-
nis viginti potis, vel foliis, & tota herba decocta,
serpentesque nunquam in Trifolio aspici. Præterea
celebratis autoribus contra omnia venena pro an-
tidoto sufficere vigintiquinque grana eius.

APPENDIX.

Debet eius Trifolij odorati vsus esse subinde in
omnibus officinis, quod mirificè venenis aduersetur
& ad vlcera malefica sananda perquam vtile sit.

APPENDIX ALTERA.

Non latet hanc herbā propè accedere ad descri-
ptionem Loti sylvestris. Caulem nanque fert bicu-
bitalem, & aliquādo maiorem, numerosis alarum
cauis. Folia Trifolio quod in pratis nascitur simi-
lia: semen Fænograceo ita respondens, vt nisi minus
esset, vix ab inuicem discerneres: sapore item me-
dicato. Tamen non minus accedit etiam ad Trifo-
lij acuti picturam. Frutex enim verius esse quàm
herba videtur, cubito maior, virgas habens tennes,
nigras, iuncosa adnata obtinentes, in quibus sunt
folia Loti in singulis pediculis tria, in ambitu cu-
spidibus serrata, vt hinc commodissimè dici merear-
tur, ὀξύφυλλον. Hæc etiam odorata sunt vehemen-
ter, vt nonnullis caput offendant: & ad bituminis
certè

certè odorem proximè accedunt, sed non parum tam
 men suauior & iucundior est. Florem præterea ex
 se mittit purpureum, hoc est, ad purpuræ colorem
 nonnihil accedentem: ex a. bo enim purpureus, aut
 subcæruleus est. Semen etiam modicè latū, & sub-
 hirsutum, ex altero fine veluti cornu obtinēs. Quod
 ego non de ipso quidem nudo semine, sed de eius po-
 tius folliculo, quod in cacumine planè aculeatum
 ac veluti cornutum existit, intelligendum puto. Ra-
 dix denique illi longa, gracilis, & tenax existit, ni-
 hilque est in tota descriptione quod ei aptissimè nō
 quadret. Accedit præterea amaritudo quæ in semi-
 ne non est obscura, pulchrè sibi etiam Trifolij odo-
 rati facultates vendicans: mouent enim quæ ama-
 ra sunt vrinam, menses ducūt, comitialibus prosunt,
 aliæque quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit ef-
 ficere possunt. Quare iis rationibus motus, à conce-
 pta sententia discedere nondum queo, nisi contin-
 gat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, at-
 que adeò grana ipsa hirsuta, & cornuta existant.
 Quanquam non lateat parum admodum referre
 vtram sententiam, nostram aut aliorum amplectæ-
 ris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non mul-
 tū aut ferè nihil distent. In hoc tamen semine, quod
 nos Trifolij odorati esse contendimus, nulla inesse
 apparet adstrictio, quā tamen in Loti semine Dio-
 scorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sen-
 tentia adiciere volumus.

PLANTARVM HISTORIAE
DE TRIFOLIO PRATENSI.
CAP. CCCXVI.

NOMINA.

Tρίφυλλον ἢ χορὸν ποταμίου γένω μῦθος
Græcis, Trifolium pratense Latinis dicitur.
Officinæ Latinum nomen retinuerunt, & simplici-
ter Trifolium vocant. Utendum verò illis esset odo-
rato Trifolio, quemadmodum altero ab hinc capi-
te diximus. Germanis Vuysenkle (Gallis Tre-
fle) nominatur.

GENERA.

Tria gene Tria apud nos passim in pratis proueniētia Tri-
ra praten folij inueniuntur fastigia, quorum primum à flori-
sis Trifo- bus purpureis, Trifolium pratense purpureum, Ger-
lij. manicè braun Vuysenkle, alterū itidem à flo-
Purpureū ribus suis candidis, Trifolium pratense candidum,
Candidū. Germanicè Vucisz Vuysenkle, & tertium lue-
Luteum. teum, Germanicè geel Vuysenkle appellamus.
Quod ad folia ipsa attinet, non admodū dif-
ferunt: quoduis enim horum generum tribus cōstat
foliis, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in se-
cundo autem longiora & angustiora, magisq; palles-
centia candicantiæve. In tertio sunt minora & ro-
tunda, atque ad Fœnigraci folia accedentia. Sunt
qui hoc genus Lagopum esse putent. Sed de Lago-
po suo diximus loco.

FORMA.

Caulem rotundum, cubitalem obtinent, ramos
exiles,

exiles, folia per interualla tria: flores in summo aut
purpureos, aut candidos, aut luteos: radicem longam
& lignosam.

LOCVS.

Scatēt iis prata omnia, vnde etiam nomē nacta.

TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Adstrictoria cuiusdam qualitatis sensum in qua
stu præ se ferunt, non tamen multum admodum, vt
nihilominus sint tenuium partium & exiccatoria,
quādoquidem etiam exigua quasi acrimonia præ-
dita videantur.

VIRE S.

Haud dubiè mediocriter concoquendi & exic-
candi vim possident, vt non temerè quidam ex re-
centioribus herbariis tradant, Trifolia hæc albo
muliebri profluvio mirificè conferre. Eadem etiam
inflammationibus imposita, eas concoquunt, & ad
maturationem perducunt.

DE TRAGOPOGONE.

CAP. CCCXVII.

NOMINA.

εργόπωρον, ἢ κομὴ Græcis nomina-

T tur, Latinis Hirci barba, & Coma: of=Hirci bar-
ficinis ignota est herba. Germanis Bō- ba.

eksbart & Gauchbrot (Gallis Barbe de Bouc
dicitur. Hieronymus herbarius Braunschweigens-

PLANTARVM HISTORIAE

Tragopo-
gon cur
dicta.

sis magno errore hypocisthida in hac herba nasci
putauit. Sic autē eam Græci vocarunt, quod à ca-
lyce eius promissa pēdeāt barba, vel rectius quod
lutei illius flores in volucres barbudas euanescent.

FORMA.

Caulem habet exiguum, longum tamen, & bicu-
bitalem interdū, geniculatum, folia Croco similia,
radicem longam & dulcem, supra caulem calycem
magnum, & in eius summo semen nigrum, florem
luteum, qui in canescentes barbudas fatiscit. Hæc e-
tiam cū carpitur lacte manat.

LOCVS.

Sua sponte in pratis nascitur.

TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedo quæ in radice ac tota ferè planta appa-
ret, satis monstrat eam esse caliditate tepida prædi-
tam, & modicè humidam.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba & cruda & cocta edendo est.

APPENDIX.

Ex recentiorum traditione, & temperamenti ra-
tione, æstuantis stomacho utilis est herba, thoracis
& iecoris vitiis, renum item & vesicæ malis. Suc-
cus eiusdē mirificè laterum doloribus auxiliatur.

DE TYPHA. CAP. CCCXVIII.

Ty-

Typha in stagnis frequens, Marteau quibusdam dicitur, quòd flos dura densitate longus, mallei formam & pondus imitetur.

Cætera omisimus, quòd vel essent medicis nota, vel nomen vulgo & officinis non haberent, aut saltem non aliud quàm quod à Fuschio diligentissimè scribitur: Cuius dotis & magnis laboribus gratia imprimis est habenda, quos in plantis non solum describendis, sed etiam affabrè pingendis, in studiosorum gratiam insumpsit: Longè interim valere iussis, qui omnia calūniari, nihil vtile meditari solent.

NOMINA.

TΥΦΗ Græcis, Typha latinis, officinis inusitata. Germa. Mosz, oder Nariëkolb (Gallis Plante semblable aux masses de Beaux) dicitur. A nonnullis Knospen vnd Lieszen.

FORMA.

Folium profert Cyperidi simile, caulem leuè, eodem, cuius in summo capite flos obducitur densus, euadens in pappum seu lanuginem. Quæ descriptio huic plâta sic quadrat, vt nulla sit nota quæ reclamet. Folio siquidem Cyperidis erumpit, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumen densa florum congerie stipatur, & veluti spissa cingitur lanugine, quæ in pappos tandem euanescit.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Gignitur in palustribus & stagnantibus aquis.

TEMPVS.

Iulio mense caulis lanosa floccorum densitate obducitur. Augusto autem in pappos abit, & euanesceat.

TEMPERAMENTVM.

Quantum ex viribus eiusdem colligi potest, non euidenter, potissimum eius flos, calefacit & refrigerat, modicéque abstergit, aque adeò exiccat. Quum enim ambustis medeatur, & ambusta, Paulo libro quarto, capite xi. teste, medicamenta que mediocriter citra insignem caliditatem aut frigiditatem abstergunt, requirant, sequitur hoc quale diximus temperamentum obtinere.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Flos eius cum suillo adipe vetusto eloto exceptus ambustis medetur.

DE TURCICO FRUMENTO.

CAP. CCCXIX.

NOMINA.

Hoc frumentum, ut alia multa, ex eorum est genere quæ aliundè ad nos translata sunt. E Turcicum Græcia autè & Asia in Germaniā venit, vnde Tur frumentū cicum frumētum appellatum est: Asiam enim vnicur dictū uersam hodie immanissimus Turca occupat. Germani etiā ad loca vnde affertur respicientes, Turkisch korn, (Gal. Ble de Turquie) nominant.

G E N E R A.

Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddam enim grana rufa, quoddam verò purpurea, aliquod lutea, aliquod subcandida grana profert. Spicarum seu panicularum etiam in iis est diuersitas: etsi enim omnes muticae sunt, tamen alia candidos, alia luteos, alia purpureos, prout scilicet grana colorata erunt, flores obtinet. Aliàs, quòd ad formam attinet, in iis nulla est differentia.

F O R M A.

Culmum habet crassum, rotundum, altum longumve, infima eius parte purpureum, geniculis intersectum: folia oblonga & harundinacea, in summitate paniculas, aut spicam muticam, & granis vacuam, instar secales florentem nunc luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, prout fructus quem profert coloratus est. Fructum verò & grana triangulari, diuersis iam commemoratis coloribus tincta, in foliacis, rotundis ac crassis membranis ac vaginis, quae è lateribus geniculorum fere singulorū procedunt, contenta obtinent, coacernata ac penitissimè iuncta, inq; octo aut decē versus ordine digesta. E fastigio vaginarum capilli tenues, iam cādido, iam luteo, nunc purpureo colore maculati dependent, vt pictura satis ostendit, quae vnica quidē tibi omnia genera representabit. Hac in vna vagina quatuor tibi granorum colores monstrat, cū tamen quaeuis vnius duntaxat coloris grana, nēpe aut lutea, aut purpurea,

PLANTARVM HISTORIAE

purpurea, aut rufa, aut subcandida omnia habeat. Quod nos, ne aliquem pictura deciperet, monendum esse duximus.

LOCVS

E Gracia vel Asia, vt dictū est, primū ad nos peruenit. Nunc autē passim in omnibus hortis prouenit.

TEMPVS.

Seritur mense Aprili, nec nisi sub finem Augusti & initia Septembris ad maturitatem peruenit.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedinem & lentorem quandam grana gustu pra se ferunt, vt haud dubiè idem cum Tritico habeat temperamentum.

VIRE S.

Cū idem cum Tritico habere videatur temperamentum, easdem etiam obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in cādidissimā farinā, quae in panificia subinde cogitur. Panis tamen ille lentoris quiddam & obstructis naturae habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo vsum esse, nisi cū annona premit inopia, dicunt. Ceterū foliorum succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata vtilem admodum esse coniiciunt.

DE THYMO. CAP. CCCXX.

NOMINA.

Serpyllū
Romanū.



ῥμος Gracis, Thymus latinis, herbariis vulgaribus Serpyllū Romanum, haud dubiè ab odore

odore quē cum Serpyllo communem habet, dicitur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt. Germanis Thym, & Romischer quēdel (Gallis du Tin, Thymus ou Thim) vocatur. Thymus autē Græcis ab exci vnde distando, quod θύει dicunt, nomen inuenit. Nonnullis etus, potius hoc placet etymum, vt Thymos quasi thymos, hoc est, sanguinem impellens dicatur.

FORMA.

Thymus surculosus frutex est, minutis multis & angustis foliis circumdatus, in summo capitula floribus purpureis referta habens. Ex qua sanè delineatione omnibus conspicuum fit, herbā cuius picturā damus esse Thymum. Dodrantalis enim & surculosus frutex est, foliis exiguis, flosculis ex purpura candicantibus, suauissimi odoris, capitella specie cōplicatarum formicarum, radice lignosa, enascentias virides multas obtinente, quibus in terra radicatur.

LOCVS.

Nascitur petrosus & tenuibus locis: neque enim locum pinguem, neque stercoratum, sed apricū desiderat. Nunc in hortis multis Germaniæ prouenit.

TEMPVS.

Floret serò, quod Theophrastus etiam libro sexto de historia plantarum, capite secundo testatur, circa Solstitia, cum & apes decerpūt, & augurium mellis est.

TEMPERAMENTVM.

Thymus vehemēter calefacit. Itaque in calefaciendo

PLANTARVM HISTORIAE

ciendo & exiccando in tertio ordine statuendus est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Potus cum sale & aceto, pituitam per aluum ducit. Decoctum eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest. I. umbricos vëtris, menses, fœtus & secundas pellit. Vrinam ciet. Mixtus melle in eclegmate, excreabilia efficit thoracis vitia. Recentia oedemata cum aceto illitus discutit. Sanguinis grumos dissoluit. Thymos & verrucas pensiles tollit. Ischiadicis cum vino & polenta impositus auxiliatur. Hebetibus oculis in cibo sumptus opitulatur. Votilis etiam pro condimento in sanitatis vsu.

EX GALENO.

Thymus incidit, & calefacit manifestè: ob id & urinam & menses prouocat, fœtum euellit, & viscera potus expurgat, educendus ex thorace & pulmone confert.

EX AETIO.

Hæc experimentis de Thymo cõperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho. Bilem enim reliquosque humores atque acrem saniem euacuat. Facit & ad vesicæ mala. Ventre inflatis, ubi intumescere cœperint, drachmã vnã dato ieiuno cum cochleari aqua mulsa. Ad lumborum coxendiciumque dolorem, laterisque & thoracis, ac hypochondriorum suspensiones, ac inflationes, pondere trium drachmarum cum oxymelite

melite temperato, mensura cochleari ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timorēq; detentis drachmas tres cum oxy melitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis & ante cenam aduersus lippitudinem, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motū omnino interceperit, cum vino utilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes, ieiunis trium drachmarum pōdere exhibeatur.

EX PLINIO.

Oculorum claritati multū conferre existimatur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutina tussi ecligmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinē concreescere non patitur è melle. Longas faucium destillationes extrà illita cum Sinapi extenuat: item stomachi & ventris vitia. Modicè tamen vtendum est, quoniam exalfacit, quanuis sistat aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordiis medentur ex aceto cum melle: quæ potio datur & in alienatione mentis & melancholicis. Datur & comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi. Aiūt & dormire eos oportere in molli Thymo. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierumq; mensibus retardatis. Vel, si emorti sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias.

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

tertijs. Viris verò contra inflationes, cum melle & aceto. Et si venter turgeat, testésve aut vesica dolor exigat. E vino tumores & impetus tollit impostum. Item cum aceto, callum & verrucas. Coxen dicibus imponitur cum vino. Articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Et in fastidio, tritum cum sale.

D E T E U C R I O. C A P. C C C X X I.

N O M I N A.

Θύκτρον, ἢ χαμαίδρυς Græcis, Teucrion

Teucrion
vnde dictum.

T Latinis appellatur. Officinis ignotum. Germanis grosz Bathengel dicitur. Teucrium autè vocatum est Græcis pariter & Latinis, quòd Teucer Aiakis frater hoc inuenerit. Inuentum verò ab eo sic tradit Plinius. Quum exta in sacrificio super id proiecta fuissent, lieni adhaesit, eumq; exinanivit. Proinde quod casus ostenderat, obseruatumq; à Teucro fuit, ad aeternum humani beneficii decus

Teucrion
hoc diuersum ab
Hemionitide, quod
multi non
obseruat.

& famam illi accreuit. Diuersum tamen hoc Teucrium ab Hemionitide, quod à Plinio etiã Teucrium appellari diximus. Chamædrys autem nominata est hæc herba, quòd Chamædry similima sit, adeò vt vicissim etiam Chamædry hoc nomine, vt suo dicemus loco, dicta sit Teucrium. Maius tamen est Teucrium quàm sit Chamædrys, vt meritò Germanis grosz Batlengel nuncupari queat.

F O R M A.

Herba est virga referens effigiem, Chamædry
similis.

*similis, tenui folio, non multū Ciceri dissimile. Hæc
quanquam breuissima sit Teucris delineatio, tamē
abundē mōstrat herbari hanc, cuius picturam ex-
hibemus, esse verum Teucrium, cū nihil Chamæ-
dry magis simile dici queat, si diligenter vtriusque
plantæ notas expendas.*

LOCVS.

*Nusquam, quòd sciam, sponte sua in Germania
prouenit. Sæpe tamen copiose nascitur. In Cilicia
plurimum habetur.* TEMPVS.

*Floret Iunio & Iulio mensibus, ac subinde se-
men producit.*

TEMPERAMENTVM.

*In secundo exsiccantium, tertio autem exico-
cantium existit ordine.*

VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Viride cum posca potum, aut aridum decoctum
ac haustum, lienem potenter minuit. Lienosis cum
ficis & aceto illinitur. Vencnatorum autem morsu-
bus cum aceto sine ficis.*

EX GALENO.

*Teucrium incidendi, & tenuium partium fa-
cultatis est, quare lienes sanat.*

EX PLINIO.

*Recens Teucris in posca, vel sicca deferuefacta,
potu lienem efficaciter consumit. Item ex aqua illi-
nitur. Pota arida & decocta quantum manus ca-
piat, i aceti heminis trib. lieni medetur. Ad vulnus
illini*

PLANTARVM HISTORIAE

illinitur eadem cum aceto, aut si tolerari non possit, ex fico vel aqua. Serpantium plagis imponitur cum aceto tantum.

DE HYPERICO. CAP.

CCCXXII.

NOMINA.

Υπερίκον, ἁνδροπόσαμον, χαμαίπυτος
 Græcis, Hypericum Latinis dicitur. Nomen
 latinum in officinis seruat. Vulgus herbariorum Per-
 foratā vocat, quod folia soli obiecta innumeris fo-
 Perforata ramis scatere, & omni ex parte punctis qui-
 busdam pertundi videantur. Herbam quoque diui
 Iohannis appellant. Germanis S. Iohans kraut
 Androse = (Gallis Mille pertuis) nominatur. Androsæmō ob
 mon. florem eius qui digitis confricatus sanguineum e-
 Chamæpi mittit liquorem, dixerunt. Chamæpitys verò ab os
 tys. dore seminis resinacco nominata est. Fugam demo-
 Fuga de num aliqui, quod superstitione quadam inducti, fu
 monum. gare posse demones crediderint, appellauerunt.

FORMA.

Folia Ruta similia habet, surculosus frutex, do-
 drantalisis, rubescens. Florem luteum, qui digitis at-
 tritus sanguineum emittit succum, qua ratione An-
 drosæmon, quasi humanum dixeris sanguinem, ap-
 pellatur. Siliquas gerit hirsutas, in rotunditate ob-
 longas, hordei magnitudine, in quibus semen nigrum,
 resinam obolens. Cuius nimirum descriptionis nota
 ita herba illi, quam Perforatam vocat nostri tem-
 poris

poris herbarii, respondent, vt nemo nisi prorsus praefracto sit animo, Hypericum esse deinceps reclamare possit. Siquidem surculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio Ruta, flore lutco, quem si digitis libeat terere, manus profecto inuenies sanguineo succo cruentatas. Siliqua denique terere, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaque in Perforata inueniuntur, quae esse Hypericum certam tibi faciunt fidem, cruentus nempe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus. qui diuersum sentiunt haud dubie Marcelli Florentini inter Marcelli pretatione falsa seducti sunt, qui flore albo constat Florentini; re Hypericum asserit, cum tamen in Dioscoride sit, erratum. *αυθος εχον μηλινον*, hoc est, florem luteum habes.

LOCVS.

Gignitur in cultis, & asperis locis.

TEMPVS.

Aestate floret, Iulio potissimum & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Hypericum calefacit & exiccat, tenuisq; substantiae est.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, menstrua ducit appositum. A tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semine quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta.

EX GALENO.

LL Menses

PLANTARVM HISTORIAE

Menses & vrinas prouocat: sed ad hæc totus sum-
mendus est fructus, non tantum semen. Cum foliis
illitus viridis ad cicatricem ducit cum alia, tum es-
tiam ambusta. Caterum si sicca contusa inspergas,
humida & putredinosa vlcera sanabis. Sunt nonnul-
li qui ischiadicis bibendum exhibent.

EX PLINIO.

Natura semini Hyperici spissandi. Aluum sistit,
vrinam cit, ad calculos vesicæ cum vino bibitur.

DE HYOSCYAMO. CAP.

CCCXXIII.

NOMINA.

ὄσνυαμος Græcis, Hyoscyamus, Apol-
linaris Latinis dicitur. Arabibus Plinius
Altercū. Y linaris Latinis dicitur. Arabibus Plinius
Altercum vocari testatur. Officinis cor-
rupta voce Iusquiamus dicitur. Germanis Bilsam-
kraut, vel simpliciter Bilsen, (Gallis du Iusquia-
me, ou de la Hanebane.) Hyoscyamon autem
Hyoscyas Græci videntur appellare quasi fabam suillam as-
mon unde prinamve, quod, vt in historia sua Helianus in-
dictum. quit, pastu huius herbe conuellantur sues aprive,
presenti mortis periculo, nisi copiosa aqua statim
se foris & intus proluerint. Adeuntq; aquas non vt
proluant se tantum, verumetiam vt cancras venen-
tur: iis enim nactis protinus sanitati restituntur.
Atque hinc est quod à nonnullis etiam Germanis
Apollina- Seuubon nominetur. Apollinarem verò Latini ab
ris. Apolline medicinae inuentore dixerunt.

GENERA.

Tria sunt Hyoscyami genera. Vnum purpureos **Niger** Hyfert flores, folia Smilaci similia, semen nigrum, **oscyamus**. cythinos duros & spinosos. Hoc nigrum herbarii appellant. Alterum flores luteos ceu mæli effigie, folia & siliquas teneriores, semen subflauū ceu Arion, **Flauus**. flauum vocant. Et hoc est quod pictum damus. Ter **Albus**. tium vtile ad medicinam, placidissimum existens, pingue, tenerum, lanuginosum, flore & semine candido: album nominant. Quod si verò illud non adsit, vtendum flauo erit. Nigrum vt deterrimum improbandum.

FORMA.

Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, incisa, nigra, hirsuta. Per caulem deinceps flores prodeunt veluti mæli punici cytini, clypeolis septi, semine, vt Papaueris, plenis. Quid multa? frutex est tristi aspectu, folio lato, longo, pingui, hirsuto, venoso, & laciniato: caulibus crassis, e quorum latere flores prodeunt tanquam mælorū punicorum cytini, muricatis calycibus, ramos continua serie vestientibus, semine intus Papaueris refertis.

LOCVS.

Primum genus in Galatia nascitur. Alterū passim circa littora, & inter ruinas & rudera prouenit. Tertium in Maritimis & ruderibus.

TEMPVS.

Semen nullum nisi postquā inaruerit legendum.

LL ij Floret

PLANTARVM HISTORIAE

Floret ferè per integram æstatem, potissimum Iulio mense.

TEMPERAMENTVM.

Candidus ex tertio quodammodo ordine refrigerantium est. Reliqua duo genera venosa.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Exprimitur succus ex tenero semine, foliis, caulibusq; in quem vsum tunduntur omnia, expressusq; in sole siccatur. Vsus eius ad annum vsque facile enim putrescit. Exprimitur priuatim etiã succus ex arido semine, aqua calida persuso, tuso et expresso. Est verò succus liquore præstantior, & magis dolores finit. Herba autẽ virens contusa, & trimestri farina mixta in pastillos conformatur & reconditur. Prior verò succi expressio, & quod à semine exprimitur, collyriis dolorem lenientibus commode miscetur, & contra acres calidasq; fluxiones, dolores aurium, & vulua vitia. Cum farina autẽ aut polenta, contra oculorum, pedum, aliasq; inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationẽ, oculorũ fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluvia, aliasq; sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulsa potum. Cõfert podagris, testibus inflatis, mammisq; à partu turgentibus, si tritum cum vino illinitur. Miscetur utiliter & aliis cataplasmatibus dolorem sedantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per se, & cum polenta mixta utiliter illinuntur.

Recentia

Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerum modo, & triblii mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in collo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

EX GALENO.

Hyoscyamus cuius semen atrum est, insaniam & soporem affert. Huic is cui semen mediocriter flavum est, propinquam facultatem obtinet. Fugendi autem utriq; sunt vt inutiles & venenosi. Ceterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est.

EX PLINIO.

Hyoscyamum contra canum morsus valet, inq; vulnera cum melle imponitur. Contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinè excreantibus medetur. Nidor quoque accensi tusipientibus. Vsus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus foliisq; vtuntur, & radice, temeraria in totum (vt arbitror) medicina. Quippe etiam foliis constat mentem corrumpi, si plura quam quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febrem depelli arbitrabantur. Et oleum sit ex semine, quod ipsum auribus infusum tentat mentem.

PLANTARVM HISTORIAE
DE HYACINTHO .CAP.

CCCXXIIII.

NOMINA.

Ἰακινθὸς Græcis, Hyacinthus Latinis, officinis incognitus, Germanis Blauu Mertz enblumlin, quòd videlicet cū Viola purpurea in Martio & primo vere erūpat, appellatur. (Ga. Vne Iacinthe, ou vaciet.) GENERA.

Albi Hyacinthi.
Duplices sunt Hyacinthi, albi & cærulei, vt ex hoc Columellæ carmine colligi potest. Necnon vel niveos, vel cæruleos hyacinthos. Albos verò, non intelligas prorsus candidos, sed eos potius qui si cum cæruleis conferas pallescere videntur, quemadmodum pictura affabrè tibi demonstrat. Germani album fœminam, sicut cæruleum marem vocant. Sūt qui ad ætatem hanc differentiā coloris referre volunt, quorum ego sententiam veriorē esse existimo: cū enim adoleseunt, pallescere incipiunt. Cæruleū autē Hyacinthū nostra terra triplicē producit, vt è pictura manifestè cernere licet: maximū, maiore, & minore. Minor floribus differt plurimū à maiore: in illo enim maiores ac patetiores, in hoc autem minores & quasi orbiculati sunt flores. Omnibus autem descriptio, vt ex iis quæ statim subiiciemus planum fiet, pulchrè conuenit, vt hinc congeneres herbas esse coniicere cuius liceat.

FORMA.

Folia Bulbo similia habet, caulem dodrantalem, leuem,

leuem, minimo digito tenuiore, viridem, comā adiacentem incuruam, plenam florum purpureorum, radicem & ipsam bulbosam. Hæc certè descriptio ita picturis quas damus quadrat, vt nulla prorsus sit eius nota quæ illas non appositissimè exprimat. Folia siquidem Bulbi protinus à radice prodeunt, caulis dodrantalis, leuis, & minimo digito tenuior, herbaceus, coma procumbens incurua, plena florum purpureorum, radix bulbacca. Verū posset aliquis cauillari, hos quos descripsimus flores non esse Hyacinthos, quòd in iis discurrentib. venis Græcarū literarū figura α, vt Plin. li. xxi. ca. xi. prodidit, & Poetæ fabulatur, haud inscripta legatur. Cui sic respondemus: Hyacinthum, quem Dioscori. & alii historici describunt, diuersum esse ab eo de quo Poetæ fabulantur. Cuius rei testis est Pausanias, qui refert florem qui natus est extincto Aiace apud Salamina, non esse Hyacinthum, sed literis Hyacintho similem videri, ex candido rubentem, ac Lilio minore, quem admodum Ouidius, itémque Vergilius describunt. Idem etiam autor Cosmofandalō dici florem apud Hermionenses, Træceniis cōfines testatur. Cū itaque constet duplicem esse Hyacinthū, alterum rubentem, cum literis illis inscriptis, qui à Poetis describitur: alterum verò purpureum seu cæruleum (nihil enim refert vtrum dixeris, quòd Diosc. per

Obiectio.

Ouid. xiiij.

Met. Ipse

suos gemis

tus foliis

inscribit,

& α α

Flos habet

inscriptū,

funestāq;

litera du-

cta est.

Theocri.

Idyl. xix.

νῦν ὑά-

κινθε λῶ.

λῆ τὰ σὰ γράμματα & πλεον αἰ αἰ, λάμβανε τοῖς πῶ
τῶλοισι. Hyacinthus poetarum. Hyacin

PLANTARVM HISTORIAE

thus Dio purpureum colorem violaceū dilutum, hoc est, clas-
 scoridis. riorem & apertiore, quem cæruleum vocamus,
 intellexerit: nam & Plinius lib. xxxvij. ca. ix. Hyacin-
 cinthi colorem violaceum dilutum vocavit) sine li-
 teris, à Dioscoride aliisq; historicis descriptum: ni-
 hil enim Diosco. in suo Hyacintho de literis cōme-
 nei Hyacinthi minit: Haud igitur temerè in Vergilio ferrugineos
 cinthi qui hyacinthos, non cæruleos, sed rubentes ad similitu-
 apud Verdinem ferruginis quispiam interpretabitur, potissi-
 gilium. mum cum Poetarum Hyacinthus, non cæruleus,
 Ver. Ecl. sed rubens sit, quemadmodum alibi Vergilius &
 tertia: Et Pausanias docuere. Rubet etiam color ferrugineus.
 suaue ru- Neque obstat quod Nonius ferrugineos hyacinthos
 bens Hyacinthi cæruleos interpretatus est: is enim cæruleum tatum
 cinthus. Hyacinthū nouerat. Quod si verò hæc morosis qui-
 busdam non probabuntur sed prorsus funestas lite-
 Literæ in ras inscriptas esse contendant, iis ita responsum vo-
 Hyacintho lo. Quas in Hyacintho literas appellant Poetæ, ve-
 quales. ras non esse, sed potius notas quasdam nigras, id
 Vir. Dic quod hinc palàm sit. Plinius lib. xviii. cap. xij. vbi
 quibus in de leguminibus loquitur, literas lugubres in flore ca-
 terris in- tiam fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit,
 scripti no- in quo tamen flore non literas vllas, sed nigras tan-
 minaregū tum notas, ut res ipsa & pictura docent, inspicere
 nascun- licet. Quod si nec ista satisfecerint, dicemus tum pe-
 tur flores. nitus fabulosum esse quod regum nominibus inscri-
 Eclo. iij. prum Poeta, florem hunc canit. Si enim id creden-
 dum erit, credendum etiā quod idem ex puero trans-
 formato

formato natus sit. Vel, quod vero similis est, de regiis florum appellationibus Poeta iocum struxisse videtur, cum pastorem inducit sciscitantem, quibus in terris inscripti nomina regū nascuntur flores: sunt enim complures flores quibus à suis inuentoribus regionibus nomina sunt indita. Neque nunc vlla prorsus regum permultorum extaret memoria, nisi in florū nomenclaturis, qui nominibus regum inscripti sunt, asservaretur.

L O C V S.

Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galili, apud quos, Plinii etiam testimonio, eximiè provenit, ut in suis commentariis de Natura stirpium vir eruditione clarus Ioannes Ruellius autor est, ne Ruellius. moralem vel agrestem capam nominet. Et eius cer Agrestis tè magna est copia verno tempore in nemore haud capa. procul à vico Luschenau iuxta Tubingam sito, ut vel ex natali etiam satis constet flores hos quos p̄stos exhibemus, esse genuinos Hyacinthos.

T E M P V S.

Vere, mensibus nimirum Februario & Martio, cum viola purpurea, Theophrasto lib. vi. de Stirpium historia, cap. ultimo teste, erumpit: hinc Mar Martium florē Germanis nostris dictū esse suprā mon- flos. strauimus. Hoc potissimum tempore prorumpit is quem Hyacinthum minorem nominauimus. Exit etiā, eodem Theophrasto autore, cum Gladiolo, qui vernus etiā flos est. Quo sanè tēpore is maximè flo- ret,

PLANTARVM HISTORIAE

ret, quem maiorem appellauimus. Proinde cum tēpus etiam conueniat, nemo est qui deinceps veros esse Hiacinthos, dubitare meritò possit aut debeat.

TEMPERAMENTVM.

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi verò completi, aut incipiētis in refrigerando. Semen autem tertio quadantenus ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hyacinthi radix pueris cum vino albo illita impubes seruare creditur. Sistit aluum. Pota vrinā ducit, & phalangiorum morsibus auxiliatur. Semen magis adstringit, & coeliacis prodest. Potum cum vino regium morbum emendat.

EX GALENO.

Radix pueros diutissimè seruare impubes in vino illita creditur. Semen regio morbo affectis in vino exhibetur.

EX PLINIO.

Radix Hyacinthi in vino dulci illita pubertatē coerces, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum morsibus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumq; regium, semen eius cum Abrotono datur.

DE HYSSOPO. CAP.

CCCXXV.

NOMINA.

σσωτος Gracè, Hyssopus & Hyssopum
 y Latine, officina nomen legitimum retine-
 runt. Germanicè Ispen, oder Ilop, (Gal.
 De l'Hyssoppe) vocatur.

GENERA.

Duūm generum Dioscoridi Hyssopus est, horten-
 sis & mōtana. Hortensis quæ in hortis provenit, ac Hortensis
 culinarum causa colitur, garten Ispen Germanis
 vocatur. Montana quæ in montibus nascitur, & Montana.
 Germanicè Birg Ispen appellari potest.

FORMA.

Herba est pedali altitudine hortensis, fruticosa,
 folio Satureia sativa floribus in caeruleo purpura
 scentibus, thyrsos spica modo vestiētibus, radice lon-
 ga & lignosa. Montana priori haud dissimilis est.
 Errant qui nostram Hyssopum hortensem non esse Hortensis
 verā putant: habet enim planè folium origani, nisi & nostra
 quod angustius est. Nec plures sunt eius apud Dio- Hyssopus
 scoridem notæ. Nam quæ de umbella quidam ob- est vera et
 iiciunt, nihil ad hyssopum attinent, cum simplici genuina.
 ter scribat Dioscorides, Origanum non habere um-
 bellam rotæ speciē obtinentem. Id quod verum est.

LOCVS.

In hortis, ut diximus, hortensis, in montibus ve-
 rò mōtana nascitur. Cateris præfertur quæ in Tau-
 ro monte provenit.

TEMPVS.

Aestate

PLANTARVM HISTORIAE

Aestate floret, quo etiam potissimū tempore carpenda venit.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopū calefacit & desiccatur ordine tertio: sed & tenuium est partium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet extenuādi & calefaciendi. Decocta cum ficis, aqua, melle acruta, & pota, peripneumonici, asthmaticis, tussi vetusta, destillationi & orthopnoe opitulatur. Lumbricos necat. Cum melle lincta idem praestat. Decoctum eius cum oxymelitte potum, crassitudinem per aluum ducit. Estur cū ficis viridibus, aluum subducens. Vehementius purgat adiecto illi cardamomo, aut iride, aut crysimo. Colorem bonum praebet. Cum fico & nitro illinitur ad lienem, aquam intercutem. Cum vino ad inflammationes. Discutit sugillata cum aqua feruenti illita. Angina laborantibus cum decocto ficorum optimum gargarisma. Decocta cum aceto, dentium dolorem collutione mitigat. Inflammationes quae circa aures sunt suffitu soluit.

EX PLINIO.

Hyssopum in oleo contritum phthiriasi resistit, & prurigini in capite. Stomacho est contrariū. Purgat cum fico sumptum per inferna, cum melle vomitionibus. Putant & serpentium ictibus aduersari, tritum cum melle & sale & cumino.

DE

DE HYDROPIPERE.

CAP. CCCXXVI.

NOMINA.

Yδρωπερι Græcis, Hydropiper Latinis,
 officinis incognitum. Germanis Vuasser-
 pfeffer, oder Muckenkraut (Gallis Curaige)
 nominatur. Hydropiper autem à locis quibus nasci Hydropi-
 tur, & piperis sapore quem præ se fert, quasi dixes per quare
 ris piper aquatile, appellatum est. Muscæ deniq; ab dictum.
 eo vehementer abhorrent: neque enim id quod suc-
 co eius aspersum est attingunt, hincq; ad eam alteram
 appellationem Germani illi indiderunt.

FORMA.

Caulē adit geniculatum, robustū, circa quem
 alarū concavitates, & folia Mentha similia, maio-
 ra, teneriora, candidiora que, gustu piperis acri non
 tamen odorato. Semen in ramulis fert secundum fo-
 lia nascens, continua serie congestum, racemosum,
 & acre. Radicem exigua et inutile. Ex qua descri-
 ptione satis constat herbam hanc, cuius imaginem
 damus, esse Hydropiper: nulla siquidē nota est quæ
 illi non conveniat. Caulis enim eius geniculatus, so-
 lidus, circa quē alæ panduntur, & folia Mēthæ cō-
 similia, maiora tantū, hoc est, lōgiora multò, tene-
 riora et albiora. Quæ singula facile diligēs quispiā
 oculis lustrabit. Si verò linguam consulat, folia me-
 ram piperis acrimoniam resipiunt, nullam tamen
 odoris suavitatem in eis deprehendet. Quòd si reli-
 quam

PLANTARVM HISTORIAE

quam faciem excusserit, offendet semen prope folia enatum racematim congestum, & quadam serie coherens, ipsumq; acre. Accedunt denique natales, facultates, & alia, vt nullus planè ambigendi locus relictus sit. Damus hñc etiam alterius herbae qua in aquis prouenit picturam, quam nonnulli Hydropiperis speciem esse arbitrantur, quae ferè Hederae folia obtinet, & secundum ea semen, Ari semini haud dissimile: Nos à colore seminis appellauimus Hydropiper rubeum, germanicè rot Vuasserpfeffer. Huius herbae & racemosus fructus, & folia acrimonia sunt praedita.

LOCVS.

Gignitur prope stantes aquas, aut quae leniter fluunt. Copiosè prouenit ad flumen Pegnicum hand procul à Norimbergo.

TEMPVS.

Floret Augusto mense floribus albis spicatis coherentibus, ac subinde semen minutum profert.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est, non tamen usque adeò vt piper, & siccum: id quod gustus abundè docet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum semine illita, ædemata, veteresq; duritias discutiunt. Sugillata delcent. Siccata & tusa pro pipere sali & opsoniis miscetur. Radix parua, nullius in medicina vsus.

EX GALENO.

Hydropiper

Hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum Pipere in gustu est, nomē sortitum est. Caterum calidum est, sed minus quàm piper. Atque herba ipsa etiamnum viridis cū semine cataplasmatīs in modum imposita, sugillata & induratos tumores digerit.

EX AETIO.

Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramusculis ac foliis Menthae similis, maior tantum, gustu acerrima ut piper, perexigua semina singulis foliis ferens. Calida quidem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugillata ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addunt.

APPENDIX.

Cum interea temporis dum sub prælo sunt nostri commentarū, quomodo veteribus sit appellata herba quam Hydropiper rubrum vocauimus, diligentius cogito, tertiam Dracōtū apud Pliniū li. xxiiij. cap. xvi. speciē esse comperio: hanc enim ita pingit: Tertia demonstratio fuit folio maiore quàm Cornus radice harundinea, totidem ut affirmabant geniculata nodis, quot haberet annos: totidemque esse folia. Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes dabant. Quæ quidem nota huic etiam herba competere videntur. Est enim folio maiore quam Cornus, radice harundinea, nodisque geniculata. An vero tot nodis sit geniculata, quot habet annos, totidemque foliis, nondum obseruare potuimus. Quinetiam
vniuersa

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

uniuersa tum foliorum tum fructus forma, acrisq; sapor, Ari ac Dracontij genus esse euidenter ostendunt. Facultas denique contra serpentes, quā Dioscorides suis etiam tribuit Dracontiis, abundè quod contendimus docet. Non est autem, ut quidam existimant, Plinij Aris, quod eius radix olinae grandis magnitudinem atque formam non referat. Hāc nostram de hac stirpe sententiam hoc loco referre placuit, ne quis nos illam Hydropiperis esse genus pertinaciter asserere ac tueri velle existimet.

D E P H L O M O . C A P . C C C X X V I I .

N O M I N A .

*Tapsus
barbatus.
Candela
regis.*

Λόμος Gracè, Verbascum Latine, officinis Tapsus barbatus dicitur. Sūt qui Cādelam regis, Candelariam, Lanariamq; nominent. Germanicè Vullkraut, Kertzēkraut, Vnholdenkertz, Himelbrant, Brennkraut, (Gallicè du Boillon blanc ou noir) vocatur.

*Phlomos
cur dicta.
Candelaria.*

Phlomon autem haud dubiè dixerunt Graci, quòd ea pro ellychniis vtantur. Candelariā quoque recētiore nominarunt, quòd caulibus eius adipe, seuo, vel aliquo pingui illitis, nōnulli pro lucernis vtātur.

G E N E R A .

- Verbascum omnium veterum testimonio duo habet summa genera. Candidum enim alterum foliis, nigrum alterum est. Cādidum rursus in marem & fœminam digeritur. Præter tria hæc, & syluestre habetur, Vuuld Vullkraut Germani appellant.

Sunt

Sūt etiam Verbascula duo, quæ à nostris herbariis herba paralyfis, & vulgò arthetica, cūm arthritica dicendū esset, vocantur. Germanicè Schluffelblumen. Horum vnum est odoratum, alterum odoris expers. Prius Germanicè simpliciter Schluffelblumen, oder gelb Schluffelblumen, Himmelschluffel, oder S. Peters schluffel, alterum Vuild Schluffelblumē, oder Vueisz Himmelschluffel appellāt. Est & tertium Verbasculum, quod Lychnitum, alij autem Thryallida appellant, Germani Marienrosen vocant. Hæc sunt genera Verbasci quemadmodum à Dioscoride & Galeno cōmemorantur, quorum sanè omnium picturas damus, excepto vltimo, quod hoc tempore nondū floruerat. Quāquam distingui genera hæc, vt Plinius lib. xxv. cap. x. ait, pene supernacū sit, quum sint eiusdem effectus omnia. FORM A.

Verbascum candidum fœmina, Brassicæ similia folia habet, multò tamen hirsutiora, latiora & cādidā. Caulis eius cubitalis & amplior, candidus, subhirsutus. Flores albi aut subpallidi. Semē nigrū. Radix longa, acerba, crassitudine digiti. Candidū Cādidum mas à foliorum candore Leucophyllon Græcis dicitur. Etum, oblongioribus & angustioribus foliis, & tenui caule. Nigrum in cunctis candido simile, nisi latioribus nigrioribusq; constaret foliis. Syluestre vir Nigrum. gas fert altas & arborescentes, folia saluie similia. Syluestre. Habet verò circa virgas ramulos Marrubij modo.

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

- Verbascula** Florem luteum, auri fulgore. Verbascula duo hirsuta, terra inhaerentia, humiliave: foliis rotundis, & multo minoribus, rugosis, e quib. mediis stylus exilit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius vertice terni, quaterni, & plures etiam dependent flores lutei, summis labris denticulati; in altero odorati, in altero inodori, calyculo in album pallefcente.
- Lychnitis** Lychnitis siue Thryallis foliis ternis, aut quaternis, aut etiam plusculis, crassis, pinguibus, hirsutisq; ad lucernarum lumina utilibus, floribus purpureis.

L O C V S.

Candidū & nigrum in campestribus, & in sylvis etiam proueniunt. Syluestre in campestribus, potissimum siccis & lapidosis, nascitur. Verbascula duo passim in pratis & hortis producuntur. Lychnitis similiter aliis in campestribus nasci solet.

T E M P V S.

Verbascula duo primo statim vere emicant, certique huius appetentis nunciij. Hoc sanè tēpore carpenda veniunt, quod confestim fugacia euanescat: vita enim illis cum plurimum menstrua, nec temerè ad summum sesquimensē excedunt. Reliqua genera autumnō, dum florent & semen proferunt, colligenda.

T E M P E R A M E N T V M.

Omnium folia desiccandi & detergendi vim possident.

V I R E S. I E X D I O S C O R I D E.

Radix

Radix priorum duorum adstringit: vnde tali ludicri magnitudine in alui profluvio vtiliter cū vino in potu datur. Decoctū eiusdem ruptis, conuulsis, contusis, & antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aurei coloris, capillos tingit, & quocūque reponatur blattas in se contrahit. Folia in aqua decocta aduersus cedemata, & oculorum inflammationes illinuntur. Syderata vlcera cum melle aut vino, cum aceto autem vulnera sanat. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Syluestris folia ambustis illinuntur. Ferūt scemina folia caricis interposita, incorruptas atque à putrefactione immunes seruare.

EX GALENO.

Priorum duorum radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest. Sed & ad dentium dolorē eam nonnulli colluunt. Folia tamen digerendi vim habet. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Capillos quoque flavescere faciunt.

EX PLINIO.

Contra scorpiones bibitur radix cum Ruta ex aqua magna amaritudine, sed effectu pari. Verbasculū priuatim tōsillis in aqua potū medetur. Tribus obolis bibitur. Verbascum cuius flos arcus est, contra omnia pectoris vitia, tussē, & purulenta excreantibus. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam nō tussientibus modò, sed ilia trahētibus auxilietur potus. Lateris & pectoris dolores Verbascum cum

PLANTARVM HISTORIAE

Ruta ex aqua sedat. *Panos* sanat cum sua radice tritum, vino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen ex vino decoctum & contritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollens. Radicis medulla collyrii tenuitate in fistulam additur. Contusis, euersis, & si febris sit potatur in aqua *Verbasculi*, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in struma. Semine ac foliis decoctis in vino ac tritis, omnia corpori infixi extrahuntur.

APPENDIX.

Recentiores duobus *Verbasculis* hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicae renumque obstructions soluantur. Ius herbae propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem partium docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acria sunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem, quam illis *Galenus* adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiā temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formæ studentes, succo è floribus illorū expresso faciem illinunt, quod maculas rugasq; & alia eiusdem vitia mirificè detergeant. Ut hinc cuiusdam sit herbas, quas *Schlusfelblumen* vocant Germani, esse *Verbascula*.

DE FRAGARIA. CAP.

CCCXXVIII.

NO.

NOMINA.

Gracis vt herba quæ fraga gerit nominata sit, certò constituere nobis nondū licet. Sunt tamen qui ῥόζον id αἶμα, hoc est, Rubum Ideum Rubus I= esse putent, eum potissimum qui sine spinis inueni- datus vide tur. Quorū certe sententiā ob multas variasq; cau- tur esse sas, vt in sequentibus dicemus, minimè repudiādam Fragaria. existimamus. Apuleius Gracis ῥόμαρον appellari scribit: quod si verum est, alia sit à Comaro quam Dioscorides, Galenus & alij quidam depingūt, necesse est: hæc enim arbor est, illa autem herba. Ego tamen vidi codicem manuscriptū, in quo hæc verba: Comaron Graci, Romani Fragum nuncupant: non habebantur. Quicquid verò sit, ex numero Mororum esse constat eius fructum optimi odoris: hinc à fragro verbo, quod odorem reddo significat, herba Fragaria ipsa Latinis Fragaria, & fructus fragum dici cœ- vnde di- perunt. Germani Erdtbeer (Galli Fraises, ou sta. herbe portant Fraises) vocant. Graci autē si Comaron appellarunt, ob fructum arboris eiusdem nominis qui fragis iis terrestribus similis est, haud dubiè sic dixerunt.

G E N E R A.

Duo Fragariae sunt genera. Vna flores fructusq; paulò maiores, altera minores obtinet. Nos vna pictura vtranque expressimus.

F O R M A.

Humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, quorum alij flore candido coronā-

MM iij tur,

PLANTARVM HISTORIAE

tur, alij trigemino comantur, folio per ambitum serrato atque venoso, alij fructum gerunt exiguis quidem Moris haud absimilem, ceterum sui generis solidum, callosum, tenerum, quum maturuit rubentem, tum gustu, tum etiam odore suauissimum. Radice foris atra aut rubescente, intus candida, multo fibrata capillitis.

LOCVS.

In syluis, dumetis, & in opacis montibus, ac secus vias sponte nascitur. Vnde etiam colligi potest esse Rubum Idaeum, quando & is in lucis proueniat. In hortis etiam nonnunquam ut grandiore fructum ministret, colitur *Fragaria*.

TEMPVS.

Floret vere, & tota aestate, inq; maximam autumni partem. Fructus tamen eius fugax, raro nisi aestatis initio inueniri potest.

TEMPERAMENTVM.

De temperamento *Fragariae* recentiores diuersa tradunt. Serapio calidam & siccam in secundo ordine tradit. Alij frigidam & humidam in primo: nonnulli, qui tamen prorsus meo iudicio hallucinari videntur, in tertio ordine scribunt. Nos folia ipsa gustu modice esse amara, et adstringere deprehendimus ut succa esse hac ratione, & minime humidam oporteat. Quapropter in tanta sententiarum de eius temperamento diuersitate animaduertendum, idem de *Fragaria*, quod de rubo sentiendum esse, nepe quod folia,

folia, flores, fructus & radix adstringant. Differre tamen inter se, quod folia potissimum recens nata Folia Fragarum plurimum in se habeant aqueae substantiae, parum vero adstringant: adeo ut verisimile sit de iis locutos esse, qui frigidam & humidam in primo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eorum temperies ex terrena frigida essentia, & aquea tepida. Fructus Fructus immaturus frigida terrea substantia praeditus est, eiusdem. ut frigidus et siccus hec nomine dici mereatur. Maturus autem non parum succi temperati calidi qui dulcis est, modicamque adstrictionem habet, ita ut calidus & siccus dicendus veniat. De fructu itaque intelligendi erunt, qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant. Quare ubi de temperamento Fragariae agitur, non simpliciter, sed cum praedicta distinctione respondendum est. Vnde cum idem fere cum Rubo temperamentum habeat Fragaria, iterum hanc ab Ideo Rubo nihil differre verisimile est.

VIRES.

Quum recentiores in commemorandis Fragariae facultatibus partim eas quas Dioscorides Rubo Ideo, partim etiam quas Comaro tribuit Apuleius, vires Fragariae adscripserint, operae pretium me facturum arbitror, si utriusque de iis verba praefero, ut nimirum quisque hac ratione, quapropter iuniores iis facultatibus Fragariam ornaverint, certius intelligere queat.

EX DIOSCORIDE.

Ideus Rubus eadem potest quae Rubus. Amplius

MM iij

eius

PLANTARVM HISTORIAE

cuius flos cum melle tritus & illitus, oculorum inflammationibus auxiliatur. Sacros ignes extinguit. Stomachicis cum aqua potui datur.

EX APVLEIO.

Ad lienis dolorem herbae Fragae succum ex mellis vntia potui datum mirifice proficere certum est. Ad suspiriosos eiusdem succus cum pipere albo & melle mixtus, potui datus, mirificum est remedium. Has facultates etiam antiquus manuscriptus herbarius Fragariae adscribit, nomine tamen Apuleii in Dioscoridis nomen immutato. Addit tamen huius fructum comestum stomacho conferre & ex succo eius os contra foetorem collui, id quod Serapion quoque tradit.

EX RECENTIORIBVS.

Herba fragaria in cibo sumpta medetur lienosis, item succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedant, stomacho prosunt, sed praesertim bilioso. Succus Fragis exprimitur, vetustate vires accipiens, praesentaneo remedio ad faciei ulcera, oculorum suffusiones, neque non epiphoras. Radicis decoctum iecinoris feruores mulcet matutino & meridie potum. Vtuntur hodie frequenter Fragaria ad glutinanda vulnera, alui sistendam, menstrua cohibenda, gingivas confirmandas, oris ulcera, eiusdemque foetorem tollendum, quae singula Rubus etiam laevis potest, ut inde rursus coniscere liceat Fragaria ab eodem nihil differre.

CAPVT CCCXXIX. 461
DE PHV GERMANICO.
CAP. CCCXXIX.

NOMINA.

Φοῦ, ἢ ἀγρία ῥάψος græcis, Phu & Nardus Nardus syluestris. Latinis, Valeriana officinis & her syluestris bariis nostri temporis, Germanis Baldrion, Den- Valeria- nenmarck, oder Katzenkraut, oder Augen- na. uurtzel (Gallis Valeriane) appellatur, quòd scilicet cati odore radicis eius, quo eorum oculi roborantur, impensè delectentur.

GENERA.

Duo sunt præcipua Phu genera. Magnum quod alio nomine Theriacaria vocatur. Hoc descriptioni per omnia respondet. Germanicè grosz Baldrion, & Triacks appellatur. Vulgus herbariorum Valerianam maiorem nominat. Alterum vulgare, quod alio nomine Valeriana etiam vulgaris nuncupatur. Germanis geimein Baldrion, & Katzenuurtzel dicitur. Hoc etiā genus à pictura Dioscoridis, vt paulò pòst fusius docebimus, non abhorret.

FORMA.

Folia Elaphobosco, siue Olusatro similia habet. Caulem cubitalem, aut proceriorem, leuem, tenerum, purpurascentem, in medio concavum, geniculis interfectum. Flores ad Narcissi flores accedentes, minores & teneriores, in subalbido purpurascētes. Radices in superiore parte minimi digiti crassitudine. Adnascentes etiā radiculas obliquas velu-

ti iuna

PLANTARVM HISTORIAE

ti iuncus odoratus, aut veratrum nigrum, inuicem
 implicitas, subflauas, bene odoratas, nardum in gu-
 stu referentes, cum quadā virosa grauitate. Ex qua
 certē descriptione sole clarius fit, herbam quam vul-
 garem hodie Valerianam nominant, esse Dioscori-
 dis Phu, quod omnia ferē sic illi respondeant, vt
 prorsus nulla reclamare nota videatur. Folia nanq;
 huius cū primū erumpunt, Elaphobosci prae se fe-
 runt imaginem: postea, verò dum adolescit, in Olu-
 satri modum laciniantur. Caulis quoque eius cubi-
 talis, & maior (non enim rarò ad trium cubitorum
 longitudinem caulis à nobis visus est) lauis potissi-
 mum in infima eius parte, denique tener, purpura-
 scens, in medio concavus, geniculatus. Flores eiusdē
 qui summis caulibus emergunt, Narcissi certā ex-
 primunt effigiem; quanuis minores sint, atque adeò
 teneriores, vt hoc nomine cum Ruellio in Græcis
 codicibus Dioscoridis ἡστρον pro κείρον legens
 Phu Pōti. dū esse putem. Nisi quis existimet Phu Pōti, quod
 Dioscorides potissimum describit, fauentis cœli be-
 neficio maiusculos habere flosculos. Prædicti etiam
 flores acernatim coeuntes in purpuram candicant.
 Radices quoque in superiore parte minimi digiti
 crassitudine obtinēt, multasq; radículas obliquas,
 Scheni, aut nigri Veratri modo sibiipsis iplicitas.
 subflauas, odoratas, Nardum, cū virosa tamen gra-
 uitate, imitantes. Quum itaque hæ omnes nota, Va-
 lerianæ nostræ respondeant, multorumq; consensus
 nobis

nobis subscribat, & facultates eius quas illi recensiores tribuunt, planè cum iis quæ Dioscorides Phu adscribit cōueniant, quid impediatur cur nō certò asfirmemus Valerianā hāc vulgarem esse. Phu Dioscoridis non video, præsertim cū manuscriptus etiam herbarius Phu esse Valerianā apertè doceat, ita vt mirari satis non queā, cur aliquot docti viri in Germania nostra diuersum astruere voluerint.

LOCVS.

Nascitur in humectis locis, & prope aquas, hæcquæ ad mirandam altitudinem surgit. Prouenit etiā in lucis & caduis syluis, sed hæc in tantam proceritatem non emergit.

TEMPVS.

Floret integra æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse in secūdo ordine tradūt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Phu calefacit. Sicca pota vrinam mouet. Potest idem & decoctum eius. Ad lateris dolorem prodest. Menses ducit, & antidotis miscetur.

EX GALENO.

Odorata quodāmodo est huius herbe radix, Narado viribus similis, sed tamen ad plurima infirmior. Vrinā plus mouet quā Indica aut Syriaca Nardus, similiter autem vt Celtica.

EX PLINIO.

Radix Phu datur potui trita, vel decocta ad strāgulationes,

PLANTARVM HISTORIAE

gulationes, vel pectoris dolores, vel laterum. Menses quoque cit. Bibitur cum vino.

APPENDIX.

Magni Phu radice hodie multi, magno cum errore, pro calamo aromatico vtuntur, quod hoc in loco monere placuit.

DE PHACO. CAP. CCCXXX. NOMINA.

Lens. **Φ**ΑΧΟΣ, ἢ φακὶ græcis, Lens & Lenticula latinis dicitur. Officinis & herbariis latinum nomen retinuit. Germani Linsen (Galli Lentille) appellant.

FORMA.

Lens racemosum legumen est, foliis Vicia, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascētibus, siliquis paruis, molliter in latitudinem fissis, in quibus tria aut quatuor grana inter legumina minima, sunt.

LOCVS.

Prouenit passim in agris satum.

TEMPVS.

Iulio mense floret, & deinceps in siliquis grana profert.

TEMPERAMENTVM.

Lentes medium tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lens crebro comesta, oculorum aciem hebetat.

Aegrè

Aegrè concoquitur. Stomacho nocet, cumq; & in-
 testina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit.
 Præstat quæ facilimè concoquitur, & nihil atri in
 maceratione reddens. Vim habet adstrictoriâ: quæ
 propter aluum sistit, si detracto antea cortice ac-
 curatè coquatur, primâque aqua inter coquendum
 effundatur. Primum enim eius decoctum aluū sol-
 uit. Sônia tumultuosa & grauiâ facit. Nervis, pul-
 moni & capiti inutilis. Melius suo fungetur officio
 contra alui fluxiones, admixto illi cum aceto inty-
 bo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut
 cortice punici mâli, aut rosæ siccis, aut mespilis,
 aut sorbis, aut pyris Thebanis, aut cotoneis mâlis,
 aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ
 post decoctionem abiiciuntur, aut rhois quæ obsoniis
 inspargitur. Acetum autem cum eo diligenter per-
 coqui debet, aliâs aluum conturbat. Contra subuer-
 sionem stomachi triginta grana lentis suis cortici-
 bus denudata deuorata prosunt. Decocta cum po-
 lenta, & illita, podagrâ lenit. Sinus cum melle glu-
 tinat. Crustas rumpit, & vlcera purgat. Decocta
 in aceto duritias & strumas discutit. Cum melilo-
 to, aut cotoneo mâlo, medetur inflâmentationibus ocu-
 lorum & sedis, addito rosaceo, in maioribus sedis
 inflâmentationibus & sinu amplo cum malicorio aut
 siccis rosæ, adiecto melle decocta. Contra nomas gâ-
 grénicas similiter vtuntur, aut adiuncta maris a-
 qua. Aduersus autem pustulas, herpes, erysipela-
 ta,

PLANTARVM HISTORIAE

ta, pernionesq; , vt antea dictum est. Contra mamas
grumosum lac continentes, & lactis copia turgem-
tes, in aqua maris cocta & illita auxiliatur.

EX GALENO.

Lentes non valenter adstringunt. ipsum itaque
earum corpus desiccant, & sistit ventrem : caterum
decoctum irritat. Proinde etiā prior aqua abiici-
tur, vbi retentionis causa adhibentur. Cortex eius
vehementer adstringit, carnea substantia tenuiter,
qua & crassi succi & terrestris est. Succus porro
Lētis adstringenti est cōtrarius. Quocirca si elixa
in aqua iusculū sale garo oleoq; conditum bibatur,
alium deiciet. At quod ex bis decocta Lēte fercu-
lum apparatus, cōtrariam succo vim obtinet. Nam
qua ventri obueniūt fluxiones desiccant, os ventricu-
li, intestina, & totum denique vētrem corroborās.
Quamobrem coeliacis & dysentericis accommodatus
est cibus. Lens verò decorticata, vt illam adstrin-
gendi vehementiā, cumq; hac alia videlicet omnia
qua cōsequuntur, amittit, ita alibilior quā inte-
gra illa efficitur, crassum prauumq; succum gignēs,
tardē cōmeans : alui tamen fluores haud desiccant,
vti ea qua cortice non est spoliata. Iurē igitur qui
modū in hoc edulio nō seruant, elephantiasim quā
vocant, & cancerum incurrūt. Siquidem crassa sic-
caq; cibaria facile in melācholicos humores vertū-
tur. Quare iis dūtaxat quibus vitiosa est habitudo
ob aquā in carne diffusam, Lēs cibo utiliter praebe-
tur,

tur, ceu aridis & squalentibus admodum damnosè.
Eandem ob causam visum integrum & inculpatis
hebetat, immoderatè exiccans. Ei verò qui contra-
rio modo se habet, humidiori videlicet, opitulatur.
Mēstruis purgationibus inepta est: crassum enim et
tardifluum sanguinem facit. At muliebri appella-
to profluvio convenientissima.

EX PLINIO.

Lens optima quæ facilimè coquitur, eaq; quæ ma-
ximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorū ob-
tundit, & stomachū inflat: sed aluum sistit in cibo,
magisq; discocta cœlesti aqua. Eadem soluit, minus
percocta. Crustulas vlcerū rūpit, eaq; quæ intra os
sunt, purgat & adstringit. Collectiones omnes im-
posita sedat, maximèque exulceratas & rimosas.
Oculorum autem epiphoras cum meliloto aut co-
toneo. Contra suppurantia cum polenta imponitur.
Decoctæ succus ad oris exulcerationes & genita-
lium adhibetur. Ad sedem cum rosaceo aut coto-
neo. In iis quæ acrius remedium exigunt cum pu-
tamine punici, melle modico adiecto. Ad id demū
ne celeriter inarescat, adiiciunt & Beta folia. Im-
ponitur & strumis panisque, vel maturis, vel matu-
rescētibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsæ
& gāgranis cū punici tegmine. Itē podagrīs, cū po-
lenta, et vuluis, & renibus & pernionibus, vlceri-
bus difficilè cicatricē trahentibus. Propter dissolu-
tionē stomachi triginta grana Lentis deuorantur.

In cho-

PLANTARVM HISTORIAE

In choleris quoque & dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta in qua usu melius semper eam torrere aut tundere, vt quam tenuissima detur, vel per se, vel cum coloneo malo, aut pyris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, nervosisq; omnibus, & felli, nec somno facilis. Ad pustulas variolis, ignique sacro, & mammis, in aqua marina decocta: in aceto autem, duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polenta modo potionibus inspergitur. Quae sunt ambusta, aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso fursure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura.

EX SIMEONE SETHI.

Crassi succi est, & austeram vim atq; qualitatem possidet. Si quis ergo in aqua coquat, & ea aqua, oleo & sape cum sale misceat, potionem faciet quae ventrem subducatur. Bis autem cocta ventericulum & ad ipsum defluxus sistit. Inducit autem stomacho robur, & intestinis, & vniuerso vatri. Quapropter utilis est cibus coeliacis & dysentericis. Si vero cortice ablato sumatur, vehementiam adstringendi abicit, magis vero nutrit, cum tardi sit transitus, & crassus succi, non tamen adeo siccatur, vt antea dixi. Qui vero hoc edulio crebro utitur, elephantiam contrahit, & caneros & duritias, & nervorum dolores, & melancholicos affectus. Aptus enim est crassus & siccus sanguis,

sanguis, vt fiat succus melancholicus. Quibus igitur habitus quissiam malus aquosus in carne est, iis solum utile est edulium, quemadmodum siccis & squallidis maximè noxium. Similiter visum salubriter se habentem nimium exiccando habet, contra verò affectum iuuat. Neque etiam ad menstruas purgationes utilis est, eò quòd crassum & difficulter fluentem sanguinem efficiat. Ad hæc veneris appetentiam semen exiccando, extinguit: ideo castè viuere volentibus ad hoc maximè confert. Grauiam somnia facit, eò quòd ex ea melancholici succi in totum distribuuntur corpus. Cū mentha decocta, plurimū inflationis deponit. Nonnulli & Betā huius rei gratia eo quo decoquitur tēpore iniiciūt. Lens verò probè decocta & trita, si vulneribus ex iaculo aut telo facta imponatur, sanguinis fluxum vehementer compescit. Parue verò lentis decoctum sumptum, difficilem partum soluit. Auribus ex quibus pus emanat instilla: um, succurrit.

DE PHILYRA. CAP.

CCCXXXI.

NOMINA.

Ἰλῦξ & Græcis, Tilia Latinis, & officinæ,

♂ Germa. Linden (Gallis Tilet) appellatur.

Alia ab hac est arbor quæ Diosc. Φιλλυρίαι vocatur. Quòd non animaduertentes viri etiā nonnulli doctissimi, vtrasque arbores magno errore confundūt, quòd forma admodum discrepent, vt ex iis.

NN quæ

PLANTARVM HISTORIAE

quæ paulò post dicemus, & è Dioscoride & Theophrasto libro tertio de plantarum historia, cap. x. inuicem collatis, abundè constabit. Differunt itaque inter se Philyra & Phillyrea, neque vna vtraque voce arbor significatur, sed diuersæ.

GENERA.

Tilia Theophrasto loco iam citato autore, duo habentur genera, mas scilicet & fœmina. Distantq; inter se tum materia, tum totius corporis forma et quòd altera fructifera, altera sterilis. Materies mari dura, flaua, nodosior, spinosiorq;, fœmina candidior: & cortex mari crassior, detractusq; inflexibilis propter duritiam est: fœmina candidior flexibiliorq;, ex quo cunas faciunt: item fœmina odoratior. Et mas sterilis, nulloq; flore est: fœmina, cui us tibi picturam damus, & florem & fructum gignit.

FORMA.

Folio est hederaceo, molliore, & in angulum acutiores rotundiores & prolixiores, & in orbem lentè crispo atque serrato: flore tantisperdum calyculo còtinetur herbaceo, ubi emerfit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semē prætenue quantum atriplicis, omnibus animantibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducantur, eorumq; mira dulcedine capiantur. Nunc cum in confer ea quæ Dioscorides de Phillyrea tradit, & senties esse diuersissima. Nam quis vnquam dixit Tiliam habere folia oleæ, & fructum ferre subdul-

cem

cem ad similitudinem Lentisci, nigrum, vuarū more congestum? Philyræ enim seu Tiliæ folia sunt heracea atque serrata, adcoq; ab oleæ foliis dissidentia: fructum denique fert nō modò non subdulcem, sed qui à nullo mandi potest.

LOCVS.

Montes & valles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquis.

TEMPVS.

Floret Iunio mense.

TEMPERAMENTVM.

Calidam esse Tiliam, vel ex eo liquet quòd frigidis cerebri malis, epilepsiæ, & id genus aliis mirifice conferat. Amaritudo etiam cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus preualere videtur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatem cum modica adstrictoria, perinde atque vlmus, cuius facultates illi Plinius, vt ex iis quæ paulò pòst subiiciemus planum fiet, tribuit, habere euidentissimum est.

VIRE. EX GALENO.

Vlmi foliis aliquando recens vulnus glutinamus, confidentes adstringentē pariter & extergentem illis inesse facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est & adstrictorius, itaque cum aceto leprā sanat. Porro viridis etiānum & recēs si vulneribus deligatur vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandē vim obtinent: proinde & de

PLANTARVM HISTORIAE

cocto earum quidam perfundunt fracturas quibus callo inducto opus est.

EX PLINIO.

Cortex interior Tiliae lepras sedat, & folia ex aceto illita. Multi corticem commanducatum vulneribus utilissimum esse putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoque à medulla castrate arboris effluens, capillū reddit capiti illitus, defluentesq; continet. Humor denique cuti nitorem inducit, faciemq; gratiorem præstat. Folia ad infantium ulcera in ore commanducata prosunt. decocta & pota, urinam ciunt & menses.

APPENDIX.

Quā Plinius ferè omnes facultates Vlmi etiam Tiliae adscribat, ut ex eiusdem verbis patet, ideo à Galeno quæ ille de Vlmo tradit produximus. Si verò quispiam vires quæ à recentioribus Tiliae tribuuntur, probè expendet, nihil ab iis quæ ex Plinij & Galeni sententia retulimus differre comperiet. Nam maculas facie abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lauetur. Mederi etiam morbo comitiali bibitum eius liquorem stillatitium, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere iidem docent. Quid multa? omnes facultates Vlmi obtinet Tilia, ideoq; vulneribus etiā recentibus succurrit, & alia quæ à Dioscoride & Galeno in Vlmi historia commemorantur, potest.

DE CHELIDONIO MAIORE.

CAP. CCCXXXII.

NOMINA.

Xελιδόνιον μέγα Græcis, *Chelidonium ma-*
ius Latinis, Officinis *Chelidonia*, Germanis
 Schelkraut, Scheluurtz, groß Schuualben-
 kraut, (Gallis *Chelidoine*, ou esclere) dicitur.
Chelidonio autem, vel si *maius* *Hirundinariae*, auis *Chelido-*
hirundo quæ Græcis *Χελιδών* vocatur, nomen in-
 didit, vel, vt autor est *Plinius*, quòd hanc primùm de dictũ.
 inuenit, & ea oculis pullorum in nido restituit vi-
 sum, vt quidam tradunt, etiam erutis, vel quòd flo-
 ret aduentu hirudinum, discessuq; commarcescit: id
 quod de minore verè dicitur.

FORMA.

Caulẽm emittit cubitalem & maiorem, gracilẽ,
 adnata foliis plena habentem. Folia *Ranunculo* si-
 milia, teneriora tamen, & colore subcæsia, iuxtaq;
 singula folia florem *Leucoio* similẽ. Succus illi cro-
 ceus, acris, mordax, cũ aliqua amaritudine & odo-
 ris grauitate. Radix supernè singularis, infernè au-
 tẽ plures. Fructus cornuti *Papaueris* instar tenuis,
 longus veluti galeæ conus, in quo exigua semina
 sunt, *Papaueris* semine maiora. Huius descriptionis
 notæ omnes *Chelidonio* nostro respondet. Siquidem
 fruticosa est herba, cubitali altitudine, cauliculis la-
 ruginosi, teneris, folio *Ranunculi*, magis anguloso,
 tenuiori, aduersa parte cæsis, auersa incano, flore lu-

PLANTARVM HISTORIAE

teo, Leucoio consimili, semine papaueris, quod in corniculis seu siliquis longis exilibus clauditur. Vulnerata succum croceum emittit, gustum vellicantē. Radix in superiore parte vna, in inferiore parte multis luteis fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in opacis & parietinis.

TEMPVS.

Chelidonium hirundinum aduentu florem excitat, atque adeo toto deinceps vere & aestate floret, quibus etiam temporibus carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Herba hac tertii ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Succus Chelidonii mixtus melli, & in aneo vase in carbonibus decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Exprimitur autem succus ex foliis, radicibus & floribus incipiente aestate, siccaturque in umbra & in pastillos conformatur. Radix cum Aniso & vino albo pota, regio morbo medetur. Sanat herpetas cum vino illita. Dentium dolores commāo ducata sedat.

EX GALENO.

Chelidonium admodum extergentis & calidae facultatis est. Sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur discussione indigens. Vñ
sunt

sunt quidam radice eius ad morbum regium à iccoris obstructione proficiscentē, in vino albo cam potui exhibentes, cum Aniso. Pari modo mansa, dentium doloribus confert.

EX PLINIO.

Florentibus succus exprimitur, & in aevo vase cum melle Attico leniter cinere feruētī decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Utuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellatur ab ea. Eadem oculorum aciem adiuuat, si addita aqua foveantur. Succus eius cum melle cunctilices, nubeculas, obscuritatemq; discutit, cicatrices extenuat. Albugines etiam iumentorum.

DE CHELIDONIO MINORE.

CAP. CCCXXXII.

NOMINA.

Xελιδόνιον μικρόν Græcis, Chelidonium minus Latinis, Officinis Scrofularia minor vocatur, quod strumosaradix multis granorum firmi grumis videatur coaluisse: vel quod strumosa, quas imitatione Græca Scrofulas vocant, mœdeatur. Germanis Feiguartzen oder Blaternkraut, id est Ficariā, Pfaffēhodlin, klein Schelwurtz, oder Schuualbenuurtz, oder Meyenkraut nominatur. Chelidonium autem hæc herba vocata est haud dubiè, quod, ut Theophrastus libro septimo, cap. xiiij. hirundinum aduentu florem excitet.

Scrofularia minor
cur dicta.

FORMA.

NN iij

Herbus

PLANTARVM HISTORIAE

Herbula est à stolonibus pediculisve pendens, sine caule, foliis Hederae figura, rotundioribus minoribusq; item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet paruas multas, ex eodẽ callo prodeutes, tritici modo acervatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem progrediuntur. Hæc Dioscoridis delineatio prorsus herbae illi quam Scrofulariam minorem vulgò nominant, convenire videtur. Nam hæc herbula est à pediculis pendens, vidua caule, foliis Hederae, rotundioribus multò, minoribusq; teneris & modicè pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeutes, paruas, complures in granorum tritici morem acervatim collectas, quarum tres vel quatuor in longum protenduntur. Flos ei Ranunculi ut maiori luteo colore nitens. His addunt locus, tempora, vires, & alia quæ iam commemorabuntur, quæ singula Scrofulariae minori adamusim quadrant, ut nemo hanc Chelidonium minus esse inficias ire sine magna impudentia possit.

LOCVS.

In palustribus, prope aquas, & in limitibus humidis, omnibusque vliginosis tractibus ac hortis passim gignitur.

TEMPVS.

Verno tempore, Maio mense, & præsertim hirsutinum aduentu floret, nec longo post tempore marcescens evanescit, sic ut irrigui limites, qui largo foliorum florumque stipatu pubescebant, confestim

is spoliati glabrescere conspiciantur.

TEMPERAMENTVM.

Chelidonium minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando, idcōque magnam præ se fert acrimoniam, gustum erodētem. Nostrium autem vsqueadeò acre non est, vt com-
manducando sæpe nullam prorsus sentias acrimo-
niam, potissimum in eo quod in humido loco natum
sit. In hoc autem quòd locis siccis provenit, senties
& amaritudinem & acrimoniam, sensim tamen
gustum erodentem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acrem vim habet, Anemones modo summā cus-
tem exulcerantem. Scabiem & vnguium lepras
tollit. Ex radicibus expressus succus ad purgatio-
nem capitis addito melle naribus vtiliter instilla-
tur. Similiter decoctum eius cum melle gargarissa-
tum, caput strenuè purgat, et omnia pectoris vitia.

EX GALENO.

Chelidonium minus cūm acrius sit maiore, illi-
tum confestim cutem exulcerat, vnguesq; scabros
eiicit. Succus eius per nares purgat, vtpote vehemē-
ter acris existens.

APPENDIX.

Recentiores ea herba in exterendis fribus ma-
riscisve, & strumis, magna experientia vtuntur, vt
inde certè Scrofularia nominari, quemadmodū di-
ximus, meruerit. Antiquus etiam ac manuscriptus
herbarius,

PLANTARVM HISTORIAE

herbarius, sub nomine tamen Pedis vetuli, quo Aron nominatur, se à quodam qui expertus sit cognovisse scribit, quòd hæc herba contra mariscas ac strumas mirificè prosit.

DE CHAMAEDRY. CAP.

CCCXXXIIII.

NOMINA.

αμυγδαλός Græcè, Trissago Latine, officinis græcum nomen insedit, vulgo Quercula minor, & à serratis foliis Serratula appellatur: Gallicè Chesnette, ou petit Chesne, ou de la germandrée. Chamaedrys verò Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quòd scilicet folia Quercus habeat, & huius respectu quasi humi repat. Sunt qui Serratam nominatam ideo putèt, quòd ab ea serra inuenta sit. Dioscorides hæc Teucrium, etiam, propterea quòd Teucrio similis admodum sit, appellari à nonnullis scribit.

GENERA.

Etsi Diosc. aliq; veteres unicam faciant Chamaedryn, tamen nos, quia plures herbas ad eius formam ac picturam accedere videmus, duo eius genera produximus. Quorū sanè primum vera Chamaedrys existit, & Germanicè Klein Bathengel nominatur. Illius autē rursus duo sunt genera. Vnū enim quod præ cæteris omnibus picturæ Dioscoridis maximè accedit, mas dicitur, alterum verò femina: neque enim aliter nobis discrimen indicare li-

cuit

cuit nisi sexus ratione. Alterum genus vulgaris est Chamædrys, quod iterum duum est generum, mas scilicet & fœmina. Mas Germanicè Erdtuucirauch, Fœmina verò Gamenderle, Blauumenderle, Vergifzmeinnit appellatur.

FORMA.

Frutex dodratalis, foliis exiguis, forma & diuisuris quernis similibus, amarisq; flore subpurpureo, exili, semine in calyculis atro. Quæ utique descriptio ita herbis illis quas pictas exhibemus respondet, vt nulla prorsus nota reclamare videatur. Sûnt enim herba palmum alta vt plurimum, exili folio, effigie & diuisura Quercus, amaro, flore penè purpureo & exiguo, ita vt mirari satis non possim, cur nonnulli alteram speciem genuinâ Chamædryn esse negent, cum tamen Germanica etiâ appellatio pulchrè ad antiquum atque ad eò græcum nomen aludat. Sed instabit forsitan quispiam dicens, Chamædrys Dioscoridis palmum alta est, hæc tua mēsurā hanc excedit. Fateor sanè, attamen non multum exuperat. quòd si etiam plus exuperaret, nō tamen hoc nomine alterius speciei herba putāda esset: neque enim ad eò statam atq; certam mēsurā herbis tribuit Dioscorides, vt quandoque ultra citraq; cōsistere non liceat: verum cum alicui herba mēsuram adscribit, id ea ratione facit, vt maiori parti indiduatorū illius speciei quadrare existimet. In prioris itaque inopia, alterius vsus esse potest.

PLANTARVM HISTORIAE

LOCVS.

Nascitur asperis & petrosis locis, interdum etiā in montosis & campestribus solidis.

TEMPVS.

Primum genus Iunio & Iulio mensibus floret. Alterum autem vere potissimum. Carpuntur semine praegnantia.

TEMPERAMENTVM.

Ex tertio ordine calefacientium & desiccantium facit Galenus. Germanica tamen minus calefacere & desiccare videntur, utpote in regione frigidiore nata.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Recēs ac viridis in aqua decocta & pota, cōuulsis, tussietibus, lieni indurato vrinae difficultatibus, hydropicis inter initia auxiliatur. Cit menses, fetusq; extrahit. Lienē ex aceto pota minuit. Aduersus venenata cum vino pota & illita efficax est. Trita ad praedicta in pilulas conformatur. cū melle vetera vlcera purgat. Cum oleo trita, inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.

EX GALENO.

Chamaedrys vincentem qualitatem amarā habet, & est quodāmodo acris. Quocirca meritò lienum colliquat, vrinam & menses mouet, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions expurgat.

EX THEOPHRASTO.

Trissaginis

Trissaginis folia adrupta, vulneraq; in oleo tri-
ta valent, & ad depascentia vlcera. Semen bilem
extrahit, & oculis quoque beneficum est. Foliū ad
albugines tritum in oleo predest.

EX PLINIO.

Aduersus serpentium venena potu illituq; effica-
cissima. Item stomacho, tussi vetusta, pituita in gua-
la cohaerescenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus.
Lienem consumit. Vrinam & menses cit, ob id in-
cipiētibus hydropicis efficax, manualibus scopis ea-
ius in tribus heminis aquae decoctis vsque ad ter-
tias. Sanat & vomicas, & sordida vlcera cū mel-
le. Fit & vinum ex ea pectoris vitiis. Foliorum suc-
cus cum oleo, caliginem oculorum discutit. Ad sple-
nem ex aceto sumitur.

DE CHAMAECYPARIS.

CAP. CCCXXXV.

NOMINA.

XΑΜΟΥΝΤΡΑΡΙΟΣ Plinio dicta est; quasi
pumila Cupressus. Apud Græcos, quod sciā,
eius fruticis nulla fit mentio. Vulgo Cypressus, Ger-
manis Cypresz, (Gallis Cypres) nominatur. Cy= Cypressus
pressus ab odore & forma foliorum eiusdē nomen unde di-
claturæ arboris vocata est. eta.

FORMA.

In arbusculi formam fruticat, foliis incanis, Ab=Chamaecy-
rotoni scemina modo scissis. Floribus in summo au- parissusi. ō
ri instar fulgentibus. Totus frutex odoratus est. est Cha-
Errant mapitys.]

PLANTARVM HISTORIAE

Errant qui Chamæpityn esse arbitrantur: neque enim vt illa humi serpit, sed altius à terra, vt pictura monstrat, consurgit.

LOCVS.

In hortis passim ac figulinis prouenit.

TEMPVS.

Aestate floret. Paucos autem frutices inuenies in quibus flores intueri liceat, quando per vniuersam vitam nõ nisi vnum hunc, cuius picturam damus, fruticem in quo flores apparuerint, viderim.

TEMPERAMENTVM.

Apparet in ea, sicut gustus testificatur, lenis quidem acrimonia, sed maior amaritudo, multoq; etiã plus acerbitatis in tota plãta. Resiccat itaque absque insigni caliditate.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Quum easdem quas arbor Cyparissus qualitates habeat Chamæcyparissus, necesse est vt etiam facultates easdem obtineat. Arboris igitur hæ sunt vires. Adstringit & refrigerat. Folia eius cum passo & myrrha modica pota, vesica fluxionibus & vrina difficultati medentur. Pilula tusa, & cū vino potæ, contra sanguinis reiectionem, dysenterias, alui fluxiones, orthopnceam, tußimq; prosunt. Decoctum earum idem potest. Tusa cum fico duritias emolliunt, & polypos in naribus sanant. Leprosos vngues cum aceto decocta & trita adiectis lupinis tollunt. Intestinorum ramices illita coercent. Folia
idem

idem possunt. Pilulæ cum coma suffitæ culices abigere creduntur. Folia trita & illita vulnera glutinant, sanguinemque supprimunt. Cum aceto autem trita, capillos tingunt. Illinitur per se aut cum polenta ad erysipelata herpetas, carbunculos, & oculorum phlegmonas. Cerato mixta & imposita ventriculum firmant.

EX GALENO.

Cupressi folia, germina, pilulæ recētes & molles, magna vlcera in duris corporibus glutināt. Ex quo clarum est quòd resiccādi vim habeat, absque insigni acrimonia & caliditate. Tanta inest ei acrimonia caliditasq̃, quanta satis sit deducendæ in altum acerbitati: nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficit. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq̃; affectibus humiditates, sine molestia, tutòque depascitur, quum quæ calefaciunt & desiccant, eas quidem quæ cōtentæ sunt absumant, ceterum acrimonia & caliditate alias attrahāt. Sic intestinorum ramice affectos inuat: siquidē exiccat & robur addit corporibus præ humiditate laxis, utpote quum adstrictio in altum subeat, eò quòd caliditas quæ illi admista est deducat, ad eam quidem mensuram perueniens, ut præire quidem valeat, nondum tamen mordicare. Quidam ea vtuntur ad carbunculos & herpetas polentæ miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos efficientem humiditatem. Sūt qui

PLANTARVM HISTORIAE

qui ad erysipelata vtantur, admista nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

EX PLINIO.

Cupressi folia trita serpentum ictibus imponuntur, & capiti cum polenta, si à sole doleat. Itē rami ci, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumori cum cera illinuntur. Capillum denigrant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis mollis, & è vino Aminao subacta, pedum ac neruorū dolores sedant, Pilula aduersus serpentium ictus bibuntur, aut si eiiciatur sanguis. Collectionibus illinuntur. Ramici quoque teneræ tusa cū axungia & lomēto profunt. Bibuntur ex eadem causa. Parotidi & strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tusus cum semine, qui mixto oleo, caliginem oculorum aufert. Item victoriati pondere in vino potus illitusq; cū fico sicca pingui, exemptis granis, vitia testium sanat, tumores discutit, & cū fermento strumas. Radix cum foliis trita potaq; vesica & straguria medetur, & cōtra phalangia. Ramenta pota Chamæcy menses ciunt, scorpionum ictibus aduersantur. Chamæcy parissi fac mæcy parissos herba ex vino pota contra venena serpentium omnium scorpionumq; pollet.

DE CHAMAECISSO. CAP.

CCCXXXVI.

NOMINA.

Hedera **X**ΑΜΑΙΝΙΣΟΣ, ἡ γῆς στέφανος græcis, Hedera terrestris. **X**ra terrestris, Terræ corona latinis appellatur.

tur. Officina nomen Hederae terrestres retinuerunt. Germanicè Gundelreb, corrupto sanè nomine vocatur, cum dicendum esset Grundreb, hoc est, humi repens viticula. Nominatur etiam Germanis Erdepheuu, & Erdenkrätzlin, (Gallicè Lierre terrestre.) Chamacissos verò dicta est, quod Chamæ nunquam non repat humi, foliis Hederae similis cissos vnbis. Corona terræ, quod ramulos suos per terram de dicta. spargens, folioso veluti serps eandem coronare videtur. Corona terra.

FORMA.

Folia Hederae similia habet, minora tamen & tenuiora. Ramulos dodrantes multos, foliis plenos, à terra quinque aut sex prodeuntes. Flores Leucois similes, minores tamen, & in gustu vehementer amaros. Radix illi est tenuis, alba, & inutilis. Ex hac historia satis constat herbam hodie vocatā Hederam terrestrem, esse Dioscoridis Chamacisson. Siquidem foliis Hederae constat, minoribus tamen & tenuioribus, ac in circuitu incisis. Leggendum enim esse $\mu\iota\kappa\rho\gamma\tau\omicron\rho\alpha$, & non $\mu\alpha\kappa\rho\gamma\tau\omicron\rho\alpha$, res ipsa docet: nam etsi folia Chamacissi aliquatenus Hederae similia sint, tamen rotundiora, atque adeo minora etiam & tenuiora existunt. Et est hic lapsus ab ι in α apud Dioscoridem frequens, ut ex aliis etiam locis suprā notatis liquet. Ramulis etiam dodrantalibus multis foliosis, qui tamen antequā scindantur, quinque aut sex à radice procedunt. Flores

Dioscoridis locus
emaculatur.

OO denique

P L A N T A R V M H I S T O R I A E

denique eius Leucois similes sunt, non quidem luteis, albis, aut purpureis, sed cœruleis: ita ut vehementer errent qui eius flores, neque figura, neque colore floribus Chamæcissi, qui Leucois adsimilatur, esse similes putant. Etsi enim colore neque albi, neque lutei sint, cœruleos tamen, qui color Leuciorum est, esse constat. In gustu denique, sicut etiam folia, amari sunt. Radix quoque eius tenuis, & nullius prorsus usus est. His omnibus accedit, quod nomen etiam pulchrè quadrat: neque enim Græcis aliud sonat Chamæcissos, nisi humilem ac humilem Hederam. Cæterum non esse Elatinen, præter alia multa quæ referre superuacaneū arbitror, sapor manifestè ostendit, qui in Hedera terrestri æmarus & modicè acris est, atque adeò calorem præsert. Elatine verò refrigerat atque adstringit. Sic

Chamæcissos.
Hedera
terrestris
non est Elatine.

Non est Asclepiada, ut taceam quod Securidacæ simile semen non proferat, vel vnus locus natalis satis monstrat. Asclepias enim in montibus, Hedera autem terrestris in decliuibus locis & vallibus, ut Germanicum nomen Grundtreb abundè indicat, prouenire solet. Quæ autem herba sit, Asclepias, suo loco dictum à nobis est.

L O C V S.

Nascitur in cultis locis, iuxta etiā sepes & dumeta.

T E M P V S.

In Martio statim erumpit, & floret in magnam usque æstatis partem.

T E M

TEMPERAMENTVM.

Amaritudo exiguaq; acrimonia foliorum & florum satis monstrant herbam hanc calidam & sic Error quocam esse, ita vt hi qui frigidam esse statuunt, re-runda ne-prehensione non careant. tatur.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia eius trioboli pondere in aquæ cyathis tribus, quadragenis aut quinquagenis diebus pota, ischiadicis prosunt. Morbum quoque regium in senos septenôsve dies similiter pota emendant atque expurgant.

EX GALENO.

Chamæcissi flos quum sit admodum amarus, iccoris obstructions soluit. Sunt qui illum etiã ischiadicis exhibeant.

EX PLINIO.

Chamæcisson appellant Hederam non attollentem se à terra. Et hæc contusa in vino acetabuli mēsurā lieni medetur. Eius folia bibunt ischiadici triobolis, in vini cyathis duobus septē diebus, admodum amara potione.

APPENDIX.

Has omnes iam commemoratas facultates Hederæ terrestri recentiores tribuunt: neque dubium est, quum sit admodū amara, quin eadem habeat, & alia etiā possit quæ illi adscribunt, vt euocare suppressos menses, vrinam mōuere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiā tradunt

PLANTARVM HISTORIAE

efficacē esse: id quod equites quoque sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur.

DE CHRYSANTHEMO.

CAP. CCCXXXVII.

NOMINA.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟΝ græcis, Chrysanthemum latinis, officinis inusitatū, Germanis Goldtblum, Schmaltzblum, à pinguedine quæ contrito digitis flosculo apparet, & Dratblū. (Gallis Marguerites blanches) nominatur.

Chrysanthemum Chrysanthemon verò à flosculis auri splendorem & colorem præ se ferentibus, dictum est.

unde dictum.

FORMA.

Herba est tenera, fruticis tamen speciem obtinēs, leues proferens caules, & multifida folia: luteos flores, vehementer splendentes, & oculi instar circulares. Ex qua sanè descriptione satis clarum est, herbam quam pictam damus, esse Chrysanthemon, quòd illi omnes à Dioscoride tradita notæ, nulla prorsus reclamante, conueniant. Quibus Democriti in Hydrosopico accedit testimonium, qui herbam hanc quæ Batrachio similis est, Chrysanthemon Græcis appellari scribit, foliisq; Apij esse, maioribus tamen, flore auri colore splendente. Addit denique ab Aquilegiis mirè celebratam esse, eò quòd aquam subesse certum sit, vbi solet emicare. Quæ quidem singula herba illi quam depictam exhibemus respondent.

spondent. Nam vt cætera omittam, vbi hæc nascitur aquæ latices subesse non est dubium. Quidam perperam Vuasserhanenfusz Germanicè nominant: nam hoc nomine appellata herba, alia ab ea est, vt in capite de Batrachio docuimus. Nam cum hæc nostra acrimonia vacet, quanquam Batrachii similis sit, tamen in numero illorum esse hoc nomine non potest.

LOCVS.

Nascitur prope vrbes, in pratis humidis, & aliis locis aquosis.

TEMPVS.

Maio mense eius floribus prata & loca humida splendent.

TEMPERAMENTVM.

Eiusdem esse cum Buphthalamo temperamenti, & gustus & facultates declarant. Calidum itaque esse & siccum constat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Eius flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis coloris bonitatem tempestiuè reddit, à balneo post longiorem in eo moram exitu pota.

EX PLINIO.

Vesica calculos Chrysanthemon eiicit.

DE CHAMAELEONE ALBO.

CAP. CCCXXXVIII.

PLANTARVM HISTORIAE

NOMINA.

Carduus		αμουλέωρ λευκός Græcis, Chamæleon
suarius.	X	albus, Carduus suarius & varius Latini,
Cardopatiū		nis, officinis & barbaris Cardopatiū ap-
tium.		pellatur. Quod nomen haud dubiè corruptum est, deductumq; à dictione Pæcration, nam sic olim esse nominatū Chamæleonem Apuleius testatur: aut à Carduo vario, à qua dictione, v scilicet litera in p, & r in t mutata, in Cardopatiū facilis est lapsus. Germanis Eberuurtz, eleganti allusione ad Carduum suarium, nuncupatur. (Gallis Vne herbe espineuse semblable à la carline, ou Artichault saulauge.) Chamæleon autē à foliorum leon vnde varietate dici cepit. Mutat enim cū terra colores, dictus. Plinio teste: hic niger, illic viridis, alibi cyaneus, alibi croceus, atque aliis coloribus videtur. Suiarius autem Carduus dictus est, quod sues si in po- Carduus lēta exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam quare no= Eberuurtz Germanis nuncupatam puto. minatus.

FORMA.

Folia habet Silybo aut Scolymo similia, asperiora autem, acutiora, nigroq; Chamæleone validiora. Caulē vacat, verū ē medio spinam Echino marino, aut Cinaræ similem erigit. Flores purpureos, veluti capillos, qui in pappos evanescent. Semē Cnicō simile. Radicem in pinguibus collibus crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graueolentem & dulcē.

Plinius

Plinius lib.xxij.cap.xvij.breuius herbam hãc depingit,sic inquit:Asperiora folia habet,serpit in terra Echini modo spinas erigens,radice dulci,odore grauissimo.Quæ certè notæ in vniuersum omnes,herbæ quæ hodie barbara & corrupta voce Cardopatium vocatur,adamusim respondent,ita vt nemo non esse Chamæleonẽ perspicuè intelligat.Huc accedit quòd facultates etiam eadem sint.Radix enim Chamæleonis albi hausta,venenis resistit.Radix etiam Cardopatij ex recentiorum traditione,mirificè venenis aduersari,& contra pestilentiam populatim scruientem,vt paulò pòst dicemus,efficacissimum esse remedium dicitur.Quòd si tamen rectiora quis protulerit,non grauabimur hîc,vt in aliis quoque,mutare sententiam.

LOCVS.

In glabretis montium prouenit,& in syluis,vt hinc etiam syluaticus Carduus cognominatus sit.

TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus cum suis floribus efodi potest.

TEMPERAMENTVM.

Radix eius calefacit secundo ordine absoluto,desiccatur autem tertio.

VIRE. EX DIOSCORIDÈ.

Radix pota acetabuli mensura,latos lumbricos pellit.Sumitur autem in vino austero,cum decocto Origani.Hydropicis commodè drachma in vino

OO iij datur:

PLANTARVM HISTORIAE

datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatē vrinæ decoctum eius propinatur. Pro theriaca cū vino pota est. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta, aut hydrelao madefacta.

EX GALENO.

Radix eius potui datur acetabuli mensura contra latos lumbricos cum vino austero. Exhibent etiam aqua inter cutem laborantibus.

EX PLINIO.

Hydropicos sanat succo radicis decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in vino austero cum Origani scopis. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes suesque in polenta. Addita aqua & oleo contrahit in se mures & necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicē eius aliqui concisam seruari iubent funiculis pendentem, decoquuntque in cibo contra fluxiones, quas Graeci rheumatismos vocant.

APPENDIX.

Recentiores radicem Cardui suarij drachmæ pondere in vino sumptam contra pestilentiae contagia prodesse tradunt. Eādem etiam in aceto decoctam, contra scabiem, impetiginē, & omnes cutis fœditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decoctio lauentur. Idem dentium etiam dolori succurrit.

DE CHAMAELEONE NIGRO.

CAP. CCCXXXIX.

NOMINA.

Xαμαιλέων μέλας Græcis, Carduus niger
 aut Vernilagium Latinis dicitur. Officinis
 hæc planta incognita existit. Germanis allusione
 ad Latinam nomenclaturam schuuartzzer Gar-
 tēdistel (Gallis Cardonette) vocari potest, quòd
 scilicet in hortis tantum culta proueniat. Sunt qui
 eam à candore foliorum nominet Vuelſch Vuelſz
 Distel, sed prior appellatio ad discriminandas plan-
 tas melior existit. Chamaleon verò dictus est à va Chamae-
 rietate foliorum, quæ pro terræ & locorum differ-
 rentia, aut admodum viridia, aut subalba, aut cæ-
 rulea, aut rubra inueniuntur. Niger verò haud du-
 biè à radice appellari cœpit.

FORMA.

Foliis Scolymo similis est, minora tamen, tenuio-
 raque, & rubentia ea habet. Caulem emittit digi-
 tali crassitudine, dodrantalem, subrubrum, qui in
 summo habet umbellam, & spinosos flores tennes,
 hyacinthi æmulos, versicolores. Radicem crassam,
 nigram, densam, & aliquando corrosam, quæ disse-
 cta subflauescit, & cōmanducata mordet. Hæ qui-
 dem notæ quanquam plantæ, cuius hic picturæ da-
 mus, ferè omnes videantur quadrare: caulem enim
 euehit dodrantalem, & altiore etiam, digitum
 æquantem crassitudine, subrubrum, folia instar Sco-
 lymi, minora, subalba & leniter punicea, candidum
 ac hispidum florem, hyacinthina purpura varia-
 tum.

PLANTARVM HISTORIAE

tum, radicem nigrā & subflauam: tamen cū non admodum linguam vellicet commanducata radix, sit vt non parum an legitimus sit Chamæleon niger addubitem. Verū cum multi huius temporis viri eruditi hanc plantam Chamæleonem nigrum esse credant, nolui hoc tempore ab iis prorsus dissentire, atque adeo eandem quæ illi, plantæ huic inde re appellationem volui, maximè cū nullā aliam eidem conuenire apud Dioscoridem descriptionem videam, donec aliquid certius de ea nobis aut aliis compertum fuerit.

LOCVS.

Nusquam sua spōte in Germania provenit, quare cultura indiget. Nascitur autem Chamæleon niger, Dioscoride autore, siccis, cāpestribus, cliuosisq; & maritimis locis.

TEMPVS.

Iunio mense floret, ac subinde in capitulis rotundis Augusto mense semen hispidum profert.

TEMPERAMENTVM.

Chamæleontis nigri radix sicca est in tertio ordine, calefacit verò in secundo absoluto.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix trita additis exiguo atramento sutorio, cedrino oleo, & axungia, scabiū abigere potest. Abstergit etiam impetigines, admixtis sulphure & bitumine. Decoctum eius collutione dētium dolorem mitigat. Cum pari pipere & cera oblita, dolētibus dentibus

dentibus auxiliatur. Quinetiā fouentur ea dentes, quum decocta in aceto, & calens imposita fuerit. Scriptorio stylo dolenti denti calida admota, eum frangit. Cum sulphure decolorem ob solem faciem, & alphas emendat. Miscetur medicamentis erodentibus. Phagedenas, ferinaq; ac tetra vlcera illita, ad mitiorem habitum transferens sanat.

EX GALENO.

Radix quiddam letale obtinet, quamobrem eius foris vsus ad scabies, impetigines, alphas, et in summa, ad omnia quæ deterfionem postulant. Præterea emollientibus & discutientibus medicamentis miscetur, ac illita phagedænica vlcera sanat.

EX PLINIO.

Radice eius lichenes curatur, cum sulphure & bitumine vnâ coctis: commanducata verò dentes mobiles, aut in aceto decocta. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant. Et ricinos canum necant.

DE CHAMAEPITY.

CAP. CCCXL.

NOMINA.

αμμουίτις Græcis, Aiuga sine Abiga, X antore Plinio, Latinis dicitur, Inuenitur & Ibiga vocari, quod nomen, Hermolao Ibiga. teste, ferè seruât hodie Illyrici. Hinc abiectionis duab. literis i & g, Iba, & ab Aiuga abiectione literarū & & g, Iua manauit in vulgi nomenclatione. Offi- Iua. cine Iuā cognomēto muscatā appellant, Germani
ye len-

PLANTARVM HISTORIAE

Chamapitye lenger ye lieber (*Galli lue Muscate.*) *Cæ-*
tys unde *terum Chamapitys* dicta est, quasi *humilis* & bre-
 dicta. *uis, humiq;* depressa *picea*: nam eius folia *piceam* o-
Abiga lent. *Abiga* verò vocata propter abortus, quos, edu-
 quare vo^c cendis iis quæ in utero sunt, excitare solet.
 cata.

GENERA.

Prima. Tria eius sunt genera. Vna foliis *Sedi* seu *Aixoi*,
Alter. quam nos *femina* fecimus. *Alter* ramis ancho-
Tertia. ra modo incuruis, quam nondum vidimus. *Tertia*
mas dicitur etiam *Dioscoridi*. Harum discrimina
 è descriptionibus certius cognosces.

FORMA.

Prima, herba est per terram serpens, subcurua,
 folia minori *Aixeo* similia habens, multò tamẽ te-
 nuiora, pinguiora: hoc est, vt *Serapion* interpreta-
 tur, super se plus humiditatis tenacis habentia, &
 hirsuta, circa ramos frequentia, odore *piceæ*, flores
 exiguos, luteos aut candidos, radicem *Cichorij*. *Al-*
tera cubitalibus est ramis anchoræ modo incuruis,
 tenuibus, coma supradicta simili, flore candido, se-
 mine nigro. Olet autem & ipsa *piceam*. *Tertia*
 quæ mascula appellatur, herbula est foliolis, tenui-
 bus, candidis & hirsutis, caule aspero, cándido, flos-
 culis luteis, semine secus alas pusillo. *Piceam* &
 hæc olet.

LOCVS.

Sua sponte, quòd sciam, in *Germania* non proue-
 nit. Nunc tamen in hortis plantari cæpit. *Plinius*
 tertiana

tertiam in petris nasci tradit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Chamæpitys gustu quidem amarum saporem ascribi validiorem obtinet. Est autem in calefaciendo secundi, in siccando verò tertij ordinis.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia primæ septem diebus in vino pota, regio morbo medentur. Quadraginta verò ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter iccinososis, vrinæ difficultatibus, & renū vitiis. Profunt etiam torminosis. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis data aluum emollit. Excepta melle, squama æris, & resina, purgat. Apposita ex melle, ex vtero ducit. Mammarum duritias discutit. Vulnera glutinat. Vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet. Secunda & tertia eandem vim obtinent, non tamē vsque adeo efficacem.

EX GALENO.

Effectu expurgat Chamæpitys, abstergitq; viscera plus quam calfacit, Proinde regio morbo correptis, & omnino quibus facile iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tñ pota, tum apposita cum melle. Sed & vrina mouēda

PLANTARVM HISTORIAE

da aptum est medicamen. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis decoctam in melicrato. Herba porro ipsa viridis magna vulnera conglutinat, & vlcera putrescentia sanat: Mammarum præterea durities discutit.

EX PLINIO.

Profunt aduersus scorpionum ictus. Item iecinori illita cum palmis aut cotoneis. Renibus & vesica decoctum earum cum farina hordeacea. Morbo quoque regio, & vrina difficultatibus, ex aqua decocta bibuntur. Nouissima contra serpentes valet cum melle. Sic & appesita vulvas purgat. Sanguinem densatum extrahit pota. Sudores facit, perunctis ea. Peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulae, cum ficu aluum trahentes. Lumborum quoque dolorem victoriati pondere in vino finit, & insim recentem. Mortuos foetus ex acetato cocta potaque, eiicere protinus dicitur.

APPENDIX.

Officina-
ri error.

Recentiores herbarii, & magna officinarum pars, aliam Chamapityn ostendunt, folio Salvia rimoso, angustiore tamen, & ad radicem maiore, flore subcandido ac luteo, & semine nigro: quæ tamen legitima Chamapitys non est, sed prima potius Sideritidis, ut suo diximus loco, species. Desinant igitur subinde hac herba pro Chamapity vera uti, ac illius loco has quarum nunc picturas damus usurpent. Erroris autem huius nulla alia fuit causa, quam

quàm quòd Chamæpitys etiam veteribus alio nomine dicta sit Sideritis. Hinc plerique decepti eā herbā quæ priuatim ac propriè sic nominatur, pro Chamæpity vſurpare cœperunt. Sideritis autē nulla alia de cauſa dicta eſt Chamæpitys, niſi quòd illi vulnera glutinandi inſit facultas.

DE PSYLLIO. CAP. CCCXLI.

NOMINA.

Ψύλλιον Græcè, herba Pulicaris Latinè, nomē Græcum in officiis retinet, Germanicè Pſyllienkraut (Gallicè Herbe à Puces) nominatur. Tam Græcam autem quàm Latinam appellatio-
nem à pulice, cuius effigiem ſemen eius reſert, ſortita eſt herba. Vcl, vt nonnullis videtur, quia ſi viridis in domum feratur, generari in ea pulices prohibeat. Pſylliū vn de dictum

FORMA.

Pſyllion folia Coronopo ſimilia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantaſ. Tota herba ad fœni graminisve formā accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in ſummo cōtracta conuolutaue, in quibus ſemen pulicibus ſimile, nigrum durumque.

LOCVS.

In aruis & incultis naſcitur. Nuſquam tamen, quòd ſciam, in Germania niſi ſatum prouenit.

TEMPVS.

Flores tota ſerè æſtate ex capitulis eius, quæ ſpicæ formam obtinent, crumpentes dependent, canis-

PLANTARVM HISTORIAE

no capiti haud dissimiles, vt pictura abundè monstrat. Semen verò autumnoprofert.

TEMPERAMENTVM.

Semen eius ex secundo refrigerantium est ordine, in desiccando verò & humectando mediū quod Mesues dammodo & symmetrum. Commentum Mesues de cōmentū. substantia eius interiore calida nihil moror.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vis Psyllio refrigeratoria. Cū rosaceo, aceto, aut aqua illitum articulorū doloribus, parotidibus, tuberculis, oedematis, luxatis, capitisq; doloribus prodest. Enterocœlis seu intestinorū ramicibus puerorum, & vmbilicis prominentibus cum aceto illitū medetur. Oportet autem acetabuli mensura tusum in aqua heminis duabus madere, & vbi aqua concreuerit illinire: egregiè siquidē refrigerat: deiectū enim in feruentem aquam, calorem eius reprimat. Prodest erysipelatis. Perhibent si viridis domū importetur, prohibere ne in ea fulices generentur. Tusa cum adipe, sordida & maligna vlcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas, & vermiculosas conducit.

EX PLINIO.

Vis ei ad refrigerandum ingens. Semen in vsu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextario aqua densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinem illinere oportet cuiuscunque

cunq; dolori, & collectioni inflammationiq;. Tenas-
mo in aqua cū radicib. decoctum medetur. Omni-
bus articolorum morbis salutare est huius semē ma-
defactū in aqua, admistis in heminā seminis duo-
bus resina colophonia cochlearibus, thuris vno.

DE PSEVDONARDO.

CAP. CCCXLII.

NOMINA.

Yeuδovapdos Gracē & Latine nominatur, Pseudonardus
quod scilicet nō sit vera & genuina Nardus, dus vnde
cuius Dioscorides & alij veteres meminerunt. dicta.

GENERA.

Duam cernitur generū. Alterum procerius est,
& maiorem spirat odorem, nec minus quam Nar-
dus placet. Hoc nos Pseudonardum mare diximus.
Officina & vulgus herbariorum Spicam à spica Spica.
tis floribus nominant, Germani Spicanardi (Galli
du Narde, ou Aspic.) Alterum amplitudine &
odore minus, quod nos Pseudonardum feminā ap-
pellauimus. Officina & herbarij recentiores Lauā Lauandu-
dulam vel Lauendulam, eo quod balneis & homi- la.
num lauacris expetatur, elotāque omnia si permi-
sceatur odoris commendat suauitate, vocant. Ger-
mani ad hoc nomen alludentes Lauendel (Galli
Lauende) nuncupant.

FORMA.

Frutex est folio crassiore, carnosio, angusto colore
PP languido,

PLANTARVM HISTORIAE

languido, in candidum vergente, piloso, frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis in spica ferè caeruleis, in Lavendula autem purpureis.

LOCVS.

Gaudent apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, vt penè flores odoris incunditate vincant, qua dote vestibus inferuntur.

TEMPVS.

Vtraque perpetua coma exitu veris canescit, In nio & Iulio mēse spicatur, floribúsque pragnās est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccet ordine secundo, tenuibúsque constat partibus, hand multum à natura Celtica Nardi dissidens.

VIRE S.

Antiquus manuscriptus herbarius easdem ferè facultates Pseudonardo, quas Celtica habet, tribuit, dum in hunc modum scribit: Stomachi dolorem frigidum eiusdem inflationes, uteri dolores, lienis duritiē, iecinorisque obstructions tollit. Strāgarie & difficultati vrina auxiliatur. Capiti admota calefacit, eiusque humiditates exsiccat. Hinc est quod recentiores tantisper eius vsum in frigido cerebri & neruorum morbis, apoplexia, paralyti, & similibus commendent.

Sequentia duo Capita, quoniam opere ad finem iam ferè perducto, in exēplari Ger-

manico

manico circa finē serò inuenimus, & nos ea suo loco reponere non potuimus. Bono igitur animo candide lector, hæc in fine accipe.

DE DIGITALI. CAP.

CCCXLIII.

NOMINA.

Quòd appellatione tum Græca tum Latina herba hæc hodie destituta sit, nulla alia de causa factum existimamus, quàm quòd veteribus incognita fuerit. Nos pulchritudine eius illecti, & ὡνυμῶν esse diutius non sumus passi. Appellauimus autem Digitalem, alludentes ad Germanicam nomenclaturā Fingerhut, sic enim Germani hanc stirpem nominant, à florum similitudine, quæ digitale pulchrè referunt ac exprimunt. Hac appellatione utemur, donec nos vel alij meliorem inuenerint.

Digitalis.

GENERA.

Duūm est generum. Vna enim purpureos obtinet flores, idcoque Digitalem purpuream appellauimus. Germanis Brauner Fingerhut dicitur. Altera luteos habet flores, ob id Digitalis lutea dicta nobis est. Germanis Geeler Fingerhut nominatur. In aliis per omnia similes sunt.

Digitalis purpurea.

Digitalis lutea.

FORMA.

Herba est cubitalis, foliis latius & oblongis, Plā-

PP ij tagini

PLANTARVM HISTORIAE

tagini non dissimilibus, in extremitatibus serratis, floribus à lateribus caulis ordine dependentibus digitalis formam referentibus, purpureis aut luteis. Quibus decidentibus, semen in calycibus latū & oblongū profert. Radix illi est exigua & capillata.

LOCVS.

Nascitur in montibus, vmbrosis & saxosis locis.

TEMPVS.

Floret Iulio potissimum mense, atque subinde cadentibus floribus semen producit.

TEMPERAMENTVM.

Impense amara est herba, perinde atque Gētiana, vt hoc nomine calidam & siccam esse evidētissimum sit.

VIRES.

Hæc herba haud dubiè quum opus est extenuatione, abstersione, purgatione, & obstructionis liberatione efficax admodum esse solet. Nam, vt testatur Galenus libro quarto de simplici. medic. facult. cap. xviij. amari sapor es absterunt, expurgant, & quæ in venis est, crassitiem incidunt. Quamobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, & ex thorace & pulmone pus educere. Quid multa? potest hæc herba ferè omnia quæ Gentiana, cuius vires suo in loco inuenient studiosi.

DE OCIMASTRO. CAP.

CCCCXLIIII.

NOMINA.

Quomoidēs Gracis, Ocimastrum Latinis dicitur. Officinis inusitatum atque incognitū. Germanis Vuild Basilg, (Gallis Basilic saulua=ge) appellatur, Ocimoides vero Gracis haud alia Ocimoi=ratione dictum est, quā quòd Ocimo, suis potissimè des cur di= mum foliis simile sit. Ocimastrum autem Latini, etum. quasi sylvestre Ocimum appellauerunt. Nam sic i= Ocima=psum vocare videtur libro vigesimo capite decimo= strum, Syl=tertio Plinius. uestre Oci=

FORMA.

mum.

Folia habet Ocimo similia, ramulos dodrantales, eosdemq; hirsutos, siliquas Hyoscyamo persimiles, semine nigro plenas, Melanthio seu Nigellæ simili (legendum enim in Dioscoride τοῖνός, & uò Dioscori= τοῖνός, ut habent aliqua exemplaria.) Radix dislocus illi est gracilis & inutilis. Ex qua quidem delineat= emendat=ione omnibus palam fit, stirpem, cuius effigiem at=tus. que picturā damus, esse Ocimastrum: siquidē folia fert Ocimi, ramulos palmares & quadratos (quod Dioscorides omisit) hirsutos, flores purpureos (quos itidem Dioscorides non explicauit) forma Ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, distant: decidētibus floribus siliquas Hyoscyamo similes, seminis nigri, Melanthio similis, plenas ostendit. Radice etiam nititur tenui & superuacua. His omnibus etiam accedit odor, qui planè

PLANTARVM HISTORIAE

Ocimum referre videtur: ita vt nemo dubitare debeat, quin haec herba verum sit Ocimastrum, potissimum cum illi Dioscoridi descriptio sic quadret, vt nulla prorsus nota reclamare videatur.

LOCVS.

Nascitur arenosis in locis. Copiosè autem iuxta Nirtingam ad Nicerum oppidulum prouenit, vbi id ipsum primum vidi, ac reperi: aliàs, quòd sciam mihi nunquam visum.

TEMPVS.

Floret in fine Septembris & Octobri mense, atque simul in siliquis semen profert.

TEMPERAMENTVM.

Ocimastrum, maximè eius semen, est calida & sicca temperatura, quod sapor etiam satis ostendit, qui cum modica adstrictione amarus est.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen Ocimastri in vino potum, medetur viperarum & aliarum serpentium moribus. Ischiadicis datur cum myrrha & pipere.

EX GALENO.

Ocimoides quidem philiterium cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

EX PLINIO.

Syluestri ocimo vis efficacior ad eadem omnia, quae satiuo. Peculiaris ad vitia quae vomitionibus
crebris

crebris contrahuntur. Vemicisq; vulua, contraq; be-
stiarum morsus radix in vino est efficacissima.

APPENDIX.

Vel sylvestre Plinij Ocimum diuersum est ab
Ocimaestro, aut in verbis eiusdem iam productis,
error subest. Quum enim Ocimaestri radix, Dios-
coridi & Galeni testimonio, inutilis sit, non recte
à Plinio dicitur quod eius radix in vino contra be-
stiarum morsus efficacissima sit: sed hoc potius, Dios-
coride teste, semini tribuendum erit. Quare in Plinio legendum, contraque bestiarum morsus semen
in vino est efficacissimum. Quam sanè lecticem

Plinij lo-
cus emen-
datur.

Dioscoridis autoritas abundè confirmat, qui
Ocimaestri semen cum vino potum, con-
tra viperarum & aliorum re-
ptilium ictus efficax
esse tradit.

COMMENTARIORVM DE

Stirpium Historia finis.

PP iiij

EXPLI

EXPLICATIO QVA

R VNDAM VOCVM TOTO

hoc opere passim occurrentium, in quibus assequendis non admodum peritus lector hærere posset.

Acetabula.



Cetabula ab aceto denominata videtur: quauis alij ab accipiendo dictum putent, atque hinc est quod scribant acceptabulum: vasculaque fuerunt orbiculata, concava, sine marginis latitudine, quæ aceto plena ad intinctus ponebatur. Dehinc vox ad omnia alia quæ similem cõcauitatem habent, trās-lata fuit. Primumq; sic cõcavas partes in polyporū flagellis, quibus id animal nititur, & velut adminiculis fultū exurgit, nominauerūt. Trās-lata etiam vox ad fœminarū locos, vocaueruntq; acetabula venarū arteriarumq; ora, quæ in utrū feruntur hiātia. Translulerunt postremo etiā hoc nomen ad herbam, quam eā ob causam Acetabulū dixerūt, quod folia acetabulo similia in orbem circumacta, sensimq; sic vt sensum fallāt, in cõcavam lacunā descendit habeat, $\chi\gamma\tau\upsilon\lambda\eta\delta$ oues Græcè nominantur.

Acinus.

Acinus nō tātū grana interna vna, quemadmodū quidam existimant, sed totum fructū, qui ex succo,

succo, & parte quæ veluti caro est, & ex vinaceis,
 & ambiente forinsecus cute cõstat, significat. Testis
 Galen. qui lib. 2. de facultatibus alimẽtorũ sic scri-
 ptum reliquit: Acini corpus ex quatuor partibus cõ-
 stat, ex ea scilicet quæ eius veluti caro est: exq; hu-
 more per eam disperso, vnde vinũ: præterea ex nu-
 cleo, atque eo quod omnia hæc foris circũcludit mẽ-
 branoso tegumento. ῥᾶξ Græcis dicitur. Aculei, Aculei.
 quæcunque duriuscula in cuspidem turbinata pũ-
 ctionẽ infligũt spiculorũ modo, nominantur. Acus Acus.
 purgamentũ frumenti, leuissimũ scilicet in eo quod
 ventilabris extra aream iaculatur. Adnata, vel Adnata.
 Adnascentia, siue Appēdices, ramuli dicuntur quos
 caulis nonnunquam ex se mittit, quasi nouã adsciz-
 titiamq; prolem. Sic autem vocantur, quod quasi
 cauli adnascantur & superaccedāt. Græci πρῶτος-
 Φυῶδης, quod circũ caulem erũpentes accrescāt,
 appellarunt. Ale, cani inter caule, & ramulos an Ale.
 fractus, vnde sinuatim noua proles egreditur, facta
 ab humanis alis trãslatione, dicuntur. Græci πρῶ-
 τος ῥᾶξ vocant. Alabastra sunt seruandis odoribus Alabastra
 ex solidissimã & frigidissimã materia facta
 vascula, sic dicta græcis, quod ob leuorem suã capi
 tenerique manibus non faciliẽ possent, lubricaq; dila-
 berentur. Hinc alabastrites lapis quẽ nunc Alaba-
 strũ vocant, quoniã ex eo alabastra fierent, denomi-
 natus est. Aluta pellis seu coriũ dicitur postquam Aluta.
 ad

VOCVM DIFFICILIVM

ad vsum & opus calceorum & aliarū rerū concinnatum est. Hinc Alutamen, siue alutamentū, opus ex cōcinnatis pellibus factum. Et Alutarj, pellium

Alsiōsa. & coriorum concinnatores. Alsiōsa non dicuntur ea quæ frigidis locis gaudent, sed cōtrā potius quæ

Amulcta. algores ferre non possunt. Amuleta remedia sunt præsentanea aduersus venena & fascinationes, quæ quidā in annulis, & è collo suspēsa gestare solēt,

Amphora Amphora mensura est quæ capit duas urnas, seu

Apices. octo congios. Apices quæ in medio calycis seu folliculi quo flos clauditur, erumpunt, stamina sunt, quæ veluti filamēta ab intimo floris sinu profiliūt. Habet apices sæpius in summo quidpiam crassiusculum,

Arbor. à qua similitudine nomen acceperunt. Arbor est quicquid à radice statim simplici caudice, brachiatum ramis, surculosum, dissolutuq; centum

Articuli. max assurgit. Articuli sunt partes quæ in nodos quosdā intumescūt, à quibus per sepe ramuli pdeūt,

Asparagi. Asparagi quæ primū in lucē prodeunt olerū germina, priusquā in folia explicentur, recentissimiq;

Arista. turiones qui edēdo sunt, dicuntur. Arista, est quæ vt acus tenuis, longa, eminet à gluma. In summa arista quasi apices & cornua sunt spicarum.

Bacca. **B**acca sunt fetus minutiores herbarum, fruticum, arborūve, qui dispersi rariū q; enascuntur: vt sunt partus lauri. Atque in hoc ab acinis

Brachia. differunt, quod ij densius proneniant. Brachia sunt plantarum,

plantarum, præcipuè autem arborum ramuli, quòd
instar brachiorum in homine extendantur. **Bul-** Bulbi.
bi radices sunt rotundæ tunicatæ, quales sunt hya-
cynthi, asphodeli, & colchici.

Cachryes sunt oblonga panicularum modò nu Cachryes
camenta, quæ squamatim compacta propen-
dent è ramis. Crescunt hyeme, vere dehiscunt in fla-
uescentes squamulas, & folio prodeunte, decidunt:
qualia in abiete, picea, & aliis permultiis videre li-
cet. Plinius pilulas nominat. Calathus est rectus Pilula.
turbo, hoc est, id quod ex angustis in latitudinem Calathus
se diffundit. Calathi effigiem planè referunt flores
liliorum. Calyx folliculus est, quo flos primum, Calyx.
mox seminis fœtus clauditur. Capillamenta Capilla-
mentum particula teretes & oblongæ in capilli modum ex-
tenuatæ dicuntur. Caput est id quod sursum de- Caput.
orsumve in globum extuberat, aut in orbem glome-
ratur. Si magnitudine cesserit, capitulum nomina-
tur. Extremâ tamen vitis partem caput etiâ vocant.
id est, ultimum & productissimum flagellum. Ca Capreoli.
preoli sunt coliculi intorti veluti cincinni quidâ in
ipsis pampinis tenerioribus apparètes, quibus vitis
veluti manibus quibusdam adminicula complecti-
tur, ac comprehendit. Ii enim vt vitem teneant, ser-
punt ad locum capiendum: vnde à capiendo capre-
oli dicti sunt. Caro dicitur id quod cortici subest. Caro.
Caudex dicitur in arboribus & fruticibus, id quod Caudex.
à radice

VOCVM DIFFICILVM

- Caulis.** à radice supra terram simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia. Caulis verò idem quod supra solum simplex profilit in herbis nominatur. Sic utique caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet.
- Cervix.** Cervix est pars illa à capitis radicibus prodiens, prælonga, teresque:
- Cyathus.** sic dicta, quòd in colli speciem figuretur. Cyathus Græcis ἀπὸ τοῦ χύειν, id est, à fundendo dictus, est duodecima pars sextarii.
- Cymæ.** Cymæ herbarum delicatiores tenerioresque coliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferunt. Nam cum vernum tempus appetit, primo quoque foliorum pullulatu, præclusis adhuc florum calycibus, quosdam quasi turiones, olus subministrat, in quibus floris primum, mox seminis fœtus concluditur.
- Cirri.** Cirri sunt capillamenta quæ contorta crispantur. Clavicula coliculi sunt, quibus quasi manibus proreptans vitis adminicula comprehendit.
- Clavicula.**
- Coma.** Coma est quicquid hilari venustate crinũ modo, summa ramorum vel coliculorũ exornat.
- Congius.** Congius, qui Græcè χοῦς dicitur, sex sextariorum capax mensura est. Eadem etiam congiarium appellatur. Conus Græcis, vel pyramus, est inuersus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arctius protrahitur ac fastigiatur. Cui calathus, vt diximus, contrarius existit. Cor est quod in medio ligni residet, & tertium à cortice continetur, velut in ossibus

bus medulla. Ab aliis *matrix*, à nonnullis *medulla Matrix*. nominatur. *Corymbus* est *hederarum* *vua depen*. *Corym*. *dentibus acinis coacta*. Transfertur tamen ad *mul bus*. *tos herbarum fructus*. *Cortex* pars est *ultima à Cortex*. *subiecto corpore separabilis, veluti crusta quædam* *ad tegendum data*. *Cotyle* vox est in *Græcia na*. *Cotyle*. *ta, nam Romani hemina vocabulo vtuntur*. Vide in dictione *Hemina*. *Crenæ* sunt quædam in *ex*. *Crenæ*. *tremis oris incisuræ, à quibus crenata herbarum fo* *lia vocantur, hoc est, serratæ, per ambitumq; secta*.

Cubitus est *mensura quanta patet à cubiti flexu*. *Cubitus*. *ra vsque ad summum medium digitū, quæ sex pal* *mis, digitisve vigintiquatuor constat*. *Culmus* fru *Culmus*. *menti calamus est, qui spicam sustinet*.

D *Ecussis antiquis ad X literæ figuram fiebat, Decussis*. *quæ apud Latinos decem significat. Hinc de* *cussari est in speciem literæ X diduci*.

Dilutum dicitur, quod est *mixtum: unde vinum Dilutum*. *aqua mixtum dicitur dilutum. Dilutum verò sub* *stantium factum, est id liquidum, in quo aliquid* *certo tempore maceratum & infusum fuit: vt si in* *vas vini appositū absinthiū fuerit, deinde post in* *teriectū tempus abstractū, id vinum absinthij dilu* *tum vocatur*. *Dodrans* est *mensura duodenūm di* *gitorum. Aliàs palmus maior Latinis, & Græcis Dodrans*. *αἰθραμῖν* dicitur. *Dodrantis* itaque *cauliculus* *vocatur, qui longitudine duodenos æquat digitos*.
Echinus

VOCVM DIFFICILIVM

- Echinus.** **E**chinus est quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen fuerit: sic dictus quod globoso spinarum agmine maris herinaceum mentiatur.
- Fibra.** **F**ibra capillamentis germana sunt, quae herbarum arborumq; minutiores sunt radicle, in quas velut extremas, crassiores effusa sparguntur.
- Fimbria.** Fimbriae sunt vestium extremitates, à quibus & fimbriata folia dicuntur, quae in ambitu in quasdam
- Flagella.** fimbrias exeunt. Flagella dicuntur cymae arborum & ipsarum summæ partes, quae ad cuiusque venti flatum mouentur: unde etiam nomen traxerunt ab eo quod flatibus petantur. Flagella etiam sunt vitium rami oblongiores, & productiores, aliis tamen minores, ab ipsis brachiis sursum ascendentes: dicta flagella prius, à venti flatu scilicet.
- Folliculus** **Folliculus** theca rei cuiuslibet, quae granum vel semen continet inuolutum. Sic membranosa cutis acini folliculus dicitur.
- Fructus.** **Fructus**, quod carne & semine compactum est. Frequenter tamen pro eo, quod in uolucro perinde quasi carne & semine coactum est, accipi solet.
- Frutex.** **Frutex** est quod à radice caudice multiplici, ramosumq; sese attollit, ut rubus.
- Frons.** **Frons** interdum pro ramo ponitur. Proprie tamen dicitur id quod ipse ramus circumquaque producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis, ac veluti cauliculi.

Gemma

Gemma in vite idem est quod oculus, quia ve
 Gluti ocellus quidam conspicuus, aut gemma
 quædam excellens conspici possit, cum primum è
 vite prodit, aut sarmento. Hæc inuenite vere sese os
 tendit, & ab ea primum flos, deinde fructus pro
 dit tam in ipsis vitibus, quam arboribus. Geni-
 culi siue genicula sunt nodi qui in herbis, aut legu-
 minibus, aut etiam sub fruticibus apparent. Sic ge-
 niculate radices nominantur, quæ nodis quibusdam
 interstinctæ protuberant, rotundæ & leuiter capi-
 tulate. Gluma est folliculus grani quod in spica
 continetur, vel grani theca. Grossi appellantur
 fici, quæ non matureſcunt. Priuatim tamen in bisce-
 ra fico e. is intelligunt, quæ per messes maturantur,
 Has grossulos Græci vocant ὀλύνθους.

Gemma.

Geniculi.

Gluma.

Grossi.

Hemina Romana vox est, ex Græco quidem
 ἥμισυ, quod dimidia sextarii pars sit, deri-
 uata. Græcis ἡμίλη nominatur. Caput uncias de-
 cem mensurales, vt copiose in annotationibus no-
 stris in quartum de Tuenda sanitate librum Gale-
 ni demonstrauimus. Herba est quod à radice for-
 liatum, sine caudice provenit, sæpiusque semen in
 caule fert.

Hemina.

Herba.

Internodium, quod inter artus vel genicula me-
 Idium intercedit, dici consuevit. Interuenium, dium.
 quod inter venas intercipitur. Iuba est arundina-
 cea coma effusa, qualis in milio est: metaphora de-
 sumpta Iuba.

Internod.

Idium.

Interue-

nium.

sumpta Iuba.

VOCVM DIFFICILIVM

Iulus. sumpta à iubis, hoc est crinibus animalium à collo pendentibus. Iulus tam Græcis quàm Latinis est quod in corylo compactili callo racematim cohaeret, & veluti praelongus vermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit.

Lachryma. **L**achryma est is humor, qui statim defecto caudice, vel ramo, aut tantum ipso ligno, profilit,

Lanugo. & apparet. Lanugo in herbis atque arboribus lanata quaedam est hirsuties, qua folia, coliculi que ca-

Liber. nesciunt. Liber pars corticis interior quæ ligno pressius adheret. Is quibus scribimus libris nomen ded-

Libra. dit. Libra Romana capit uncias duodecim men-

Ligula. surales. Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc

Locula. est, semuncia, demptis scilicet duobus scriptulis.

Loculamenta. Loculamenta sunt seminum inuolucra, quæ velus-

Lomentum. ti parvæ capsulae ea recludunt. Lomentum faba-

Lacinia. rum farina est. Lacinia partes sunt extremae par-

ticulatim decoris causa concisæ, orarumque summa-

rum casurae. Inde folia membratim per flexuras di-

gesta, vel natiuis segminibus discreta, laciniata vo-

citantur. Sunt tamen qui lacinosum pro sinuoso vo-

surpent.

Malicorium. **M**alicorium est mali punici putamen. Mal-

Malleolus. leolus novellus est palmes immatus prioris

anni flagello, cognominatus à similitudine rei, quod

in ea parte qua deceditur ex vetere sarmento, pro-

minens utrinque malleoli speciem præbet. Vel, quod

capilla-

capillatus vtrunque, & surculatus solebat feri. Ma Matrix.
 trix, vide in dictione Cor. Medulla, vide ibi Medulla.
 dem. Mucro est acumen in quod pars quacunque Mucro.
 desinit. Sic foliorum multorum, siliquarum quarun-
 dam, & spinarum omnium extrema in mucronem
 acuminantur. Muscus est id quod in ipsa corticis Muscus.
 superficie quarundam arborum lanuginosum appa-
 ret, veluti cani quidam ipsarum arborum villi. In
 quibusdam etiam quadam ipsarum arborum qua
 visitur villosa flosculorum congeries, qua quod con-
 ferta sit densaque florescat, muscus dici consuevit:
 vt in Ligustro, & complurib. aliis. Muscaria sunt Muscaria
 in orbem radiata herbarum coma, cacuminaq; in fa-
 sces coacta: à flabii similitudine, cuius ventilatu
 musca conuiuiis abiguntur, dicta.

Vcamenta dicuntur ea quæ callo squama- Nucamen
 N tim compactili pendent e ramis nucum, ro- ta.
 borum, picearum: sic dicta, quod sint quasi
 quadam naturæ rudimenta, pineam nucem face-
 re condiscantis.

Oculus gemmula illa in herbarum surculis, prie Oculus.
 mum germinationis argumentum dicitur.

Alma dicitur maius vitis flagellum, vnde Palma.

P nascuntur vnae. Palmus veteribus duplex Palmus.
 fuit. Minor digitorum quatuor habebatur,
 Græcis τετράδακτυλος vocatus. Maior digitorum duos
 decim, δωδεκάκτυλος Græcis dictus. Palmites dicuntur Palmites.

Q Q tur

VOCVM DIFFICILIVM

tur qui è stirpibus ac surculis quotannis prodeunt:
sic nominate, quòd in modum humanarum palma-

Pampini. rum virgulas quasi digitos edant. Pampini sunt
frondentium ramusculorum coma coliculiq; fructu
fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria.
Hinc pampinare, est pampinos superfluos ex vinea

Panicula. detrahère, posteaquàm fronduit. Panicula dici po
test quicquid sublonga vel subrotunda effigie tumet
vt quæ pendet è picearum ramis. Lanosam quos
que comam in milio, panico, arundine, & qualem
in aruis complures herbae, & in palustribus iunci

Pappus. gerunt, Latini paniculam dixere. Pappus tam
Græcis quàm Latinis est lanugo ex floribus aut fru
ctibus decidua. Sic etiam lanosi quidam villi, qui
deflorescentibus aliquot herbis remanent, & post
modum in auras euanescent, pappi sunt, vt in sene

Pediculus cione, soncho, & plerisque aliis fit. Pediculus, siue
quod idem habetur, Petiolus, id est quo folium, fru
ctus, aut flos dependet. Pedamenta quibus stat
ta. recta vinea dicuntur, hoc est, quibus veluti pedibus

Pilula. nititur. Nominantur etiam à quibusdam pedamis

Pyramis. na. Pilula, vide Cachrys. Pyramis, vide Conus.

Propago. Propago dicitur vitis vetula depressa, atque in ter
ram per inflexos arcus submersa, vt ex vna plures
Pulpa. emergant. Pulpa in arboribus est, quod nos in a-

Puluinus. nimalium corporibus musculū appellamus. Pul
uinus est quod inter sulcos eminulum protumet, sic
dictus

dictus quòd quandam referat puluinorum in quibus sedemus, similitudinem.

Q Vincuncialis figura, eius figura quæ decussim antiquis significabat, media est. Fiebat verò decussis ad X literæ formam, quæ quidem apud Latinos decem significat. Atque hæc si per mediū secetur, remanebit V figura, quæ quinarium numerum, atque adeo quincuncem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tum superius, tum etiā inferius multiplicata, figurā facit, quæ quincuncialis appellatur. Talem planè Trichomanis cauliculi efficiunt.

Acemus pro vna accipitur. Neque tantum Racemus

R ipsius vitis est, sed etiam hedera, & aliarum herbarum, aut fruticum vuas quasdam producentium. Dicitur etiam ramosum id, quo dependunt acini. Rami sunt, qui in caule fissi multiplices sparguntur.

Armenta prælongæ sunt vitium virgule, in Sarmenta

S quas vitis luxurians spargitur: hoc est, vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tādum sunt in ipsa vite, quàm dū exēcta, & exēpta sunt. Scapus est caulis qui in styli modū sursum proreptat, aut in altū fertur, ducta à colūnaribus scapis similitudine. Scopus ramosum id, quo dependunt acini. Sesqui vocabulum cū aliqua men sura vel modi, vel numeri, vel tēporis collocatum,

QQ ij non

VOCVM DIFFICILIVM

non integrum modò id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sesquilibra, libram vnā & semis significat. Sesquimensis, integrum mēsem

Sextarius cū dimidio. Sextarius capit vncias viginti men-

Siliqua. furales. Siliqua tegumentum est, quo vel grana leguminum, vel herbarum semina concluduntur.

Nam non modò legumina, sed & complures quo-

Sinus. que & herbe & frutices siliquas proferunt. Si-

Spica. nus alarū causa sunt. Spica est quod culmus extulit. Hāc antiquitus rustici specam vocabant, &

à spe videtur nominata: eam enim quòd sperant fore, serunt. Tria verò continet, gransum, glumam,

& aristam. Spica mutica est, quæ non habet ari-

Spongia. stam. Et mutica, quasi mutila nominatur. Spon-

gias antiqui olitores vocarunt radículas illigatas & connexas. Hinc Asparagi sativi & altilis ra-

dices multis irretitæ capillamentis coalescentes, & inter se implicatæ, ac quasi in vnitatem coeuntes

spongiole, & spongie spongiosæq; appellantur.

Stamina. Stamina sunt qui in medio calycis erumpūt apices: sic dicta, quòd veluti filamenta ab intimo floris

Stipule. sinu profiliant. Stipule folia sunt culmū ambien-

Strie. tia. Strie partes sunt quedam quæ protuberant et eminet. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi striis est præditus, aut striaturis exasperatus. Strigiles

Stolones. etiam, si Vitruvio credimus, appellantur. Stolo-

nes appellantur coliculorum soboles, inutilisque è radici-

radicibus fruticatio. Suffrutices sunt quæ com- Suffruti-
 pluribus ramulis surculis quæ lignosis scatent, sed mi ces.
 nutis constant foliis. Surculus, quod ex ramis sim Surculus.
 plex ac individuum oritur, estq; velut germē quod-
 dam ex ipso trunco vel caudice productum.

Thyrsus est caulis, idque nomen sibi vendica Thyrsus.
 uit, quod virgulæ in modum, vel teli rectitu-
 dinem consurgat. Tomentum Latinis omne id Tomentum
 quo culcitra ad molliorem & calidiorē quietem
 infarciuntur, dicitur, siue id lana sit siue pluma, si-
 ue quod voluerit aliquis, excipiendis molliter &
 & fouēdis calore corporibus nostris aptum. Sic Di-
 etamni folia, quod mollia videntur esse, tomentis-
 tia & lanca dicuntur à Dioscoride, hoc est, γυα-
 φαλοειδῆ. Tori prominentes partium calli, Tori.
 & in se pulparum modo collecti nominantur. Graeci
 κοῦδ' ὕλῃς vocant. Hinc κοῦδ' ὕλῳ δ' ἡς, id est,
 torosus, quod idem Latinis est, ac nodi formam præ-
 se ferens. Triens quatuor cyathi. Tunica est Triens.
 tenuis cortex & veluti mēbranaceus, quo vel ar- Tunica.
 bor, vel radix inuestitur. Sic cape folliculis est tu-
 nicatum. Turbo dicitur quicquid ex acumine tē- Turbo.
 dēs in amplius spaciatur. Hinc Turbinatum, quod
 ex angusto continenter in latius prodit. Sic turbi-
 nata conspicitur pyrorum forma. Per multa etiam
 herbarum folia in mucronem turbinantur.

Turiones sunt teneritates summitatum ipsarum Turiones.

¶ iij arborum,

VOCVM DIFFICILIVM

- Topiarium.** arborum, quæ singulis annis crescunt. Topiarium opus est quod ex arbore, frutice, vel herba ad decorem componitur, in testudines aut cameras fornicatum. Hinc Topiaria dici merentur arbores vel herba quæ nimirum huic operi, quod flexiles sunt, ac suo lentore sequaces, accommodantur.
- Vascula.** **V**ascula, seminum involucria sunt. Vena sunt
- Vena.** quæ in plantarum foliis apparent, & ramus
- Vermiculatus.** los & humorem habentes. Vermiculatum quod rose modo, quasi purpurisso, rutilat, dicitur. Ver-
- Verticillum.** ticillum florum vel foliorum ambitus, qui coliculos aut ramulos herbarum coronat, existit: ab instrumenti muliebris similitudine dictum, quod fuso vertendi gratia solitum est adhiberi. Vinacei, grana sunt acinorum, ῥῖγας Græci nominantur, quæ pressis vuis cum folliculo abiiciuntur.
- Virga.** Virga est quæ ex radicibus, aut caudicis lateribus exit. A nonnullis virga appellata sunt soboles.
- Virgultum.** Virgultum surculus is est, qui terra committitur, ut in arborem insurgat. Viticula non palmitibus aut sarmenta sunt, sed flagella quæ vitis modo reptantia longè latèque vagantur, ac vicinos frutices nata sic intricant eos, ut iis perinde quasi pedamentibus abutantur: vel scandentia suis irretiunt clauiculis, quibus quasi digitis hærent, quales in cucumeribus, cucurbitis, & plerisque aliis inveniuntur.
- Umbella.** Umbella est floris seminisve pedamentum, in
plures

plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti in latius continuo radiantur, singulique vel florem, vel semen sustinent, in orbem circumactum. Græci hunc floris habitum $\sigma\upsilon\lambda\lambda\acute{o}\delta\iota\sigma\upsilon$, Latini verò quoniam umbella, qua mulieres vultum vindicant à sole, & æstum arcent, circinam tam effigiem gerit, umbellam dixerunt. Umbilicus Umbilicid in pomis est, quod in eis medium vel prominet, cuius vel conditur. Vngues in rosis & foliatis floribus Vngues intellexerunt veteres, imas suorum foliorum partes, quibus in capite suo coherent, decoloresq; dependent. Vel brevius: Vnguis infima pars foliorum rosea alba appellatur.

ERRATA.

- Fo. 2. pag. 2. vers. penult. lege in hunc modum, hypochondrys iccinori &c.
- Fo. 3. pag. 1. vers. 13. lege, Eadem potest prestare cum Sapa aut lenticula.
- Fo. 5. pag. 1. vers. 19. lege, Plinius lib. 21. cap. 21. Marem quidem campestre &c. Ibidem vers. 22. legendum, eiusdem nomenclatura. expungenda itaque virgula post eiusdem. Ibidem vers. 25. lege, quod masculinum appellamus.
- Fo. 8. pag. 1. vers. 10. Ex Macro Aemilio.
- Fo. 11. pag. 1. vers. 11. lege, de Acoro vero affirmare.
- Fo. 12. pag. 1. vers. 22. lege, tubercula facultatem obtinet.
- Fo. 22. pag. 1. vers. 4. Sic legendum est, acris, ut piper, admodum sit.
- Fo. 25. pag. 2. vers. 15. cum axungia.
- Fo. 30. pa. 1. ver. 11. mollib. dūtaxat spinis pradita.
- Fo. 57. pag. 2. vers. 21. *ἑρυνία*
- Fo. 63. pag. 2. vers. 25. lege, *κνίδι*.
- Fo. 81. pag. 2. vers. 21. Ieiuno ieiunum.
- Fo. 99. pag. 2. vers. 12. *ἑλὶττον*.
- Fo. 106. pag. 2. vers. 7. *γλυκὺ ῥίζα*.
- Fo. 109. pag. 2. vers. 9. aspergula minor.
- Fo. 219 pag. 1. vers. 20. Hirundinariam.
- Fo. 392. pag. 2. minus contra minores.
- Fo. 395. pag. 1. vers. 15. suffitur.

